

# COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

## CARGO 16: MÉDICO DO TRABALHO

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 01/09/2024

### PADRÃO DE RESPOSTA

O diagnóstico desse paciente é de pneumonia adquirida na comunidade (PAC), cujo quadro clínico típico se caracteriza por febre, tosse produtiva com escarro purulento, cansaço aos esforços e estertores crepitantes em terço inferior do pulmão direito, leucocitose (demonstrada pelo hemograma) e infiltrados no lobo inferior direito (conforme radiografia de tórax).

Não há necessidade de outros exames. A radiografia de tórax em associação com a anamnese e o exame físico forma a tríade propedêutica clássica para PAC. Embora possa haver resposta inadequada a alguns tratamentos empíricos, a realização de testes etiológicos não é necessária nos casos de pacientes com PAC não grave com tratamento ambulatorial. O uso dos biomarcadores não deve ser tomado como um critério isolado para estabelecer ou modificar a conduta terapêutica.

Recomenda-se antibioticoterapia com amoxicilina ou amoxicilina + ácido clavulânico ou macrolídeos: azitromicina ou claritromicina.

O paciente deve ser tratado no regime ambulatorial, devido à ausência de variáveis de risco como confusão mental, ureia > 50 mg/dL, idade acima de 65 anos, frequência respiratória > 30 irpm, pressão arterial sistêmica < 90 mmHg, SatO<sub>2</sub> < 92% ou comorbidades associadas.

#### QUESITOS AVALIADOS

##### QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não estabeleceu nenhum diagnóstico ou estabeleceu diagnóstico correto.

Conceito 1 – Estabeleceu o diagnóstico parcialmente, mencionando apenas pneumonia.

Conceito 2 – Estabeleceu o diagnóstico corretamente, mencionando pneumonia adquirida na comunidade.

##### QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não justificou o diagnóstico ou o fez incorretamente.

Conceito 1 – Justificou parcialmente o diagnóstico, citando apenas um critério.

Conceito 2 – Justificou parcialmente o diagnóstico, citando apenas dois critérios.

Conceito 3 – Justificou o diagnóstico corretamente, citando os três critérios: clínico, laboratorial e radiológico.

##### QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não respondeu ou mencionou a necessidade de exames complementares.

Conceito 1 – Respondeu que não são necessários exames complementares, mas não justificou ou o fez incorretamente.

Conceito 2 – Respondeu que não são necessários exames complementares e justificou corretamente, mencionando que já foi cumprida a tríade propedêutica clássica para PAC.

##### QUESITO 2.4

Conceito 0 – Não respondeu ou não antibioticoterapia.

Conceito 1 – Indicou antibioticoterapia, sem especificar nenhum medicamento adequado.

Conceito 2 – Indicou um dos antibióticos corretamente.

##### QUESITO 2.5

Conceito 0 – Não respondeu ou o fez incorretamente.

Conceito 1 – Respondeu que o regime terapêutico é ambulatorial, mas não justificou ou o fez incorretamente.

Conceito 2 – Respondeu que o regime terapêutico é ambulatorial, mas justificou de forma incompleta ou parcialmente inconsistente.

Conceito 3 – Respondeu que o regime terapêutico é ambulatorial, justificando corretamente.

# COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

## CARGO 16: MÉDICO DO TRABALHO

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 01/09/2024

### PADRÃO DE RESPOSTA

Pneumoconioses são doenças pulmonares parenquimatosas causadas por inalação de poeiras, independentemente do processo fisiopatológico envolvido. São excluídas dessa denominação as alterações neoplásicas, as reações de vias aéreas, como asma e a bronquite, e o enfisema. São exemplos a asbestose, causada pela inalação do asbesto, a silicose, pela inalação da sílica, e a bagaçoze, pela inalação de bagaço de cana-de-açúcar.

Todo trabalhador exposto à poeira de sílica e(ou) portador de silicose deve realizar propedêutica para investigação de tuberculose e asbestose, que o predispõem a mesotelioma de pleura e câncer de pulmão.

Entre as provas de função pulmonar, a espirometria, pela sua praticidade e acessibilidade, é o exame mais importante na avaliação da disfunção provocada pelas pneumopatias. As principais medidas obtidas são: a capacidade vital forçada (CVF), que fica diminuída nas patologias pulmonares restritivas; o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), que fica alterado nas patologias obstrutivas; e a relação do VEF1 com a CVF.

#### QUESITOS AVALIADOS

##### QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não apresentou a definição da doença.

Conceito 1 – Definiu a doença de forma insuficiente ou parcialmente inconsistente.

Conceito 2 – Definiu corretamente a doença.

##### QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não apresentou nenhum exemplo da doença nem seus agentes relacionados ao trabalho.

Conceito 1 – Apresentou apenas um exemplo correto, sem mencionar seu agente relacionado ao trabalho.

Conceito 2 – Apresentou apenas um exemplo correto e seu agente relacionado ao trabalho.

Conceito 3 – Apresentou dois exemplos corretos, sem mencionar seus agentes relacionados ao trabalho.

Conceito 4 – Apresentou dois exemplos corretos, mas acertou o agente de apenas um deles relacionado ao trabalho.

Conceito 5 – Apresentou dois exemplos corretos e seus respectivos agentes relacionados ao trabalho.

##### QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não apontou mesotelioma de pleura nem câncer de pulmão.

Conceito 1 – Apontou apenas uma das complicações oncogênicas citadas.

Conceito 2 – Apontou as duas complicações oncogênicas citadas.

##### QUESITO 2.4

Conceito 0 – Não citou a espirometria.

Conceito 1 – Citou o exame, mas não acertou nenhum de seus parâmetros nem a classificação de doença restritiva nem obstrutiva.

Conceito 2 – Citou o exame e acertou parcialmente a classificação dos resultados, indicando um dos parâmetros do exame.

Conceito 3 – Citou o exame e acertou parcialmente a classificação dos resultados, indicando os dois parâmetros do exame.

Conceito 4 – Citou o exame e acertou totalmente a classificação dos resultados, indicando os dois parâmetros do exame.