

003. PROVA OBJETIVA

AGENTE UNIVERSITÁRIO DE EXECUÇÃO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

(OPÇÃO: 006)

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue suas provas e assine o termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 04:

Tempo do castigo

Quando eu era criança, ficava de castigo e ia para o quarto pensar. Perguntava quanto tempo e contava os segundos para sair. Até hoje acho essa punição interessante: “Pense no que você fez para conversarmos”. Mas, para ser boa, essa punição precisa ter um tempo combinado. O tempo, na época, me parecia justo por ser proporcional ao erro e ao amor de minha mãe por mim. Eu sabia que ela me amava, sabia que ia ficar um tempo ali e sabia que ia sair e poder falar com ela. Era um acordo.

Hoje temos um jeito adulto de punir: bloquear a pessoa no WhatsApp. Bloquear alguém que se ama é como colocar de castigo. “Você fez algo que não gostei, preciso de um tempo.” E aí vem o importante: quanto tempo é esse tempo? O tempo que pode ser o remédio que cura a relação ou o remédio que vira veneno.

O tempo de castigo era válido quando não trazia mágoa. Quando servia apenas para acalmar os ânimos. Quando era um tempo com a intenção velada da paz.

Quando se diz o que se quer nessa nova interação virtual e se bloqueia sem deixar que o outro responda, coloca-se o outro em um castigo cheio de angústia. E, na espera sem saber o tempo, a mágoa cresce, os argumentos perdem sentido.

Bloquear pode ser usado como um respiro para avançarmos, mas nunca como forma de evitar conversas difíceis, que são justamente as que permitem o amadurecimento que vem dos relacionamentos. As relações avançam nas discussões. O castigo da minha mãe sempre me trouxe uma oportunidade de uma relação mais próxima com ela, entendendo meus erros, e isso me trazia um profundo alívio.

(Alice Ferraz. *O Estado de S. Paulo*, 6 de dezembro de 2025. Adaptado)

01. A narradora é de opinião de que

- (A) o castigo materno imposto à criança e o castigo de bloquear, no WhatsApp, o adulto que se ama têm funções diferentes, independentemente do tempo de duração.
- (B) o tempo de castigo materno estabelecido era considerado desmedido frente à gravidade da falta cometida, critério atribuído à frieza de sua mãe.
- (C) o bloqueio, no WhatsApp, de quem se ama pode salvar um relacionamento se os conflitos existentes deixarem de ser discutidos por ambas as partes.
- (D) a destruição de um relacionamento adulto ocorre quando, depois do tempo suspenso, no WhatsApp, o sentimento de mágoa é deixado de lado.
- (E) os desentendimentos dos adultos podem ser superados, desde que se saiba o tempo de castigo e que as divergências sejam discutidas.

02. Assinale a alternativa cuja frase está redigida de acordo com a norma-padrão de concordância e de pontuação.

- (A) A punição que traz, bons resultados, têm o tempo combinado.
- (B) O erro e o sentimento de minha mãe, fazia com que o tempo, parecesse justo.
- (C) Existem, de acordo com a narradora, o tempo que cura e o tempo que destrói.
- (D) No castigo, de minha mãe, contava-se os segundos para sair.
- (E) No bloqueio pelo WhatsApp, haviam argumentos, que precisavam ser discutidos.

03. Assinale a alternativa em que a palavra em negrito estabelece, corretamente, a relação de sentido apresentada.

- (A) **Quando** eu era criança, ficava de castigo e ia para o quarto pensar. (1º parágrafo) – oposição.
- (B) **Até** hoje acho essa punição interessante: ... (1º parágrafo) – inclusão.
- (C) Bloquear alguém que se ama é **como** colocar de castigo. (2º parágrafo) – explicação.
- (D) Quando servia **para** acalmar os ânimos. (3º parágrafo) – finalidade.
- (E) Bloquear pode ser usado como um respiro para avançarmos, **mas** nunca como forma de evitar conversas difíceis. (5º parágrafo) – conclusão.

04. Há, no texto, uma frase cuja construção é própria da linguagem coloquial, mas desrespeita a norma-padrão de regência verbal. Assinale a alternativa que apresenta essa frase.

- (A) Pense no que você fez para conversarmos. (1º parágrafo)
- (B) ... sabia que ia sair e poder falar com ela. (1º parágrafo)
- (C) ... um jeito adulto de punir: bloquear a pessoa no WhatsApp. (2º parágrafo)
- (D) “Você fez algo que não gostei, preciso de um tempo.” (2º parágrafo)
- (E) As relações avançam nas discussões. (5º parágrafo)

05. Assinale a alternativa em que a frase está redigida de acordo com a norma-padrão de conjugação do verbo e do sinal indicativo de crase.

- (A) A filha dirigiu-se à sua mãe e **manteu** a palavra de que não cometeria mais o mesmo erro.
- (B) A mãe tinha **chego** à uma conclusão: a filha sentiria grande alívio quando abrisse a porta.
- (C) Mãe e filha **deteram-se** à conversar sobre a oportunidade de entender os erros cometidos.
- (D) Quando ela **vir** sua mãe dirigir-se à porta, poderá falar com ela e a paz será restabelecida.
- (E) Se a mãe não **intervis**se na educação da filha, assistiria à sério prejuízo na sua educação.

06. Para uma festa de confraternização entre funcionários de uma empresa, havia a necessidade de se distribuir 350 brigadeiros, 294 cajuzinhos e 238 olhos de sogra. Os responsáveis pela organização decidiram colocar esses docinhos no maior número de bandejas possível, de maneira que cada bandeja tivesse exatamente a mesma distribuição, ou seja, em cada uma deveria ter X brigadeiros, Y cajuzinhos e Z olhos de sogra. Realizada a distribuição dessa maneira, é correto afirmar que cada uma dessas bandejas recebeu um número de docinhos igual a

- (A) 42.
- (B) 51.
- (C) 63.
- (D) 75.
- (E) 77.

07. Ronaldo comprou um micro-ondas na loja Maior Desconto e conseguiu um desconto de R\$ 63,00, correspondente a 15% do preço original. Sua amiga, Regina, comprou o mesmo micro-ondas na loja Mais Barato e conseguiu um desconto de R\$ 28,00, correspondente a 8% do preço original.

A quantia que Regina pagou a menos do que Ronaldo na compra desse micro-ondas foi de

- (A) R\$ 38,00.
- (B) R\$ 35,00.
- (C) R\$ 32,00.
- (D) R\$ 29,00.
- (E) R\$ 26,00.

08. Considere a afirmação:

- Se a procura é exaustiva, então o problema não tem solução.

Uma afirmação que corresponda à negação lógica dessa afirmação é

- (A) A procura não é exaustiva ou o problema tem solução.
- (B) Se o problema tem solução, então a procura não é exaustiva.
- (C) Ou a procura é exaustiva ou o problema tem solução.
- (D) A procura é exaustiva, e o problema tem solução.
- (E) O problema tem solução se, e somente se, a procura não é exaustiva.

09. Tem-se a sequência de números racionais a seguir, criada com um padrão lógico matemático:

$$27; 18; 12; 8; \frac{16}{3}; \dots$$

Assim, é correto afirmar que o primeiro elemento dessa sequência, que é menor do que 1, ocupa a posição de número

- (A) 7.
 - (B) 8.
 - (C) 9.
 - (D) 10.
 - (E) 11.
10. Em uma sala, estão: Francisco, Rafael, Rogério, Milena e Cleonice. Essas pessoas farão um sorteio entre si, para escolherem duas desse grupo que irão à padaria comprar lanche para todas elas.
- A probabilidade de a dupla sorteada ser a Milena e a Cleonice é um valor entre
- (A) 3% e 7%.
 - (B) 7% e 11%.
 - (C) 11% e 15%.
 - (D) 15% e 19%.
 - (E) 19% e 21%.

R A S C U N H O

LEGISLAÇÃO

11. Imagine que Juçara é membro do corpo técnico-administrativo da UENP e há dois meses praticou uma infração disciplinar a qual, após o devido processo legal, foi apenada com advertência oral.

Com base na situação hipotética apresentada e no disposto no Regimento Geral da UENP, assinale a alternativa correta.

- (A) Em razão da pena disciplinar imposta à Juçara, pode-se afirmar que o reitor era a única autoridade competente para aplicá-la, sob pena de sua anulação.
- (B) A pena aplicada à Juçara deve ser anulada, pois em face da dignidade da pessoa humana não se admite mais a advertência oral, mas apenas a escrita.
- (C) A pena aplicada à Juçara só será considerada válida se tiver sido aplicada pelo diretor do campus.
- (D) Uma vez aplicada a penalidade à Juçara, ela deve ser comunicada para fins de registro na Pró-Reitoria de Recursos Humanos.
- (E) Em face do sigilo e do respeito à privacidade e à intimidade, dispensa-se o registro no prontuário de Juçara da penalidade que lhe foi aplicada.

12. Considere que a UENP é proprietária de dez imóveis localizados na cidade de Cornélio Procopio e, como cinco desses imóveis estão subutilizados, deseja-se aliená-los e utilizar o valor auferido conforme as finalidades da Universidade.

Com base na situação hipotética apresentada e no disposto no Estatuto da UENP, é correto afirmar que

- (A) a legislação proíbe a alienação de bens imóveis.
- (B) a alienação depende do voto favorável de dois terços (2/3) da totalidade dos membros do Conselho Universitário.
- (C) se admite a alienação dos imóveis e, com o valor auferido, a Universidade poderá adquirir bens, e isso é sujeito à tributação estadual.
- (D) a alienação dos bens depende unicamente da decisão pessoal e intransferível do reitor.
- (E) não cabe à Universidade a decisão a respeito da alienação dos imóveis, pois compete diretamente à Secretaria Estadual de Educação administrar o patrimônio da UENP.

13. Imagine que Carol é servidora do Estado do Paraná e atualmente está lotada na Secretaria Estadual de Educação, localizada em Curitiba. Como ela considera importante aprimorar sua qualificação profissional, deseja se matricular em um curso de aperfeiçoamento de três meses de duração, que será realizado em Londrina. No entanto, a distância entre o município em que é domiciliada e o local do curso é de mais de 300 quilômetros e não é viável fazer tal trajeto todos os dias.

Com base na situação hipotética apresentada e no disposto na Lei Estadual do Paraná nº 6.174/1970 (Estatuto do servidor público do Poder Executivo do Estado do Paraná), é correto afirmar que Carol

- (A) só poderá requerer a licença para frequência ao curso de aperfeiçoamento se tiver mais de dez anos no serviço público paranaense.
- (B) deverá procurar um curso de aperfeiçoamento que seja disponibilizado completamente por meio de plataforma *online*.
- (C) deverá procurar um curso de aperfeiçoamento que seja localizado em Curitiba e que seja ministrado em horário diferente do qual ela exerce suas funções.
- (D) só poderia requerer a licença para frequência de curso se fosse de especialização e não de mero aperfeiçoamento.
- (E) poderá obter a licença para frequência ao curso de aperfeiçoamento, mas desde que o aperfeiçoamento vise o seu melhor aproveitamento no serviço público.

14. Assinale a alternativa que está de acordo com a Lei Estadual do Paraná nº 21.583/2023 (Lei da Carreira Técnica Universitária das Universidades Públicas Estaduais do Paraná).

- (A) Para todos os casos, a promoção dependerá da comprovação de disponibilidade orçamentária e financeira e será devida somente após a publicação do respectivo ato de concessão.
- (B) O Adicional de Titulação é concedido ao servidor ocupante do cargo de Agente Universitário Profissional que possua o título de mestre, correlato com a sua área de atuação.
- (C) A Gratificação de Atividade de Saúde é cumulativamente compatível com o recebimento de gratificação de insalubridade e/ou periculosidade.
- (D) As promoções previstas na Lei nº 21.583/2023 passarão a integrar direito subjetivo do servidor a partir do requerimento administrativo, sendo os efeitos financeiros devidos a partir desta data.
- (E) O estágio probatório será de cinco anos de efetivo exercício no cargo, função e classe de ingresso, admitindo-se, excepcionalmente, a promoção para o servidor ainda em estágio probatório.

15. Suponha que Lara é servidora de uma Instituição de Ensino Superior do Paraná e acabou de completar o primeiro período aquisitivo para ter direito a férias. Como está há pouco tempo no cargo público, ainda não sabe os detalhes a respeito de tal direito e procurou um servidor público experiente, para saber se é possível parcelar as férias em quatro períodos.

Com base na situação hipotética apresentada e no disposto na Lei Estadual do Paraná nº 20.933/2021 (Lei Geral das Universidades Públicas Estaduais do Paraná), é correto afirmar a Lara que

- (A) as férias só poderão ser parceladas em dois períodos e que isso depende da aprovação do seu superior hierárquico.
- (B) o parcelamento das férias em até quatro períodos poderá ser determinado pelo superior hierárquico ou requerido por ela, mediante deliberação do reitor.
- (C) as férias poderão ser parceladas em quantos períodos ela desejar, desde que haja prévio acordo com a chefia imediata.
- (D) o parcelamento das férias depende de prévia aprovação do reitor e pode ocorrer em até cinco períodos.
- (E) as férias poderão ser parceladas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quinze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos cada um.

16. No ambiente de trabalho do MS-Windows 11, em sua configuração padrão, os atalhos são arquivos que funcionam como apontadores que direcionam o sistema para abrir um aplicativo, uma pasta ou um arquivo armazenado em outro lugar no computador. A extensão de arquivo que geralmente identifica um atalho nesse sistema operacional é:

- (A) .com
- (B) .exe
- (C) .lnk
- (D) .sql
- (E) .txt

17. A respeito da formatação de parágrafos em um documento que está sendo preparado como programa MS-Word 365, em sua configuração padrão, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo a seguir:

O recurso denominado _____ evita uma inadequada separação de parágrafos entre páginas. Nesse contexto, a _____ ocorre quando a primeira linha de um parágrafo aparece sozinha _____ da página, enquanto a _____ acontece quando a _____ permanece sozinha _____ da página.”

- (A) controle de quebras... linha viúva ... no topo ... linha órfã ... última linha ... na base
- (B) controle de linhas órfãs/viúvas ... linha órfã ... na base ... linha viúva ... última linha ... no topo
- (C) controle de recuos ... linha inicial ... na margem ... linha final ... primeira linha ... no rodapé
- (D) controle de parágrafos ... linha deslocada ... no fim ... linha isolada ... última linha ... no centro
- (E) controle de espaçamento ... linha órfã ... no topo ... linha viúva ... primeira linha ... na base

18. Considere uma planilha em processo de composição por um usuário do aplicativo MS-Excel 365, em sua configuração padrão, que teve suas células previamente preenchidas, conforme mostrado a seguir:

	A	B	C	D	E
1	2,9	3,6	4,3	5,0	5,7
2	1	2	3	4	5
3					
4					

Dando prosseguimento, esse usuário digitou a fórmula =ARREDMULTB(A1; A2) na célula A3 e, para preencher as células B3 a E3, utilizou a ferramenta de preenchimento que aparece no canto inferior direito da célula A3, depois de selecioná-la com um clique de mouse. Para finalizar, ele inseriu a fórmula =A3*MÉDIA(B3:E3) na célula E4, resultando nessa última célula o valor numérico

- (A) 1.
- (B) 3.
- (C) 5.
- (D) 7.
- (E) 9.

19. Durante a elaboração de uma apresentação com o MS-PowerPoint 365, em sua configuração padrão, um usuário adicionou um novo slide ao arquivo e, dentro dele, inseriu um conjunto de itens na seguinte sequência:

1. Retângulo;
2. Rodapé;
3. Equação.

Para realizar essa tarefa, o usuário precisou utilizar os recursos disponíveis, respectivamente, em quais grupos da guia Inserir?

- (A) Ilustrações, Texto e Símbolos.
- (B) Imagens, Links e Suplementos.
- (C) Mídia, Texto e Suplementos.
- (D) Imagens, Comentários e Mídia.
- (E) Ilustrações, Links e Símbolos.

20. Assinale a alternativa em que a URL do site indicado respeita o formato apropriado, tanto para especificar um protocolo seguro quanto para especificar um subdomínio.

- (A) blog://uenp.edu.br/
- (B) ftp://secure.uenp.br/
- (C) http://uenp.secure.br
- (D) imap://uenp.edu.br/
- (E) https://uenp.edu.br/

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O Decreto Federal nº 94.406/1987 determina, entre outras ações, que cabe ao técnico de enfermagem:

- (A) assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem.
- (B) realizar a prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, sob orientação do enfermeiro.
- (C) executar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
- (D) realizar a prescrição da assistência de enfermagem em conformidade com os protocolos aprovados pela comissão de ética de enfermagem implementados na instituição, sob orientação do enfermeiro.
- (E) executar o parto sem distócia e prestar assistência obstétrica em emergências.

22. Em relação à Comissão de Ética de Enfermagem (CEE), é correto afirmar:

- (A) sua criação e funcionamento é obrigatória em instituições públicas e privadas, independentemente do número de profissionais de enfermagem em seu quadro.
- (B) representa o Conselho Federal de Enfermagem na instituição na qual existe Serviço de Enfermagem, e tem como principal função fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem.
- (C) deve ser constituída por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 11 (onze) profissionais de Enfermagem, sempre respeitando o número ímpar de efetivos, de acordo com a proporcionalidade estabelecida em Resolução do COFEN.
- (D) em organizações públicas e autarquias, deve ser constituída por profissionais de Enfermagem, da categoria enfermeiro, designados para tal pelo diretor administrativo ou pelo enfermeiro responsável técnico (ERT) da instituição.
- (E) o mandato dos membros da CEE é de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois) anos, a critério da instituição.

23. Em um ambulatório de saúde, o técnico de enfermagem (TE) utilizará um aparelho eletrônico (técnica oscilométrica) para aferir a pressão arterial (PA) de um indivíduo adulto, eutrófico, com diagnóstico de pressão arterial normal alta. Para obter medidas fidedignas, entre outros cuidados, o TE deverá, selecionar o manguito de tamanho adequado e colocá-lo _____, no braço _____. A seguir, deverá realizar, pelo menos, _____ medida(s), observando entre elas um intervalo de _____. Caso verifique, pelo menos, uma diferença maior ou igual a _____ mmHg entre os valores obtidos, deverá realizar medições adicionais.

Considere as orientações do Ministério da Saúde (2025) sobre a realização do procedimento de medida da pressão arterial com aparelho eletrônico (técnica oscilométrica) e assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, a afirmação.

- (A) de 3 cm a 5 cm abaixo do ombro, sem deixar folgas ... esquerdo ... 2 ... 2 minutos ... 10
- (B) sobre a fossa cubital, deixando 1 cm de folga para conforto do paciente ... em que, anteriormente, tenha sido obtido o maior valor da PA ... 1 ... 3 minutos ... 10
- (C) de 2 cm a 3 cm acima da fossa cubital, sem deixar folgas ... em que, anteriormente, tenha sido obtido o menor valor da PA ... 1 ... 2 minutos ... 5
- (D) de 2 cm a 3 cm acima da fossa cubital, sem deixar folgas ... em que, anteriormente, tenha sido obtido o maior valor da PA ... 2 ... 1 minuto ... 5
- (E) sobre a fossa cubital, sem deixar folgas ... direito ... 1 minuto ... 1 ... 15

24. Ao realizar o curativo em uma ferida crônica na perna de uma pessoa idosa, o técnico de enfermagem verificou que a prescrição de enfermagem indicava o uso de cobertura de hidrofibra com prata iônica diretamente na lesão, após limpeza com soro fisiológico. Entre outras características, esse tipo de cobertura

- (A) mantém níveis ideais de umidade no leito da ferida, promove o desbridamento enzimático contínuo e reduz o mau odor da lesão.
- (B) promove granulação e epitelização, mas, devido ao seu alto teor de água, apresenta baixa capacidade de absorção de exsudato.
- (C) apresenta grande capacidade de absorção de fluidos, possui ação antimicrobiana e promove o desbridamento enzimático.
- (D) proporciona ambiente úmido para a lesão, age contra bactérias, de forma profilática e/ou terapêutica, e promove o desbridamento autolítico.
- (E) é eficaz no controle da infecção, mas possui odor forte, o que pode ser erroneamente interpretado como piora do quadro.

25. Em uma unidade de pronto atendimento, a prescrição médica para um paciente adulto com diagnóstico de crise hipertensiva é:

Nitroprussiato de sódio – 50 mg (dissolvidos em 2 mL de diluente próprio). Diluir em 248 mL de soro glicosado 5%. Administrar 12,0 mL/hora, em bomba de infusão, por via endovenosa.

Considerando-se que na unidade só estão disponíveis bombas de infusão configuradas para a administração de soluções em microgotas por minuto (mcg/min), assinale a alternativa que apresenta corretamente a velocidade de infusão (VI) e o cuidado de enfermagem (CE) que o técnico de enfermagem deve observar ao administrar o medicamento prescrito.

- (A) VI = 4 mcg/min; CE = observar a presença de efeitos colaterais do medicamento, tais como cefaleia e taquicardia.
- (B) VI = 12 mcg/min; CE = manter o frasco e o equipo protegidos da luz.
- (C) VI = 4 mcg/min; CE = controlar a pressão arterial, no mínimo, a cada 10 minutos.
- (D) VI = 40 mcg/min; CE = manter o frasco e o equipo protegidos da luz.
- (E) VI = 12 mcg/min; CE = observar a presença efeitos colaterais do medicamento tais como midríase constipação.

26. Considere as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a higiene das mãos e associe as colunas relacionando o tipo de produto indicado e a(s) situação(ões) em que deve ser utilizado, desde que as mãos não se apresentem visivelmente sujas ou manchadas de sangue ou de outros fluidos corporais.

I. Sabonete, líquido ou espuma, não associado a antissépticos.	() Após retirada de luvas com pó/talco.
II. Sabonete, líquido ou espuma, associado a antissépticos (higiene antisséptica das mãos).	() Após aplicações consecutivas de preparação alcoólica para a higiene das mãos.
III. Preparação alcoólica (sob as formas gel, líquida, espuma, spray e outras).	() Após risco de exposição a fluidos corporais tais como: esvaziamento de bolsa contendo urina, aspiração traqueal, retirada de cateteres.
	() Nos casos de precaução de contato recomendada para pacientes portadores de microrganismos multirresistentes, definidos em protocolo da instituição.
	() Antes e imediatamente após a remoção das luvas (sem pó/talco)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dessa associação.

- (A) I, I, III, II, III.
- (B) I, II, II, III, I.
- (C) II, III, III, III, I.
- (D) I, III, III, II, I.
- (E) III, I, III, II, III.

27. Considere a seguinte afirmação:

De acordo com norma da ANVISA, produtos para a saúde classificados como semicríticos, tais como: _____, após limpeza, devem ser submetidos, no mínimo à _____, exceção feita a artigos semicríticos utilizados na assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia, que, após limpeza, deverão ser submetidos no mínimo à _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, a afirmação.

- (A) espéculos nasais, auriculares e vaginais ... esterilização ... desinfecção de alto nível
- (B) marcapassos e cateteres ... esterilização ... desinfecção de alto nível
- (C) espéculos nasais, auriculares e vaginais ... desinfecção de alto nível ... desinfecção de nível intermediário
- (D) comadre e papagaio (dispositivos utilizados para coletar urina e fezes de pessoas acamadas ou com severa dificuldade de locomoção) ... desinfecção de nível intermediário ... desinfecção de alto nível
- (E) espéculos vaginais e drenos ... desinfecção de alto nível ... desinfecção de nível intermediário

28. A.A., 70 anos, sexo masculino, é portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e, além do atendimento pelos profissionais do Projeto Melhor em Casa, é acompanhado pelas equipes de saúde da família. Ao realizar visita domiciliar para A.A., o técnico de enfermagem observou que, entre outros itens, a prescrição médica compreendia a administração contínua de oxigênio (O_2), por cânula nasal, com fluxo de 1 litro por minuto. Constatou, ainda, que o oxigênio utilizado provinha, em caráter provisório, de um cilindro de O_2 estacionário, que era recarregado periodicamente.

Diante dessa situação, o TE deve considerar que

- (A) o dispositivo utilizado para administrar O_2 para o paciente permite o fornecimento de um grande fluxo de oxigênio em pequeno volume de ar.
- (B) a necessidade de interromper temporariamente a administração de O_2 durante a alimentação consiste na principal desvantagem do uso da cânula nasal para oxigenoterapia.
- (C) o uso de cânula nasal pode causar irritação e lesão da pele ao redor das orelhas ou narinas.
- (D) o uso de dispositivo para a umidificação do oxigênio é obrigatório, devido ao fluxo de O_2 prescrito pelo médico.
- (E) o cuidador e os familiares devem ser orientados a lubrificar as mãos com óleos emolientes antes de manusear o cilindro de O_2 , evitando atritos que podem resultar em combustão.

29. Uma funcionária, com 37 semanas de idade gestacional, procurou o técnico de enfermagem (TE) do ambulatório de saúde da instituição, buscando informações a respeito da realização do “exame do pezinho”, que o bebê deverá realizar após o nascimento.

Frente a essa situação, de acordo com orientação do Ministério da Saúde, o TE deve esclarecer que

- (A) a triagem neonatal biológica permite identificar, precocemente, entre outras condições, indivíduos com doenças genéticas e portadores de sífilis adquirida durante a gestação.
- (B) a coleta da primeira amostra do sangue do bebê deve ser realizada, preferencialmente, entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê.
- (C) o exame não será realizado em crianças cujo peso ao nascer seja inferior a 2.800 g.
- (D) caso não seja possível realizar o exame no período ideal para fazê-lo, a coleta de sangue da criança deve ser realizada antes que ela complete 1 (um) ano de vida.
- (E) a coleta da amostra de sangue será realizada, pelo menos, 30 minutos após a criança ter sido alimentada.

30. Gestante, 12 semanas de gestação, procurou o técnico de enfermagem (TE) para esclarecer dúvidas sobre como tomar os medicamentos prescritos pelo médico na última consulta de pré-natal. Ao verificar a receita médica, o TE constatou que se tratava de suplemento alimentar à base de carbonato de cálcio e sulfato ferroso.

Frente a essa situação, o TE deve esclarecer que, de acordo com orientação do Ministério da Saúde, a indicação para suplementação do carbonato de cálcio (Ca) e sulfato ferroso (Fe) para gestantes e o cuidado que a gestante deve observar em relação à ingestão e interação (CI) entre esses dois suplementos são:

- (A) Ca = redução do risco de pré-eclâmpsia; Fe = prevenção da anemia no recém-nascido; CI = ingerir os dois medicamentos juntos, 30 minutos antes do almoço.
- (B) Ca = fortalecimento dos ossos e dentes do bebê; Fe = prevenção da anemia no recém-nascido; CI = ingerir o suplemento de cálcio com intervalo mínimo de 30 minutos do suplemento de ferro.
- (C) Ca = redução do risco de pré-eclâmpsia; Fe = prevenção da anemia materna; CI = ingerir os dois medicamentos juntos, 30 minutos antes do almoço.
- (D) Ca = prevenção de malformação dos ossos e dentes do bebê; Fe = prevenção da hemorragia pós-parto; CI = ingerir os dois medicamentos juntos, em jejum, 30 minutos antes do café da manhã.
- (E) Ca = redução do risco de pré-eclâmpsia; Fe = prevenção da anemia materna; CI = ingerir o suplemento de cálcio com intervalo mínimo de 2 horas do suplemento de ferro.

31. O processo de envelhecimento, frequentemente, leva à fragilidade da pele da pessoa idosa que, entre outras condições, pode se apresentar mais ressecada, com rugas, com menor sensibilidade e elasticidade e maior flacidez.

Considerando que essas condições tornam a pele mais vulnerável a atritos, lesões e infecções, ao interagir com as pessoas idosas e seus cuidadores o técnico de enfermagem deve enfatizar as orientações sobre como prevenir lesões de pele aplicando medidas, tais como:

- (A) secar o corpo com toalha macia, esfregando vigorosamente a pele com o propósito de aumentar a irrigação das células que a compõem, favorecendo a nutrição e hidratação do tecido cutâneo.
- (B) aplicar na pele um creme hidratante à base de água, diariamente, de preferência após o banho.
- (C) dar preferência ao banho de aspersão com água quente nos dias frios, evitando o resfriamento e favorecendo o controle da temperatura adequado da temperatura corporal.
- (D) aplicar talco, sem perfume, nas dobras de pele, evitando que fiquem úmidas, o que aumenta o risco de crescimento de fungos.
- (E) dar preferência ao uso de boné com abas para proteção do rosto e, em caso de alopecia, da cabeça, em vez do protetor solar, pois a pele da pessoa idosa é mais suscetível ao desenvolvimento de alergias.

32. O técnico de enfermagem (TE) foi solicitado para realizar a coleta de escarro de um morador de rua, identificado como sintomático respiratório.

Para realizar esse procedimento, o TE deve esclarecer sobre a importância do exame e, entre outras ações,

- (A) identificar o pote com etiqueta contendo o nome do paciente e a data de nascimento, fixando-a sobre a tampa do recipiente, para evitar sua contaminação com o material coletado.
- (B) oferecer escova de dentes com pasta, ou solução dentifrícia, e solicitar que o usuário higienize a cavidade oral antes da coleta do material.
- (C) encaminhar o usuário, preferencialmente, ao banheiro destinado a pacientes para realizar a coleta do escarro, garantindo a sua privacidade.
- (D) explicar ao usuário que deve coletar de 1 a 3 mL de escarro, após inspirar profundamente, reter o ar por alguns segundos e expirar.
- (E) após a coleta, observar a amostra obtida, considerando que o aspecto ideal da amostra é mucopurulento.

33. Mensalmente, aproveitando o momento em que os insulinos são entregues, a equipe de saúde da família realiza grupos educativos com usuários diabéticos e seus familiares ou cuidadores.

Nessa ocasião, como membro da equipe, o técnico de enfermagem pode aproveitar para esclarecer o seguinte:

- (A) recomenda-se o uso da caneta de insulina porque esse dispositivo está associado à melhora nos níveis de hemoglobina glicada em um maior número de pessoas diabéticas, quando comparado à aplicação com seringa.
- (B) a assepsia com álcool 70% do local onde será acoitada a agulha é desnecessária, pois a agulha descartável vem acondicionada em embalagem estéril.
- (C) é necessária a realização do teste de fluxo de insulina após a colocação da agulha na caneta, que é realizado por meio da compressão do botão injetor com a caneta na posição vertical, devendo-se considerar inadequada a saída de gota na ponta da agulha.
- (D) deve-se fazer a prega cutânea, introduzir a agulha no tecido subcutâneo a 45° e pressionar o botão injetor, mantendo-o pressionado por, no mínimo, 1 minuto após a dose do medicamento ter sido injetada.
- (E) é necessário liberar o botão injetor da caneta de insulina antes da completa retirada da agulha da pele, para evitar o retorno de parte da dose do medicamento injetado.

34. Leia a afirmação a seguir:

Por suas características, o câncer de colo do útero apresenta alto potencial para o desenvolvimento de ações de controle por meio da prevenção primária e secundária e, com base nessa premissa, recentemente, o Ministério da Saúde aprovou a utilização de testes moleculares para a detecção de DNA-HPV oncogênico para o rastreamento desse tipo de câncer, o que se trata da aplicação de uma medida de prevenção _____, no âmbito da(o) _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, a afirmação apresentada.

- (A) secundária ... detecção precoce
- (B) primária ... diagnóstico precoce
- (C) secundária ... proteção específica
- (D) primária ... promoção da saúde
- (E) secundária ... limitação da incapacidade

35. Considere as atividades recomendadas pela Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2012) e associe as duas colunas apresentadas a seguir, relacionando a ação ao momento em que ela deve ser realizada.

I. Antes da indução anestésica.	() Confirmar se oxímetro de pulso está colocado no paciente e funcionando.
II. Antes da incisão cirúrgica.	() O cirurgião, o anestesiológico e a equipe de enfermagem confirmam verbalmente a identificação do paciente, o sítio cirúrgico e o procedimento.
III. Antes de o paciente sair da sala de operações.	() O profissional da equipe de enfermagem confirma verbalmente com a equipe médica se há algum problema com equipamento para ser resolvido.
	() A equipe de enfermagem revisa se os todos os materiais necessários, estão presentes e dentro do prazo de esterilização, incluindo resultados dos indicadores.
	() Confirmação de que a profilaxia antimicrobiana foi administrada nos últimos 60 minutos.

Assinale a alternativa que apresenta de forma correta a sequência dessa associação.

- (A) I, I, III, II, I.
- (B) II, III, I, I, II.
- (C) I, II, III, II, I.
- (D) II, III, I, II, II.
- (E) I, II, III, II, II.
36. Na sala de espera, enquanto aguardava atendimento, homem, 32 anos, ingeria um lanche, quando se engasgou. Solicitado para prestar os cuidados de primeiros socorros, o técnico de enfermagem (TE), ao se aproximar da vítima, constatou que ela estava consciente e apresentava incapacidade de falar, fraqueza e cianose.
- Diante dessa cena, em consonância com as recomendações atuais da Associação Americana de Cardiologia (American Heart Association – AHA), até que a vítima, consciente, consiga expelir o objeto/alimento ou a chegada do serviço médico de emergência, o TE deve
- (A) verificar se há um objeto visível na boca e iniciar ciclos repetidos de 3 tapas nas costas seguidos de 2 ventilações.
- (B) posicionar-se por trás da vítima, fechar uma das mãos em punho e colocá-la, com o lado do polegar, na região do epigástrico, segurando-a com a outra mão, e, a seguir, fazer compressões rápidas e firmes para dentro e para cima, até que o objeto/alimento seja expelido.
- (C) iniciar ciclos repetidos de 5 tapas nas costas seguidos de 5 compressões abdominais.
- (D) sentar a vítima e estimular a tosse, aplicando séries de 5 tapas nas costas, com intervalo de 30 segundos entre eles.
- (E) verificar se há um objeto visível na boca e iniciar ciclos repetidos de 30 compressões torácicas e 2 ventilações, com a vítima na posição supina.

37. Mulher, 52 anos, foi admitida na sala de emergência com queixa de dor torácica. Cumprindo o protocolo para dor torácica, o médico solicitou a realização imediata de eletrocardiograma com 12 derivações.

Ao realizar o exame para a obtenção da derivação V5, o eletrodo deve ser posicionado no

- (A) 4º espaço intercostal à direita, próximo ao esterno.
- (B) 5º espaço intercostal à esquerda na linha axilar anterior.
- (C) membro superior esquerdo.
- (D) 5º espaço intercostal à esquerda na linha hemiclavicular.
- (E) membro inferior esquerdo.

38. Tem-se a seguinte afirmação:

De acordo com o Calendário de Vacinação do Estado do Paraná (atualizado), a administração da vacina vírus sincicial respiratório A e B (recombinante) está indicada para _____. O esquema básico compreende a administração de _____, por via _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, a afirmação apresentada.

- (A) todas as pessoas, a partir dos 60 anos de idade e lactentes ... duas doses, com intervalo mínimo de 5 anos entre as doses ... subcutânea
- (B) o recém-nascido ... dose única, ao nascer ... intramuscular
- (C) as gestantes ... duas doses, a partir da 24ª semana gestacional, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses ... subcutânea
- (D) as gestantes ... dose única, em cada gestação, a partir da 28ª semana gestacional ... intramuscular
- (E) as crianças menores de 5 anos ... três doses, preferencialmente aos 2 e aos 6 meses de idade, e uma dose de reforço aos 12 meses, respeitando o intervalo mínimo de 60 dias entre a segunda dose e o reforço ... intramuscular

39. Considere os diferentes aspectos relacionados aos procedimentos e técnicas para a administração de vacinas e assinale a alternativa correta.

- (A) Em uma mesma oportunidade, quando necessária a aplicação de múltiplas vacinas por via intramuscular, as mais dolorosas devem ser aplicadas primeiro, e a menos dolorosa deve ser aplicada por último.
- (B) A tampa de borracha de vedação dos frascos-ampola contendo vacinas deve ser limpa com algodão umedecido com álcool a 70%.
- (C) Para a reconstituição de imunobiológicos apresentados sob a forma liofilizada, após a introdução do diluente, o profissional de enfermagem deve agitar vigorosamente o frasco-ampola, para a homogeneização do conteúdo.
- (D) Caso necessário aplicar mais de uma vacina no mesmo músculo, o Ministério da Saúde recomenda respeitar a distância mínima de 1,5 cm entre os pontos de aplicação.
- (E) Quando possível, a criança deve ser amamentada durante o procedimento de vacinação injetável, e a mãe deve ser orientada a iniciar a amamentação 5 minutos antes da administração das vacinas.

40. A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como um de seus princípios a Transversalidade, compreendida como

- (A) a integração do cuidado e dos processos de trabalho, associando a clínica, a política e a produção em saúde, tornando inseparável o cuidar e o gerir.
- (B) a adoção de postura ética que implica a escuta ativa das necessidades do usuário, garantindo um atendimento resolutivo e baseado em critérios de risco.
- (C) o trabalho em conjunto de servidores e usuários visando melhoria na produção e gestão a partir do compartilhamento de poder e responsabilidade.
- (D) a interação entre todos os sujeitos responsáveis pela produção da saúde, aumentando o fluxo de conhecimento levando ao rompimento das barreiras de poder.
- (E) a cooperação entre usuários e servidores, de modo que ambos atuem de forma cooperativa, nas melhorias e inovações nos serviços de saúde.

RASCUNHO

RASCUNHO

