

EA - CAMAR 2013 – GABARITO OFICIAL

ESPECIALIDADE: CARDIOLOGIA

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	A
32	B
33	A
34	A
35	#
36	B
37	#
38	B
39	C
40	#
41	C
42	A
43	A
44	D
45	C
46	B
47	D
48	D
49	C
50	A
51	C
52	B
53	A
54	D
55	B
56	D
57	#
58	B
59	B
60	C

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	C
32	D
33	A
34	A
35	C
36	#
37	C
38	B
39	#
40	B
41	#
42	A
43	A
44	B
45	A
46	C
47	B
48	B
49	#
50	D
51	B
52	D
53	A
54	B
55	C
56	A
57	C
58	D
59	D
60	B

- As questões com # foram anuladas;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVAS DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES

35 VERSÃO A / 41 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

A infusão de furosemida provoca uma elevação significativa dos níveis de sódio em pacientes com síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Há mais de uma opção que atende à questão (amlodipina / furosemida).

37 VERSÃO A / 39 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

O erro material (grafia correta: atenolol) comprometeu o entendimento e a compreensão, haja vista, não existir o betabloqueador lipossolúvel denominado "altenolol".

40 VERSÃO A / 36 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Nos casos de choque cardiogênico com pressão arterial sistólica entre 70 - 100 mmHg, sem sinais de choque, está indicado o uso de dobutamina. Não há opção de resposta que preencha corretamente a afirmativa em questão.

Fonte: IV Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST. Arq Bras Cardiol.2009

57 VERSÃO A / 49 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Há uma inconsistência gráfica na opção de resposta (terbutalina) que invalida a questão.