



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
ESCOLA SARGENTO MAX WOLF FILHO

EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS 2020-21
SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE SAÚDE

APROVEITADA PARA: () Geral/Aviação () MÚSICA **(X)** SAÚDE

QUESTÃO: A enfermagem é exercida privativamente, respeitados os respectivos graus de habilitação, pelos profissionais descritos nas alternativas abaixo, exceto um. Marque a única alternativa errada:

Alternativa correta: Cuidador.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

O cuidador nem mesmo está descrito na referida Lei, portanto não é um profissional habilitado a exercer a enfermagem – menos ainda em caráter privativo.

APROVEITADA PARA: () Geral/Aviação () MÚSICA **(X)** SAÚDE

QUESTÃO: Assinale a alternativa correspondente à lesão inicial da sífilis primária:

Alternativa correta: Cancro duro.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

A lesão inicial da sífilis primária é o cancro duro.

APROVEITADA PARA: () Geral/Aviação () MÚSICA **(X)** SAÚDE

QUESTÃO: Com relação aos cuidados de enfermagem durante a crise epilética, assinale a alternativa correta:

Alternativa correta: Deixar o paciente deitado, não impedindo sua movimentação psicomotora.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

Deve-se deixar o paciente deitado, não impedindo sua movimentação psicomotora.

APROVEITADA PARA: () Geral/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO: A necessidade de contracepção de emergência pode surgir depois de um episódio de relação sexual sem proteção, como estupro, preservativo ou diafragma defeituoso ou lacerado, ou outras situações que possam resultar em concepção indesejada. Nesse sentido, sobre a “pílula do dia seguinte”, é correto afirmar que:

Alternativa correta: Quanto mais precoce for a administração da contracepção de emergência, mais efetiva ela será.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

Quanto mais precoce for a administração da contracepção de emergência, mais efetiva ela será.

APROVEITADA PARA: () Geral/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO: A Febre amarela é uma doença infecciosa causada por vírus. Sobre esta doença, marque a alternativa correta:

Alternativa correta: Mosquitos são os principais vetores.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

Vetores/reservatórios e hospedeiros- O principal vetor e reservatório da FAS no Brasil é o mosquito do gênero *Haemagogusjanthinomyis*. Na FAU, o mosquito *Aedes aegypti* é o principal vetor.

APROVEITADA PARA: () Geral/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO: As terapias de substituição renal são necessárias quando os rins não são mais capazes de remover os produtos da degradação, manter eletrólitos e regular o balanço hídrico. Assim sendo, marque a alternativa que apresenta apenas exemplos destas terapias:

Alternativa correta: Transplante renal, hemodiálise e diálise peritoneal.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

As principais terapias de substituição renal incluem os vários tipos de diálise (hemodiálise, diálise peritoneal, terapia de substituição renal contínua) e o transplante renal.

APROVEITADA PARA: () Geral/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO: Marque a alternativa que não corresponde a uma conduta adequada no socorro imediato às vítimas de picadas de cobras:

Alternativa correta: Fazer um torniquete no membro lesionado e aplicar gelo no local.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

A questão pede que seja marcada a alternativa que não corresponde a uma conduta adequada no socorro imediato às vítimas de picadas de cobras. Gelo ou torniquete não devem ser aplicados.

APROVEITADA PARA: () Geral/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO: Foram prescritas para um paciente 100mg de um medicamento. Temos na farmácia o medicamento na concentração de 1g. Se diluirmos o conteúdo do frasco em 5ml de água destilada, em quantos ml dessa solução conseguiremos obter as 100mg?

Alternativa correta: 0,5.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

Calcula-se da seguinte maneira: 1000mg (que corresponde a 1g, dado no enunciado da questão) estão diluídos em 5ml, 100mg está diluído em "X" ml; então: $1000 \text{ --- } 5\text{ml}$
 100-----"Xml"

$1000 \times \text{"Xml"} = 5 \times 100$; aplicando a regra de três, temos que $1000X=500$, então $X=\frac{500}{1000}$

Assim, chegamos à resposta da questão, que é 0,5 ml.

APROVEITADA PARA: () Geral/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO: A ingestão de substâncias tóxicas corrosivas (agentes alcalinos ou ácidos) requer tratamento de emergência pela equipe de saúde. Com relação aos cuidados prestados nesta situação, marque a alternativa correta:

Alternativa correta: O uso do carvão ativado reduz a absorção da substância ingerida.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

O carvão ativado reduz a absorção ao adsorver (prender em sua superfície) uma ampla gama de substâncias; isso torna a substância tóxica inacessível para a circulação, reduzindo assim a sua toxicidade.

APROVEITADA PARA: () Geral/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO: As queimaduras são classificadas de acordo com a profundidade de destruição tecidual, e, conforme a gravidade das mesmas, são empregados vários cuidados. Dentro do estudo das queimaduras, analise as questões e marque a alternativa correta:

Alternativa correta: ANULADA

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

APROVEITADA PARA: () Geral/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO: No que se refere aos cuidados de enfermagem em saúde mental, atribua V para VERDADEIRO e F para FALSO, e assinale a alternativa que preencha a sequência corretamente:

- () Contenções mecânicas e químicas são absolutamente proibidas desde a Reforma Psiquiátrica.
- () Em casos de agitação psicomotora, a contenção física deverá ser o último recurso a ser utilizado.
- () O paciente psiquiátrico requer cuidados que são básicos, e ao mesmo tempo especiais, uma vez que se lida com a alteração de comportamento.
- () Forçar os pacientes a tomarem a medicação, pedindo que levantem a língua para ver se for deglutida ou não, é uma das práticas consideradas ultrapassadas.
- () Os pacientes devem ser estimulados ao autocuidado quanto às suas necessidades físicas.

Alternativa correta: F – V – V – V – V

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

A **primeira** afirmativa é FALSA (F), tendo em vista que as contenções mecânicas e químicas não são proibidas, mas devem ser realizadas com prescrição e em casos extremos, quando a segurança do paciente e de outras pessoas estiverem em risco.

A **segunda** afirmativa é VERDADEIRA (V), uma vez que, em casos de agitação psicomotora, a contenção física deverá ser o último recurso a ser utilizado., e só poderá ser feita quando extremamente necessário, e por curto período de tempo.

A **terceira** afirmativa, que diz que o paciente psiquiátrico requer cuidados que são básicos, e ao mesmo tempo especiais, uma vez que se lida com a alteração de comportamento, também é VERDADEIRA (V).

A **quarta** afirmativa, que diz que forçar os pacientes a tomarem a medicação, pedindo que levantem a língua para ver se for deglutida ou não, é uma das práticas consideradas ultrapassadas, é VERDADEIRA (V), porque tais ações intimidam e humilham o paciente, por isso devem ser evitadas.

A **quinta** afirmativa também é VERDADEIRA (V), pois a enfermagem precisa atender os pacientes quanto às suas necessidades físicas, como alimentação, higiene, vestimenta, entre outras, estimulando-os ao autocuidado.

Dadas as justificativas acima sobre as sentenças a serem julgadas no item para escolha da sequência correta, a única alternativa que responde a questão é a letra “c”, que traz a seguinte sequência: F – V – V – V – V.

APROVEITADA PARA: () Geral/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO: Selecione de acordo com o quadro abaixo o tipo de precaução indicado para cada situação descrita e marque a alternativa correspondente:

TIPOS DE PRECAUÇÃO

A = AÉREA

C = CONTATO

G = GOTÍCULAS

P = PADRÃO

() Herpes simples, abscessos, celulites, furunculose, piodermites, conjuntivites, contato entérico, contato com secreções respiratórias.

() Rubéola, caxumba, difteria, coqueluche, adenovírus, meningococco.

() Tuberculose, sarampo, varicela.

() Sistema que deve ser adotado por todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência, independente da doença inicialmente diagnosticada no paciente assistido.

Alternativa correta: C – G – A – P.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

C – As precauções de contato são indicadas no cuidado de pacientes com infecção suspeita ou reconhecida de importância epidemiológica que sejam transmitidas pelas mãos/pele, tais como infecção ou colonização por agente multirresistente, herpes simples, abscessos, celulite, furunculose, piodermites, pediculose, escabiose, conjuntivites, contato entérico (hepatite A, diarreia infecciosa), contato com secreções respiratórias, etc.

G – As precauções com gotículas (partículas maiores que 5 micra) são indicadas na atenção a pacientes com infecção suspeita ou reconhecida de importância epidemiológica, e que sejam transmitidas pelas gotículas da orofaringe (tosse espirros ou conversando), como por exemplo rubéola, caxumba, difteria, adenovírus, meningococco, etc.

A – As precauções em transmissão via aérea devem ser tomadas nos casos de suspeita ou após confirmação de doenças que se transmitem pelo ar, com partículas menores que 5 micra, as quais ficam suspensas no ar e são transmitidas a longa distância, como tuberculose, sarampo, varicela, etc.

P – As precauções padrão ou universais devem ser adotadas por todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência, independente da doença inicialmente diagnosticada no paciente assistido.