

## CONHECIMENTO BÁSICO - LÍNGUA PORTUGUESA

## O que é resiliência?

01 A resiliência é um termo muito trabalhado na Psicologia e que diz respeito à capacidade de uma  
02 pessoa de conseguir lidar com problemas e mudanças, de superar desafios — de forma a manter o equilíbrio  
03 — e de conseguir alcançar os seus objetivos. Inclusive, ao mesmo tempo, trata-se da capacidade de sair de  
04 circunstâncias adversas mais fortalecido e capaz de continuar a sua jornada.

05 Ou seja, o conceito está intimamente ligado com a forma como interpretamos e como agimos  
06 diante dos problemas no dia a dia. Se você tem a postura de encarar os desafios e seguir em frente, lidando  
07 com os abalos de uma maneira mais tranquila, é sinal de que tem uma maior resiliência. Já aqueles que se  
08 sentem paralisados e são mais afetados diante dos obstáculos, via de regra, são menos resilientes.

09 Saiba, porém, que não há problema algum em fazer parte do segundo grupo, afinal, isso não  
10 significa que você precisa se manter condicionado a essa situação para sempre. Se isso o incomoda, é possível,  
11 sim, segundo a Psicologia, trabalhar essa habilidade para que você possa lidar com os problemas com maior  
12 resistência e mais poder e, até mesmo, para dar maior apoio para os seus familiares e para os entes queridos.

13 É importante lembrarmos que essa não é uma característica inata. Assim, você pode desenvolvê-la  
14 ao longo da vida. Também há situações que são mais confortáveis para nós e, por conseguinte, lidaremos com  
15 elas com maior resiliência, enquanto outras já serão mais complexas.

Disponível em: <https://blog.primaveras.com.br/o-que-e-resiliencia/>. Acesso em: 26 jul. 2023.

01. Qual é asserção cujo teor **NÃO** corresponde ao texto em análise?

- (A) Os indivíduos podem apresentar níveis diferentes de resiliência.
- (B) A resiliência se manifesta, com mais intensidade, quando se baseia no altruísmo.
- (C) A idiosincrasia (“Maneira de agir ou reagir própria de uma pessoa”) e a resiliência estão relacionadas.
- (D) A ciência das estruturas mentais e comportamentais do indivíduo preconiza o desenvolvimento dessa capacidade.

02. Entre os argumentos seguintes, qual se baseia na defesa de ser resiliente?

- (A) “A resiliência é um termo muito trabalhado na Psicologia”.
- (B) “É importante lembrarmos que essa não é uma característica inata”.
- (C) “trata-se da capacidade de sair de circunstâncias adversas mais fortalecido e capaz de continuar a sua jornada”.
- (D) “o conceito está intimamente ligado com a forma como interpretamos e como agimos diante dos problemas no dia a dia”.

03. O texto em discussão se caracteriza por apresentar um nível de linguagem em que predomina:

- (A) o jargão.
- (B) o regionalismo.
- (C) a linguagem informal.
- (D) a norma culta da língua.

04. De acordo com as relações coesivas, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) o substantivo “pessoa” (l. 02) é retomado pelo pronome “seus” (l. 03).
- (B) o pronome “seus” (l. 12) refere-se à forma de tratamento “você” (l. 11).
- (C) o termo “essa situação” (l. 10) e o pronome “isso” (l. 10) retomam referentes distintos.
- (D) o “porém” (l. 09) liga a ideia de ser “menos resilientes” (l. 08) à de não haver problema em ser “menos resilientes”.

05. Existem quantos pronomes no último parágrafo (da l. 13 à l. 15)?

- (A) 03.
- (B) 05.
- (C) 07.
- (D) 09.

06. Entre os termos seguintes, aquele que exerce a função de sujeito é:

- (A) “o conceito” (l. 05).
- (B) “problema algum” (l. 09).
- (C) “uma maior resiliência” (l. 07).
- (D) “uma característica inata” (l. 13).

07. Assinale a alternativa em que a relação entre o conectivo e a ideia expressa está **INCORRETA**.

- (A) “porém” (l. 09) – oposição.
- (B) “se” (l. 10) – consequência.
- (C) “para que” (l. 11) – finalidade.
- (D) “enquanto” (l. 15) – proporção.

08. Uma das características do texto em estudo é ser dissertativo-argumentativo, por isso a maioria dos verbos estão flexionados no:

- (A) presente do subjuntivo.
- (B) presente do indicativo.
- (C) futuro do presente.
- (D) futuro do pretérito.

09. Ao se colocar este trecho “no dia a dia” (l. 06) no plural, tem-se a seguinte forma **CORRETA**:

- (A) *nos dia a dia*.
- (B) *nos dias a dia*.
- (C) *nos dias a dias*.
- (D) *nos dia a dias*.

10. Quanto à regência dos verbos constantes do último parágrafo (da l. 13 à l. 15), qual é a assertiva **INCORRETA**?

- (A) Existe verbo intransitivo.
- (B) Tem-se verbo de ligação.
- (C) Há verbo transitivo indireto.
- (D) Observa-se verbo transitivo direto.

**CONHECIMENTO ESPECÍFICO – ENFERMEIRO PSF**

11. São várias as doenças detectadas por meio do exame “teste do pezinho”. Assinale a alternativa que **NÃO** confere uma doença que esse teste detecta.

- (A) Doença falciforme.
- (B) Hiperplasia adrenal congênita.
- (C) Hipertireoidismo congênito.
- (D) Deficiência de biotinidase.

12. Sobre a triagem neonatal a partir da matriz biológica, “teste do pezinho”, assinale a alternativa que contém uma afirmação **CORRETA**.

- (A) O diagnóstico presuntivo em triagem neonatal refere-se à constatação da presença do distúrbio ou doença.
- (B) O período para coleta do exame, como uma condição de exceção, após o 28º dia de vida, pode ser realizado diante das excepcionalidades.
- (C) Para que haja uma boa circulação de sangue nos pés da criança, suficiente para a coleta, o calcanhar deve sempre estar acima do nível do coração.
- (D) Deve-se puncionar em uma das laterais da região plantar do calcanhar, bem como na região central, pois são locais com pouca possibilidade de atingir o osso.

13. A OMS recomenda a suplementação diária de ferro conforme o Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF), como uma intervenção de saúde pública para a prevenção da deficiência de ferro e da anemia em lactentes e em crianças. Sobre a suplementação de ferro, de acordo com as novas recomendações do Ministério da Saúde de 2022, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) o PNSF contempla todas as crianças de 6 a 28 meses de idade, que não estão contempladas pela estratégia NutriSUS, gestantes e mulheres no pós-parto e/ ou pós-aborto atendidas na Atenção Primária à Saúde.
- (B) o esquema de suplementação para a criança prevê a oferta diária de sulfato ferroso por três meses consecutivos, seguida de uma pausa de três meses; no final do terceiro mês, inicia-se um novo ciclo de três meses.
- (C) crianças que não estejam em aleitamento materno exclusivo e recebam leite de vaca poderão ser submetidas à suplementação profilática de ferro a partir dos 6 meses de idade.
- (D) as gestantes devem receber 0,4 mg de ferro elementar, diariamente após a confirmação da gravidez até o terceiro mês pós-parto; aplica-se também nos casos de abortos.

14. Você, durante uma consulta de puericultura, ouviu de uma mãe o seguinte relato: “Doutora, eu amamento sim, sempre que posso, mas também deixo para minha mãe dar outro leite, a fórmula, quando não estou em casa”. Diante do relato, é **CORRETO** afirmar que essa prática de alimentação é caracterizada como:

- (A) aleitamento materno exclusivo.
- (B) aleitamento materno complementado.
- (C) aleitamento materno predominante.
- (D) aleitamento materno misto/parcial.

15. O diabetes mellitus é um conjunto de alterações metabólicas caracterizado por níveis elevados e sustentados de glicemia. Sobre os sinais e os sintomas mais comuns dessa doença, assinale **V** para **VERDADEIRO** e **F** para **FALSO** nas assertivas a seguir:

- Apresenta polidipsia que é o aumento da eliminação de água.
- Apresenta poliúria que é o excesso de produção de urina.
- Apresenta polifagia que é o aumento dos gânglios linfáticos.
- Apresenta anorexia que é a perda de peso.

Está **CORRETA**, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) F, V, F, F.

16. Em 02 de setembro de 2022, foi instituída a Lei nº 14.443, a qual alterou alguns artigos da Lei nº 9.263/1996, para disciplinar as condições para o acesso à esterilização voluntária no âmbito do planejamento familiar. São dispositivos contidos nas leis, válidos atualmente, **EXCETO**:

- (A) é mantido o direito à esterilização voluntária nos casos em que há risco à vida ou à saúde da mulher, situação em que o fato deve ser atestado em relatório escrito e assinado por dois médicos.
- (B) não é mais necessário o consentimento expresso de ambos os cônjuges para a realização de laqueadura tubária ou de vasectomia.
- (C) a idade mínima para mulheres e para homens com capacidade civil plena passa para 22 (vinte e dois anos), independentemente do número de filhos vivos.
- (D) foi definido prazo mínimo de 60 (sessenta) dias entre a manifestação de vontade e o ato cirúrgico.

17. Em uma consulta de puericultura, você, como enfermeiro, sabe que a criança ao completar 6 meses de idade, precisa receber, além do leite materno, outros alimentos. Sobre a rotina alimentar de uma criança de 6 meses que é amamentada, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A introdução de novos alimentos deve acontecer pouco a pouco. No início, deve-se peneirar ou bater os alimentos no liquidificador, bem como amassá-los com o garfo, devendo oferecê-los separadamente no prato.
- (B) O esquema alimentar para criança de seis meses é: leite materno livre demanda, lanche da manhã (fruta e leite materno), almoço (01 alimento de cada grupo alimentar) e lanche da tarde (fruta e leite materno).
- (C) A quantidade aproximada para o almoço é de 4 a 5 colheres de sopa no total, lembrando que essa quantidade serve apenas para a família ter alguma referência e não deve ser seguida de forma rígida.
- (D) O suco é recomendado aos 6 meses, cerca de 120 ml por dia, desde que seja natural da fruta e sem adição de açúcar. Pode fazer parte de uma refeição, sendo oferecido, de preferência, ao término dela.

18. Em uma unidade de saúde de Pedra Branca (CE), a enfermeira Maria atendeu a um adolescente de 14 anos e anotou os seguintes achados durante a consulta: peso: 45kg; estatura: 1,60 (IMC: 17,5 - > escore Z -2 e < escore Z +1). Com relação ao IMC calculado, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) o adolescente encontra-se com magreza acentuada.
- (B) o adolescente encontra-se com magreza.
- (C) o adolescente encontra-se eutrófico.
- (D) o adolescente encontra-se com sobrepeso.

19. A puberdade pode se iniciar dos 9 aos 14 anos e alguns aspectos devem ser observados. Assim, a primeira manifestação da puberdade no sexo masculino, segundo a prancha de Tanner, é:

- (A) aumento do volume testicular.
- (B) crescimento dos pelos.
- (C) crescimento peniano.
- (D) crescimento do broto mamário.

20. Você, enfermeiro da Unidade Básica de Saúde, sabe que a puberdade está relacionada à liberação hormonal, ocorrendo a Adrenarca (1) e a Gonadarca (2), que significam, respectivamente,

- (A) 1- aparecimento de pelos na região do púbis e nas axilas; 2 - primeiro sangramento menstrual.
- (B) 1 - aparecimento de espermatozoides no líquido seminal; 2 - início do desenvolvimento do tecido mamário.
- (C) 1 - início da produção dos hormônios sexuais (aparecimento de pelos, odor e acne); 2 - aumento dos esteroides sexuais (testosterona e estrógeno), por ação do FSH e do LH.
- (D) 1- responsável pela ovulação e pelos ciclos menstruais; 2- aumento dos testículos e do pênis, engrossamento da voz, crescimento de pelos e aumento da massa muscular.

21. As orientações adequadas, para a conservação e para uso correto e regular dos preservativos masculino e feminino, devem fazer parte da abordagem realizada pelos(as) trabalhadores(as) da saúde com a finalidade de aumentar a sua eficácia. Assinale a alternativa que contém uma afirmação **CORRETA** sobre o uso correto dos preservativos.

- (A) Preservativo masculino: apertar a extremidade do preservativo entre os dedos durante a colocação, devendo deixar o ar no seu interior.
- (B) Preservativo masculino: após a ejaculação, retirar o preservativo do pênis ainda ereto, segurando-o pela base para que não haja vazamento de esperma.
- (C) Preservativo feminino: para uma maior proteção, deve-se utilizar juntamente com o preservativo masculino.
- (D) Preservativo feminino: a argola fixa (externa) deve ficar, aproximadamente, três centímetros para dentro da vagina.

22. O rastreamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) é a realização de testes diagnósticos em pessoas assintomáticas para estabelecer o diagnóstico precoce (prevenção secundária). Sobre esse rastreamento, assinale a alternativa **CORRETA** de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (2022).

- (A) Em adolescentes e jovens ( $\leq 30$  anos), o rastreamento do HIV e da sífilis deve ser semestral.
- (B) Em gestantes (gestantes  $\leq 30$  anos), o rastreamento de clamídia deve ser na 1ª consulta do pré-natal.
- (C) Em travestis/transsexuais, o rastreamento da hepatite B e da hepatite C deve ser bimestral.
- (D) Em pessoas privadas de liberdade, o rastreamento do HIV e da sífilis deve ser anual.

23. O sítio de rastreamento para clamídia e para gonococo irá depender da prática sexual realizada pela pessoa. Analise as assertivas e relacione a 1ª coluna (prática sexual) com a 2ª coluna (sítio de coleta).

1ª Coluna

- (1) Sexo oral sem preservativo
- (2) Sexo anal receptivo sem preservativo
- (3) Sexo vaginal receptivo sem preservativo
- (4) Sexo insertivo sem preservativo

2ª Coluna

- ( ) Coleta de material de orofaringe
- ( ) Coleta de material uretral
- ( ) Coleta de material genital
- ( ) Coleta de swab anal

Está **CORRETA**, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- (A) 1, 4, 3, 2.
- (B) 1, 2, 3, 4.
- (C) 4, 3, 1, 2.
- (D) 4, 1, 2, 3.

24. A imunização para HPV é realizada por meio de vacina quadrivalente (tipos 6, 11, 16 e 18). Sobre essa imunização oferecida por meio do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) É indicada para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos.
- (B) É indicada para homens e para mulheres imunossuprimidos, de 9 a 45 anos.
- (C) O grupo dos imunossuprimidos contemplados com essa imunização é: HIV/aids, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, diabéticos e hipertensos.
- (D) O esquema vacinal é de três doses (0 – dia que compareceu, 2 meses após a primeira e 6 meses após a segunda) para os adultos.

25. A vacina influenza trivalente do Instituto Butantan é uma suspensão injetável composta por diferentes cepas do vírus *Myxovirus influenzae* inativados, fragmentados e purificados. Sobre esse imunizante, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Deve ser aplicado somente por via intramuscular profunda.
- (B) A utilização, após abertura do frasco, é de 10 dias, desde que mantidas as condições assépticas e a temperatura entre + 2 °C e + 8 °C.
- (C) As crianças menores de nove anos de idade, primovacinadas, deverão receber duas doses da vacina influenza com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
- (D) As crianças de 6 meses a 3 anos de idade devem receber duas doses de 0,25 ml com intervalo mínimo de 30 dias após receber a 1ª dose.

26. Criança de 5 meses chega à sala de imunização acompanhada da sua mãe para atualização vacinal. Na caderneta de imunização, há o registro da BCG, da Hepatite B, da Vacina Inativada da Poliomielite (VIP - 1ª dose), Pentavalente (Penta - 1ª dose) e Pneumocócica 10-valente (Pneumo - 1ª dose). Após análise da caderneta, de acordo com o caso citado, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Ela poderá tomar VIP (2ª dose), Penta (2ª dose) e Rotavírus (1ª dose).
- (B) Ela poderá tomar VIP (2ª dose), Penta (2ª dose), Rotavírus (2ª dose, pois perdeu a primeira) e Meningo C (2ª dose).
- (C) Ela poderá tomar VIP (2ª dose), Penta (2ª dose), Pneumo (2ª dose), Meningo C (2ª dose - pois perdeu a 1ª dose).
- (D) Ela poderá tomar VIP (2ª dose), Penta (2ª dose), Pneumo (2ª dose) e Meningo C (1ª dose).

27. Você, gestora de uma unidade de saúde, preocupada com a saúde dos seus funcionários, solicitou um histórico de afastamento dos trabalhadores e identificou que a planilha estava caracterizada segundo a Classificação de Schilling, que é utilizada para identificar qualquer tipo de relação entre a doença e o ambiente de trabalho. O motivo mais prevalente estava relacionado às doenças mentais. Sobre essa situação (classificação de Schilling e doença mental), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A classificação de Schilling I foi a identificada no caso, pois tem o trabalho como causa necessária.
- (B) A classificação de Schilling II foi a identificada no caso, pois tem o trabalho como fator contributivo, mas não necessário.
- (C) A classificação de Schilling III foi a identificada no caso, pois tem o trabalho como provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida.
- (D) A classificação de Schilling não está relacionada às doenças mentais, pois não se enquadra como benefícios acidentários.

28. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) adotou, em 2022, para a região das Américas, a terminologia Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (ESAVI). Sobre ESAVI, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Trata-se de um evento supostamente atribuível, destaca-se a incerteza quanto à relação causal entre o evento adverso e a vacina.
- (B) É qualquer ocorrência médica indesejada temporalmente associada à vacinação, não possuindo necessariamente uma relação causal com o uso de uma vacina ou de outro imunobiológico.
- (C) Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (ESAVI) e Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV), ambos os termos devem e podem ser utilizados, pois possuem o mesmo significado.
- (D) A diferenciação dos termos “vacinação” e “imunização”, utilizados no termo ESAVI, foi somente para fins de notificação, não alterando, assim, a relação causal.

29. O trabalho em grupo é uma realidade no cotidiano das equipes de Atenção Básica/Saúde da Família que desenvolvem grupos de hipertensão, de diabetes, de puericultura, de gestantes, dentre outros. Para tanto, algumas considerações estratégicas orientadoras do trabalho em grupo com os idosos devem ser lembradas, sendo **CORRETO** afirmar que:

- (A) as temáticas e as atividades a serem propostas devem ser discutidas com os participantes de forma a estarem mais adequadas às demandas e às realidades nacionais, promovendo atualização.
- (B) o local de escolha deve buscar superar as limitações relativas à locomoção e as condições socioeconômicas adversas, devendo priorizar sempre a Unidade Básica de Saúde.
- (C) os grupos não devem ser tipificados, segundo suas ações dominantes, como grupos de prática corporal/atividades físicas e terapêuticas.
- (D) toda a equipe pode participar do grupo, tomando-se o devido cuidado para o número de profissionais não ser excessivo, isso pode vir a inibir a participação das pessoas.

30. A senilidade compreende as doenças associadas ao processo de envelhecimento, ou seja, aquelas doenças que são mais comuns nas idades mais avançadas. Assim, assinale a alternativa que contém uma doença que **NÃO** é ocasionada pela senilidade.

- (A) Doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial sistêmica.
- (B) Acidente vascular cerebral (AVC).
- (C) Demências, especialmente a doença de Alzheimer.
- (D) Diabetes mellitus tipo 2.

31. Entre as pessoas idosas, a queda é considerada um evento capaz de ocasionar uma série de complicações. Alguns riscos, para a segurança física, dependem do ambiente em si. Assinale a alternativa que contém risco para queda em idoso.

- (A) Presença de tapetes soltos, de vazamentos de água e de piso ou buracos.
- (B) Utilização de óculos ou de aparelho auditivo indicado por um profissional.
- (C) Instalação de barras de apoio, bem como pisos e calçadas niveladas.
- (D) Adaptação de camas, de cadeiras, de sofás ou de assentos de acordo com a necessidade do idoso.

32. Dona Maria chegou a uma unidade de saúde com os seguintes sintomas: tontura, fraqueza e sudorese (pressão arterial 110x70 e glicemia de capilar 60mg/dl). Sobre as possibilidades de manejo diante de um paciente com hipoglicemia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O próprio paciente pode ingerir pequena dose (30g a 40g) de carboidrato simples diante dos sintomas serem ainda primários.
- (B) O profissional pode orientar a ingestão do carboidrato simples mais de uma vez, com intervalo de 15 minutos da primeira oferta, caso seja necessário.
- (C) Um amigo ou familiar também pode ajudar, oferecendo carboidrato simples; se a pessoa não conseguir engolir, deve forçar até obter sucesso na ingestão.
- (D) Se o quadro agravar (sintomas de hipoglicemia grave), administrar insulina de acordo com a prescrição médica.


33. Segundo a Lei nº 8.080 de 1990, que tem como disposição preliminar as ações e os serviços de saúde, a Vigilância Sanitária é descrita como:

- (A) um conjunto de ações capaz de eliminar, de diminuir ou de prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (B) um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e de adotar as medidas de prevenção e de controle das doenças ou agravos.
- (C) um conjunto de ações que visa a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e aos agravos advindos das condições de trabalho.
- (D) um conjunto de ações que abrange a assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho e a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.

34. “Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e os pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos” está descrito em qual capítulo do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (2017)?

- (A) Capítulo dos Deveres.
- (B) Capítulo dos Direitos.
- (C) Capítulo das Obrigações.
- (D) Capítulo dos Princípios Fundamentais.

35. Você, gestor de um serviço de saúde, com intuito de potencializar as medidas de prevenção e de assistência de Enfermagem, enfatiza a necessidade de considerar a hierarquia de controle de riscos. De acordo com a hierarquia de controle de riscos, proposta pelo Ministério da Saúde (2021), analise a imagem a seguir:



Disponível em: [https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-contenido/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude\\_5ed\\_21nov21\\_isbn5.pdf](https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-contenido/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude_5ed_21nov21_isbn5.pdf).

Assinale a alternativa que contém a sequência, de cima para baixo, dos controles de riscos que devem ser inseridos nas lacunas da imagem supracitada.

- (A) Eliminação dos riscos, Substituição dos riscos, Controle de engenharia, Controle administrativo e Equipamentos de proteção individual (EPIs).
- (B) Equipamentos de proteção individual (EPIs), Eliminação dos riscos, Substituição dos riscos, Controle de engenharia e Controle administrativo.
- (C) Controle de engenharia, Controle administrativo, Equipamentos de proteção individual (EPIs), Eliminação dos riscos e Substituição dos riscos.
- (D) Controle administrativo, Controle de engenharia, Eliminação dos riscos, Substituição dos riscos e Equipamentos de proteção individual (EPIs).

36. O *M. tuberculosis* é transmitido por via aérea, de uma pessoa com tuberculose (TB) pulmonar ou laringea, que elimina bacilos no ambiente. Sobre a transmissão da tuberculose, segundo o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (2019), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A transmissão é feita por via respiratória, pela inalação de aerossóis produzidos pela tosse, pela fala ou pelo espirro de um doente com tuberculose ativa pulmonar ou laringea.
- (B) Os bacilos que se depositam em roupas, em lençóis, em copos e em outros objetos se dispersam em aerossóis e, por isso, merecem atenção, pois têm papel importante na transmissão da doença.
- (C) Os pacientes com exame bacteriológico de escarro positivo sustentam a cadeia de transmissão da doença.
- (D) Estima-se que uma pessoa com baciloscopia positiva infecte de 10 a 15 pessoas em média, em uma comunidade, durante um ano.

37. Em 2006, o Ministério da Saúde divulgou o Pacto pela Saúde, que versa sobre a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto. Sobre o Pacto pela Vida, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Significa uma ação prioritária no campo da saúde que deverá ser executada com foco em resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados.
- (B) Dentre as prioridades para o Pacto pela Vida, tem-se a de implementar um projeto permanente de mobilização social com a finalidade de mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos.
- (C) Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde e aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas.
- (D) As doenças prioritárias enfatizadas nesse Pacto são: as doenças emergentes e as endemias, com ênfase na dengue, na hanseníase, na tuberculose, nas parasitoses, na malária e na influenza.

38. Durante uma consulta de Enfermagem, você ouviu de um paciente o seguinte relato: "Doutora, eu estou aqui, pois estou sendo perseguido por uma máfia chinesa, que está querendo me matar; todos da minha casa estão ajudando a máfia". Diante desse caso hipotético, você, ao registrar no prontuário, diz que o paciente, segundo o conteúdo, apresenta:

- (A) alucinações visuais.
- (B) agnosia.
- (C) delírio.
- (D) compulsão.

39. A pressão arterial (PA) deve ser medida em toda avaliação por médicos, de qualquer especialidade, e por todos os profissionais da saúde devidamente capacitados. Para tanto, no diagnóstico de hipertensão, deve-se também fazer a verificação correta da medição da PA. Sobre a medida da pressão arterial no consultório, conforme as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2020), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O paciente deve sentar-se confortavelmente em um ambiente silencioso por 10-15 minutos antes de iniciar as medições da PA.
- (B) Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos há, pelo menos, 60 minutos e não fumou nos 30 minutos anteriores.
- (C) O manguito deve ser posicionado ao nível do coração. A palma da mão deve estar voltada para baixo, e as roupas não devem garrotear o braço.
- (D) As costas e o antebraço devem estar apoiados; as pernas podem estar cruzadas; e os pés, apoiados no chão.

40. Paciente apresenta quadro diarreico, com estado geral irritado, olhos fundos, bebe água rápido e avidamente, pulso cheio e sinal da prega abdominal desaparece lentamente. Segundo o protocolo sobre Manejo do Paciente com Diarreia, proposto pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa **CORRETA** que corresponde ao estado de desidratação que o paciente possa estar.

- (A) Sem desidratação.
- (B) Com desidratação.
- (C) Com desidratação moderada.
- (D) Com desidratação grave.