

## CONHECIMENTOS BÁSICOS – LÍNGUA PORTUGUESA

## Apêndice

01 Nesta história, o facto de se melhorar as condições do trabalho visa tão-só um incremento de produção. É melhor do  
02 que nada, mas está muito aquém da verdadeira utilidade daquilo que é inútil: “também Georges Bataille se perguntou, em *El*  
03 *limite de lo útil*, sobre a necessidade de imaginar uma economia atenta à dimensão do antiutilitarismo [...].

04 O erro está muito próximo da inutilidade e ambos têm um papel fulcral na criatividade. Não precisarei de salientar este  
05 ponto que já foi muito debatido, mas sublinho a convicção de que as coisas mais importantes da vida não são utilitárias:  
06 desprezamos quem faz um gesto por lucro ou benefício e não pelo gesto em si, ou por amizade ou amor. O que sentiríamos se  
07 um amigo confessasse que só conversa conosco porque lhe pagam para isso? Ou que uma mãe confessasse ao filho que apenas  
08 o educa e trata bem de modo a ter alguém para a amparar na velhice? É na inutilidade que está o altruísmo e aquilo que o ser  
09 humano considera naturalmente mais nobre.

CRUZ, Afonso. **Vamos comprar um poeta**. Porto Alegre: Dublinense, 2020, p. 82-83.

01. Observa-se uma **INCORREÇÃO** quanto à sintaxe de concordância verbal no seguinte fragmento textual:

- (A) “Nesta história, o facto de se melhorar as condições do trabalho visa tão-só um incremento de produção”.
- (B) “É na inutilidade que está o altruísmo e aquilo que o ser humano considera naturalmente mais nobre”.
- (C) “O erro está muito próximo da inutilidade e ambos têm um papel fulcral na criatividade”.
- (D) “Não precisarei de salientar este ponto que já foi muito debatido”.

02. Com base unicamente neste trecho “É na inutilidade que está o altruísmo” (l. 08), é **CORRETO** interpretar que:

- (A) a palavra “altruísmo” faz alusão a algo sem serventia para si próprio.
- (B) o substantivo “inutilidade” remete ao sentido de desinteresse, isenção.
- (C) os termos “inutilidade” e “altruísmo” estão no mesmo campo semântico.
- (D) o uso de “inutilidade” e “altruísmo” implica redundância, repetição de ideias.

03. O termo sublinhado em “e **ambos** têm um papel fulcral na criatividade” (l. 04) retoma os referentes:

- (A) “economia” e “antiutilitarismo”.
- (B) “papel” e “criatividade”.
- (C) “ponto” e “convicção”.
- (D) “erro” e “inutilidade”.

04. A oração “É na inutilidade que está o altruísmo” (l. 08) pode ser reescrita, mantendo-se o mesmo significado, da seguinte forma:

- (A) *O altruísmo está na inutilidade.*
- (B) *A inutilidade está no altruísmo.*
- (C) *A inutilidade está o altruísmo.*
- (D) *O altruísmo está a inutilidade.*

05. O verbo debater, neste trecho “**este ponto que já foi muito debatido**” (l. 04 e 05), está na voz passiva analítica. Ao se colocar esse verbo na voz passiva sintética, conservando-se o aspecto semântico-temporal de tal fragmento textual, tem-se esta forma:

- (A) *este ponto que já tem sido muito debatido.*
- (B) *este ponto que já se tem debatido muito.*
- (C) *este ponto que já se faz muito debatido.*
- (D) *este ponto que já se debateu muito.*

06. De acordo com as regras ortográficas determinadas pelo AOLF 1990, em qual alternativa existe erro ortográfico?

- (A) “É melhor do que nada, mas está muito aquém da verdadeira utilidade daquilo que é inútil”.
- (B) “É na inutilidade que está o altruísmo e aquilo que o ser humano considera naturalmente mais nobre”.
- (C) “Nesta história, o facto de se melhorar as condições do trabalho visa tão-só um incremento de produção”.
- (D) “Georges Bataille se perguntou, em *El limite de lo útil*, sobre a necessidade de imaginar uma economia atenta à dimensão do antiutilitarismo”.

07. Considerando a regência dos verbos constantes do primeiro parágrafo, aponte a alternativa **CORRETA**.

- (A) Inexistem verbos de ligação nesse trecho.
- (B) O verbo visar, nesse contexto, é transitivo indireto.
- (C) A forma verbal “perguntou” tem dois complementos.
- (D) Em tal trecho, “melhorar” e “imaginar” têm regência diferente.

08. Em “uma economia atenta à dimensão do antiutilitarismo” (l. 03), o termo destacado exerce a função sintática de:

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) adjunto adnominal.
- (D) agente da passiva.

09. Analise as palavras que constam deste excerto “É melhor do que nada, mas está muito aquém da verdadeira utilidade daquilo que é inútil” (l. 01 e 02) e marque a asserção **EXATA**.

- (A) Nesse período, inexistente pronome indefinido.
- (B) O único substantivo desse trecho é primitivo.
- (C) O primeiro adjetivo está no superlativo relativo.
- (D) Observa-se uma locução adverbial de intensidade.

10. No segundo parágrafo, o autor defende a tese que se baseia:

- (A) no desprezo pelas atitudes pseudoantiutilitárias.
- (B) no utilitarismo exacerbado nas relações humanas.
- (C) na tentativa de buscar as coisas mais significativas.
- (D) na ausência de interesses nas relações interpessoais.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO PSF**

**11.** Um trabalhador de 50 anos viu em sua empresa um cartaz onde incentivava os trabalhadores a partir de 50 anos a realizarem o exame de detecção precoce do câncer de próstata com o toque prostático e PSA (sigla em inglês de antígeno específico da próstata). Ele foi ao posto de saúde, conversou com o médico e quis saber mais detalhes sobre os exames. Em relação aos exames de detecção precoce do câncer de próstata, é verdadeiro afirmar:

- (A) o PSA é um exame substituto do toque prostático
- (B) quanto menor o percentual de PSA livre, maior a chance de câncer prostático
- (C) pacientes sem histórico familiar de câncer de próstata é indicado a iniciar exames a partir dos 30 anos de idade
- (D) PSA é um antígeno específico do tumor de próstata

**12.** O índice de mortalidade materna é um importante indicador sobre a saúde da mulher, retratando as condições de saúde e de atenção à saúde da mulher e suas desigualdades. Razões de mortalidade materna (RMM) elevadas indicam:

- (A) baixa cobertura vacinal e de vigilância de doenças infecciosas.
- (B) alta cobertura de assistência pré-natal, mas baixa qualidade.
- (C) alta cobertura vacinal e de vigilâncias de doenças infecciosas.
- (D) precárias condições socioeconômicas e de assistência à saúde.

**13.** Uma jovem de 18 anos primigesta e com idade gestacional (IG) de 20 semanas vai à consulta pré-natal, com cartão vacinal comprovando esquema completo para tétano aos 10 anos. Em relação à recomendação do esquema vacinal da dupla dT (difteria e tétano) durante a gravidez, a conduta correta para essa gestante é:

- (A) vacinar, pois o esquema completo foi realizado há mais de 05 anos; fazer dose de reforço.
- (B) não vacinar, pois só gestantes com esquema vacinal prévio incompleto necessitam de reforço.
- (C) não vacinar, pois o esquema vacinal está completo e dentro dos 10 anos.
- (D) vacinar, pois com a gestação se faz o esquema completo da dT como nunca se tivesse vacinado.

**14.** Um grupo de pesquisadores estudou associação entre aleitamento materno e o desenvolvimento de um determinado tipo de meningite. Para tanto, mediram as taxas de amamentação em populações brasileiras e as compararam com as incidências de meningite por *Haemophilus influenzae* nos mesmos locais, 01 a 03 anos mais tarde. Foi detectada forte correlação negativa, sugerindo efeito protetor do aleitamento materno. Esse estudo é classificado como:

- (A) de Coorte.
- (B) ensaio clínico.
- (C) ecológico.
- (D) caso-controle.

**15.** Em uma consulta de puericultura na UBASF (Unidade Básica de Saúde da Família), a mãe de um lactente relata ao médico que seu filho “descobriu” e brinca com as próprias mãos, na última semana, e as aproxima em frente do ao seu corpinho. Esse lactente deve estar com idade, em meses, de:

- (A) 02.
- (B) 03.
- (C) 04.
- (D) 06.

**16.** Ao nascerem, os recém-nascidos recebem vacinas, dentre essas, a BCG; seguindo o calendário vacinal do Ministério da Saúde (MS). Essa vacina especificamente protege a criança:

- (A) da forma grave de pneumonia.
- (B) da tuberculose pulmonar.
- (C) da meningite meningocócica.
- (D) da forma grave de tuberculose.

**17.** Um lactente de 11 meses, alimentado exclusivamente com leite de vaca, é levado por sua mãe ao posto de saúde devido a dores nas pernas. Ao exame físico: criança hipocorada, apresenta dor ao manuseio das extremidades e permanece na posição em “pernas de rã”, quando colocada deitado na mesa de exame. O diagnóstico é:

- (A) raquitismo carencial.
- (B) hipovitaminose A.
- (C) escorbuto.
- (D) hipovitaminose E.

**18.** Uma criança de 05 anos apresenta lesões vesicopustulosas e erosões crostosas há 05 dias, comprometendo a região perinatal bilateral, a região mentoniana e a fronte. Não há sintomatologia geral, porém há relato de coriza nasal há uma semana. Os achados clínicos são compatíveis com:

- (A) impetigo.
- (B) sarampo.
- (C) rubéola.
- (D) foliculite.

**19.** Criança de 04 anos chega à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com história de febre alta há 12 horas, acompanhada de vômitos e cefaleia. Após baixar temperatura, está toxemiada, com petéquias em conjuntivas, esparsas sufusões hemorrágicas em tronco, presença de hipotensão arterial e ausência de sinais meníngeos. O diagnóstico provável nesse caso é:

- (A) febre maculosa.
- (B) hantavirose.
- (C) dengue.
- (D) meningococcemia.

**20.** Um sopro pansistólico paraesternal esquerdo, alto, rude, mais audível na borda esternal esquerda inferior e acompanhado de frêmito, sugere:

- (A) Comunicação interatrial (CIA).
- (B) Comunicação interventricular (CIV).
- (C) Persistência do canal arterial (PCA).
- (D) Coarctação aórtica.

21. Hipertensão sistólica isolada é bastante comum em idosos. Outra causa comum de hipertensão arterial sistólica com pressão arterial diastólica normal ou baixa é:
- (A) doença policística renal.
  - (B) feocromocitoma.
  - (C) hipertireoidismo.
  - (D) pielonefrite crônica.
22. Cada parede cardíaca é vista no eletrocardiograma (ECG) por um conjunto de derivações. Dessa forma, quais derivações visualizam a parede inferior?
- (A) V1, V2 e V3.
  - (B) V4, V5 e V6.
  - (C) D1, aVL e aVR.
  - (D) D2, D3 e aVF.
23. Homem, 50 anos, dá entrada no HGF (Hospital Geral de Fortaleza) 03 horas após o início de quadro súbito caracterizado por intensa vertigem rotatória, náuseas e vômitos incoercíveis, nistagmo horizontal, Síndrome de Horner à direita, hipoestesia facial à direita, hemiataxia cerebelar à direita, hipoestesia térmico-dolorosa no dimídio esquerdo, poupando face. O episódio sugere:
- (A) trombose da artéria vertebral direita.
  - (B) hemorragia da artéria meníngea média.
  - (C) trombose do seio transverso.
  - (D) neurofibromatose tipo II.
24. A neoplasia sabidamente associada à miastenia grave, cuja extirpação influencia o prognóstico, caso feita precocemente na evolução da doença, é:
- (A) meningioma.
  - (B) sarcoma.
  - (C) timoma.
  - (D) linfoma.
25. Mulher de 30 anos, em uso de contraceptivo oral combinado, apresenta dispneia súbita, com taquipneia e dor pleurítica. A radiografia do tórax mostrou sinais de derrame pleural e condensação em base pulmonar esquerda com formato em cunha. Esses dados favorecem a hipótese de:
- (A) atelectasia.
  - (B) embolia pulmonar.
  - (C) carcinoma broncogênico.
  - (D) paquipleurite.
26. Qual defeito de campo visual que um paciente com adenoma hipofisário causando compressão do quiasma óptico apresentará na fase inicial?
- (A) Hemianopsia binasal.
  - (B) Hemianopsia homônima.
  - (C) Quadrantanopsia heterônima.
  - (D) Hemianopsia heterônima bitemporal.
27. Em tempos em que a beleza é cada vez mais exigida por uma sociedade narcisista, muitas pessoas praticam a bulimia, regimes extremos e uso abusivo de medicações para emagrecer. As complicações clínicas mais comuns, entre os pacientes com bulimia nervosa, incluem:
- (A) destruição do esmalte dentário, arritmia cardíacas e hemorragia digestiva.
  - (B) obesidade, amenorreia e uso abusivo de diuréticos.
  - (C) ataxia, aparecimento de lanugo e delirium.
  - (D) caquexia, hemorragia digestiva e hipercarotemia.
28. Paciente jovem vai ao posto relatando perda retal de sangue vermelho vivo (hematoquezia) sem alterações hemodinâmicas, apesar de o volume ser expressivo, segundo o paciente; isso permite deduzir que a origem desse sangue tenha origem no:
- (A) delgado distal.
  - (B) cólon distal.
  - (C) duodeno.
  - (D) esôfago.
29. Homem de 60 anos vai à Unidade Básica de Saúde da Família (UBASF) com dor em hipogastro, alegando dificuldade miccional e relata ter feito sonda vesical de alívio algumas vezes. Qual a principal causa de retenção urinária em paciente nessa faixa etária?
- (A) Bexiga neurogênica.
  - (B) Cistite intersticial.
  - (C) Estenose uretral.
  - (D) Hiperplasia prostática benigna.
30. Paciente de meia idade procura médico com problemas conjugais devido à sua disfunção erétil; relata boa libido, porém com ereção não eficaz. O médico avalia a condição geral do paciente e prescreve tadalafila para resolver seu problema de disfunção erétil. Qual das alternativas é contraindicação formal para o uso de inibidores das fosfodiesterase no tratamento da disfunção erétil?
- (A) Hiperplasia prostática benigna.
  - (B) Uso de betabloqueadores.
  - (C) Uso de nitratos.
  - (D) Idade acima de 65 anos.
31. Mulher com 65 anos, menopausada há 12 anos, relata que nunca fez uso de terapia de reposição hormonal; fez ultrassonografia transvaginal e foi evidenciado um mioma calcificado causando compressão em ureter direito. A melhor conduta, neste caso, é:
- (A) histerectomia total.
  - (B) embolização das artérias uterinas.
  - (C) contraceptivo oral combinado.
  - (D) progestagênio contínuo.
32. A *diabetes mellitus* é uma epidemia em franca expansão em todo mundo. A cada dia, surgem novas medicações com melhores ações e menos efeitos adversos. Os medicamentos abaixo apresentam perda de peso, reduzem o nível de insulina e são cardioprotetores, **EXCETO**:
- (A) Arcabose.
  - (B) Inibidores SGLT-2.
  - (C) Análogos GLP-1.
  - (D) Sulfonilureias.
33. A educação em massa, para o câncer mamário, que incentiva a prática do autoexame da mama é uma medida preventiva de nível:
- (A) primário: proteção específica.
  - (B) primário: promoção da saúde.
  - (C) secundário: diagnóstico e tratamento precoces.
  - (D) secundário: diagnóstico precoce e limitação da incapacidade.

**34.** Paciente dá entrada em UPA com abdome agudo. Ao exame físico, deve, obrigatoriamente, incluir:

- (A) reflexo pupilar.
- (B) toque retal.
- (C) inspeção da cavidade oral.
- (D) palpação de gânglios axilares.

**35.** A Portaria nº 1.943, de 18 de outubro de 2001, define a relação de doenças de notificação compulsória para todo território nacional. Os casos suspeitos ou confirmados das doenças relacionadas a seguir são de notificação compulsória às secretarias estaduais e municipais da saúde e à fundação nacional de saúde, **EXCETO**:

- (A) malária em área endêmica.
- (B) raiva humana.
- (C) hanseníase.
- (D) tuberculose pulmonar.

**36.** Dentre os estudos epidemiológicos, aquele que reúne características que conferem maior validade científica é o:

- (A) ensaio clínico randomizado.
- (B) estudo de prevalência.
- (C) estudo de caso-controle.
- (D) estudo de Coorte.

**37.** Vivemos uma época de novas epidemias em todo o mundo, em que novos germes estão infectando homens e anteriores, ressurgindo, como no caso do ebola. A capacidade de um bioagente produzir casos graves e/ou fatais é a definição de:

- (A) poder invasivo.
- (B) virulência.
- (C) infectividade.
- (D) imunogenicidade.

**38.** Um paciente suspeita de uma doença, faz o exame dessa determinada doença, solicitado por um médico assistente, cujo resultado foi negativo; não satisfeito com o resultado, procurou outro médico que conhece as características desse teste (sensibilidade = 80%, especificidade = 85%, valor preditivo positivo = 80% e valor preditivo negativo = 90%). Assinale a opção que contenha a possibilidade de o paciente estar doente, mesmo tendo obtido um resultado negativo no teste.

- (A) 20%.
- (B) 15%.
- (C) 10%.
- (D) 05%.

**39.** O SUS (Sistema Único de Saúde) foi o 1º sistema de saúde da América Latina, incorporou os princípios do movimento de reforma sanitária e é uma conquista de todos os cidadãos brasileiros. A base legal para formação desse sistema foi estabelecida no(a):

- (A) VI Conferência Nacional de Saúde.
- (B) Pacto pela Saúde – 2006.
- (C) Norma Operacional Básica – NOB SUS nº 01/92.
- (D) Constituição Federal de 1978.

**40.** Uma idosa foi atropelada por um automóvel na rua em frente de sua casa. O SAMU (Sistema de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e, chegando ao local, fez os primeiros socorros e a levou para o hospital de referência, onde se submeteu a uma cirurgia em virtude do TCE (Traumatismo Cranioencefálico). No oitavo dia de pós-operatório, apresentou meningite bacteriana, evoluiu com sepse e morreu após 03 dias. De acordo com as normas da OMS (Organização Mundial da Saúde), a causa básica desse óbito foi:

- (A) traumatismo cranioencefálico.
- (B) atropelamento por automóvel.
- (C) meningite bacteriana.
- (D) sepse.