423

EMPRESA CUIABANA
DE SAÚDE PÚBLICA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA - ECSP

EDITAL Nº 01/2023/ECSP

MÉDICO CARDIOLOGISTA

Duração: 2h (duas horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS				CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	LEGISLAÇÃO	
1 a 4	5 a 6	7 a 8	9 a 10	11 a 20

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No Cartão de Respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 O candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá declarar sua desitência do Processo Seletivo Simplificado e assinar o Termo de Ocorrência, que será lavrado pelo Coordenador do Local.

07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 30 (trinta) minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará obrigatoriamente o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal de sala, ressalvado o estabelecido em Edital.

09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.

10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Anvisa torna permanente entrega de remédio controlado em casa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tornou definitiva a prática da entrega de medicamento controlado na casa dos pacientes. A medida foi autorizada durante a pandemia em caráter provisório.

No entanto, a agência alterou a quantidade máxima de remédios por receita para a entrega remota. Durante a pandemia, a quantidade havia sido ampliada, porém essa permissão perdeu a validade na semana passada.

Na pandemia, por exemplo, era permitida a entrega de 18 ampolas ou quantidade suficiente para seis meses de tratamento de medicamentos com controle especial. Agora, podem ser entregues cinco ampolas ou quantidade para 60 dias de tratamento.

Para fazer a entrega de medicamentos controlados em domicílio, farmácias e drogarias precisam cumprir algumas regras. São elas:

- O estabelecimento deve buscar a receita médica ou receber em formato eletrônico antes de fazer a entrega;
- As informações da receita devem ser checadas, como tipo, quantidade, validade. O farmacêutico deve orientar o paciente sobre os cuidados necessários;
- O estabelecimento deve reter a via original da prescrição médica;
- Farmácias e drogarias devem manter em seus sistemas dados dos pacientes para acompanhamento e fiscalização das autoridades sanitárias;
- No momento da entrega do remédio, devem ser colhidas as assinaturas necessárias;
- Estão autorizados a fazer entrega remota de medicamento controlado estabelecimentos privados, públicos e para programas governamentais. (com Agência Brasil)

Fonte: https://www.jb.com.br/bem-viver/saude/2023/09/1046205-anvisa-torna-permanente-entrega-de-remedio-controlado-em-casa.html. Acesso em: 19 out. 2023.

1. O texto tem como objetivo central:

A) divulgar que haverá entrega permanente de medicamentos controlados na casa dos pacientes, mediante regras
B) explicar que todos os pacientes devem assinar as entregas dos medicamentos em seu próprio domicílio
C) realizar campanha política favorável a quem autorizou a entrega de medicamentos em domicílio
D) ampliar o número de ampolas que um paciente pode receber em domicílio

2. "**No entanto**, a agência alterou a quantidade máxima de remédios por receita para a entrega remota" (2º parágrafo). O conectivo destacado estabelece relação semântica de:

A) causa
B) tempo
C) contraste
D) consequência

3. "Durante a pandemia, a **quantidade** havia sido ampliada, **porém** essa permissão perdeu **a** validade na semana passada" (2º parágrafo). Nesse trecho, as palavras destacadas são, respectivamente, classificadas como:

A) numeral – preposição – preposição
B) numeral – conjunção – preposição
C) substantivo – preposição – artigo
D) substantivo – conjunção – artigo

4. "O estabelecimento **deve** buscar a receita médica ou receber em formato eletrônico antes de fazer a entrega". O verbo destacado tem o mesmo sentido de obrigação atestado em:

A) Meu pai acha que deve cem reais ao meu irmão.
B) Ele deve estudar muito, se quiser ser aprovado amanhã.
C) Todos estão dizendo que deve chover muito hoje à tarde.
D) Acho que deve fazer uns cinco anos que não vejo meus tios.

RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Conceição vai assistir a uma partida do time de futebol pelo qual ela torce. Em meio à expectativa pela partida, ela afirmou: "Se meu time não vencer essa partida, então eu vou parar no hospital".
A negação lógica da afirmação de Conceição é:

A) Meu time vence essa partida e eu vou parar no hospital.
B) Meu time não vence essa partida e eu vou parar no hospital.
C) Meu time vence essa partida e eu não vou parar no hospital.
D) Meu time não vence essa partida e eu não vou parar no hospital.

6. Regina tem um jogo em que peças de madeira, representando algarismos, devem ser colocadas uma ao lado da outra para formar números. Certa vez, ela formou o número 12245 e, em seguida, pediu para que sua filha, usando essas mesmas cinco peças, formasse todos os números possíveis. Se a filha de Regina atingiu o objetivo proposto, então ela formou exatamente a seguinte quantidade de números:

A) 36
B) 48
C) 60
D) 84

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

7. Na Internet ou em uma intranet baseada em TCP/IP, os computadores são identificados na comunicação entre redes por meio de seu endereço IP. Um exemplo de endereço IP válido é:

A) 258.10.1.324
B) 100.10.10.280
C) 192.168.81.270
D) 104.112.137.78

8. Dentre as informações fornecidas pelo utilitário do Windows 11, em sua versão em português, denominado 'Gerenciador de Tarefas', é possível citar:

A) a taxa de utilização do processador por cada processo
B) as atividades a serem desenvolvidas por cada usuário local
C) o total de armazenamento disponível nos discos no momento
D) o conteúdo e as operações de cada registrador do processador

LEGISLAÇÃO

9. De acordo com o art. 2° da Lei Orgânica do Município de Cuiabá – MT, são poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e:

A) o Executivo
B) o Judiciário
C) a Secretaria Municipal
D) a Câmara de Vereadores

10. Conforme o art. 194 da Constituição Federal, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à:

A) Assistência, à Saúde e à Moradia
B) Assistência, à Vida e à Previdência
C) Saúde, à Assistência e à Educação
D) Saúde, à Previdência e à Assistência Social

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Um paciente foi à primeira consulta com cardiologista, queixando-se de dor torácica aos moderados esforços, há cerca de 3 meses. Levou um ecocardiograma transtorácico que evidenciou fração de ejeção do VE de 35%, área valvar aórtica de 0,8 e gradiente sistólico médio de 35mmHg. Nesse cenário, o próximo exame que deve ser solicitado é:

A) o Ecocardiograma sob estresse farmacológico
B) o Ecocardiograma transesofágico
C) a Ressonância magnética
D) o Teste ergométrico

12. Um paciente, 32 anos, foi ao consultório para consulta de rotina e, durante o atendimento, foi realizada a medida da pressão arterial dele com a média das duas últimas medidas: 190x115mmHg. O ECG evidenciou ritmo sinusal, eixo preservado, sinais de sobrecarga de átrio e ventrículo esquerdos. Sobre o caso clínico, a melhor conduta a ser tomada é:

A) orientar mudança do estilo de vida e retorno em 3 meses para reavaliação
B) não iniciar tratamento medicamentoso e solicitar MAPA para excluir hipertensão do jaleco branco
C) iniciar tratamento com uma classe de anti-hipertensivo e solicitar exames para rastreamento de lesão de órgão alvo
D) iniciar tratamento com duas classes de anti-hipertensivos e solicitar exames para rastreamento de lesão de órgão alvo

13. Um paciente, 57 anos, tabagista ativo, realizou cateterismo cardíaco por quadro de angina estável com o resultado a seguir: coronária direita sem lesões obstrutivas, tronco das coronárias esquerdas sem lesões obstrutivas, artéria descendente anterior, evidenciando lesão intermediária e circunflexa, sem lesões obstrutivas. Foi realizado iFR na lesão da artéria descendente anterior, com resultado de 0,85. Com relação a esse caso, é correto afirmar que o implante de Stent coronário na artéria descendente anterior:

A) deve ser considerado, pois o valor de referência do iFR para intervenção é menor ou igual a 0,89
B) deve ser considerado, pois o valor de referência do iFR para intervenção é menor ou igual a 0,85
C) não deve ser considerado, pois o valor de referência do iFR para intervenção é menor ou igual a 0,83
D) não deve ser considerado, pois o valor de referência do iFR para intervenção é menor ou igual a 0,80

14. Em um quadro assintomático, o fechamento percutâneo de CIA (comunicação interatrial) deve ser considerado no caso de paciente de:

A) 29 anos, com ECO evidenciando CIA ostium primum e índice Qp/Qs de 1,7
B) 36 anos, com ECO evidenciando CIA ostium primum e índice Qp/Qs de 1,3
C) 37 anos, com ECO evidenciando CIA ostium secundum e índice Qp/Qs de 1,7
D) 42 anos, com ECO evidenciando CIA ostium secundum e índice Qp/Qs de 1,3

15. Um paciente, 72 anos, com diagnóstico recente de síndrome do túnel do carpo, foi encaminhado ao cardiologista para a realização de risco cirúrgico. Durante o atendimento, o paciente relata quadro de dispneia aos moderados esforços e edema discreto de membros inferiores há cerca de 4 meses. O ECG realizado na consulta evidencia ritmo de fibrilação atrial e complexos QRS de baixa voltagem. O diagnóstico mais provável é:

A) Amiloidose
B) Sarcoidose
C) Doença de Fabry
D) Doença de Chagas

16. As dosagens consideradas para a realização da fórmula de Friedewald são:

A) LDL colesterol e triglicerídeos
B) Colesterol total e triglicerídeos
C) Colesterol total e HDL colesterol
D) Colesterol total, HDL colesterol e triglicerídeos

17. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção (FE) melhorada ocorre em pacientes com uma fração de ejeção basal menor que:

A) 40%, com um aumento de, no mínimo, 5 pontos da FE basal e uma segunda medição da FE maior que 40%
B) 40%, com um aumento de, no mínimo, 10 pontos da FE basal e uma segunda medição da FE maior que 40%
C) 50%, com um aumento de, no mínimo, 5 pontos da FE basal e uma segunda medição da FE maior que 50%
D) 50%, com um aumento de, no mínimo, 10 pontos da FE basal e uma segunda medição da FE maior que 50%

18. O prolongamento do intervalo QT, no eletrocardiograma, é encontrado no distúrbio hidroeletrolítico denominado:

A) hipocalemia
B) hipercalemia
C) hipocalcemia
D) hipercalcemia

19. Paciente com história de febre reumática, com cardite prévia e sem sequelas valvares, deve fazer uso da profilaxia com Penicilina Benzatina com duração:

A) até os 18 anos ou por 5 anos após o último surto
B) até os 25 anos ou por 10 anos após o último surto
C) até os 40 anos ou por toda a vida
D) por toda vida

20. Um exemplo de fenômeno vascular presente na endocardite infecciosa denomina-se:

A) glomerulonefrite
B) nódulos de Osler
C) manchas de Roth
D) lesões de Janeway