PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 - EDITAL Nº 001/2023 - ESTATUTÁRIO

DATA DA PROVA: 18/02/2024
PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: DENTISTA

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões**;
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:
NOME COMPLETO:

ANOTE ABAIXO AS SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**										

LÍNGUA PORTUGUESA

Rússia solicita reunião do Conselho de Segurança da ONU após bombardeio em Belgorod; 14 pessoas foram mortas.

A Rússia solicitou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU após ataques aéreos realizados neste sábado (30) contra a cidade de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, informou a agência de notícias estatal RIA, citando a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que 14 pessoas, incluindo duas crianças, foram mortas e 108 ficaram feridas em ataques ucranianos "indiscriminados", que supostamente incluíram bombas de fragmentação na capital da província. "O ataque terrorista em Belgorod será objeto de procedimentos no Conselho de Segurança da ONU – a Rússia solicitou uma reunião do Conselho de Segurança", disse Zakharova.

O bombardeio de sábado ocorre após a Rússia lançar da noite de quinta (28) para sexta-feira (29) o maior ataque aéreo à Ucrânia desde o início de sua invasão em grande escala, resultando em pelo menos 39 mortes e mais de 150 feridos. Os ataques ucranianos às regiões russas perto da fronteira vem ocorrendo quase diariamente há mais de um ano, por vezes resultando em vítimas civis. Se confirmado, este é um dos incidentes mais mortais.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi informado sobre o ataque em Belgorod, disse o Kremlin. Putin ordenou que uma equipe do Ministério da Saúde e equipes de resgate do Ministério de Emergências fossem enviadas à cidade para ajudar as pessoas afetadas.

Cerca de 40 instalações civis foram danificadas na cidade devido ao bombardeio, que causou 10 incêndios que já foram extintos. As autoridades russas disseram que Belgorod já havia sido bombardeada na noite de sexta-feira, com um civil morto, disse o governador da região, Vyacheslav Gladkov. Outras quatro pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas, acrescentou. No sábado, uma criança também morreu em consequência do bombardeamento ucraniano na região russa de Bryansk, disse o governador da região, Aleksandr Bogomaz.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que destruiu 32 UAVs ucranianos que sobrevoavam as regiões russas de Bryansk, Oryol, Mursk e Moscou, de acordo com uma postagem no Telegram do Ministério da Defesa no sábado. A Ucrânia não comentou publicamente os incidentes e raramente assume a responsabilidade pelos ataques ao seu vizinho.

Fonte: Rússia solicita reunião do Conselho de Segurança da ONU após bombardeio em Belgorod; 14 pessoas foram mortas | CNN Brasil

01) Assinale a alternativa que apresente o tipo textual predominante no texto:

(A) Argumentação.
(B) Descrição.
(C) Narração.
(D) Notícia.
(E) Piada

02) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO apresente dígrafo:

(A) Rússia.
(B) Morreu.
(C) Pessoas.
(D) Vizinho.
(E) Ucranianos.

03) Assinale a alternativa cuja letra em destaque NÃO represente o mesmo fonema representado pela letra *s* na palavra *quase*:

(A) Pre**s**idente.
(B) Defe**s**a.
(C) Vi**z**inho.
(D) Con**s**elho.
(E) Reali**z**ados.

04) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelos termos em destaque no período: "Se confirmado, este é um dos incidentes mais mortais".

(A) Causa.
(B) Condição.
(C) Concessão.
(D) Finalidade.
(E) Tempo.

05) Assinale a alternativa que apresente a justificativa adequada para o emprego da crase no período: "Putin ordenou que uma equipe do Ministério da Saúde e equipes de resgate do Ministério de Emergências fossem enviadas à cidade para ajudar as pessoas afetadas".

(A) Regência Verbal.
(B) Locução Adverbial.

(C) Locução Prepositiva.
(D) Regência Nominal.
(E) Locução Conjuntiva.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

06) Adriana está em busca de um terreno para construir sua casa. Um terreno de dimensões 12 x 25 metros foi lhe oferecido pelo valor de R$ 285.000,00. Nesta proposta o valor do metro quadrado deste terreno tem o custo de:

(A) R$ 850,00.
(B) R$ 875,00.
(C) R$ 925,00.
(D) R$ 950,00.
(E) R$ 1.050,00.

07) Em uma promoção no supermercado X um cartaz informa que o valor de 150 gramas de queijo prato é R$ 7,80. Se um cliente decide comprar um quilo deste queijo vai pagar por ele o total de:

(A) R$ 48,90.
(B) R$ 50,80.
(C) R$ 52,00.
(D) R$ 54,80.
(E) R$ 56,20.

08) A tabela seguinte mostra o número de ocorrências urgentes um uma unidade de saúde durante o turno da madrugada em um período de 7 dias:

Dia	Número de Ocorrências Urgentes
1	4
2	5
3	2
4	5
5	4
6	3
7	1

Com base nas informações da tabela, o valor da mediana de ocorrências urgentes é igual a:

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

09) Ao longo do mês de janeiro Arlete realizou um regime visando perder peso. Antes do regime pesava 82 quilos. No dia 1º de fevereiro resolveu subir na balança e esta marcou 75,85 quilos. Com base nestas informações, qual foi a redução de peso percentual que Arlete teve?

(A) 5,10%.
(B) 6,50%.
(C) 6,75%.
(D) 7,25%.
(E) 7,50%.

10) Uma panificadora utiliza a relação de 80 gramas de café para um litro de água. Se em um evento o responsável pela panificadora foi contratado para fazer 25 litros de café, qual a quantidade em gramas de pó de café que vai ser necessário para atender o evento?

(A) 1.500 gramas.
(B) 1.750 gramas.
(C) 1.850 gramas.
(D) 1.950 gramas.
(E) 2.000 gramas.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

11) Preencha as lacunas e assinale a alternativa com a sequência correta:
No início de janeiro de 2024, mesmo com exemplos como a notável engenharia nipônica para prevenir catástrofes em situações semelhantes, as consequências de um _____ deixaram um lastro de vítimas e danos no extremo leste asiático. No território _____, chegou a ser emitido um alerta de _____. Esse tema deixa a própria comunidade internacional apreensiva, devido ao desastre relacionado à usina nuclear de Fukushima no início da década passada.

(A) Terremoto/japonês/tsunami.
(B) Tufão/chinês/enchentes.
(C) Furacão/indonésio/granizo.
(D) Tornado/australiano/deslizamentos de terra.
(E) Maremoto/indiano/erupção vulcânica.

12) O município de Janiópolis foi oficialmente criado em 1961, ao ser desmembrado da jurisdição de Campo Mourão. Embora sua história seja comumente remetida à trajetória do ex-presidente Jânio Quadros, sua criação foi um processo ocorrido em nível estadual. Qual dos nomes abaixo se refere ao então governador do Paraná que sancionou a criação do município de Janiópolis?

(A) Jaime Lerner.
(B) Ney Aminthas de Barros Braga.
(C) Roberto Requião de Mello e Silva.
(D) Carlos Alberto Richa.
(E) Álvaro Fernandes Dias.

13) Do ponto de vista da transição energética e da economia global, uma das principais apostas do setor automotivo está relacionada aos veículos elétricos. Embora a empresa norte-americana Tesla tenha dominado o setor nos últimos anos, no quarto trimestre de 2023 ela foi ultrapassada em volume de vendas por uma empresa asiática. Tal fato ainda não modifica a hegemonia ocidental no setor, mas torna evidente uma possível mudança na geopolítica econômica mundial. Qual das alternativas abaixo se refere a empresa em questão?

(A) JAC
(B) Hyundai
(C) BYD
(D) Great Wall
(E) Honda

14) Preencha a lacuna e selecione a alternativa com a sequência correta:
Devido às fortes chuvas em 2023, o vertedouro da usina de Itaipu foi aberto em capacidade total, causando um espetáculo tão belo quanto incomum, e por isso muito procurado por turistas. O empreendimento foi construído a partir da parceria entre Brasil e _____. No processo de construção de sua barragem e de constituição do seu gigantesco lago no rio _____, outro ponto turístico paranaense desapareceu. Hoje submerso, existe apenas na memória o lugar outrora conhecido entre outros nomes como _____.

(A) Argentina/Iguaçu/Cataratas.
(B) Bolívia/Ivaí/Corredeiras.
(C) Uruguai/Tibagi/Pontal.
(D) Paraguai/Paraná/Sete Quedas.
(E) Chile/Piquiri/Véu de Noiva.

15) Em 2023, o bioma amazônico sofreu com a severa seca nos seus principais rios. Para além de todo o contexto do desmatamento específico do bioma e do chamado aquecimento global, com registro de aumento de temperaturas no Atlântico Norte, existe um fenômeno natural em curso que também agravou a situação, pois é responsável por alterar a distribuição de umidade e temperaturas em diferentes regiões do planeta. No caso do Brasil, pode ocasionar secas prolongadas na região Norte e Nordeste, e chuvas intensas e volumosas no Sul. Qual das alternativas abaixo se refere a este fenômeno natural em questão?

(A) Pororoca.
(B) Oscilação do Mar de Labrador.
(C) La Niña.
(D) Aurora Boreal.
(E) El Niño.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Assinale a alternativa incorreta com relação à pericoronarite:

(A) Paciente com pericoronarite pode se queixar de dor durante a deglutição (disfagia), halitose, gosto ruim na boca e incapacidade de fechar os maxilares.
(B) A sintomatologia característica, nos casos mais leves, inclui dor e inchaço local e pode ser tratada com soluções irrigantes como a água oxigenada ou clorexidina, e analgésicos para diminuir a dor na região.
(C) A pericoronarite aguda nunca pode ser considerada uma infecção oportunista.
(D) Uma causa comum da inflamação pericoronária é o aprisionamento de restos de placa e comida entre a coroa do dente e o retalho gengival ou o opérculo sobrejacente.
(E) A pericoronarite pode surgir a partir de pequenos traumas ocasionados pelo terceiro molar superior sobre a mucosa superficial que recobre o terceiro molar inferior parcialmente incluso, deixando-a edemaciada, o que favorece ainda mais o traumatismo nessa região.

17) Assinale a alternativa incorreta com relação ao abscesso dentoalveolar agudo:

(A) Em casos de defesa orgânica debilitada e/ou determinadas bactérias de alta virulência, a necrose pulpar pode gerar uma infecção periapical de proporções que fogem ao controle do sistema imune causando os abscessos dentoalveolares agudos e suas desagradáveis consequências.
(B) O exame radiográfico é uma referência importante para que o profissional possa obter um diagnóstico, já que existe normalmente uma ótima correlação entre as imagens radiográficas e a condição histopatológica dos abscessos dentoalveolares agudos.
(C) Dentre todas as possíveis doenças que afetam o sistema estomatognático, os abscessos estão entre as piores, tanto em termos de sintomatologia quanto em risco de evolução para quadros gravíssimos de infecção, septicemia e até morte.
(D) Para o diagnóstico correto da doença pulpar ou periapical, o profissional tem que correlacionar a sintomatologia dolorosa, a história da doença, as atitudes tomadas pelo paciente, um bem executado exame clínico e as descobertas radiográficas.
(E) A composisão microbiológica de um

abcesso dentário agudo é polimicrobiana, composta principalmente de anaeróbios estritos e anaeróbios facultativos, mas também pode conter fungos (cândidas) e vírus.

18) "O alvéolo seco é uma das complicações pós-operatórias mais comuns após a extração de dentes permanentes. O termo Alvéolo Seco é utilizado na literatura desde 1896, contudo outros termos tem sido usados para se referir a esta condição, como osteíte alveolar (AO), osteólise localizada, alveolite pós-operatória, alveologia, alveolite seca dolorosa, cavidade séptica, cavidade necrótica, osteomielite localizada e alveolite fibrinolítica."
Assinale a alternativa incorreta com relação ao alvéolo seco:

(A) Clinicamente o alvéolo seco é caracterizado pelo esvaziamento da cavidade alveolar de uma exodontia realizada previamente.
(B) A periferia do osso alveolar fica desnudada e coberta por uma camada de tecido necrótico acinzentado e a mucosa circundante geralmente torna-se eritematosa.
(C) A lesão apresenta um odor pútrido e dor intensa que se irradia para o ouvido e pescoço. A dor é considerada o sintoma mais importante do alvéolo seco.
(D) O trismo pode ser um sintoma frequente que se desenvolve de 10 a 14 dias após a extração, se a infecção não se espalhar.
(E) A linfadenopatia regional pode estar presente no lado afetado e a febre é muito frequente.

19) A técnica de Gow-Gates apresenta vantagens em relação às demais técnicas anestésicas, verificadas por uma maior frequência de êxito, menor incidência de aspiração positiva e ausência de problemas de inervação sensorial acessória aos dentes mandibulares em comparação à técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior, por exemplo.
Assinale a alternativa incorreta com relação à técnica anestésica Gow-Gates:

(A) A abertura máxima de boca é uma das condições para a boca execução da técnica.
(B) Embora essa técnica possua grande indicação de aplicabilidade clínica, a mesma é contraindicada em pacientes que evoluem com quadros de infecção ou inflamação na área de injeção, principalmente em pacientes que, por ventura, possam vir a morder o lábio ou a língua.
(C) Na técnica de Gow-Gates, o ponto de inserção da agulha deve ser lateralizado à depressão pterigotemporal, próximo à região do musculo temporal.
(D) Recomenda-se o uso de agulhas curtas de calibre 30G.
(E) A técnica de bloqueio mandibular de Gow-Gates é uma técnica de bloqueio troncular que pode ser aplicada em diversos procedimentos que requerem a anestesia da mandíbula, principalmente quando a intervenção envolve os tecidos moles bucais em todo o hemiarco, sendo necessária somente uma punção no local de indicação preconizado pela técnica.

20) "É definida como aumento da tolerância a uma droga que é administrada repetidamente. É muito mais provável que se desenvolva se for permitido que a função do nervo retorne antes da reinfiltração (p. ex., se o paciente se queixa de dor). A duração, a intensidade e a disseminação da anestesia diminuem muito com a reinfiltração. Provavelmente é ocasionada por algum ou todos os seguintes fatores: edema, hemorragia localizada, formação de coágulo, transudação, hipernatremia e diminuição do pH dos tecidos."
Qual termo se refere ao texto acima?

(A) Fototaxia.
(B) Tafilaxia.
(C) Quimiotaxia.
(D) Nosotaxia.
(E) Epitaxia.

21) Assinale a alternativa que apresenta o nome do anestésico que apresenta curta duração de ação (anestesia pulpar de aproximadamente 30 minutos):

(A) Mepivacaína 3% sv.
(B) Lidocaína 2%+ norepinefrina 1:50.000.
(C) Articaína 4%+ epinefrina 1:100.000.
(D) Lidocaína 2%+ epinefrina 1:100.000.
(E) Bupivacaína 0,5%+ epinefrina 1:200.000.

22 Assinale a alternativa que apresenta o nome do anestésico local que forma a orto-toluidina na sua metabolização:

(A) Lidocaína.
(B) Mepivacaína.
(C) Prilocaína.
(D) Articaína.
(E) Bupivacaína.

23) A polpa, por ser um tecido conjuntivo, quando diante de um fator agressor responderá por meio de reações de defesa. Tais reações podem ser inflamatórias ou degenerativas e vão estar presentes dependendo do tipo, da frequência e da intensidade do agente irritante. Fatores

sistêmicos também influenciam no tipo de resposta pulpar ante o agente patogênico. Assinale a alternativa que não apresenta uma alteração pulpar degenerativa:

(A) Formação de dentina reacional.
(B) Esclerose dentinária.
(C) Tratos mortos da dentina.
(D) Formação de áreas de hialinização.
(E) Formação de pólipo pulpar.

24) "Com o objetivo de melhorar a visualização dos dentes com posicionamento demasiado posterior no osso mandibular, foi proposta uma modificação na técnica de Miller-Winter. O chamado _____ está indicado para a visualização de dentes localizados em região de ângulo e ramo mandibular e sempre que a técnica de Miller-Winter não mostrar completamente as raízes do terceiro molar inferior. Essa técnica pode ainda ser utilizada para a localização de molares inferiores retidos em posição transversa no processo alveolar."
Assinale a alternativa que melhor preenche a lacuna acima:

(A) Método de localização de Donovan.
(B) Método de Parma.
(C) Método de Le Master.
(D) Método da lateral oblíqua.
(E) Método de Clark.

25) Assinale a alternativa incorreta com relação às doenças sistêmicas crônicas relacionadas à doença periodontal:

(A) O uso do fumo pode gerar supressão da reação inflamatória no periodonto de proteção e sustentação dos pacientes, destruição do periodonto de sustentação, osso de suporte e fibras do ligamento periodontal, gerando perda do elemento dentário.
(B) A gengiva inflamada em pacientes com periodontite causa um aumento na absorção da insulina, causando um desequilíbrio glicêmico preocupante nos pacientes portadores de diabetes.
(C) Os níveis bacterianos que podem cair na corrente circulatória, nos pacientes que sofrem doença periodontal ativa, aumentarão a incidência das doenças cardíacas coronarianas.
(D) O cigarro aparece como o principal fator de risco comum às duas doenças (doença periodontal e doença cardiovascular).
(E) Algumas drogas afetam consideravelmente a composição da placa bacteriana e o metabolismo dos tecidos gengival e ósseo, promovendo crescimento gengival e reabsorção óssea alveolar.

26) Assinale a alternativa incorreta com relação ao gerenciamento e destinação de resíduos gerados em um ambiente odontológico:

(A) Nenhum tipo de material odontológico deve ser descartado na cuspideira ou na pia (como por exemplo: material de moldagem, soluções reveladoras e / ou fixadoras, etc.), mas sim em recipientes específicos.
(B) Produtos com prazo de validade vencido, como formocresol, tricresol formalina, eugenol, vernizes, cimentos, materiais restauradores e medicamentos de uso sistêmico devem ser armazenados em recipientes separados.
(C) As lâminas de chumbo das películas radiográficas deverão ser armazenadas em recipiente próprio, identificado, e encaminhadas para o correto processamento pela empresa especializada.
(D) Os materiais perfurocortantes devem ser descartados imediatamente após o uso, em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento.
(E) Jatos de água e sugadores de alto volume nunca devem ser usados quando se remover restaurações de amálgama, ou durante o polimento/acabamento de restaurações novas.

27) Assinale a alternativa incorreta com relação aos equipamentos que visam a proteção da equipe odontológica e suas funções:

(A) Gorro: barreira individual que protege contra possíveis contaminações ocasionadas por secreções, aerossóis e produtos, e também evitam a queda de cabelo nas áreas de procedimento odontológico.
(B) Óculos de proteção: protegem os olhos contra produtos químicos, secreções e aerossóis.
(C) Máscaras: filtram partículas de aerossóis produzidas durante a fala, espirro, tosse e respiração. Devem ser descartáveis.
(D) Luvas: impedem o contato direto com saliva, sangue ou microorganismos. Devem ser sempre de cano longo e de látex.
(E) Uniforme para procedimentos não-invasivos: avental e calça limpos, que devem ser trocados diariamente, protegem contra fluídos corporais e geradores aerossóis.

28) "O material e os instrumentos, assim como o equipamento dental, podem se tornar um veículo para a transmissão indireta de agentes infecciosos. Assim é fundamental a realização de ações que visem a eliminação de microrganismos, de forma a garantir a eliminação ou redução do risco de infecção."
Assinale a alternativa incorreta com relação

aos procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos odontológicos:

(A) A autoclave (calor úmido) realiza a esterilização por meio da combinação das ações temperatura, pressão e umidade, o tempo de duração do processo depende da temperatura e da pressão, em autocláves com temperatura de 121 ºC e 1atmosfera - o tempo de duração do processo é de 30 minutos.
(B) Diferente da esterilização que visa a eliminação toda de microorganismos, a desinfecção refere-se ao processo pelo qual microorganismos patogênicos e não patogênicos são eliminados, reduzindo o risco de infecção, mas não de forma absoluta.
(C) A limpeza diminui a carga microbiana por arraste, provocando a destruição de todos os microorganismos.
(D) A desinfecção de baixo nível é um procedimento que elimina alguns tipos de bactérias e fungos em suas formas vegetativas, porém é ineficiente para o extermínio de vírus, esporos resistentes e outros tipos de bactérias.
(E) A desinfecção de alto nível é um processo mais completo pelo qual bactérias, vírus, fungos e alguns esporos resistentes são eliminados.

29) A prática da prevenção fez surgir um perfil de pacientes, livres de cárie, porém resultou, em alguns casos, numa modalidade diferente de ocorrência da doença, a cárie oculta. Com relação aos aspectos radiográficos da lesão de cárie oculta, assinale a alternativa incorreta:

(A) A técnica radiográfica interproximal é a mais indicada, mas lesões mais extensas são vistas também nas radiografias periapicais e panorâmicas.
(B) Radiografias com menor contraste (com número maior de tons intermediários entre o branco e o preto) facilitam a visualização deste tipo de lesão.
(C) A lesão de cárie oculta tem aspecto mais difuso e menor radiolucidez, tornando o seu diagnóstico, por exame complementar, um pouco mais difícil.
(D) O aspecto radiográfico da cárie oculta é idêntico ao da imagem das lesões cariosas rotineiramente encontradas, quando aparelhos com quilovoltagem na faixa de 50 a 70 kVp são utilizados.
(E) A visualização de lesões cariosas oclusais nas radiografias nem sempre é possível.

30) Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às características da erosão dentária e suas técnicas de tratamentos, exceto:

(A) A erosão dentária pode ser mal diagnosticada e confundida com outros tipos de desgaste dentário que também acometem a superfície dentária, como abrasão e atrição.
(B) Em estágios iniciais, o desgaste da erosão se caracteriza como aumento no polimento do esmalte, levando a superfície afetada a se apresentar mais lisa e com perda de brilho.
(C) O tecido dentário previamente desgastado pela erosão não o torna mais susceptível ao desgaste por abrasão ou atrição quando comparado ao tecido intacto.
(D) Um correto diagnóstico do desgaste dentário, bem como dos seus fatores etiológicos, é fundamental para se adotar medidas efetivas para o manejo desses desgastes e para se chegar ao melhor tratamento.
(E) Uma boa forma de controlar os desgastes dentais associados à erosão dentária é o monitorando a frequência de ingestão de alimentos e bebidas ácidas.

31) Assinale a alternativa incorreta com relação aos produtos de aplicação profissional de fluoreto (géis, espumas, e vernizes):

(A) Sua capacidade de manutenção de concentrações extremamente elevadas de fluoreto no biofilme dental é idêntica ao mecanismo da água fluoretada e dentifrício.
(B) Aplicados nas superfícies dentais em alta concentração reagem com mineral da estrutura dental, formando reservatórios solúveis de fluoreto de cálcio.
(C) A quantidade de produtos formados da reação desses materiais com minerais da estrutura dental é maior na dentina do que no esmalte e maior nas superfícies com lesão de cárie do que nas hígidas.
(D) O seu efeito pode ser mantido por semanas ou meses após a aplicação.
(E) Estão indicados para pacientes que não conseguem controlar a doença cárie pelo uso apenas de água fluoretada e dentifrício fluoretado.

32) Assinale a alternativa que apresenta o nome do adoçante que pode ser fermentado por algumas espécies de bactérias:

(A) Sacarina.
(B) Ciclamato.
(C) Ximatina.
(D) Sorbitol.
(E) Aspartame.

33) Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à associação entre o consumo de açúcar e a ocorrência da cárie dentária, exceto:

(A) O consumo de sacarose aumenta a ocorrência de cárie, porém de maneiras diferentes, de acordo com a forma de consumo.
(B) O fator mais importante para a ocorrência de cárie não é a quantidade total ingerida, mas a frequência de consumo de açúcar.
(C) A consistência do alimento apresenta um papel irrelevante.
(D) Existe uma variabilidade individual, com alguns indivíduos sendo mais suscetíveis ao desenvolvimento da cárie dentária do que outros, mesmo sob condições alimentares semelhantes.
(E) Quanto maior o tempo em que o alimento permanecer na cavidade bucal, mais cariogênico ele será.

34) Em geral, para quadros de odontalgia em que não é possível identificar o dente fonte da dor, sugere-se a prescrição de alguns medicamentos, até que se consiga localizar o dente acometido (por meio da evolução natural da inflamação em direção ao periápice). Todas as alternativas abaixo apresentam nomes desses medicamentos, exceto:

(A) Nimesulida.
(B) Dipirona.
(C) Paracetamol.
(D) Paracetamol com fosfato de codeína.
(E) Cloridrato de Tramadol.

35) Assinale a alternativa incorreta com relação ao antimicrobianos:

(A) METRONIDAZOL - Devido ao seu potencial bactericida contra anaeróbicas e Gram negativas tem sido indicado seu uso isoladamente ou associada à amoxicilina no tratamento da periodontite.
(B) CLINDAMICINA - Devido sua elevada concentração no tecido ósseo, é interessante sua indicação em processos infecciosos intraósseos.
(C) AMOXICILINA - Antibiótico de amplo espectro com indicação para pacientes não alérgicos a penicilina que necessitem de profilaxia antibiótica ou como terapia anti-infecciosa.
(D) AZITROMICINA - Está contraindicada para pacientes com hipersensibilidade à Azitromicina, Eritromicina ou qualquer antibiótico macrolídeo.
(E) AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO - A alimentação interfere na ação desse medicamento, que não deve ser ingerido no início das refeições.

36) Assinale a alternativa incorreta com relação à clorexidina:

(A) Indicado para antissepsia oral pré-operatória.
(B) Possui baixa toxicidade, amplo espectro bacteriano e alta substantividade.
(C) Antisséptico que apresenta maior efetividade no controle do biofiome periodontal, sendo primeira escolha como coadjuvante terapêutico na periodontite.
(D) Mesmo em concentrações maiores, de 1 a 40%, na forma de gel ou verniz, não consegue favorecer um equilíbrio no processo de desmineralização/remineralização.
(E) Pode causar alteração na coloração nos elementos dentários, restaurações, próteses e língua, formação de cálculo supragengival, perda do paladar, queimaduras no tecido mole, dor, xerostomia e gosto desagradável.

37) Durante uma cirurgia oral a hemostasia pode ser obtida pelos seguintes meios, exceto:

(A) Aplicando pressão sobre vasos sangrantes com uso de gazes (mecanismos hemostáticos naturais).
(B) Utilizando esponja de tecido (mecanismos hemostáticos não naturais/farmacológicos).
(C) Pinçando o vaso com uma pinça hemostática (mecanismos hemostáticos naturais).
(D) Através de ligadura (nó cirúrgico/sutura).
(E) Colocando no corte substâncias vasoconstritoras pró-coagulantes como a heparina.

38) Assinale a alternativa que apresenta um caso de <u>emergência</u> odontológica:

(A) Pulpite.
(B) Celulite.
(C) Pericoronarite.
(D) Alveolite pós-operatória.
(E) Cáries extensas ou restaurações com problemas que estejam causando dor.

39) Assinale a alternativa incorreta com relação à Ulotomia e Ulectomia:

(A) É recomendada a cirurgia de ulectomia quando houver obstáculo à erupção dentária em virtude de fibrose gengival, que corresponde à exérese dos tecidos que revestem a face incisal do dente não irrompido, permitindo que este dente ocupe a sua posição na arcada dentária.
(B) A ulectomia é uma técnica cirúrgica de

fácil execução, cujos procedimentos envolvem: a anestesia local da mucosa gengival, a incisão circunferencial e exposição da coroa dentária, remoção da mucosa e hemostasia.
(C) A ulotomia é apenas a exérese do capuz mucoso que recobre os dentes não-erupcionados.
(D) A técnica de ulotomia é utilizada em quadros normalmente assintomáticos, mas pode também estar indicada em casos que apresentam sintomatologia dolorosa, como os cistos de erupção.
(E) A ulectomia está indicada em casos de crianças que apresentem alteração na cronologia da erupção dentária, se o dente estiver 12 ou mais meses atrasado em relação à sua data de erupção.

40) Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação aos cimentos ionômero de vidro (CIV), exceto:

(A) A dosagem do material, a manipulação, bem como a inserção e proteção superficial do material, devem ser seguidas de acordo com as instruções dos fabricantes, sendo de total importância para a obtenção de melhores resultados em suas propriedades.
(B) A proteção da superfície, após a presa inicial do material, é de fundamental importância.
(C) Os CIVs têm a capacidade de absorver íons, como os íons cálcio e fosfato, presentes na saliva. Tal fato faz com que desenvolvam uma superfície mais dura, tornando assim o material mais resistente às forças exercidas em sua superfície.
(D) Os ionômeros modificados por resina possuem um coeficiente de expansão térmica linear melhor do que dos ionômeros convencionais, que mostram valores semelhantes aos do amálgama ou das resinas compostas híbridas.
(E) A adesão à estrutura dental juntamente com a liberação de flúor auxilia na inibição do metabolismo de microrganismos acidogênicos, reduzindo a velocidade de progressão das lesões de cárie.

41) Assinale a alternativa que não apresenta uma característica da periodontite apical aguda:

(A) Dor intensa à mastigação.
(B) Teste positivo de percussão e, às vezes, de palpação.
(C) Dor ao toque.
(D) Sensação de “dente crescido” – leve extrusão devido ao edema no ligamento periodontal.
(E) Radiograficamente: “Rarefação óssea periapical difusa”.

42) Assinale a alternativa que não apresenta uma situação que pode exigir tratamento endodôntico em mais de uma sessão:

(A) Urgências – Sem tempo hábil.
(B) Exsudação persistente.
(C) Abscessos.
(D) Pulpite irreverssível.
(E) Rizogênese incompleta.

43) Todas as alternativas abaixo apresentam vantagens da técnica de instrumentação de canais radiculares denominada Crown Down, exceto:

(A) Auxilia na eliminação da constrição cervical.
(B) Previne a ocorrência de degrau e consequentes perfurações, mesmo quando uma maior pressão é exercida na lima.
(C) Possibilita maior alargamento do terço apical.
(D) Reduz a extrusão de microrganismos para região periapical.
(E) Proporciona um acesso mais retilíneo e direto à região apical do canal.

44) Assinale a alternativa incorreta com relação ao agregado trióxido mineral (MTA):

(A) Apesar do MTA conter hidróxido de cálcio em sua composição, após seu endurecimento, esse composto se transforma devido a reação com os fluidos teciduais.
(B) Após o contato com o tecido pulpar, o MTA apresenta algumas estruturas que são similares aos cristais de cálcio encontrados no hidróxido de cálcio.
(C) O MTA tem uma propriedade osteoindutora desejável e uma distribuição de partículas de óxido de bismuto, propositalmente adicionadas para aumentar a radiopacidade.
(D) O pó do MTA, quando misturado com água, resulta na formação de um gel coloidal que endurece dentro de 3 a 4 horas.
(E) O pH do MTA é altamente alcalino e favorece as propriedades antimicrobianas do material.

45) “Para a instalação da doença periodontal há influência dos fatores determinantes, predisponentes, modificadores e ambientais.” Assinale a alternativa que apresenta apenas fatores predisponentes da doença periodontal:

(A) Composição do biofilme supra e subgengival.
(B) Fumo, restaurações subgengivais e fatores genéticos.
(C) Fumo, medicações, estresse e nutrição.
(D) Restaurações subgengivais ou com defeitos, anatomia dental, apinhamento.
(E) Imunidade, fatores genéticos, saúde sistêmica.

46) Assinale a alternativa que apresenta o nome da técnica de frenectomia que se mostra ideal para um freio hipertrófico largo, espesso e de inserção baixa, associado a um diastema interincisivos e um vestíbulo curto:

(A) Romboplastia em V.
(B) Z-plastia.
(C) Técnica de Milter.
(D) Técnica de Marley.
(E) VY-plastia.

47) "Esse tipo de incisão estende-se da papila mesial do primeiro molar inferior, passando em volta do colo coronário dos dentes até a porção disto vestibular do segundo molar, seguida de uma extensão posterior lateral do bordo anterior do bordo da mandíbula. Esse tipo de retalho é indicado para terceiros molares inclusos com variação de amplitude, conforme a posição do dente e portadores de próteses fixas nos primeiros e segundos molares. Esse tipo de retalho não é indicado para incisões profundas, em que o cirurgião necessite de acesso as regiões mais apicais do dente."
Assinale a alternativa que apresenta o nome do tipo de incisão descrita no texto acima:

(A) Incisão Ward por Howe.
(B) Incisão Gosgwell.
(C) Incisão de Lotter.
(D) Incisão do tipo Envelope.
(E) Incisão do tipo Avellanal.

48) A gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os três entes da Federação: a União, os Estados e os municípios. A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde.
A estrutura do SUS engloba, exceto:

(A) A atenção primária.
(B) Os serviços urgência e emergência.
(C) A atenção hospitalar.
(D) As ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental.
(E) Assistência financeira através do pagamento de pensões e aposentadorias.

49) Assinale a alternativa abaixo que apresenta um princípio organizativo do SUS:

(A) Centralização.
(B) Universalidade.
(C) Participação popular.
(D) Integralidade.
(E) Equidade.

50) Assinale a alternativa incorreta com relação a Gengivite Ulcerativa Necrosante – GUN:

(A) É um processo inflamatório do tecido gengival com presença de úlcera e necrose da papila interdental que forma uma cratera.
(B) Ocorre sangramento gengival e dor.
(C) Pode haver halitose, pseudomembrana, febre e sialorréia.
(D) A etiologia é desconhecida.
(E) Os fatores predisponentes são: má nutrição grave, estresse, cigarro.