



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 03.2022

212 – MÉDICO PLANTONISTA – 12H – GINECOLOGISTA OBSTETRA

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **40** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTA CADERNO SE ENCONTRA COMPLETO E LEGÍVEL. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTA CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO, ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

**É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS
NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA.**

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

A aproximação das comemorações do bicentenário da Independência tem despertado em alguns historiadores o desejo de promover um certo resgate da reputação da família real, e que foi satirizada em filmes e séries televisivas. Fundada em 1810 por Dom João 6º, a Biblioteca Nacional menciona esse objetivo em seu caderno de projetos para o bicentenário. O documento busca valorizar “personagens que se tornaram chacotas para o público em geral, através da TV e do cinema, quando a historiografia é capaz de trazer conteúdo objetivo e sério sobre a família que reinou no Brasil”.

“É preciso apresentar a dimensão familiar da monarquia, da forma como se constituiu o poder no Brasil, e como questões centrais como autoridade, bem comum, religiosidade, sacrifício, vícios, doações e abusos vinham à tona”, diz a instituição. Em maio deste ano, a biblioteca promoveu uma exposição virtual sobre dona Maria, mãe de dom João 6º, em que o adjetivo “a louca” foi deixado de lado. Em seu lugar, privilegiou-se o título formal da soberana, dona Maria 1ª.

“É importante dignificar os fundadores da nação e superar um cacoete de negação que é muito forte”, diz Luiz Ramires Jr, coordenador-geral do centro de pesquisa e editoração da Biblioteca Nacional. Para ele, usar a sátira é algo que pode levar o tema ao conhecimento de mais pessoas, mas com riscos no processo. “À medida que você faz chacota dessas figuras centrais, isso decanta, sobretudo, em livros didáticos”.

Como afirma a historiadora Mary del Priore, “dona Maria foi uma mulher responsável pela criação de academias, assinatura de diversos tratados de comércio e diplomáticos. Muitos a adoravam, tanto que quando a família real vem para o Brasil, ela recebe cartas pedindo que volte para Portugal”. Nascida em 1734, ela tornou-se rainha em 1777. Para seus contemporâneos, era conhecida como “a piedosa”, pelo fervor religioso, que a fez isolar da corte o Marquês de Pombal, adepto do Iluminismo português. A instabilidade mental começou na segunda década de reinado, acentuando-se após uma sucessão de perdas na família, especialmente a do primogênito, Dom José, em 1788, aos 27 anos.

O adjetivo “louca”, segundo a historiadora, é uma construção do movimento republicano português, em fins do século 19, em uma estratégia de deslegitimar a monarquia. Um dos maiores responsáveis por cunhar o termo à soberana foi o influente poeta modernista português Guerra Junqueira (1850-1923). Em seu poema “Pátria”, de 1896, o poeta descreve

a rainha num estado de loucura, fúria e delírio. A república portuguesa acabaria sendo proclamada em 1910.

(Uma outra história. Folha de São Paulo, 31.10.2021. Adaptado).

- De acordo com o texto, a aproximação do bicentenário da Independência deve
 - ensejar uma ocasião oportuna para que novos filmes e séries definam a verdadeira imagem dos membros da família real.
 - repensar a satirização à qual os membros da família real foram submetidos, pois o retrato impreciso destas personagens terá reflexos na educação.
 - estimular a economia nacional, haja vista que os membros da família real sempre renderam um bom dinheiro às bilheterias dos cinemas.
 - corroborar os estereótipos da família real, uma vez que suas práticas insanas e distorções de caráter realçam a importância que tiveram no Brasil.
- Sobre a “instabilidade mental” da rainha dona Maria 1ª, é correto afirmar que ela
 - foi decorrente de suas desavenças políticas, principalmente após ter sabido da publicação de poemas difamatórios contra sua pessoa.
 - não possuía fundamentos clínico-científicos, uma vez que sua constante sanidade mental é testemunhada por sua obra no campo da economia e diplomacia.
 - foi profundamente agravada pelos dramas pessoais vividos pela soberana, tornando o seu quadro clínico já abalado ainda pior.
 - aconteceu devido ao seu fervor religioso, tornando-a objeto de muitas críticas e insurreições no interior da corte portuguesa esclarecida.

Analise a frase abaixo para responder à questão 3.

À medida que você faz chacota dessas figuras centrais, isso decanta, **sobretudo**, em livros didáticos.

- É correto afirmar que o termo destacado desempenha a função de
 - modo, e pode ser substituído por “principalmente”.
 - intensidade, e pode ser substituído por “bastante”.
 - afirmação, e pode ser substituído por “certamente”.
 - dúvida, e pode ser substituído por “porventura”.
- Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a crase de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.
 - Filmes e séries que se propuseram à satirizar a família real precisam ser revistos.
 - É preciso destacar à importância que a família real desempenhou na formação do país.
 - Ainda que os membros da família real tivessem vícios e defeitos, não caberia à ninguém depreciar sua importância.
 - Em relação à família real, é necessário que revisemos o papel que a monarquia portuguesa exerceu no país.

5. Assinale a alternativa cuja frase apresenta palavra com sentido figurado.

- (A) Para ele, usar a sátira é algo que pode levar o tema ao conhecimento de mais pessoas, mas com riscos no processo.
- (B) O adjetivo “louca”, segundo a historiadora, é uma construção do movimento republicano português, em fins de século 19, em uma estratégia de deslegitimar a monarquia.
- (C) Para seus contemporâneos, era conhecida como “a piedosa”, pelo fervor religioso, que a fez isolar da corte o Marquês de Pombal, adepto do Iluminismo português.
- (D) Como afirma a historiadora Mary del Priore, “dona Maria foi uma mulher responsável pela criação de academias, assinatura de diversos tratados de comércio e diplomáticos”.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

6. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, _____ é o deslocamento do cargo, provido ou não, para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, observando sempre o interesse da Administração e _____ é o deslocamento do servidor, no interesse da Administração, no âmbito do mesmo quadro, de um órgão para outro do Poder Executivo.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- (A) remoção / redistribuição
- (B) substituição / exoneração
- (C) remoção / substituição
- (D) redistribuição / remoção

7. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, é a investidura em cargo público, momento que indica o início dos direitos e dos deveres do cargo e gera as restrições, impedimentos e incompatibilidades. O conceito refere-se ao(à)

- (A) exercício.
- (B) substituição.
- (C) posse.
- (D) estabilidade.

8. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, sobre o vencimento inicial do cargo do servidor, sem os acréscimos de outras vantagens, o trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de

- (A) 35% (trinta e cinco por cento).
- (B) 30% (trinta por cento).
- (C) 25% (vinte e cinco por cento).
- (D) 20% (vinte por cento).

9. Sobre o abono de aniversário, de acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) O abono não será incluído em folha de pagamento referente ao mês de aniversário do servidor.
- (B) O abono aniversário cessará automaticamente quando ocorrer a morte ou demissão do servidor, ressalvado os direitos adquiridos.
- (C) O valor do abono aniversário será de 40% (quarenta por cento) do maior vencimento inicial do município de Santana de Parnaíba.
- (D) Terão direito ao abono aniversário os inativos e os pensionistas.

10. Sobre o banco de horas, de acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, analise as proposições abaixo.

- I. O banco de horas possui vigência anual, sendo que o saldo positivo ou negativo de horas no banco, caso não seja, respectivamente, gozado ou normalizado até o último dia do ano, deverá ser feito dentro de 6 (seis) meses a contar do início do ano subsequente, caso contrário importará em pagamento em pecúnia com o respectivo adicional ou em desconto salarial.
- II. Na hipótese de desligamento do servidor ocupante de cargo efetivo, as horas não compensadas serão pagas na forma desta Lei Complementar.
- III. As unidades que realizam serviços essenciais e que não podem sofrer interrupção por interesse público, deverão prever antecipadamente o número necessário de horas, para fins de composição do banco de horas dos seus servidores.
- IV. O banco de horas também poderá ser utilizado para a compensação de eventual ponte em feriado, ponto facultativo e revezamentos de final de ano.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos, em periodicidade

- (A) mensal.
- (B) bimestral.
- (C) semestral.
- (D) anual.

12. De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie é um princípio a ser seguido.
- () A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades visa a alocação centralizada de recursos, gerindo um sistema centralizado.
- () Deve ocorrer a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / F / V
- (B) V / V / F
- (C) F / F / V
- (D) V / V / V

13. Sobre a notificação de doenças compulsórias, assinale a alternativa que apresenta doença ou agravo de notificação imediata ao Ministério da Saúde.

- (A) Cólera.
- (B) Casos de dengue.
- (C) Acidente por animal peçonhento.
- (D) Doença invasiva por *Haemophilus influenzae*.

14. Sobre o Conselho de Saúde, que apresenta caráter deliberativo e permanente, assinale a alternativa correta.

- (A) Haverá representantes paritários do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), apenas.
- (B) Trata-se de órgão colegiado composto, exclusivamente, por representantes do governo e prestadores de serviço.
- (C) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- (D) Os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento externo, promovidos e aprovados pelo conjunto deliberativo do Ministério da Saúde.

15. Representa a base territorial mínima a ser submetida à aprovação do Ministério da Saúde e Comissão Intergestores Tripartite para qualificação na assistência à saúde. Poderá ser uma microrregião ou uma região de saúde, de acordo com o desenho adotado pelo estado. O trecho, transcrito da NOA-SUS, refere-se ao conceito-chave de

- (A) município-polo.
- (B) módulo assistencial.
- (C) município-sede do módulo assistencial.
- (D) unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.

CLÍNICA MÉDICA

16. Diagnosticada a hanseníase multibacilar em adultos, inicia-se o tratamento denominado Poli-quimioterapia Única (PQT-U), que compreende o uso de

- (A) Rifampicina 600 mg 1x mês / Clofazimina 150 mg 1x mês e 100 mg 1x dia / Dapsona 100 mg 1x dia.
- (B) Rifampicina 300 mg 1x mês / Clofazimina 600 mg 1x mês e 50 mg 1x dia / Dapsona 100 mg 1x dia.
- (C) Rifampicina 900 mg 1x mês / Clofazimina 150 mg 1x mês e 30 mg 1x dia / Dapsona 50H mg 1x dia.
- (D) Rifampicina 600 mg 1x mês / Clofazimina 300 mg 1x mês e 100 mg 1x dia / Dapsona 100 mg 1x dia.

17. Sobre as sintomatologias da síndrome da rubéola congênita no feto, analise as proposições abaixo.

- I. Perda auditiva.
- II. Restrição do crescimento.
- III. Hepatoesplenomegalia.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.

18. Após confirmação de úlcera péptica por EDA, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais aceitável.

- (A) Inibidores da bomba de prótons e obstipantes.
- (B) Antibioticoterapia para *H. zoster* e inibidores da bomba de prótons.
- (C) Inibidores da bomba de prótons e antibioticoterapia para *H. pylori*.
- (D) Antibioticoterapia para *H. zoster* e obstipantes.

19. Consideram-se critérios laboratoriais para o diagnóstico de pré-DM II, o valor de glicemia em jejum e HbA1c, de

- (A) 126 a 140 mg/dL e > 6,4%.
- (B) 100 a 125 mg/dL e 5,7 a 6,4%.
- (C) 100 a 135 mg/dL e 5,3 a 6,3%.
- (D) 80 a 99 mg/dL e 5,1 a 6,2%.

20. Bactéria gram-negativa, a *Pseudomonas aeruginosa* deve ser tratada com carbapenens de classificação β -Lactâmicos. Considerando a informação, assinale a alternativa que apresenta a melhor escolha de antibioticoterapia.

- (A) Meropenem.
- (B) Imipenem.
- (C) Ertapenem.
- (D) Claritromicina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre o diagnóstico e o tratamento de gestantes com parasitoses intestinais, analise as proposições abaixo.

- I. Nenhuma droga antiparasitária é considerada totalmente segura na gestação.
- II. Quando há anemia e o diagnóstico de parasitose intestinal, é necessária a prescrição de drogas antiparasitárias.
- III. Mulheres com parasitoses intestinais só devem ser tratadas na gravidez quando o quadro clínico é exuberante ou as infecções são maciças, não sendo recomendado o tratamento durante o primeiro trimestre da gestação.
- IV. Medidas profiláticas, como educação sanitária, higiene correta das mãos, controle da água, dos alimentos e do solo, devem ser encorajadas devido ao impacto positivo que geram sobre a ocorrência de parasitoses intestinais.

É correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

22. Sobre as condutas frente à sorologia para toxoplasmose na gestação, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () Gestante IgG (+) e IgM (-): imunidade remota, com doença antiga ou toxoplasmose crônica. Não há necessidade de novas sorologias.
- () Gestante IgG (+) e IgM (+): possibilidade de infecção durante a gestação. Realizar teste de avididade de IgG na mesma amostra.
- () Gestante IgG (-) e IgM (+): infecção muito recente ou IgM falso positivo. Iniciar espiramicina imediatamente. Repetir a sorologia em três semanas.
- () Quando a sorologia e a infecção são confirmadas com a idade gestacional < 30 semanas, não é necessário avaliar o líquido amniótico. Inicia-se esquema triplice pela alta probabilidade de infecção fetal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / F / V
- (B) V / F / V / F
- (C) V / V / V / F
- (D) F / F / V / V

23. Deve-se solicitar os exames de rotina na primeira consulta do pré-natal de risco habitual, com exceção de

- (A) tipo sanguíneo e fator Rh.
- (B) Coombs indireto.
- (C) glicemia em jejum.
- (D) urina tipo I.

24. Sobre Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), assinale a alternativa que apresenta uma conduta **INCORRETA**.

- (A) Na presença de DMG, deve-se avaliar a presença de macrosomia fetal, polidrâmnio e malformações cardíacas.
- (B) Para a maioria das gestantes, o DMG não responde bem somente com o controle alimentar, sendo necessário o uso complementar de hipoglicemiantes orais.
- (C) O uso de insulina deve ser mantido nas gestantes que já faziam uso antes da gravidez e iniciado nas diabéticas tipo 2 que faziam uso prévio de hipoglicemiantes orais.
- (D) Os ajustes de doses são baseados nas medidas de glicemia, cujo monitoramento pode ser realizado diariamente em casa.

25. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta que deverá ser adotada no tratamento de síndromes hipertensivas na gestação.

- (A) Em urgência ou emergência hipertensiva que requeira hospitalização, realizar monitoramento intensivo, administração parenteral de anti-hipertensivos (preferencialmente a Hidralazina), considerar antecipação do parto (a depender da idade gestacional e das condições clínicas da mulher e do feto).
- (B) No tratamento de curto prazo para gestantes com pré-eclâmpsia, com quadro estabilizado, sem necessidade de parto imediato, está indicado tratamento anti-hipertensivo por via oral durante hospitalização.
- (C) Deve-se sempre prescrever anti-hipertensivo para gestantes com HAS com valores de PA < 150/100 mmHg associada à pré-eclâmpsia ou à hipertensão crônica.
- (D) Para gestantes portadoras de HAS crônica que estão em uso de anti-hipertensivos e com PA > 120/80 mmHg, recomenda-se reduzir ou mesmo descontinuar o tratamento e iniciar monitoramento cuidadoso da PA.

26. Sobre Líquen Plano Vulvar (LPV), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Se apresenta como pápulas ou placas eritematosas e, eventualmente, erosadas da região vulvar, onde o prurido é sua principal manifestação.
- (B) É considerada doença de aparecimento frequente em mulheres pós-menopausa.
- (C) Corresponde a processo inflamatório da pele e/ou mucosa vulvar, podendo ser observada em forma localizada ou até mesmo generalizada.
- (D) Seu diagnóstico diferencial deve ser feito com o Líquen Escleroso Atrófico (LEA) e neoplasia intraepitelial da vulva. As principais pistas diagnósticas para diferenciar do LEA é que, neste, o restante da pele vulvar e perianal está frequentemente acometida, enquanto a mucosa oral e vaginal comumente não está afetada.

27. De acordo com o volume e a descida da cistocele, do prolapso uterino ou da retocele, elas podem ser classificadas em três graus. Sobre eles, analise as proposições abaixo.

- I. Primeiro grau: ocorre quando se forma uma protrusão envolvendo a parede vaginal e o órgão adjacente, que ultrapassa o introito vaginal. Considera-se como prolapso uterino de primeiro grau quando todo o corpo uterino ultrapassa o introito vaginal.
- II. Segundo grau: quando ocorre descida maior da parede vaginal e órgão adjacente, chegando a atingir o introito vaginal, porém sem ultrapassá-lo completamente. A rotura perineal de segundo grau é a rotura parcial ao nível do corpo perineal, com afastamento da musculatura do diafragma pélvico, sem atingir o ânus.
- III. Terceiro grau: quando há alguma descida da parede vaginal e órgão adjacente (bexiga, útero ou reto) durante esforços, sem atingir o introito vaginal.

É correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

28. Sobre Doença Inflamatória Pélvica (DIP), analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () É um processo inflamatório de natureza infecciosa que pode atingir estruturas do trato genital superior, como útero, tubas uterinas, ovário e estruturas anexas, provocando endometrite, salpingite, ooforite, abscesso tubo-ovariano e peritonite.
- () É determinada, em geral, por ascensão do agente infeccioso vaginal ou cervical, de forma espontânea ou devido a procedimentos como inserção de dispositivo intrauterino (DIU), biópsia de endométrio e curetagem.
- () Os agentes etiológicos envolvidos são os principais responsáveis por uretrites, cervicites e vulvovaginites como *Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis*, além de *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium*, *Ureaplasma urealyticum*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides* spp. Outras bactérias anaeróbias responsáveis por vaginose também podem levar à DIP, como cocos Gram-positivos (p.e. *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus* do grupo A, *Staphylococcus* sp.) e *Enterobacteriaceae* (p.e. *E. coli*).
- () Suas manifestações clínicas indicam o seu diagnóstico etiológico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V / F
- (B) V / V / V / V
- (C) F / V / F / F
- (D) F / F / F / V

29. O diagnóstico clínico-laboratorial de vaginose bacteriana se confirma quando estiverem presentes três dos critérios de Amsel, dos quais **NÃO** se inclui

- (A) corrimento vaginal homogêneo, geralmente acinzentado e de quantidade variável.
- (B) pH vaginal > 4,5.
- (C) teste de *Whiff* ou teste da amina (KOH 10%) negativo.
- (D) presença de *cluecells* na bacterioscopia corada por Gram.

30. A inserção do DIU com cobre, no pós-parto, pode ser a qualquer momento até completar _____ horas, mas, de forma prioritária, a inserção deve ser imediata (até 10 minutos pós-dequitação), pois a taxa de expulsão é menor. Após o período de _____, deve-se esperar de quatro a seis _____ para realizar a inserção. Tendo em vista a segurança do dispositivo no puerpério imediato, justifica-se a oferta de informações amplas sobre saúde sexual e reprodutiva e de inserção do DIU com cobre, caso seja da escolha da mulher, antes da alta hospitalar, respeitando os critérios de elegibilidade da OMS para o método.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) 48 / 48 / semanas
- (B) 24 / 24 / semanas
- (C) 48 / 48 / dias
- (D) 24 / 24 / dias

31. Sobre o câncer de ovário, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A segunda neoplasia ginecológica mais comum, atrás apenas do câncer do colo do útero. A quase totalidade das neoplasias ovarianas (95%) é derivada das células epiteliais (que revestem o ovário). O restante provém de células germinativas (que formam os óvulos) e células estromais (que produzem a maior parte dos hormônios femininos).
- (B) O risco de câncer de ovário é diminuído em mulheres com infertilidade e aumentado naquelas que tomam contraceptivos orais ou que tiveram vários filhos.
- (C) Histórico familiar de cânceres de ovário, colorretal e de mama está associado a risco aumentado de câncer de ovário.
- (D) Mutações em genes como BRCA1 e BRCA2 estão relacionadas a risco elevado de câncer de mama e de ovário.

32. O câncer de mama inflamatório é raro e difere dos outros tipos de câncer de mama quanto aos sintomas, prognósticos e tratamento. Sobre o assunto, analise as proposições abaixo.

- I. O câncer de mama inflamatório é considerado um câncer agressivo porque cresce rapidamente e é provável de já estar disseminado no momento do diagnóstico, além da probabilidade de recidivar após o tratamento, comparando com a maioria dos outros tipos de câncer de mama.
- II. O exame físico e outros exames podem levar à conclusão de câncer de mama inflamatório, sendo desnecessária a realização de uma biópsia para a confirmação diagnóstica da doença em todos os casos.
- III. O câncer de mama inflamatório provoca uma série de sinais e sintomas, a maioria dos quais se desenvolve rapidamente e podem começar simultaneamente, podendo incluir o espessamento da pele da mama.

É correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

33. Em gestantes previamente vacinadas, com pelo menos três doses de vacina contendo o componente tetânico, deve-se administrar

- (A) uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação, o mais precocemente possível.
- (B) uma dose de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação, o mais precocemente possível. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas.
- (C) duas doses de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas.
- (D) três doses de dTpa. A dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas.

34. Embora o climatério e a menopausa sejam eventos fisiológicos na biologia da mulher, o aparecimento ou não de sintomas dependerá não somente de variações hormonais próprias desse período, mas também de fatores socioeconômicos. No período do climatério ocorrem alterações na fisiologia da mulher, caracterizadas, **EXCETO**, por

- (A) alterações hormonais como aumento dos níveis de estradiol, progesterona e diminuição das gonadotrofinas hipofisárias.
- (B) modificações funcionais (disfunções menstruais, sintomas vasomotores).
- (C) modificações morfológicas (atrofia mamária e urogenital, alterações da pele e mucosas).
- (D) alterações em sistemas hormonodependentes, como o cardiovascular e os ossos.

35. Sobre os fibroadenomas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Possuem crescimento limitado, em geral, não superando 2 cm.
- (B) A localização mais comum é no quadrante superior lateral, mas podem ocorrer em qualquer quadrante.
- (C) A fisiopatologia é desconhecida, porém existe associação com a resposta exacerbada dos lóbulos e do estroma mamário aos estímulos hormonais que ocorrem após a menarca.
- (D) Todos os casos de fibroadenomas apresentam outras lesões proliferativas concomitantes, como adenose esclerosante, alterações papilares ou císticas ou calcificações epiteliais, constituindo os fibroadenomas complexos.

36. De acordo com a vigilância epidemiológica das IST, a notificação **NÃO** é obrigatória no caso de

- (A) gonorreia.
- (B) sífilis adquirida.
- (C) hepatites virais B e C.
- (D) Infecção pelo HIV.

37. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento adequado para o primeiro episódio de herpes genital.

- (A) Aciclovir endovenoso, 5-10 mg/kg de peso, EV, de 8/8 h, por 5 a 7 dias ou até resolução clínica.
- (B) Aciclovir 200 mg, 2 comprimidos, VO, 2 x dia, por até seis meses, podendo o tratamento ser prolongado por até dois anos.
- (C) Aciclovir 200 mg, 2 comprimidos, VO, 3 x dia, por 5 dias.
- (D) Aciclovir 200 mg, 2 comprimidos, VO, 3 x dia, por 7 dias.

38. A infecção pelo HPV é muito comum no país, até 80% das mulheres sexualmente ativas irão adquiri-la ao longo de suas vidas. Aproximadamente 100 tipos de HPVs foram identificados e tiveram seu genoma mapeado, 40 tipos podem infectar o trato genital inferior e 12 a 18 tipos são considerados oncogênicos para o colo uterino. Entre os tipos de vírus do HPV que estão relacionados à patologia cancerígena do colo uterino, os tipos mais prevalentes são:

- (A) HPV tipos 11 e 18.
- (B) HPV tipos 6 e 11.
- (C) HPV tipos 16 e 18.
- (D) HPV tipos 18 e 6.

39. A palpação abdominal através da manobra de *Leopold-Zweifel*, em seu 3º tempo, é o achado clínico:

- (A) situação fetal.
- (B) sobilidade do polo.
- (C) fundo uterino.
- (D) grau de insinuação fetal à pelve materna.

40. Jheniffer, 23 anos, sexarca aos 16 anos, possui parceiro sexual fixo, não utiliza preservativos nas relações sexuais e não usa nenhum método contraceptivo. Compareceu à consulta para coleta de preventivo. Sobre as indicações do exame, analise as proposições abaixo.

- () O exame colpocitológico deve ser coletado imediatamente.
- () Não há indicação para coleta.
- () Deverão ser coletados dois exames consecutivos se as amostras forem negativas, poderá ter intervalo bianual.
- () Os exames devem ser priorizados para mulheres sexualmente ativas seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos 3 anos.
- () Realizar a coleta semestral.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / F / V / V / V
- (B) F / V / F / F / F
- (C) V / F / F / F / V
- (D) F / V / V / V / F