



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N.º 03.2022

201 – MÉDICO – INFECTOLOGISTA

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **40** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTA CADERNO SE ENCONTRA COMPLETO E LEGÍVEL. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTA CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO, ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



insti+u+o
mais.org.br

O Futuro é nosso Presente

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

Inaugurada no Theatro Municipal de São Paulo, em 13 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna chega a seu centenário num momento em que a cultura e valores estimados pelos modernistas, como a diversidade, a liberdade e a educação, são alvos frequentes de ataques retrógrados.

A semana foi organizada por um grupo de artistas e escritores que vinha se articulando em torno de ideias e planos de renovação do ambiente artístico e cultural. A São Paulo na qual viviam era uma cidade emergente, que experimentava uma notável aceleração de sua economia sob o impulso da abundante riqueza do café.

Prefigurava-se naqueles tempos a formação de uma metrópole industrial que estaria destinada, na visão de sua elite, e, também, dos jovens modernistas, a exercer um papel modernizante na esfera nacional, não apenas como polo econômico, mas também cultural.

Comemorava-se em 1922 o centenário da Independência, e o festival modernista que reuniu nomes como Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos e Di Cavalcanti era uma oportunidade de lançar da capital paulista uma plataforma para o futuro.

Há, naturalmente, muitos aspectos a questionar no movimento modernista de São Paulo, desde episódios das biografias de seus participantes a temas polêmicos ligados à sua atuação pública. Não há dúvida, contudo, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista. Neste projeto, a diversidade racial, a potência da natureza e a extraordinária riqueza cultural se congregavam de maneira estimulante.

(Lições de 22. Folha de São Paulo, 13.02.2022. Adaptado).

1. Sobre a cidade de São Paulo em 1922, é correto afirmar que
 - (A) seu ambiente não era apropriado para a realização de eventos artísticos, haja vista a expansão capitalista e seu aceno positivo à indústria do entretenimento.
 - (B) sua forte inclinação para o cultivo do café a punha numa rota de colisão com o modernismo, uma vez que prevalecia na capital paulistana valores mais ligados ao conservadorismo agrícola.
 - (C) seu desenvolvimento econômico, devido à industrialização e ao cultivo do café, serviu de estímulo a intelectuais que pretendiam também torná-la uma referência cultural no país.
 - (D) ela vivia um período de atraso cultural e grande pobreza, somado a um processo de obscurantismo intelectual e retorno à prática de valores há muito superados.

2. É correto afirmar que os objetivos modernistas eram
 - (A) aguçados por todo potencial natural e cultural presente no país.
 - (B) motivados por ideais de exclusivismo racial e ético.
 - (C) inspirados na concepção de mundo advinda de regimes neofascistas.
 - (D) causar uma convulsão social por meio da quebra de dogmas e tabus.
3. Assinale a alternativa cuja frase emprega palavra com sentido figurado.
 - (A) Não há dúvida, contudo, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista.
 - (B) A semana foi organizada por um grupo de artistas e escritores que vinha se articulando em torno de ideias e planos de renovação do ambiente artístico e cultural.
 - (C) Há, naturalmente, muitos aspectos a questionar no movimento modernista de São Paulo, desde episódios das biografias de seus participantes a temas polêmicos ligados à sua atuação pública.
 - (D) A São Paulo na qual viviam era uma cidade emergente, que experimentava uma notável aceleração de sua economia sob o impulso da abundante riqueza do café.

Analise a frase abaixo para responder à questão 4.

Não há dúvida, **“contudo”**, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista.

4. É correto afirmar que o termo destacado é uma conjunção
 - (A) causal e pode ser substituída por “porque”.
 - (B) explicativa e pode ser substituída por “pois”.
 - (C) final e pode ser substituída por “a fim de”.
 - (D) adversativa e pode ser substituída por “entretanto”.
5. Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a crase de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.
 - (A) Os artistas modernistas intentavam à articulação de fatores econômicos e culturais.
 - (B) Graças à visão de mundo dos modernistas, a capital paulistana entrou no roteiro cultural do país.
 - (C) Frente à todas as condições que se apresentavam, os modernistas não hesitaram em conceber um projeto de apelo nacional.
 - (D) O novo movimento modernista passou à cogitar a possibilidade de tornar São Paulo uma referência cultural no país.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

6. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, _____ é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Já a _____ é a reinvestidura do servidor no cargo, anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

 - (A) nomeação / recondução
 - (B) reversão / reintegração
 - (C) recondução / nomeação
 - (D) reintegração / reversão

7. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, analise as proposições abaixo.

- I. A natureza e as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.
- II. De acordo com os critérios de acessibilidade, às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com as limitações que possuírem, sendo-lhes reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso.
- III. Fica vedada a fixação de limite máximo de idade em concursos para admissão de pessoal, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.
- IV. Para comprovação da aptidão física e mental do candidato aprovado, o município realizará exame médico admissional.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

8. Segundo a Lei Complementar n.º 34/2011, é o efetivo desempenho das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo público ou da função de confiança. O trecho refere-se ao(à)

- (A) exercício.
- (B) posse.
- (C) substituição.
- (D) estabilidade.

9. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, sendo descontados todos os afastamentos, o período de estágio probatório será de _____ meses de efetivo exercício.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) 12 (doze)
- (B) 24 (vinte e quatro)
- (C) 30 (trinta)
- (D) 36 (trinta e seis)

10. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, somente fará jus à folga de aniversário o servidor que cumprir uma jornada de trabalho de

- (A) 8 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) semanais.
- (B) 6 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) semanais.
- (C) 5 (cinco) horas diárias ou 25 (vinte e cinco) semanais.
- (D) 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) semanais.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. Sobre o processo de regionalização, de acordo com a NOA-SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve contemplar uma lógica de planejamento integrado.
- (B) Necessariamente, o processo restringe-se à abrangência municipal.
- (C) Não contempla a hierarquização do sistema de saúde.
- (D) Possibilita o acesso dos cidadãos a algumas ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de saúde.

12. De acordo com a Constituição Federal de 1988, saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido mediante políticas sociais e econômicas que possuem o objetivo de

- (A) auxiliar no manejo clínico-social.
- (B) fomentar a disseminação cultural.
- (C) reduzir o risco de doença e de outros agravos.
- (D) direcionar demandas excessivas a outras instituições.

13. De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia e o saneamento básico.
- (B) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade em seu caráter de soberania.
- (C) Regula em território nacional as ações e serviços de saúde, executados exclusivamente em conjunto, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público.
- (D) O dever do Estado de garantir a saúde consiste, exclusivamente, na execução de políticas econômicas e sociais que visam à manutenção de da situação basal de riscos de doenças e de outros agravos.

14. Sobre a conferência de saúde, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A conferência reunir-se-á a cada dois anos.
- () Contará com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- () Poderá ser convocada, exclusivamente, pelo Poder Executivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
- (B) F / F / V
- (C) F / V / F
- (D) V / V / F

15. O Programa de Saúde da Família é considerado a estratégia que busca reorganizar a atenção básica no país, considerando os preceitos do Sistema Único de Saúde. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) É tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica.
- (B) Por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com menor potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica é considerada ação inexpressiva diante dos demais programas.
- (C) Busca ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar aumento na relação custo-efetividade.
- (D) Considerada base fundamental do Sistema Único de Saúde, suas ações seguem as normativas internacionais, importando modelos assistenciais americanos e europeus.

CLÍNICA MÉDICA

16. A DPOC é caracterizada pela obstrução crônica das vias aéreas inferiores e a destruição progressiva do parênquima pulmonar. Utilizando o exame de prova pulmonar, considera-se DPOC leve, em estágio I, pacientes que apresentam

- (A) VEF1 > 80% do previsto.
- (B) VEF1 entre 50 – 80% do previsto.
- (C) VEF1 entre 30 – 50% do previsto.
- (D) VEF1 < 30% do previsto.

17. Sobre o tratamento farmacológico da asma em sua forma grave em adultos, assinale a alternativa que apresenta a recomendação atual.

- (A) Baixas doses de CI + LABA.
- (B) Altas doses de CI + baixas doses de LABA.
- (C) Baixas doses de CI + baixas doses de LABA.
- (D) Altas doses de CI + LABA.

18. Sobre a antibioticoterapia empírica para o tratamento de meningite meningocócica em adultos, assinale a alternativa correta.

- (A) Cefalexina 2 g IV de 6/6 horas por 14 dias.
- (B) Penicilina G. Cristalina 200.000 UI IV de 4/4 horas por 4 dias.
- (C) Ceftriaxona 2 g IV de 12/12 horas por 7 dias.
- (D) Ampicilina 300 mg IV de 6/6 horas por 5 dias.

19. Osteoporose é caracterizada pela menor resistência dos ossos e, conseqüentemente, o risco aumentado para fraturas. Sobre o resultado da densitometria óssea, assinale a alternativa que apresenta o resultado para osteopenia.

- (A) T-escore < -2,5 e uma ou mais fraturas por fragilidade.
- (B) T-escore < -2,5.
- (C) T-escore < -1 e > -2,5.
- (D) T-escore > -1.

20. Sobre a HAS, assinale a alternativa que apresenta HA Estágio 2.

- (A) PAS de 140 – 159 mmHg e/ou PAD de 90 – 99 mmHg.
- (B) PAS de 160 – 179 mmHg e/ou PAD de 100 – 109 mmHg.
- (C) PAS ≥ 180 mmHg e/ou PAD ≥ 110 mmHg.
- (D) PAS de 130 – 139 mmHg e/ou PAD de 85 – 89 mmHg.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre o tratamento de furúnculo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) No tratamento tópico, os antibióticos como a neomicina, bacitracina, mupirocina ou ácido fusídico e a drenagem, quando a lesão apresenta flutuação, são curativos.
- (B) Para o tratamento sistêmico pode ser administrado eritromicina na dose de 30 a 40 mg/kg/dia, dividida de 6 em 6 horas, Tetraciclina na dose de 20 a 40 mg/kg/dia, dividida de 6 em 6 horas ou 2 g/dia para adultos, Sulfametoxazol+Trimetoprima – 800mg e 160 mg, respectivamente, a cada 12 horas em adultos. Em crianças, a dose é 20 a 30 mg/kg/dia calculada em relação ao Sulfametaxazol.
- (C) Sabonetes antibacterianos e antibióticos tópicos no nariz e unhas podem ser empregados no tratamento da furunculose recidivante, para evitar a colonização de portadores assintomáticos.
- (D) Ofloxacina, 400 mg, VO, dose única.

22. A foliculite dos cílios e glândulas de *Meibomius* que se caracteriza por edema intenso devido à frouxidão do tecido palpebral é denominada

- (A) foliculite superficial.
- (B) hordéolo.
- (C) sicose da barba.
- (D) celulite.

23. É a infecção herpética recidivante, atingindo os dedos das mãos e dos pés. Na primoinfecção, o quadro inicial é de vesículas que coalescem, podendo formar uma única bolha, com adenopatia e, eventualmente, febre. Após a cura da primo infecção, ocorrem recidivas locais. O trecho refere-se ao(à)

- (A) panarício herpético.
- (B) ceratoconjuntivite herpética.
- (C) herpes simples.
- (D) herpes Zoster.

24. Condiloma plano da sífilis (sorologia e pesquisa do *T. pallidum* em campo escuro), carcinoma espinocelular do pênis e da vulva e a doença de Bowen (carcinoma *in situ*) complementam a diferenciação e diagnóstico diferencial nos casos de

- (A) HIV.
- (B) HPV.
- (C) cancro mole.
- (D) gonorreia.

25. Raltegravir é um antirretroviral do tipo

- (A) inibidor da fusão/entrada.
- (B) inibidor da integrase.
- (C) inibidor da transcriptase reversa análogo de nucleosídeos.
- (D) inibidor da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeos.

26. É caracterizada pela presença de sangue nas fezes. Representa lesão na mucosa intestinal. Pode associar-se com infecção sistêmica e outras complicações, incluindo desidratação. Bactérias do gênero *Shigella* são as principais causadoras. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o excerto descreve a

- (A) disenteria.
- (B) diarreia grave.
- (C) diarreia persistente.
- (D) diarreia aquosa.

27. Um lactente de 3 meses de idade, com sua caderneta de vacinação completa, deverá receber

- (A) meningocócica C.
- (B) pneumocócica 10 Valente.
- (C) influenza pandêmica.
- (D) hepatite A.

28. Assinale a alternativa que apresenta a definição correta do termo "manchas de Koplik".

- (A) Manchas de tonalidade mostarda, que surgem nas pernas ocasionadas pela insuficiência venosa.
- (B) Lesões de 2 a 3 mm de diâmetro, discretamente elevadas, de cor branca com base eritematosa, localizadas na região interna da mucosa oral (bochechas), ao nível dos dentes pré-molares, antecedentes ao exantema em casos de sarampo.
- (C) Exantema generalizado.
- (D) Doença da pele caracterizada por manchas e escamas secas e pálidas, geralmente no rosto, pescoço ou ombros. Mais comum em crianças e homens. Normalmente, desaparece sozinha em um ano, requerendo apenas o uso de cremes hidratante.

29. O aleitamento materno deve ter contraindicação absoluta em caso de mãe

- (A) infectada pelo HTLV I e II.
- (B) com doença de Chagas.
- (C) em uso de antibióticos.
- (D) tuberculosa.

30. As localizações mais frequentes das lesões por HPV são a vulva, o períneo, a região perianal, a vagina e o colo do útero. Menos comumente, podem estar presentes em áreas extragenitais como conjuntiva, mucosa nasal, oral e laríngea. Dependendo do tamanho e localização anatômica, as lesões podem ser dolorosas, friáveis e/ou pruriginosas. **NÃO** é um codinome do HPV

- (A) cancro mole.
- (B) condiloma acuminado.
- (C) verruga genital.
- (D) crista de galo.

31. A sepse é uma síndrome extremamente prevalente, com elevada morbidade e mortalidade e altos custos. Seu reconhecimento precoce e tratamento adequado são fatores primordiais para a mudança deste cenário. Após identificação do paciente com suspeita de sepse, alguns fatores devem ser levados em consideração. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta uma conduta correta frente à suspeita de um quadro de sepse.

- (A) Em pacientes com qualquer das disfunções clínicas utilizadas na triagem para sepse como hipotensão, rebaixamento de consciência, dispneia ou desaturação e, eventualmente, oligúria, deve-se dar seguimento imediato ao protocolo de sepse com as medidas do pacote de 1 hora e proceder a reavaliação do paciente ao longo das 6 primeiras horas.
- (B) Todos os pacientes com protocolos de sepse abertos devem ter seu atendimento priorizado com o objetivo de otimizar a coleta de exames, o início de antibioticoterapia e a ressuscitação hemodinâmica.
- (C) Pacientes com disfunção orgânica grave e/ou choque devem ser alocados em leitos de terapia intensiva assim que possível, a fim de garantir o suporte clínico necessário. Caso não seja possível a alocação em leito de terapia intensiva, deve-se garantir o atendimento do paciente de maneira integral, independente do setor em que o mesmo se encontra.
- (D) Deve ser realizada a coleta de duas hemoculturas de sítios próximos em até três horas após a suspeita de sepse, e culturas de todos os outros sítios pertinentes como aspirado traqueal, líquido, urocultura, posteriormente a administração do antimicrobiano.

32. O atendimento ao paciente séptico nas primeiras 24 horas é de suma importância para o desfecho favorável. Entretanto, outras ações são necessárias para o sucesso pleno em termos de sobrevida hospitalar e reabilitação após a alta, com estabelecimento de uma linha de cuidado adequada, desde o momento da internação hospitalar ou do diagnóstico de sepse até o momento da alta. São exemplos de cuidados que deverão ser realizados pela equipe multidisciplinar visando à recuperação total do paciente séptico, **EXCETO**,

- (A) suporte nutricional adequado.
- (B) atendimento fonoaudiológico para recuperação de deglutição e fonação.
- (C) fisioterapia respiratória e motora focada em mobilização precoce.
- (D) vacinação contra influenza preventiva, pois o vírus da influenza é mais severo em pacientes que já apresentaram quadros de sepse.

33. O uso da vacina contra o sarampo em pessoas suscetíveis até 72 horas após a exposição pode impedir o surgimento ou modificar a doença. A Gamaglobulina padrão deverá ser usada nos contactantes suscetíveis (até o sexto dia do contato) que apresentam contraindicação à realização da vacina. A dose recomendada de Gamaglobulina em pacientes não imunocomprometidos é de

- (A) 0,05 ml/Kg.
- (B) 0,15 ml/Kg.
- (C) 0,25 ml/Kg.
- (D) 0,50 ml/Kg.

34. Sobre a leucocitose, analise as proposições abaixo.

- I. Na maior parte dos casos de infecções bacterianas, agudas e crônicas.
- II. Na mononucleose infecciosa, há elevação de leucócitos a partir da segunda semana, podendo exceder 30.000, e linfocitose, com presença de linfócitos atípicos.
- III. Na cetoacidose diabética (na presença de qualquer processo infeccioso), cifras podem atingir 20.000 a 30.000.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

35. Sobre o espectro de ação dos antimicrobianos, assinale a alternativa correta.

- (A) Estreptomicina: ativa sobre fungos e protozoários.
- (B) Eritromicina: ativa sobre micobactérias.
- (C) Penicilina: ativa sobre riquetsias, micoplasma e clamídias.
- (D) Anfotericina B: ativa sobre algas.

36. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de microrganismo resistente à Ampicilina.

- (A) *Streptococcus pneumoniae*.
- (B) *Bacillus anthracis*.
- (C) *Klebsiella-Enterobacter*.
- (D) *Neisseria gonorrhoeae*.

37. Sobre a infecção pelo HIV e inflamação, o Ministério da Saúde destaca que a população de LT-CD4+, predominantemente _____ residente na submucosa intestinal (Gut Associated Lymphoid Tissue – GALT), é intensamente infectada e destruída, ocasionando uma “quebra de barreira imune” do GALT. Essa alteração da imunidade local facilita a disseminação de produtos bacterianos para circulação sanguínea e contribui sobremaneira para o processo de disfunção e ativação imune que caracteriza a evolução da doença.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) CCR2+
- (B) CCR5+
- (C) CCR8+
- (D) CCR13+

38. Sobre os testes para hepatites virais, para verificar a imunização, o infectologista deve solicitar

- (A) HBs Ag.
- (B) Anti-HBcT.
- (C) Anti-HBs.
- (D) Anti-HBV.

39. Sobre os exames de seguimento para portadores de HIV, recomenda-se a verificação de Carga Viral (CV) a cada 6 meses. Portanto, o infectologista deve
- (A) repeti-lo 2 a 3 meses após o início/troca de TARV para avaliação da resposta virológica.
 - (B) atentar-se para o intervalo de 12 meses para pacientes em TARV com estabilidade imunológica (LT-CD4+ > 200 em duas aferições).
 - (C) repeti-lo somente para Homens > 40 anos e mulheres > 50 anos, na ausência de riscos cardiovasculares.
 - (D) repeti-lo com menor frequência em pacientes sintomáticos ou em uso de medicamentos mielotóxicos, por conta de possíveis alterações.
40. Acerca das alterações neurocognitivas associadas ao HIV (HAND), **NÃO** é fator de risco
- (A) coinfeção pelo vírus da hepatite C.
 - (B) diabetes ou resistência à insulina.
 - (C) NADIR de LT-CD4+ > 350 células/mm³.
 - (D) idade > 50 anos.