PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU

Estado do Paraná

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2023

Caderno de Questões Objetivas

MCG

MÉDICO CLÍNICO GERAL
20, 30 e 40 HORAS

M

MANHÃ

_____

Seu nome

LEIA COM ATENÇÃO

As páginas deste caderno estão numeradas; verifique imediatamente se não há folha faltando.

O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início da prova escrita.

INSTRUÇÕES

1. Ao receber a **FOLHA DE RESPOSTA,** verifique se o seu nome, nº do documento e o cargo para o qual concorre estão corretos e peça para anotar na ATA qualquer irregularidade.
2. Observe as recomendações impressas na **FOLHA DE RESPOSTA.**
3. Leia atentamente cada questão e assinale na **FOLHA DE RESPOSTA** a opção que a responde corretamente.
4. Você deverá assinar a **FOLHA DE RESPOSTA** e também escrever com sua letra usual uma frase que lhe será apresentada.
5. Se você precisar de algum esclarecimento, consulte o fiscal de sala.
6. O tempo total de prova também inclui o preenchimento da **FOLHA DE RESPOSTA**. Faça sua prova com tranquilidade, mas **CONTROLE O TEMPO**.

Printed in Brazil
www.institutounivida.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05

Transparência salarial para reduzir desigualdade entre mulheres e homens

Debate foi iniciado no segundo semestre de 2023, durante a regulamentação da legislação, com participação de representantes de empregadores e trabalhadores no grupo técnico interministerial que debate o Plano Nacional de Igualdade Salarial de Mulheres e Homens. - 18/02/2024

» Luciana Vasconcelos Nakamura, Diretora de Programa da Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

» Paula Montagner, Subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do MTE

» Rosane Silva, Secretária Nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres

A desigualdade**[,]** marca secular do Brasil**[,]** herdada do nosso passado colonial escravocrata e patriarcal**[,]** é um dos desafios mais **redivivos** no caminho em direção ao pleno desenvolvimento socioeconômico com justiça social plena. É com esse olhar que o governo [...] instituiu a Lei da Igualdade Salarial (nº 14.611/2023) entre mulheres e homens, uma iniciativa para corrigir essa assimetria profunda.

O mundo do trabalho ocupa posição estratégica em nossa sociedade e representa desenvolvimento social e econômico, autonomia e inclusão social. Na contramão, a ascensão das mulheres _____ barreiras específicas.

No mercado de trabalho formal no Brasil, a desigualdade salarial entre mulheres e homens atingiu 20,8% no quarto trimestre de 2023, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto o valor recebido por eles no trabalho principal alcançava R$ 3.233, o delas foi R$ 2.562.

A criação do Relatório de Transparência Salarial é uma ferramenta para enfrentar a discriminação salarial e de critérios remuneratórios. A iniciativa toma o cuidado de não expor os salários praticados, preservando as situações individuais ancoradas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O relatório é resultado de parceria entre os ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego (MTE), que atuavam de forma conjunta no programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, juntamente com o Ministério da Igualdade Racial, da ONU Mulheres e da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A orientação é garantir a inexistência de diferenças salariais injustificadas entre filiais, de modo a preservar a legislação vigente e características setoriais. Ao mesmo tempo, procura eliminar práticas discriminatórias que levem a disparidades salariais entre mulheres e homens que desempenhem funções equivalentes.

Esse debate sobre o tema começou no segundo semestre de 2023, durante a regulamentação da legislação, com a participação de representantes de empregadores e trabalhadores no grupo técnico interministerial que tem debatido o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens.

Após debates e análises, os técnicos decidiram ordenar as informações de acordo com os grandes grupos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), com a perspectiva de**[,]** se houver proporções semelhantes de homens e mulheres nos diferentes grupos**[,]** os salários percebidos também serão equivalentes. Esse método é utilizado para evitar a exposição desnecessária de pequenos grupos de ocupações e pessoas.

As eventuais diferenças remanescentes _____ origem nos diversos critérios remuneratórios praticados pelas empresas, considerados legítimos, envolvendo diferentes situações individuais previstas em planos de cargos e salários, variações no tempo de experiência profissional, diferenças associadas à capacidade de cumprimento de metas, entre outras.

Vivemos hoje um período de adaptação das empresas à nova legislação, da mesma forma que o governo com o trabalho de implementação, como já aconteceu em tantos períodos da história. É uma questão de tempo para que a transparência dos números se torne um hábito e a lei da igualdade salarial seja cumprida.

NAKAMURA, Luciana Vasconcelos; MONTAGNER, Paula; SILVA, Rosane. Transparência salarial para reduzir desigualdade entre mulheres e homens. Correio Braziliense, 18 de fevereiro de 20204. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2024/02/6804236-transparencia-salarial-para-reduzir-desigualdade-entre-mulheres-e-homens.html. Acesso em: 18 fev. 2024. Adaptado.

01) De acordo com o texto, o Relatório de Transparência Salarial:

A) passará por sanções devido à potencial exposição de dados de empresas.

B) será responsável por definir punições a filiais que pagam salários discrepantes.

C) auxiliará na equiparação salarial entre funcionários de alto e de baixo escalão.

D) será um método significativo no combate à desigualdade salarial.

02) Analisando-se suas características, pode-se afirmar que o texto apresentado se estrutura predominantemente de maneira:

A) narrativa.

B) dissertativa.

C) injuntiva.

D) descritiva.

03) Que sentido veicula o vocábulo grifado no primeiro parágrafo?

A) Ressuscitação.

B) Morosidade.

C) Perspicácia.

D) Monotonia.

04) As vírgulas sinalizadas com colchetes no primeiro e no sétimo parágrafos foram empregadas, respectivamente, para isolar:

A) elementos de mesma função sintática enumerados (primeiro parágrafo) e um vocativo (sétimo parágrafo).

B) adjuntos adverbiais deslocados (primeiro parágrafo) e um aposto explicativo (sétimo parágrafo).

C) vocativos (primeiro parágrafo) e orações aditivas com sujeitos diferentes (sétimo parágrafo).

D) apostos explicativos (primeiro parágrafo) e um adjunto adverbial deslocado (sétimo parágrafo).

05) Qual das alternativas abaixo preenche adequadamente, no que tange à concordância verbal, as duas lacunas inseridas no texto?

A) têm | têm

B) têm | tem

C) tem | têm

D) tem | tem

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

06) Analise as alternativas abaixo e assinale a que corresponda a função do MS-Excel 2016 responsável por retornar à duração anual de um título com pagamentos de juros periódicos:

A) Função DESC.

B) Função VFPLANO.

C) Função DURAÇÃO.

D) Função TAXAJUROS.

07) Analise a imagem e responda.



Afirma-se que o ícone representado acima, no MS-Excel 2016, pode ser localizado na guia:

A) Fórmulas.

B) Página Inicial.

C) Dados.

D) Layout da Página.

08) Qual atalho do MS-Word 2016 deve ser utilizado para recortar o item selecionado?

A) Ctrl + Z.

B) Ctrl + O.

C) Ctrl + S.

D) Ctrl + X.

09) Leia o trecho abaixo.

"Mudar o dono ou grupo de um arquivo ou diretório."

Qual comando do Linux deve ser utilizado para desempenhar a função descrita acima?

A) chown.

B) cmp.

C) ls.

D) uncompress.

10) Das alternativas abaixo, qual apresenta o atalho do Windows 11 responsável por selecionar todos os itens em um documento ou em uma janela?

A) Ctrl + Y.

B) Ctrl + R.

C) Ctrl + D.

D) Ctrl + A.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

11) A asma é uma doença de grande morbidade, afetando todas as faixas populacionais. Para se obter o diagnóstico funcional desta patologia, podem ser realizadas as provas funcionais denominadas de espirometria e de pico de fluxo expiratório (PFE). Na espirometria é considerado indicativo de obstrução ao fluxo aéreo a redução do Volume expiratório forçado no primeiro minuto (VEF1) abaixo de determinado percentual do fisiológico. Assinale abaixo a alternativa que inclui esta faixa:

A) 72%.

B) 80%.

C) 88%.

D) 96%.

12) A Dengue é considerada atualmente doença epidêmica de grande importância para a saúde pública. Sobre esta patologia podemos afirmar, EXCETO:

A) A gestante e a criança menor de dois anos de idade são consideradas grupos de risco.

B) O desconforto respiratório e a mialgia são considerados sinais de alerta/alarme.

C) O quadro pode ocorrer com os sinais clássicos, mas sem vigência de febre.

D) O Teste rápido NS1 é orientado nos casos em que são observados sinais de alarme.

13) A Doença de Crohn é uma das principais doenças inflamatórias intestinais caracterizada por um quadro de diarreia de aspecto inflamatório e por outras manifestações intestinais e extra intestinais. São consideradas possíveis complicações dessa patologia:

A) A colangite esclerosante.

B) A perfuração.

C) As fístulas.

D) O megacólon tóxico.

14) A vídeo laparoscopia tem sido a via de acesso mais utilizada atualmente na maioria das cirurgias digestivas. Durante esse procedimento observamos a formação de pneumoperitônio e de alterações como, EXCETO:

A) Acidose Metabólica.

B) Aumento da pressão intracraniana.

C) Redução da pressão de perfusão cerebral.

D) Redução do débito urinário.

15) As crianças são frequentemente acometidas por doenças respiratórias. Sendo assim, o profissional de saúde deve conseguir identificar sinais de maior gravidade dessas doenças. A frequência respiratória considerada normal para uma criança de 0 a 2 meses é de até:

A) 30 movimentos respiratórios por minuto.

B) 40 movimentos respiratórios por minuto.

C) 60 movimentos respiratórios por minuto.

D) 80 movimentos respiratórios por minuto.

16) As intoxicações exógenas ocorrem em 90% dos casos em crianças menores de 5 anos. Nos quadros de intoxicação por opioides geralmente podemos observar miose, depressão respiratória, depressão cardiocirculatória e coma. É considerado o antídoto nesses casos:

A) Atropina.

B) Biperideno.

C) Flumazenil.

D) Naloxone.

17) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas do trecho abaixo:

> A asma pode ser controlada _____ pacientes, evitando os atendimentos em emergências e as hospitalizações. Se a asma não for bem controlada, ela pode tornar-se _____ prejuízo permanente ao fluxo aéreo, levar à limitação física e social significativa e até causar a morte, _____. (FORTES et al, 2010)

A) em alguns – aguda ou crônica sem – em casos mais graves.

B) em todos os – crônica com – em todos os casos.

C) na maioria dos – aguda sem – em casos mais graves.

D) na maioria dos – crônica com – em casos mais graves.

18) Bebê, 7 meses, previamente hígido, é levado ao pediatra com queixa de sangramento intestinal súbito volumoso. Exame físico sem alterações. A causa mais provável deste sangramento é:

A) Diverticulo de Meckel.

B) Doença de Crohn.

C) Tumor de Intestino Grosso.

D) Úlcera Duodenal.

19) Dentre as parasitoses abaixo, assinale a mais relacionada aos quadros de infestação parasitária de maior gravidade em pacientes imunodeprimidos:

A) Ascaridíase.

B) Estrongiloidíase.

C) Giardíase.

D) Toxocaríase.

20) Entidade não muito bem definida etiologicamente, atribuída ao aumento do tamanho de linfonodos em região ileocecal, que pode causar dor abdominal, simulando apendicite aguda:

A) Cistite hemorrágica.

B) Colelitíase.

C) Linfadenite mesentérica aguda.

D) Psoíte.

21) Na grande maioria dos casos de Faringite, o agente causal é:

A) Estafilococos.

B) Streptococcus b-hemoliticos do grupo A.

C) Streptococcus pneumonie.

D) Viral.

22) O Índice de Harvey-Bradshaw é utilizado para fazer a diferenciação entre doença ativa ou em remissão, na seguinte patologia:

A) Doença Celíaca.

B) Doença de Crohn.

C) Doença de Paget.

D) Doença de Wilson.

23) O teste rápido molecular para Tuberculose é contraindicado na seguinte situação:

A) Na triagem de resistência à rifampicina nos casos com suspeita de falência ao tratamento da tuberculose.

B) Na triagem de resistência à rifampicina nos casos de retratamento.

C) No diagnóstico de casos novos de tuberculose pulmonar, pleural e laríngea em adultos e adolescentes.

D) No diagnóstico de tuberculose extrapulmonar nos materiais biológicos já validados.

24) Paciente 49 anos, masculino, é admitido com quadro de dor abdominal "em barra", associado a vômitos. Exames evidenciaram aumento significativo da amilase e lipase e tomografia confirmou a presença de Pancreatite Aguda. Assinale abaixo a principal causa etiológica desta patologia:

A) Colelitíase.

B) Hipercolesterolemia.

C) Pâncreas Anular.

D) Quilomicronemia.

25) Para a hidratação do paciente Rodrigo Silva, com sintomas de desidratação, foi prescrito a administração de 1.000ml de soro fisiológico a 0,9%, mais 1.000ml de soro glicosado 5%, totalizando 2.000ml, para ser administrado durante 24h de internação. Calcule qual deverá ser o gotejamento (aproximado) por minuto:

A) 53 gotas por minuto.

B) 44 gotas por minuto.

C) 32 gotas por minuto.

D) 28 gotas por minuto.

26) Qual das alternativas NÃO apresenta um sinal sugestivo de Tuberculose ativa, identificado pela tomografia computadorizada de tórax?

A) Aspecto de "árvore em brotamento".

B) Bronquiectasias de tração.

C) Cavidades de paredes espessas.

D) Nódulos centrolobulares de distribuição segmentar.

27) Quanto ao uso de antibióticos em pacientes com Diarreia é CORRETO afirmar que:

A) Devem ser usados em casos nos quais se identifiquem nas fezes trofozoítos de Entamoeba histolytica englobando hemácias.

B) Devem ser usados somente para amebíase, quando o tratamento de disenteria por Shigella sp fracassar.

C) Devem ser usados somente para casos de disenteria e comprometimento do estado geral ou em casos de cólera grave.

D) Devem ser usados somente quando a diarreia durar 14 dias ou mais e forem identificados cistos ou trofozoítos nas fezes.

28) Recém-nascido com jato miccional fino, entrecortado e sem pressão, estabelece a probabilidade da seguinte etiologia, causadora de infecção urinária (malformação, devido à hipertrofia e fusão do freio do veromontano):

A) Bexiga neurogênica.

B) Duplicação do trato urinário.

C) Ureterocele.

D) Válvula de uretra posterior.

29) São encontrados na Solução Reidratante Oral recomendada pela OMS, EXCETO:

A) Cálcio.

B) Citrato.

C) Glicose.

D) Sódio.

30) São Princípios e Diretrizes do SUS, EXCETO:

A) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

B) A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

C) A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

D) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

INSTITUTO SOCIAL UNIVIDA

Printed in Brazil
www.institutounivida.org.br