



FUNDAÇÃO DE APOIO À GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA - FAGIFOR

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2024

# MÉDICO ANESTESIOLOGISTA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**TARDE - VERSÃO A**

## INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **50 (cinquenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões, Legislação - SUS 10 (dez) e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- III. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VI. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- VIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- IX. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- X. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XI. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 03 (três) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



## GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:							ASSINATURA DO CANDIDATO:							INSCRIÇÃO:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto- Patrimônio Arqueológico – CE

(Texto adaptado especificamente para este concurso. O texto original está disponível em <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/542/> acesso em 01 mar-24)

O estado do Ceará tem grande potencial arqueológico, tendo em vista que, até dezembro de 2014, foram cadastrados 528 sítios. Esse dado é resultado de significativa ocorrência desses sítios no período pré-colonial. A extensa quantidade de sítios cerâmicos e líticos, além de notável presença de grafismos rupestres, agregaram ainda mais valor etnocultural para o local.

Dentre as áreas de interesse arqueológico, destacam-se os sítios em regiões litorâneas com vestígios históricos e pré-coloniais, identificados nas proximidades de rios como o Jaguaribe e o Acaraú. As regiões do centro-norte do Estado (Forquilha, Sobral e Iraçuba), a região de Cariri (Crato e Nova Olinda) e o sertão central (Quixadá e Quixeramobim) são palcos de manifestações rupestres que foram objeto de pesquisa em estudos acadêmicos.

Nos municípios de Tauá, Arneiroz e Morada Nova, foram identificados numerosos sítios líticos formados por grupos caçadores-coletores, assim denominados em razão do sustento obtido pela caça de animais selvagens e pela coleta de plantas silvestres. Já no município de Mauriti, na porção leste do Cariri, foram localizadas aldeias ceramistas, com destaque para a aldeia Tupi-Guarani Anauá, datada do século XIV.

Parte significativa dos sítios arqueológicos cearense foi descoberta em projetos de licenciamento arqueológico, fato que alertou para o potencial das pesquisas preventivas na região. O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) tem investido em projetos de etnoarqueologia, na identificação e no registro de coleções particulares de bens arqueológicos.

O Instituto Iphan financiou, em 2012, escavações arqueológicas na comunidade da Serra do Evaristo, localizada na área do Maciço de Baturité. Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade quilombola da Serra do Evaristo, certificada pela Fundação Palmares. A importância social e o significativo potencial informativo desse enclave arqueológico da Serra do Evaristo atraíram interessados em parcerias futuras para continuidade da pesquisa, como a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), que atua na região.

(...)

#### Bens Arqueológicos Tombados

O Brasil possui bens arqueológicos tombados em todo o território, sendo onze sítios e seis coleções arqueológicas localizadas em museus. O país reconhece a importância dos bens arqueológicos como elementos representantes dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira. Esse contexto está explícito

na legislação que protege como bem da União todo achado arqueológico e estabelece que qualquer nova descoberta deva ser imediatamente comunicada às Superintendências do Iphan ou diretamente ao Instituto. Por meio dos bens arqueológicos, é possível identificar conhecimentos e tecnologias que indicam anos de adaptação humana ao ambiente, além da produção de saberes tradicionais brasileiros.

O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, com o Decreto-Lei nº 25. No entanto, em 1961, a Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961 estabeleceu proteção específica e, em 1988, a Constituição Brasileira também reconheceu os bens arqueológicos como patrimônios da União, incluindo-os no conjunto do Patrimônio Cultural Brasileiro. Desta forma, a destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são infrações puníveis por lei.

Os bens arqueológicos, a exemplo da coleção arqueológica do Ceará, estão disponíveis para visitação no Museu da Escola Normal Justiniano de Serra, situado em Fortaleza. Podem-se observar: um vaso de cerâmica, um trabalho indígena que foi encontrado na Gruta de Ubajara; uma coleção de 68 peças formadas por arcos e flechas de índios do Mato Grosso; uma coleção formada por 22 peças de adornos indígenas, bem como quatro machados de pedra indígenas dentre diversos artefatos. Compreender a relevância desses objetos é reconhecer que a história de ancestrais brasileiros também é nossa”.

#### 1) Analise as afirmativas do texto apresentado.

- I. O Ceará possui ínfimo potencial arqueológico, conta com 528 sítios cadastrados até dezembro de 2014 e outros em áreas de interesse arqueológico, em sítios costeiros com vestígios históricos e pré-coloniais.
- II. Os bens arqueológicos tombados em todo o território brasileiro são importantes, pois, se referem aos elementos representativos dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira.
- III. O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, portanto, destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são crimes puníveis por lei.

#### Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I e II apenas.
- e) II e III apenas.

#### 2) Leia o 2º. parágrafo do texto apresentado e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual usada.

- a) Dissertativa.
- b) Injuntiva.
- c) Narrativa.
- d) Descritiva.
- e) Argumentativa.

- 3) Assinale a alternativa que contenha um adjetivo, proparoxítono, formado por 6 sílabas e por sufixo.
- Arqueológicos.
  - Superintendências.
  - Ceramistas.
  - Etnoarqueologia.
  - Universidade.
- 4) Assinale a alternativa que explique a acentuação na palavra “Acaráú”.
- Todas as oxítonas são acentuadas.
  - Todas as paroxítonas são acentuadas.
  - Todas as proparoxítonas são acentuadas.
  - As vogais “i” e “u” tônicas são acentuadas quando formam hiato com a vogal anterior.
  - Os nomes próprios não obedecem a regras de acentuação.
- 5) Marque a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque.
- “O estado do Ceará tem **grande** potencial arqueológico” – substantivo.
  - “(…) os sítios **litorâneos** com vestígios históricos” – adjetivo.
  - “(…) **escavações** arqueológicas na comunidade” – advérbio.
  - “O país reconhece a importância dos **bens** arqueológicos” – advérbio.
  - “Esse contexto está **explícito** na legislação” – substantivo.
- 6) Assinale a alternativa que justifique o emprego da crase no fragmento a seguir: “Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade”
- Preposição “a” + artigo “a”.
  - Artigo “a” + preposição “a”.
  - Locuções adverbiais iniciadas por “a”.
  - Locuções prepositivas iniciadas por “a”.
  - Locuções conjuntivas iniciadas por “a”.
- 7) Assinale a alternativa correta em relação à função sintática dos termos da oração: “O país / reconhece / a importância dos bens arqueológicos”.
- Sujeito simples/ verbo intransitivo / predicativo.
  - Sujeito composto / verbo transitivo indireto / predicativo do objeto.
  - Sujeito simples/ verbo transitivo direto / objeto direto.
  - Sujeito indeterminado / verbo intransitivo / objeto indireto.
  - Sujeito inexistente/ verbo bitransitivo / complemento nominal.

- 8) Assinale a alternativa correta em relação à passagem de voz passiva para voz ativa na oração: *Um raro adereço indígena foi encontrado pelo Iphan.*
- O Iphan encontrara um raro adereço indígena.
  - Um raro adereço indígena tinha sido encontrado pelo Iphan.
  - O Iphan encontra um raro adereço indígena.
  - Um raro adereço indígena teria sido encontrado pelo Iphan.
  - O Iphan encontrou um raro adereço indígena.
- 9) Analise as afirmativas abaixo.
- Somente o Iphan recebeu o raro adereço.
  - O Iphan recebeu somente o raro adereço.
  - O Iphan recebeu o raro adereço somente.
- Assinale a alternativa que contenha o mesmo significado da oração: “O Iphan, e mais nenhum outro Instituto, recebeu o raro adereço”.
- I apenas.
  - II apenas.
  - III apenas.
  - I e III apenas.
  - II e III apenas.
- 10) O Manual de Redação da Presidência da República exemplifica a escrita correta ao mostrar sentenças com erros e em seguida as corrigir. Assinale a alternativa em que a estrutura da sentença esteja correta.
- “O Programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional. Depois de ser longamente debatido”.
  - “É tempo de o Congresso votar a emenda”.
  - “Apesar das relações entre os países estarem cortadas (...)”.
  - “Pelo ofício circular, recomendou-se aos Ministérios economizar energia e que elaborassem planos de redução de despesas”.
  - “No discurso de posse, mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição”.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

- 11) Um cofre possui uma senha de 3 (três) dígitos, cuja soma é 6 (seis), sendo o primeiro dígito o dobro do segundo e o terceiro dígito o triplo do segundo. Assinale a alternativa que apresenta a senha correta para abrir esse cofre.
- 231
  - 123
  - 312
  - 213
  - 321
- 12) Um dado de seis lados é lançado três vezes consecutivas. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de obter a soma dos resultados igual a 10.
- 1/54
  - 1/72
  - 1/27
  - 1/108
  - 1/36

**13) No parque, 30 crianças brincam no balanço, 25 no escorrega e 20 na gangorra. Dentre elas, 10 brincam em todos os brinquedos. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de crianças que estão brincando neste parque.**

- a) 75 crianças
- b) 60 crianças
- c) 55 crianças
- d) 70 crianças
- e) 65 crianças

**14) Apresenta-se a seguinte Tabela-Verdade:**

P	Q	P v Q
V	V	?
V	F	?
F	V	?
F	F	?

**Assinale a alternativa correta.**

- a)  $P \vee Q$  é falso em todos os casos
- b)  $P \vee Q$  é verdadeiro apenas se P e Q forem verdadeiros
- c)  $P \vee Q$  é verdadeiro apenas se P for falso e Q for falso
- d)  $P \vee Q$  é falso se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro
- e)  $P \vee Q$  é verdadeiro se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro

**15) Ao se pesar seis laranjas, constata-se que elas possuem o mesmo peso que três maçãs. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de maçãs equivalentes a quatro laranjas.**

- a) seis
- b) três
- c) quatro
- d) duas
- e) cinco

**16) É dada a seguinte proposição abaixo:**

"Todos os alunos são estudiosos."

**Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição.**

- a) Todos os alunos são estudiosos
- b) Nenhum aluno é estudioso
- c) Se um aluno é estudioso, então ele é aprovado
- d) Alguns alunos não são estudiosos
- e) Se um aluno não é estudioso, então ele não é aprovado

**17) Em um Diagrama de Venn, existem 5 elementos na interseção dos conjuntos A e B. E fora da área de interseção existem 6 elementos em A e 4 em B. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade total de elementos dos conjuntos A e B.**

- a) 15
- b) 11
- c) 9
- d) 10
- e) 20

**18) As fórmulas bem formadas (FBF), na Lógica de Primeira Ordem, seguem regras sintáticas específicas. Assinale a alternativa que apresenta a única fórmula bem formada (FBF) na Lógica de Primeira Ordem.**

- a) "Se x é homem, então todo x é mortal."
- b) "Para todo x, se x é homem, então x é mortal."
- c) "Se todo homem é mortal, então todo x é homem."
- d) "Todo homem é mortal e todo mortal é homem."
- e) "Para todo x, se x é mortal, então x é homem."

**19) Em uma matriz 3x3 a soma dos números em cada linha e coluna é igual a 6. Assinale a alternativa que apresenta o número que está na posição (2,2).**

- a) 0,5
- b) 1
- c) 3
- d) 2
- e) 4

**20) Em um quadrado, ao acrescentar 1 cm ao comprimento de cada lado, o perímetro resultante é 16 cm. Assinale a alternativa que apresenta o comprimento do lado do quadrado original.**

- a) 4 cm
- b) 5 cm
- c) 3 cm
- d) 2 cm
- e) 1 cm

#### LEGISLAÇÃO - SUS

**21) A respeito da Portaria n. 483, de 1º de abril de 2014, que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os Sistemas Logísticos constituem sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, tais como patologia clínica e imagens e de assistência farmacêutica.
- II. Os Sistemas de Apoio constituem soluções em saúde, em geral relacionadas às tecnologias de informação, integradas pelos sistemas de identificação e de acompanhamento dos usuários, o registro eletrônico em saúde, os sistemas de transporte sanitários e os sistemas de informação em saúde.
- III. A Regulação constitui o componente de gestão para qualificar a demanda e a assistência prestada, otimizar a organização da oferta e promover a equidade no acesso às ações e serviços de saúde, especialmente os de maior densidade tecnológica, e auxiliar no monitoramento e avaliação dos pactos intergestores.
- IV. A Governança constitui a capacidade de intervenção que envolve diferentes atores, mecanismos e procedimentos para a gestão regional compartilhada da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas



**22) A respeito do que dispõe a Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, acerca das atribuições dos profissionais da atenção básica, assinale a alternativa correta.**

- a) São atribuições comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica, entre outras, participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades
- b) São atribuições específicas do técnico e/ou auxiliar de enfermagem, entre outras, cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local
- c) São atribuições específicas do Cirurgião-dentista, entre outras, proceder à limpeza e à antisepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos
- d) É atribuição exclusiva do enfermeiro realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe, entre outras atribuições
- e) São atribuições específicas do enfermeiro, entre outras, indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa

**23) A Portaria n. 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando o que dispõe esta portaria, a operacionalização da implantação da Rede de Atenção Psicossocial se dará pela execução de quatro fases:**

- I. Fase 1 - \_\_\_\_\_
- II. Fase 2 - \_\_\_\_\_
- III. Fase 3 - \_\_\_\_\_
- IV. Fase 4 - \_\_\_\_\_

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**

- a) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes
- b) Contratualização dos Pontos de Atenção / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Qualificação dos componentes
- c) Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico
- d) Adesão e diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial
- e) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Qualificação dos componentes / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico

**24) A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se apoio matricial a análise crítica e sistemática da qualidade de atenção à saúde prestada no hospital, incluindo-se os procedimentos usados para o diagnóstico e o tratamento, uso dos recursos e os resultados para os usuários.
- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se linha de cuidado as recomendações desenvolvidas de modo sistemático para auxiliar os profissionais de saúde e usuários no momento da tomada de decisões acerca de circunstâncias clínicas específicas.
- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se modelo de atenção os espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular, como uma unidade ambulatorial especializada, uma unidade de atenção domiciliar, uma unidade de atenção paliativa, etc.
- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se Rede de Atenção à Saúde a malha que integra os diversos pontos de atenção em determinado território, organizando-os sistematicamente para que os diferentes níveis e densidades tecnológicas estejam articulados e adequados de forma regulada para o atendimento ao usuário.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

**25)A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- a) O modelo de atenção hospitalar contemplará um conjunto de dispositivos de cuidado que assegure o acesso, a qualidade da assistência e a segurança do paciente
- b) A clínica ampliada e a gestão da clínica serão a base do cuidado, com a implementação de equipes multiprofissionais de referência, de forma a assegurar o vínculo entre a equipe, o usuário e os familiares, com a garantia de visita aberta com a presença do acompanhante e com a valorização de fatores subjetivos e sociais
- c) As equipes multiprofissionais de referência serão a estrutura nuclear dos serviços de saúde do hospital e serão formadas exclusivamente por médicos e enfermeiros, que irão compartilhar informações e decisões de forma horizontal, estabelecendo-se como referência para os usuários e familiares
- d) A horizontalização do cuidado será uma das estratégias para efetivação da equipe de referência, com fortalecimento de vínculo entre profissionais, usuários e familiares
- e) As equipes dos serviços hospitalares atuarão por meio de apoio matricial, propiciando retaguarda e suporte nas respectivas especialidades para as equipes de referência, visando a atenção integral ao usuário

**26)De acordo com a Resolução – RDC n. 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, analise o texto abaixo.**

“Art. 9º O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado \_\_\_\_\_.

Art. 10 A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo NSP, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa.

Parágrafo único - Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até \_\_\_\_\_ horas a partir do ocorrido”.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**

- a) pela Secretaria Municipal de Saúde / 72 (setenta e duas)
- b) pelo Núcleo de Segurança do Paciente – NSP / 72 (setenta e duas)
- c) pelo Sistema Único de Saúde – SUS / 48 (quarenta e oito)
- d) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA / 48 (quarenta e oito)
- e) pela Rede de Atenção à Saúde – RAS / 96 (noventa e seis)

**27)O artigo 195 da Constituição Federal de 1988 dispõe que “a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. A respeito do que dispõe a Constituição Federal acerca da seguridade social, analise as afirmativas abaixo.**

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos e integrarão o orçamento da União.
- II. A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- III. Benefícios ou serviços da seguridade social poderão ser criados, majorados ou estendidos, ainda que sem as correspondentes fontes de custeio total.
- IV. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

**Assinale a alternativa correta.**

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| a) I e II apenas  | d) II e III apenas |
| b) I e IV apenas  | e) III e IV apenas |
| c) II e IV apenas |                    |

**28)A respeito da Resolução-RDC n. 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda
- b) O serviço de saúde deve manter disponíveis registros de formação e qualificação dos profissionais compatíveis com as funções desempenhadas
- c) O serviço de saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas
- d) O serviço de saúde deve ter seu projeto básico de arquitetura atualizado, em conformidade com as atividades desenvolvidas e aprovado pela vigilância sanitária e demais órgãos competentes
- e) O serviço de saúde deve garantir a continuidade do fornecimento de água, sendo-lhe dispensada esta medida em caso de interrupção do fornecimento pela concessionária, ainda que considerada um insumo crítico

**29) A respeito do que dispõe a Lei Orgânica da Saúde acerca da telessaúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Entre os princípios a que obedecerá a telessaúde, está o direito de recusa ao atendimento nesta modalidade, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado.
- ( ) É vedado ao profissional de saúde a opção pela utilização da telessaúde quando em relação à primeira consulta.
- ( ) É obrigatória a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição, ainda que exclusivamente por meio da modalidade telessaúde.
- ( ) Para fins desta Lei, considera-se telessaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

**30) Considerando o que dispõe o Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais
- b) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos
- c) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do Sistema Único de Saúde e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço
- d) O planejamento da saúde é facultativo para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31) Sobre o sufentanil, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) É um opioide que apresenta alta taxa de ligação proteica.
- ( ) Apresenta um volume de distribuição maior quando comparado ao fentanil.
- ( ) Apresenta alta lipossolubilidade o que lentifica sua passagem pela barreira hemato-encefálica.
- ( ) Caracteriza-se por uma alta taxa de extração hepática sendo metabolizado pela enzima CYP3A4.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - V - V
- b) F - F - V - V
- c) V - F - F - V
- d) V - V - F - V
- e) F - V - V - F

**32) Em otorrinolaringologia, as cirurgias nasais mais comuns são as cirurgias endoscópicas, exérese de pólipos e rinosseptoplastias. Considerando a anestesia para cirurgias nasais, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O posicionamento do paciente em proclive reduz a congestão venosa e a pressão arterial, diminuindo a perda sanguínea e melhorando o campo cirúrgico
- b) O uso endovenoso do ácido tranexâmico além de não ser seguro, não mostrou efetividade na redução do sangramento no campo cirúrgico
- c) Anestesia com hipotensão controlada - redução em 30% da pressão arterial média basal - reduz a perda sanguínea e melhora o campo cirúrgico
- d) O uso de alfa-2 agonistas apesar de aumentar a sedação pós-operatória, diminui a pressão arterial sem causar vasodilatação tecidual significativa
- e) Evidências atuais favorecem o uso da anestesia venosa total ao invés do uso da anestesia geral balanceada para menor sangramento em campo cirúrgico



**33) Com a melhora das condições econômicas, sanitárias e alimentares, a população mundial vem apresentando um aumento da expectativa de vida com aumento progressivo do número de idosos. Pacientes esses que, com frequência, demandam cuidados hospitalares avançados como cirurgias eletivas e exames sob anestesia. Considerando a anestesia para os pacientes idosos, assinale a alternativa correta.**

- Os bloqueios de neuroeixo em comparação à anestesia geral em idosos apresenta maior índice de complicações pulmonares em pacientes pneumopatas
- Em pacientes idosos, os opioides apresentam uma menor potência de ação devido ao aumento do clearance e diminuição da sensibilidade neurológica
- As complicações pós-operatórias de ordem cognitiva são pouco comuns em se tratando de pacientes idosos
- Em se tratando de anestésicos inalatórios, espera-se uma redução de cerca de 30% na concentração alveolar mínima (CAM) em pacientes idosos
- Alterações cardiovasculares que se desenvolvem nos pacientes idosos permitem que estes tolerem melhor estados hipervolêmicos ou hipovolêmicos

**34) Considerando a importância do tempo de jejum para a realização de um procedimento anestésico eletivo com segurança, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- A ingestão de líquidos claros (água, chá, suco sem polpa, café puro) está permitida até 2 horas antes do procedimento.
- No caso de pacientes em aleitamento materno, a última alimentação deve ser feita pelo menos 6 horas antes do procedimento.
- Após a ingestão de alimentos gordurosos, comidas fritas ou carne, deve-se aguardar pelo menos 8 horas para o procedimento.
- Após ingestão de fórmula láctea infantil, são necessárias pelo menos 6 horas de jejum para realização do procedimento.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- F - V - F - F
- V - V - F - V
- V - F - F - V
- V - V - V - F
- V - F - V - V

**35) Em se tratando de anestesia para cirurgia de coluna com monitorização neurofisiológica intra-operatória, analise as afirmativas abaixo.**

- Bloqueadores neuromusculares não devem ser utilizados no intra-operatório pois impedem a transmissão de sinal na junção neuromuscular.
- Propofol é a medicação hipnótica de escolha para este tipo de anestesia sendo a infusão contínua alvo-controlada a melhor forma de utilização.
- Baixas doses de benzodiazepínicos para ansiólise não impedem a leitura dos potenciais evocados neurais permitindo a monitorização neurofisiológica intra-operatória.
- A utilização de anestésicos inalatórios para manutenção do plano anestésico não interfere com a monitorização neurofisiológica desde que utilizados como droga única.

**Estão corretas as afirmativas:**

- I apenas
- I e II apenas
- I, II e III apenas
- II e IV apenas
- I, II, III e IV

**36) A anestesia pediátrica é uma área muito abrangente que demanda o conhecimento de particularidades fisiológicas do indivíduo em cada fase do desenvolvimento infanto-juvenil. Em relação a anestesia em pacientes pediátricos, assinale a alternativa correta.**

- A morbimortalidade cirúrgica é diretamente proporcional à idade sendo os neonatos sob o menor risco de eventos adversos
- Neonatos apresentam mais fibras contráteis no miocárdio conseguindo aumentar o volume sistólico com o aumento da contratilidade cardíaca
- O aumento do débito cardíaco em neonatos é dependente do aumento da frequência cardíaca pois o volume sistólico normalmente permanece fixo
- Os pulmões no período neonatal têm mais alvéolos, maior superfície pulmonar e uma complacência pulmonar maior em relação ao pulmão de adultos
- A porcentagem de água corporal é menor em neonatos quando comparados a indivíduos mais velhos resultando em um menor volume de distribuição nos bebês

**37) Os desafios da anestesia obstétrica sempre se impuseram na prática clínica anesthesiológica e muitos aspectos tanto maternos quanto fetais, devem sempre ser levados em consideração para a tomada de decisões. Considerando a anestesia obstétrica, analise as afirmativas abaixo.**

- I. O bloqueio de neuroeixo para analgesia de parto isoladamente não influencia o aumento do risco de resolução por cesariana.
- II. A morfina intratecal é o componente mais eficaz para o controle analgésico materno no pós-operatório de cesariana.
- III. Hemorragia pós-parto é a principal causa obstétrica de morbimortalidade, parada cardíaca e mortalidade materna.
- IV. O uso imediato do ácido tranexâmico está indicado para pacientes com hemorragia puerperal independente da causa da mesma.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I apenas
- b) II e III apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) I e III apenas
- e) I, II, III e IV

**38) Considerando as medicações hipnóticas, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A ketamina é o único hipnótico com efeito simpatomimético aumentando o tônus simpático e a pressão arterial
- b) O etomidato é o hipnótico com maior estabilidade cardiovascular sendo uma ótima escolha para pacientes críticos
- c) Apesar do rápido início de ação e excelente hipnose, o propofol tem efeitos depressores cardiovasculares
- d) O tiopental tem um início de ação lento, com baixa penetração em tecido adiposo, não causando efeitos residuais de recirculação
- e) O diazepam não é uma opção adequada para a indução anestésica devido ao longo tempo para o início de ação

**39) O desenvolvimento dos anestésicos inalatórios foi um grande passo na evolução da anestesia sendo ainda, nos dias de hoje, uma classe de medicações bastante utilizada. Sobre os anestésicos inalatórios, assinale a alternativa correta.**

- a) A via de entrada sistêmica dos anestésicos inalatórios é transalveolar sendo esta independente da ventilação pulmonar
- b) A absorção sanguínea e a depuração dos anestésicos inalatórios são independentes da perfusão pulmonar
- c) A pressão de vapor é a mesma para cada anestésico inalatório e aumenta com o aumento da temperatura
- d) A solubilidade sanguínea dos anestésicos inalatórios é um parâmetro fixo não se alterando com alterações de temperatura
- e) N<sub>2</sub>O, desflurano e sevoflurano são caracterizados por apresentarem baixa solubilidade sanguínea

**40) Sobre os anestésicos locais, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Quanto menor o pKa do anestésico local, mais rápido seu início de ação.
- ( ) Anestésicos locais com maior ligação proteica apresentam efeito menos duradouro.
- ( ) O bloqueio intrapleural apresenta a maior taxa de absorção sistêmica de anestésico local quando comparado a outros bloqueios.
- ( ) Crianças abaixo de 6 meses de vida apresentam uma maior capacidade de ligação proteica.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - V - F
- b) V - V - V - F
- c) F - F - V - F
- d) F - V - F - V
- e) F - V - V - V

**41) Cirurgias e procedimentos ambulatoriais vêm tornando-se cada vez mais comuns. O avanço de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, cuidados direcionados para rápida recuperação pós-operatória e o custo-efetividade, favorecem a difusão desse tipo de tratamento. Considerando a anestesia para procedimentos ambulatoriais, analise as afirmativas abaixo.**

- I. O bloqueio de neuroeixo é uma boa opção considerando possíveis efeitos colaterais e tempo de recuperação pós-anestésica.
- II. Considerando o paciente idoso, a idade por si só, não contraindica a realização de cirurgia ambulatorial.
- III. Pacientes apresentando comorbidades descontroladas, podem ser submetidos a cirurgias em regime ambulatorial.
- IV. A cirurgia ambulatorial não deve expor o paciente a riscos maiores como hemorragia ou instabilidade hemodinâmica.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) II e IV apenas
- b) I, II e IV apenas
- c) I e IV apenas
- d) II, III e IV apenas
- e) II e III apenas

**42) Em pacientes saudáveis, a vasculatura pulmonar funciona como um sistema de baixa resistência e alto fluxo. Alterações nessa dinâmica podem ser deletérias especialmente com o aumento da pressão arterial pulmonar média acima de 20 mmHg, configurando quadro de hipertensão pulmonar. Em relação a anestesia em pacientes com hipertensão pulmonar, assinale a alternativa correta.**

- a) A resistência vascular pulmonar diminui na ocorrência de hipóxia, hipercapnia e acidose
- b) A otimização do tratamento da hipertensão pulmonar é facultativa no período pré-operatório
- c) Estratégias de ventilação protetiva como baixo volume corrente (6 ml/kg, pressão de platô < 30 cm H<sub>2</sub>O) são indicadas
- d) Hipotensão pode levar a uma queda reflexa da resistência vascular periférica e pulmonar, melhorando a hipertensão pulmonar
- e) A hipervolemia no paciente com hipertensão pulmonar não promove alterações na função do ventrículo direito

**43) A transposição de grandes artérias é uma das alterações cardíacas congênitas cianogênicas mais comumente diagnosticadas ao nascimento. Uma condição grave, com alto risco de morte dentro das primeiras 48h de vida do neonato caso não seja manejada de forma apropriada. Considerando o manejo anestésico de pacientes que apresentam transposição de grandes artérias, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Quando bebês com essa alteração cardíaca apresentam hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido, o uso inalatório de NO (óxido nítrico) é benéfico
- b) Pacientes graves, inaptos ao reparo cirúrgico imediato, beneficiam-se da oxigenação via membrana extracorpórea (ECMO) para estabilização e preparo pré-operatório
- c) Pacientes recebendo infusão de prostaglandina (PGE<sub>1</sub>) para manutenção do canal arterial (ductus arteriosus) devem ter a medicação suspensa no intraoperatório
- d) Não há um agente anestésico ideal para indução anestésica podendo-se utilizar todos os anestésicos de forma parcimoniosa utilizando-se doses adequadas
- e) Sevoflurano é o agente de indução inalatória de escolha devido a indução rápida e suave com pouca depressão miocárdica e ocorrência de disritmias

**44) Bloqueios de neuroeixo são opções seguras e as vias anestésicas de escolha para diversos procedimentos, considerando tanto questões clínicas quanto resultados intra e pós-anestésicos favoráveis. Ainda assim, complicações podem ocorrer. Em relação a anestesia epidural, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):**

- ( ) Toxicidade por anestésico local pode ocorrer primariamente por injeção intravascular accidental em veias epidurais.
- ( ) Punção intravascular epidural pode ocorrer em até 10% dos casos sendo as maiores taxas de ocorrência em pacientes gestantes.
- ( ) A probabilidade de punção intravascular epidural em gestantes aumenta quando é realizada com a paciente em decúbito lateral.
- ( ) A taxa de convulsões relacionadas a realização da anestesia epidural atinge a frequência de 1%.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V - F
- b) V - V - F - V
- c) F - V - F - V
- d) V - F - V - V
- e) F - V - V - F

**45) A anestesia para procedimentos oftalmológicos abrange uma ampla gama de possibilidades de técnicas anestésicas, sendo um campo que guarda suas peculiaridades. Considerando a anestesia para procedimentos oftalmológicos, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A anestesia tópica é a técnica mais comumente utilizada para realização da anestesia ocular
- b) Bloqueios regionais são indicados quando, além da analgesia, faz-se necessária a imobilidade do globo ocular
- c) No trauma ocular aberto, anestesia geral é a técnica preferida pois proporciona anestesia e imobilidade ocular
- d) Os efeitos gerados pela succinilcolina não interferem na pressão intraocular sendo uma opção segura para pacientes com trauma ocular aberto
- e) No paciente submetido a trabeculectomia, optando-se por bloqueio anestésico, o bloqueio subtenoniano anterior seria a escolha por causar menos estresse no nervo óptico

**46) A anafilaxia no peroperatório é uma condição grave e potencialmente fatal que se manifesta de forma abrupta com sintomas graves que demandam rápida detecção e tratamento. Considerando a anafilaxia no peroperatório, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os principais agentes desencadeantes de anafilaxia peroperatória são antibióticos e bloqueadores neuromusculares.
- II. Lesão cerebral por anóxia é a principal causa de morbidade relacionada a anafilaxia peroperatória.
- III. Comprometimento cardiovascular com vasoconstrição periférica e hipervolemia, podendo cursar com taquicardia, caracterizam uma anafilaxia grave.
- IV. Redução da infusão de volume intravascular, adrenalina endovenosa e manutenção da via aérea com oxigênio 100% são a base terapêutica da anafilaxia.

**Assinale a alternativa correta:**

- a) I e II apenas
- b) I, II e III apenas
- c) I, III e IV apenas
- d) II, III e IV apenas
- e) II e IV apenas

**47) Pacientes vítimas de lesão medular aguda podem necessitar abordagem cirúrgica para descompressão e estabilização da coluna vertebral. Considerando a anestesia para o paciente com lesão medular, assinale a alternativa correta.**

- a) Lesão em nível de T6 ou níveis superiores não acarretam quadro de disreflexia autonômica, com hipertensão, bradicardia, cefaleia e vermelhidão facial
- b) O choque espinal caracteriza-se pela acentuação de reflexos e funções sensitivas e motoras associada ao aumento do tônus autonômico com hipertensão e hipertermia
- c) Metas de hipervolemia (cristalóides e/ou hemoderivados) e início tardio de aminas vasoativas para tratamento do choque espinal estão indicados
- d) A intubação orotraqueal deve ser feita com indução em sequência rápida, preferindo-se o videolaringoscópio, mantendo imóvel a coluna cervical do paciente
- e) Anestesia inalatória é preferível a anestesia venosa total com propofol associado a um opioide em casos de neuromonitorização de potenciais evocados

**48) Pacientes submetidos a procedimentos anestésico-cirúrgicos em regime ambulatorial, dão entrada no centro de tratamento e têm alta no mesmo dia. Alguns critérios devem ser atendidos para que estes pacientes possam ter alta hospitalar com segurança. Em relação a anestesia em regime ambulatorial, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Status cognitivo e sinais vitais devem retornar aos valores basais e o paciente deve ser capaz de cuidar de si mesmo.
- ( ) Sintomas pós-operatórios como dor, náuseas ou tonturas não impedem a alta e podem ser tratados em domicílio pelo paciente.
- ( ) Não é necessária a presença de um acompanhante para o paciente nas primeiras horas após a alta.
- ( ) Estratégias analgésicas multimodais devem ser evitadas devido ao uso de múltiplas medicações em pacientes ambulatoriais.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - F
- b) V - F - F - V
- c) F - F - F - V
- d) V - V - F - V
- e) V - F - V - V

**49) Considerando a utilização dos anestésicos inalatórios halogenados na prática anesthesiológica, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O efeito colateral mais comum relacionado aos anestésicos inalatórios é a ocorrência de náuseas e vômitos pós-operatórios
- b) Hipertermia maligna pode ser deflagrada por anestésicos inalatórios halogenados, especialmente pelo halotano
- c) Alguns anestésicos inalatórios podem deflagrar quadros de hiperreatividade brônquica na indução devido ao seu cheiro pungente
- d) Isoflurano, sevoflurano e desflurano não interferem na resistência vascular sistêmica resultando em estabilidade cardiovascular e manutenção da pressão arterial
- e) O halotano produz queda no débito cardíaco à medida que se aumenta a dosagem oferecida ao paciente

**50) Paciente feminina, 31 anos, peso: 68,0 kg (quilogramas), altura: 1,60 m (metros), histórico de eczema atópico e resistência insulínica, ASA II, apresentou-se ao centro cirúrgico para realização de colecistectomia videolaparoscópica. Realizada indução endovenosa com midazolam 2 mg (miligramas), fentanil 250 mcg (microgramas), lidocaína 70 mg, propofol 150 mg, atracúrio 35 mg. Realizada intubação orotraqueal na primeira tentativa e estabelecimento de ventilação volume-controlada, com volume corrente (VC) de 400 ml, frequência respiratória (FR) de 14 irpm (insuflações respiratórias por minuto), PEEP de 5 cmH<sub>2</sub>O (centímetros de água), volume minuto (VM) 5,6 L/min (litros por minuto), FiO<sub>2</sub> (fração inspirada de oxigênio) 0,5, e sevoflurano 2%. Antes de insuflar o pneumoperitônio, a paciente apresentou queda da saturação de oxigênio, um aumento da pressão média de vias aéreas de 10 cmH<sub>2</sub>O para 39 cmH<sub>2</sub>O, redução do VC de 400 ml para 60 ml e diminuição do VM de 5,6 L/min para 0,84 L/min. A curva de capnografia passou a apresentar um formato de barbatana de tubarão e sibilos difusos foram identificados através da ausculta pulmonar. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.**

- a) Propofol como hipnótico na indução anestésica deve ser evitado em pacientes que apresentam via aérea hiperreativa
- b) Atropina acentua a liberação de acetilcolina nas terminações autonômicas pulmonares favorecendo a broncodilatação
- c) Atracúrio é um bloqueador neuromuscular que pode deflagrar a liberação de histamina e a ocorrência de broncoespasmo
- d) Lidocaína utilizada por via sistêmica resulta em um aumento da reatividade das vias aéreas tanto superiores quanto inferiores
- e) Fentanil após metabolização hepática gera metabólitos ativos que, em contato com mastócitos, causam liberação histaminérgica