

## CONCURSO PÚBLICO

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**SAD/SES/FUNSAU**

EDITAL N.º 001/2024

### MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

**Duração:** 4h (quatro horas)

**Leia atentamente as instruções abaixo:**

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **80 (oitenta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	CONHECIMENTOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA	
1 a 15	16 a 25	26 a 40	41 a 80

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:  A  B  C  D  E

- 05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **5 (cinco)** alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. O candidato deverá assinalar somente uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **2 (duas)** horas do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso Público, que será lavrado pelo Coordenador do local.
- 07 **Não** será permitido ao candidato retirar-se do local de prova a qualquer tempo portando o caderno de questões, **em hipótese alguma**.
- 08 Será fornecida folha específica para rascunho, na qual o candidato poderá anotar manualmente as alternativas marcadas no respectivo cartão de respostas. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, seu cartão de respostas e o seu caderno de questões ao fiscal da sala, sob pena de eliminação do concurso.
- 09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração.
- 10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

NOME: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

LOCAL: Campo Grande - MS

Data: 21/04/2024 Horário: \_\_\_\_\_

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

### Como o ambiente afeta o bem-estar das pessoas

Essa interação entre o meio ambiente e a saúde pública aborda aspectos que influenciam o bem-estar e inclui fatores físicos, químicos e biológicos. Juntas, essas condições são chamadas de determinantes ambientais da saúde, explica a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde).

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que ambientes mais saudáveis poderiam evitar quase um quarto da carga global de doenças. Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) foram causadas por riscos ambientais modificáveis.

As doenças não transmissíveis, incluindo doença cardíaca isquêmica, doenças respiratórias crônicas e câncer, são as condições mais comuns. Elas são seguidas por lesões, infecções respiratórias e derrames.

A Organização Pan-Americana destaca que aproximadamente 28 milhões de pessoas não têm acesso a uma fonte de água adequada e 15,6 milhões de pessoas defecam ao ar livre, o que resulta em quase 30 mil mortes evitáveis por ano.

Além disso, a exposição a produtos químicos tóxicos pode levar a distúrbios de saúde crônicos e, muitas vezes, irreversíveis, como problemas congênitos e de desenvolvimento neurológico e doenças associadas à desregulação endócrina.

Os fatores relacionados ao clima estão afetando cada vez mais a saúde e o bem-estar da população latino-americana.

Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar ao aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares, lesões e mortes prematuras.

"Ar limpo, clima estável, água adequada, saneamento e higiene, uso seguro de produtos químicos, proteção contra radiação, locais de trabalho seguros, práticas agrícolas sólidas, cidades e ambientes construídos que conduzam a uma natureza preservada são todos pré-requisitos para uma boa saúde", conclui o órgão internacional.

Fonte: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2023/09/saude-ambiental-o-que-e-e-qual-a-sua-importancia>. Acesso em: 04 mar. 2024. Adaptado.

1. A leitura atenta do texto permite a inferência de que:

- A) fatores físicos, biológicos e químicos produzem a maior parte das doenças transmissíveis
- B) é possível reduzir o número de mortes, caso haja condições ambientais sob maior controle
- C) determinantes ambientais de saúde são situações que afetam a natureza, especialmente lugares mais secos
- D) somente na América Latina as pessoas ainda morrem por falta de acesso a água potável e por falta de higiene
- E) os dados da Organização Mundial da Saúde divergem muito dos apresentados pela Organização Pan-Americana de Saúde

2. O objetivo do texto é:

- A) tecer relatos sobre situações adversas em diferentes lugares do mundo
- B) alertar os governantes quanto à necessidade de preservação das florestas
- C) apresentar um estudo científico voltado para os pesquisadores e para a comunidade científica em específico
- D) informar o leitor com relação à importância da preservação do meio ambiente, em prol da saúde da população
- E) indicar quais doenças transmissíveis e não transmissíveis podem ser disseminadas por conta da falta de saúde ambiental

3. O texto emprega uma linguagem essencialmente:

- A) denotativa, pois é marcado por grande número de metáforas
- B) denotativa, pois emprega palavras e expressões em seus usos mais objetivos e literais
- C) conotativa, pois é construído a partir de frases subjetivas
- D) conotativa, pois conta com referências a dados científicos atualizados
- E) ora denotativa ora conotativa, pois mescla figuras de linguagem amplamente utilizadas com linguagem rebuscada.

4. Em "Em 2016, **a agência** estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) foram causadas por riscos ambientais modificáveis" (2º parágrafo), com base no texto, o termo destacado faz referência à:

- A) saúde ambiental
- B) carga global de doenças
- C) população latino-americana
- D) Organização Mundial de Saúde (OMS)
- E) Organização Pan-Americana de Saúde (Opas)

5. Em "Juntas, essas condições são chamadas de determinantes ambientais da saúde, explica **a Opas**" (1º parágrafo), o termo destacado pode ser classificado sintaticamente como:

- A) sujeito
- B) aposto
- C) vocativo
- D) objeto direto
- E) adjunto adnominal

6. Na expressão "Organização Mundial de Saúde", há:

- A) um encontro vocálico
- B) dois encontros vocálicos
- C) três encontros vocálicos
- D) quatro encontros vocálicos
- E) cinco encontros vocálicos

7. Na expressão "doença cardíaca **isquêmica**", o segmento destacado é um exemplo de:

- A) hiato
- B) dígrafo
- C) ditongo
- D) tritongo
- E) encontro consonantal

8. A palavra CRIAÇÃO é formada pelo verbo CRIAR seguida do sufixo -ÇÃO. O mesmo processo de formação de palavras (verbo + sufixo -ção) é atestado em:

- A) direção
- B) posição
- C) condição
- D) população
- E) organização

9. A palavra BEM-ESTAR é formada pelo processo morfológico de composição. Esse mesmo processo é atestado na palavra:

- A) girassol
- B) hipertensão
- C) reavaliação
- D) pré-história
- E) pós-graduação

10. A única alternativa em que o elemento grifado é uma preposição é:

- A) “**Essa** interação entre o meio ambiente e a saúde pública aborda aspectos que influenciam o bem-estar e inclui fatores físicos, químicos e biológicos” (1º parágrafo)
- B) “Em 2016, a agência estimou **que** 13,7 milhões de mortes” (2º parágrafo)
- C) “Elas são seguidas **por** lesões, infecções respiratórias e derrames” (3º parágrafo)
- D) “A Organização Pan-Americana destaca que aproximadamente 28 milhões de pessoas **não** têm acesso a uma fonte de água adequada” (4º parágrafo)
- E) “Os fatores relacionados ao clima estão afetando cada vez **mais** a saúde e o bem-estar da população latino-americana” (6º parágrafo)

11. Em “Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que ambientes mais saudáveis **poderiam** evitar quase um quarto da carga global de doenças” (2º parágrafo), o verbo destacado está flexionado no:

- A) pretérito perfeito do indicativo
- B) pretérito imperfeito do indicativo
- C) pretérito imperfeito do subjuntivo
- D) futuro do presente do indicativo
- E) futuro do pretérito do indicativo

12. Em “Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) **foram** causadas por riscos ambientais modificáveis” (2º parágrafo), a forma verbal em destaque está flexionada na terceira pessoa do plural:

- A) do pretérito perfeito do verbo IR
- B) do pretérito perfeito do verbo SER
- C) do pretérito imperfeito do verbo SER
- D) do pretérito imperfeito do verbo IR
- E) do pretérito mais-que-perfeito do verbo SER

13. Em “Elas são seguidas **por lesões, infecções respiratórias e derrames**” (3º parágrafo), o termo destacado pode ser classificado sintaticamente como:

- A) aposto
- B) objeto indireto
- C) adjunto adverbial
- D) agente da passiva
- E) complemento nominal

14. “Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar ao **aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares, lesões e mortes prematuras**” (7º parágrafo). Se o segmento destacado fosse substituído pela palavra “enfermidades”, a reescrita desse trecho, à luz da norma-padrão, sem alteração de sentido, seria:

- A) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar a enfermidades.
- B) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar à enfermidades.
- C) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar as enfermidades.
- D) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar aos enfermidades.
- E) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar às as enfermidades.

15. O pronome de tratamento “Vossa Magnificência” é empregado em relação a:

- A) Deus
- B) príncipes e reis
- C) entidades religiosas
- D) reitores de universidades
- E) cardeais da Igreja Católica

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16. Um administrador de rede implementou um modelo de backup baseado no Backup Incremental. Nesse caso, o backup vai fazer a cópia de:

- A) uma imagem completa em um disco externo
- B) todo conteúdo da rede em um ambiente de nuvem
- C) dados somente modificados desde o último backup
- D) todos os dados de computadores, servidores ou estações de trabalho para outros dispositivos externos
- E) um ponto de restauração, que tem o conteúdo das alterações feitas desde o primeiro backup e todos os backups subsequentes

17. Um usuário de um computador com MS Windows está utilizando o buscador de páginas Google Chrome. Ele deseja encontrar páginas que têm a palavra “educação” no título da página. O modo adequado de executar essa função é por meio do uso da sintaxe:

- A) intitle:“educação”
- B) cache:“educação”
- C) filetype:“educação”
- D) educação inurl:guestpost
- E) site:educação "educação"

**18.** Em uma empresa de TI, pretende-se utilizar o Linux distribuído na forma de “distros”. Isso significa que será adquirida uma versão Linux que:

- A) vai demandar pagamento de licenças e de suporte para uso
- B) vem com um propósito específico, voltado para um grupo de usuários
- C) possui interface gráfica baseada no KDE, sem acesso aos aplicativos padrão
- D) vem com dispositivos montados, impossibilitando novos acréscimos de dispositivos
- E) não possui nenhuma interface gráfica disponibilizada e que necessita de acesso via linha de comando

**19.** Um usuário adquiriu um computador com o sistema operacional MS Windows 10. Esse sistema possui mecanismos próprios de utilização de parte de sistema operacional. Um deles é o assistente virtual, que é controlado através de comandos de voz. Esse mecanismo é denominado:

- A) Xbox
- B) Edge
- C) Hello
- D) Cortana
- E) Bluetooth

**20.** Um usuário de um aplicativo gerou um arquivo com extensão png. Os aplicativos adequados para manipular, alterar ou reescrever esse tipo de arquivo são aqueles que tratam de:

- A) vídeos mp4
- B) imagem digital
- C) editoração de textos
- D) apresentação de slides
- E) formatos portáteis de texto

**21.** Uma empresa precisa renovar seu estoque de memórias RAM para usar nos seus computadores. No caso, os computadores vão utilizar memórias que podem transferir dados a uma taxa de 8,5 - 14,9 GB/s, usando uma frequência externa entre 400-1066 MHz. Esse tipo de memória é a:

- A) DIP
- B) DIMM
- C) DDR3
- D) SIMM
- E) XRAM

**22.** Um usuário de um computador, contendo acesso ao MS Office 365, deseja utilizá-lo para trabalhar com uma planilha. Ao manipular a planilha, ele deseja aplicar o sublinhado em um texto de uma célula, usando teclas de atalho. Nesse caso, as teclas de atalho são:

- A) CTRL + A
- B) CTRL + G
- C) CTRL + H
- D) CTRL + N
- E) CTRL + S

**23.** Um computador está contaminado com um tipo de spyware que sempre exibe anúncios pop-up indesejados. Esse tipo de spyware também é conhecido como:

- A) Adware
- B) Riskware
- C) Keylogger
- D) Infostealer
- E) Screenlogger

**24.** Um usuário de um ambiente de intranet precisa fazer uso de um mecanismo existente no protocolo TCP/IP para autorizar a criação de mensagens relativas a um IP, mensagens de erro e pacotes de teste. Nesse caso, esse mecanismo vai fazer uso do protocolo da família TCP/IP denominado:

- A) ARP
- B) POP
- C) IMAP
- D) ICMP
- E) MIME

**25.** Uma equipe de desenvolvimento de TI está trabalhando para criar um novo buscador para a web, que vai ser uma interface de interrogação textual, revisando bancos de dados das páginas por meio de mecanismos spiders, para coletar informações de conteúdo compatíveis com a pesquisa feita. Esse tipo de buscador usa uma tecnologia conhecida como:

- A) Diretório
- B) Categoria
- C) Sensorial
- D) Hierárquica
- E) Metabuscaador

## CONHECIMENTOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA

**26.** A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

- A) colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho
- B) ordenar a formação de recursos humanos e materiais na área de saúde coletiva
- C) praticar procedimentos e desenvolver substâncias de interesse para a coletividade
- D) planejar as ações de vigilância epidemiológica, bem como as de saúde da população
- E) promover a realização de serviços comunitários para a preservação do meio ambiente

**27.** A ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população é analisada pela perspectiva que estabelece determinantes sociais em saúde de forma especial. De acordo com essa ótica, a condição de saúde é influenciada por fatores:

- A) biológicos
- B) genéticos
- C) hormonais
- D) metafísicos
- E) psicológicos

**28.** O controle social do SUS é exercido por diferentes órgãos. A deliberação sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades para as ações e serviços públicos de saúde a serem feitas pelo ente federal gestor é realizada:

- A) pelos Conselhos Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Saúde
- B) pela presidência da república com o auxílio do Chefe da Casa Civil
- C) pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional
- D) pelo Conselho Federal de Saúde
- E) pelo Ministério da Saúde

**29.** Insere-se, entre os sistemas de Informação em Saúde, o auxílio na vigilância epidemiológica, na identificação e monitoramento dos casos de Covid-19 no território nacional. Essa ação é realizada pelo sistema denominado:

- A) SIM
- B) SIVAM
- C) SINAN
- D) SINASC
- E) E-SUS notifica

**30.** Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Em relação às demais políticas de saúde, a PNH atua de forma:

- A) vertical
- B) paralela
- C) soberana
- D) horizontal
- E) transversal

**31.** A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente apresenta entre suas ações o Programa Nacional de Imunização, a prevenção e controle de doenças imunopreveníveis, além do controle de zoonoses. Também compete ao órgão coordenar a gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio:

- A) do Programa de Tecnologias em Saúde
- B) da Política Nacional de Saúde do Trabalhador
- C) do Programa de monitoramento da distribuição de insumos
- D) da Promoção da eficiência, por meio da economia da saúde
- E) de políticas de desenvolvimento e inovação na área da saúde

**32.** As ações de vigilância epidemiológica em saúde têm a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Relacionadas aos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, as ações proporcionam o conhecimento, a prevenção e a:

- A) detecção
- B) sanitização
- C) intervenção
- D) erradicação
- E) medicamentação

**33.** A Conferência de Saúde é uma instância colegiada que se reúne a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e:

- A) formular estratégias no controle da execução da política de saúde
- B) celebrar acordos de cooperação entre os diversos entes que atuam no SUS
- C) propor diretrizes para a formulação da política de saúde em diferentes níveis
- D) deliberar sobre alocação de recursos para execução de programas de saúde
- E) estabelecer princípios de atuação dos diversos atores do SUS durante o quadriênio

**34.** O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde deve ser firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. Esse contrato conterá as disposições essenciais sobre:

- A) indicadores das necessidades e interesses do usuário do SUS
- B) deveres do usuário na saúde em todas as unidades de saúde do SUS
- C) critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente
- D) estratégias que incorporem a avaliação do usuário das ações e dos serviços do SUS
- E) modelos de intervenção da União sobre os demais entes públicos para aprimorar as ações na região correspondente

**35.** A história da criação do SUS está conectada ao Movimento da Reforma Sanitária. A Saúde Pública foi um dos eixos da luta e da resistência contra a ditadura militar. Os sanitaristas foram capazes de conciliar diferentes correntes e orientações políticas em torno de um objetivo único — o acesso gratuito e integral de todos os cidadãos aos serviços de saúde. Esse movimento teve como marco institucional:

- A) a criação da Fundação Oswaldo Cruz
- B) a criação do Serviço Especial de Saúde Pública
- C) a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde
- D) a inauguração do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), em 1976
- E) o desenvolvimento do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência

**36.** A Saúde Pública envolve o esforço organizado da sociedade para zelar pela saúde da população. Para cumprir com essa missão, a saúde pública:

- A) prescinde da atuação estatal
- B) constitui-se em uma área de conhecimento estritamente médico
- C) pressupõe o investimento em atendimento de vanguarda para setores específicos da sociedade
- D) busca promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde, relacionados aos seus determinantes e condicionantes
- E) tem por objetivo garantir o aumento da expectativa de vida da população por meio da realização de campanhas de vacinação

**37.** O SUS é formado por valores estruturantes que assumem a forma de princípios que, por sua vez, estão articulados às diretrizes para que sejam atingidos os objetivos do SUS. Nesse sentido, é um princípio do SUS a:

- A) universalidade
- B) resolutividade
- C) descentralização
- D) cobertura ilimitada
- E) participação popular

**38.** O servidor do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul tem direito à retribuição pecuniária pelo efetivo exercício de cargo público, conforme símbolos, padrões e referências fixadas em lei. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes e temporárias, estabelecidas em lei é chamado de:

- A) salário
- B) subsídio
- C) provento
- D) honorário
- E) remuneração

**39.** Além do vencimento, poderão ser pagas ao funcionário algumas vantagens determinadas em lei. Incorpora-se ao vencimento ou provento, na forma do regime jurídico dos servidores públicos civis do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul, a vantagem relacionada a:

- A) indenizações
- B) gratificações
- C) licenças prêmio
- D) auxílios pecuniários
- E) acréscimos remuneratórios

**40.** A Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. De acordo com o disposto sobre esse tipo de organização:

- A) a delimitação das Regiões de Saúde observará cronograma pactuado pela instância responsável por produzir o Mapa da Saúde
- B) a instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais
- C) as Regiões de Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Rede de Atenção à Saúde em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores
- D) poderão ser estabelecidas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios de uma mesma zona urbana, por ato conjunto dos respectivos Municípios em articulação com os Estados
- E) o atendimento prioritário deverá ser realizado de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano de cada região

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**41.** M.C.R, sexo feminino, 30 anos, comparece à consulta ginecológica com queixa de corrimento vaginal amarelo-esverdeado e mal cheiroso. Ao exame especular, foram observadas microulcerações na ectocérvice e, na microscopia a fresco, foram evidenciados protozoários flagelados moveis. O provável agente etiológico é:

- A) *Haemophilus ducreyi*
- B) *Gardnerella vaginalis*
- C) *Neisseria gonorrhoeae*
- D) *Trichomonas vaginalis*
- E) *Chlamydia trachomatis*

**42.** A infecção pelo HPV (Papilomavírus Humano) é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais frequentes no mundo. O risco estimado para a exposição a essa infecção é de 15% a 25% a cada nova parceria. A partir de 2014, o Ministério da saúde ampliou o Calendário Nacional de Vacinação com a introdução da vacina quadrivalente contra HPV. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, o atual esquema de vacinação contra o HPV, para indivíduos saudáveis, compreende:

- A) duas doses, para meninas e meninos de 9 a 14 anos
- B) duas doses, para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 12 a 13 anos
- C) três doses, para meninas e meninos de 9 a 14 anos
- E) três doses, para meninas e meninos de 9 a 26 anos
- D) três doses, para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 12 a 13 anos

**43.** Em âmbito nacional, destaca-se a Lei nº 12.845/2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral às vítimas de violência sexual, em todos os hospitais integrantes da rede do SUS. O esquema de associação de medicamentos para a profilaxia das IST não virais em vítimas de violência sexual é:

- A) penicilina benzatina, ceftriaxona, azitromicina, metronidazol
- B) doxiciclina, ceftriaxona, azitromicina, metronidazol
- C) ceftriaxona, azitromicina, metronidazol, fluconazol
- D) doxiciclina, ceftriaxona, metronidazol, fluconazol
- E) penicilina benzatina, azitromicina, metronidazol

**44.** A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) consiste no uso de medicamentos antirretrovirais após um possível contato com o HIV em situações como: violência sexual, relação sexual desprotegida e acidente ocupacional. A PEP é um procedimento considerado urgência médica que deve ser iniciado o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras 2 horas após a exposição e no máximo em 72 horas. Os medicamentos devem ser tomados por 28 dias. De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV, os medicamentos que compõem a PEP são:

- A) ritonavir, tenofovir e lamivudina
- B) tenofovir, lamivudina e efavirenz
- C) abacavir, nevirapina e zidovudina
- D) zidovudina, dolutegravir e ritonavir
- E) tenofovir, lamivudina e dolutegravir

**45.** São esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência. De acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) de 2023, o câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres no Brasil. A atual diretriz do Ministério da Saúde (Registro de Deliberação nº 160/2015), para rastreamento do câncer de mama, em mulheres de baixo risco, é a realização da mamografia:

- A) anualmente, para mulheres entre 40 e 65 anos
- B) anualmente, para mulheres entre 50 e 69 anos
- C) a cada dois anos, para mulheres entre 40 e 65 anos
- D) a cada dois anos, para mulheres entre 50 e 69 anos
- E) anualmente, para todas as mulheres após os 50 anos

**46.** De acordo com o atual estadiamento do câncer de ovário pela *International Federation of Gynecology and Obstetrics* (FIGO), um tumor ovariano unilateral e com extensão para a pelve, afetando a trompa ipsilateral, porém sem comprometimento de linfonodos e sem metástases a distância, é classificado como estágio:

- A) IC-1
- B) IC-2
- C) IC-3
- D) II-A
- E) II-B

**47.** A Organização Mundial de Saúde define critérios de elegibilidade dos métodos contraceptivos, em categorias de 1 a 4, de acordo com os riscos para a saúde com o uso do método, o que permite escolher com segurança aquele(s) mais adequado(s) para cada pessoa. O método contraceptivo classificado como Categoria 4 pela OMS (risco de saúde inaceitável) para mulheres portadoras de enxaqueca com aura é o:

- A) implante subdérmico
- B) injetável de progesterona
- C) dispositivo intrauterino de cobre
- D) dispositivo intrauterino de progesterona
- E) anticoncepcional oral combinado

**48.** A incontinência urinária pode ser definida como a perda involuntária de urina objetivamente demonstrável, causando problema social ou higiênico. É uma condição que acontece devido a modificações da anatomia e/ou da fisiologia do trato urinário inferior. Sobre o diagnóstico urodinâmico da incontinência urinária de esforço, nos casos de deficiência esfinteriana intrínseca e de hiper mobilidade da uretra e do colo vesical, o estudo urodinâmico mostra uma pressão de perda uretral, na cistometria, respectivamente:

- A) < 40 cmH<sub>2</sub>O e > 70 cmH<sub>2</sub>O
- B) < 50 cmH<sub>2</sub>O e > 80 cmH<sub>2</sub>O
- C) < 60 cmH<sub>2</sub>O e > 90 cmH<sub>2</sub>O
- D) < 70 cmH<sub>2</sub>O e < 100 cmH<sub>2</sub>O
- E) < 80 cmH<sub>2</sub>O e > 110 cmH<sub>2</sub>O

**49.** O planejamento reprodutivo consiste em um conjunto de ações preventivas e educativas que visam a auxiliar as pessoas a prever e controlar a geração e o nascimento de filhos. No Brasil, o planejamento familiar faz parte da assistência integral à saúde e é oferecido pelo SUS, sendo sua garantia assegurada pela Lei Federal nº 9.263/1996 que, recentemente, foi alterada pela Lei nº 14.443/2022. De acordo com essa última atualização, a idade mínima necessária para mulheres e homens, com capacidade civil plena, poderem realizar a esterilização cirúrgica voluntária pelo SUS, independentemente do número de filhos vivos, é atualmente de:

- A) 21 anos
- B) 22 anos
- C) 23 anos
- D) 24 anos
- E) 25 anos

Considerando a Resolução CFM nº 2.320/2022, que trata sobre as normas éticas para a utilização de técnicas de reprodução assistida, responda às questões de **50 a 52**.

**50.** O número máximo permitido de embriões a serem transferidos em uma mulher com até 37 anos, candidata a gestação, é de:

- A) 1 embrião
- B) 2 embriões
- C) 3 embriões
- D) 4 embriões
- E) 5 embriões

**51.** A idade limite para a doação de gametas, para mulheres e para homens, é respectivamente de:

- A) 35 e 43 anos
- B) 36 e 44 anos
- C) 37 e 45 anos
- D) 38 e 46 anos
- E) 39 e 47 anos

**52.** A idade máxima das mulheres candidatas à gestação por técnicas de reprodução assistida é de:

- A) 35 anos
- B) 40 anos
- C) 45 anos
- D) 50 anos
- E) 55 anos

**53.** O espermograma é um dos exames mais importantes na investigação do fator masculino nos casos de infertilidade conjugal. Os parâmetros utilizados pela Organização Mundial da Saúde para análise seminal são:

- A) morfologia, motilidade e ph
- B) volume, motilidade e fluidez
- C) atividade, dimensão e ph
- D) concentração, vitalidade, solidificação
- E) concentração, estrutura e viscosidade

**54.** Nos casos de incontinência urinária de esforço, o tratamento cirúrgico visa ao reposicionamento do colo vesical e da uretra proximal na sua posição anatômica e na sua sustentação durante o aumento da pressão abdominal. A técnica que consiste na fixação da fâscia paravaginal anterior ao ligamento de Cooper denomina-se:

- A) Sling
- B) Burch
- C) Stamey
- D) Kelly-Kennedy
- E) Marshall-Marchetti-Krantz

**55.** As alterações hormonais que correspondem à fisiopatologia da síndrome dos ovários policísticos são:

- A) produção aumentada de FSH e LH
- B) produção aumentada de testosterona e reduzida de estrogênio
- C) produção aumentada de 17-OH-pregnenolona e androstenediona
- D) hiperinsulinemia e aumento da síntese hepática de SHBG
- E) aumento dos níveis séricos de estradiol e prolactina

**56.** Em 2023, foi publicado no *European Journal of Endocrinology* uma atualização nos critérios diagnósticos da síndrome dos ovários policísticos (SOP). O critério diagnóstico de SOP adicionado foi:

- A) a dosagem sérica de testosterona total
- B) a dosagem sérica do hormônio antimülleriano
- C) o volume ovariano aumentado identificado pelo exame físico
- D) a dosagem sérica de LH e FSH, com relação LH/FSH aumentada
- E) 10 ou mais folículos ovarianos medindo de 3 a 10 mm de diâmetro identificados à ultrassonografia transvaginal

**57.** Os avanços recentes das técnicas de imagem possibilitaram o diagnóstico não invasivo da adenomiose e o parâmetro de mensuração da zona juncional mioendometrial por Ressonância Magnética (RM) é, atualmente, a melhor referência para o diagnóstico dessa doença. É considerado diagnóstico de adenomiose uma medida da espessura da zona juncional, através da RM maior que:

- A) 8 mm
- B) 9 mm
- C) 10 mm
- D) 11 mm
- E) 12 mm

**58.** Pacientes do sexo feminino, no climatério e com quadro de sangramento uterino anormal, devem passar por avaliação médica, sendo submetidas à anamnese completa, exame físico e ginecológico, incluindo o exame especular para a visualização do colo uterino e da vagina. A ultrassonografia transvaginal com a medida da espessura da linha endometrial é o exame complementar inicial. É um achado suspeito para câncer de endométrio, em mulheres no climatério e sem uso de TRH, uma espessura endometrial, vista à ultrassonografia transvaginal, maior ou igual a:

- A) 4 mm
- B) 6 mm
- C) 8 mm
- D) 10 mm
- E) 12 mm

Levando em consideração as atuais Diretrizes Brasileiras do Ministério da saúde para rastreamento do câncer de colo de útero, responda as questões **59 e 60**:

**59.** Em mulheres imunossuprimidas devido à infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), o exame citopatológico deve ser realizado com intervalo:

- A) trimestral no primeiro ano e, se normais, manter seguimento semestral
- B) trimestral no primeiro ano e, se normais, manter seguimento anual
- C) semestral no primeiro ano e, se normais, manter seguimento anual
- D) semestral nos primeiros dois anos e, se normais, manter seguimento anual
- E) semestral nos primeiros três anos e, se normais, manter seguimento anual

**60.** Diante de um resultado de exame citopatológico evidenciando células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas (ASC-US), a conduta para uma mulher com 30 anos ou mais é:

- A) repetir o citopatológico imediatamente
- B) repetir o citopatológico em 3 meses
- C) repetir o citopatológico em 6 meses
- D) repetir o citopatológico em 12 meses
- E) encaminhar para a colposcopia

**61.** O tratamento de mulheres com diabetes *mellitus* gestacional (DMG) diminui os eventos adversos perinatais sérios; por isso, é de suma importância o diagnóstico e o acompanhamento adequados da diabetes *mellitus* gestacional.

O diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, realizado com o teste oral de tolerância à glicose após a vigésima quarta semana de gestação, é indicado por:

- A) glicemia de jejum entre 92-125mg/dL
- B) glicemia de jejum maior do que 126mg/dL
- C) glicemia de 1 hora maior ou igual 160mg/dL
- D) glicemia de 1 hora maior ou igual 170mg/dL
- E) glicemia de 2 horas 126- 199mg/dL

**62.** Em atendimento a um parto vaginal de uma gestante com diabetes mellitus gestacional, o recém-nascido apresentou paralisia da abdução e rotação externa do braço associada à ausência de flexão do cotovelo.

O diagnóstico apresentado pelo recém-nascido descrito acima é:

- A) distócia de ombro
- B) fratura de clavícula
- C) paralisia de Klumpke
- D) paralisia de Erb-Duchene
- E) paralisia total do membro superior com síndrome de Horner

**63.** O monitoramento eletrônico fetal contínuo é comumente realizado pela cardiocardiografia (CTG), que registra e monitora tanto a frequência cardíaca fetal quanto as contrações uterinas maternas.

Uma frequência cardíaca diminuída na CTG é definida no seguinte valor, em bpm:

- A) < 15
- B) <10
- C) <5
- D) <2
- E) 0 bpm

**64.** A bacteriúria assintomática durante a gravidez aumenta o risco de pielonefrite e tem sido associada a resultados adversos na gravidez, como parto prematuro e bebês com baixo peso ao nascer.

O tratamento antimicrobiano em gestante no primeiro trimestre que tem alergia a penicilina deve ser realizado com:

- A) ceftriaxona
- B) fosfomicina
- C) levofloxacino
- D) ciprofloxacino
- E) nitrofurantoína

**65.** A cesariana a pedido materno é aquela realizada em uma gestante sem indicações médicas e sem contra-indicação para tentativa de parto vaginal. É ético nessa situação:

- A) no setor privado, o médico poderá realizar a cesariana a pedido da gestante; já, no setor público, o médico poderá negar o procedimento sem referenciar a gestante a outro profissional, já que os desfechos materno-fetais são maiores na cesariana a pedido
- B) realizar a cesariana, a partir da 40ª semana gestacional, como direito da gestante, desde que ela tenha recebido todas as informações de forma pormenorizada sobre o parto vaginal e cesariana, seus respectivos benefícios e riscos
- C) registrar a decisão compartilhada entre o médico e a gestante em prontuário médico, respeitando o conceito de autonomia plena na bioética da gestante, com a necessidade de termo de consentimento livre e esclarecido
- D) para garantir a segurança do feto, a cesariana a pedido da gestante, nas situações de risco habitual, somente poderá ser realizada a partir da 38ª semana de gestação, devendo haver o registro no prontuário médico
- E) havendo discordância entre a decisão médica e a vontade da gestante, o médico não poderá alegar o seu direito de autonomia profissional e, nesses casos, terá que realizar a cesariana a pedido

**66.** A gravidez molar ocorre na proporção de 1 a cada mil a dois mil gestações e é subdividida em completa ou parcial com características histológicas e genéticas distintas. A mola hidatiforme completa é caracterizada por:

- A) feto presente, diploide e placenta hidrópica
- B) feto presente, triploide e áreas de degeneração molar
- C) feto ausente, diploide, placenta de espessura diminuída
- D) feto ausente, placenta de espessura aumentada e hidrópica
- E) feto ausente, triploide e placenta de dimensões aumentadas



**67.** O coriocarcinoma é um tumor epitelial altamente maligno. Pode surgir de qualquer tipo de tecido trofoblástico.

O coriocarcinoma pós-molar é frequentemente composto por:

- A) cromossomos biparentais idênticos ao feto
- B) DNA paterno ou androgenético
- C) aneuploides com DNA materno
- D) euploidia com DNA paterno
- E) euploidia com DNA materno

**68.** O diagnóstico precoce de gravidez permite dar início aos cuidados pré-natais de forma adequada.

Um sinal clínico de gravidez, caracterizado por observação de rechaço fetal quando ao toque vaginal, em que os dedos são mantidos no fundo de saco anteriores e se sente o feto ir e voltar, denomina-se Sinal de:

- A) Puzos
- B) Hegar
- C) Oslander
- D) Piskacek
- E) Nobile-Budin

**69.** O rastreamento universal de sífilis é recomendado na primeira consulta de pré-natal e o seguimento da gestante com sífilis, tratada adequadamente, deve ser realizado com teste treponêmico:

- A) mensal, sendo considerado uma resposta imunológica adequada a queda da titulação pelo menos de duas diluições em até dois meses após a conclusão do tratamento
- B) mensal, sendo considerado uma resposta imunológica adequada a queda da titulação pelo menos de duas diluições em até três meses após a conclusão do tratamento
- C) a cada dois meses, sendo considerado uma resposta imunológica adequada a queda da titulação pelo menos de duas diluições em até três meses após a conclusão do tratamento
- D) a cada dois meses, sendo considerado uma resposta imunológica adequada a queda da titulação pelo menos de três diluições em até três meses após a conclusão do tratamento
- E) trimestral, sendo considerado uma resposta imunológica adequada a queda da titulação pelo menos de uma diluição em até um mês após a conclusão do tratamento

**70.** A suplementação de ácido fólico durante a gestação demonstrou efeito protetor contra os defeitos do tubo neural (DTN). A dose de ácido fólico que deve ser utilizada para gestante de alto risco para ocorrência de DTN deve ser:

- A) 0,4mcg
- B) 0,8mcg
- C) 1mg
- D) 2mg
- E) 4mg

**71.** A medida da translucência nucal, no primeiro trimestre da gestação, promove um rastreio efetivo e precoce para a trissomia 21. Além da medida da translucência nucal, outros marcadores ecográficos de trissomia 21 são:

- A) hipoplasia de osso nasal e estenose mitral
- B) ducto venoso com onda A reversa e estenose aórtica
- C) regurgitação da válvula tricúspide e ducto venoso com onda A positiva
- D) ausência de osso nasal e aumento da impedância ao fluxo no ducto venoso
- E) triângulo retronasal com hipoplasia nasal e regurgitação da válvula pulmonar

**72.** O mecanismo de trabalho de parto é composto por fases que transcorrem e se interpoem dinamicamente. A deflexão é a fase do trabalho de parto em que acontece:

- A) a passagem do diâmetro biparietal do polo cefálico fetal, através do estreito superior da pelve materna
- B) o contato do osso occipital com o assoalho pélvico, onde se inicia o acotovelamento do canal de parto
- C) a chegada da cabeça fetal ao nível do períneo, e ocorre um desprendimento da cabeça que se processa por um movimento de báscula em direção ao arco púbico
- D) o movimento passivo da cabeça fetal em direção ao tórax, permitindo que o menor diâmetro da cabeça fetal se apresente primeiro em relação à pelve materna
- E) o desprendimento das espáduas, que pode exigir uma tração leve ao sentido posterior, e o desprendimento do ombro anterior logo após, no sentido anterior para o desprendimento do ombro posterior

**73.** O trabalho de parto é um evento fisiológico a partir do qual o feto é apresentado ao mundo exterior por ação mecânica uterina. São eventos que estabelecem o início do trabalho de parto:

- A) cinco contrações uterinas de 30 segundos por 10 minutos
- B) colo uterino com dilatação de 2 a 4 cm e esvaecimento de 20%
- C) tríplice gradiente de pressão e colo uterino com dilatação de 1 cm
- D) duas ou três contrações uterinas de 20 a 30 segundos por 10 minutos
- E) formação das bolsas das águas e modificação do colo uterino para o sentido posterior do canal vaginal

**74.** De acordo com a diretriz nacional de assistência ao parto normal do Ministério da Saúde (2022), na mulher gestante, saudável e de risco habitual, em admissão de parto espontâneo:

- A) a administração de um enema na admissão para o parto é obrigatória
- B) uma pelvimetria clínica de rotina na admissão da parturiente precisa ser realizada
- C) a depilação perineal/púbica de rotina antes do parto vaginal deve ser realizada
- D) a cardiocografia de rotina e a ultrassonografia obstétrica devem ser realizadas obrigatoriamente
- E) os planos de parto precisam serem individualizados de acordo com as necessidades e preferências da mulher


**75.** No alívio da dor da distensão perinatal, pode ser feito o bloqueio:

- A) do nervo pudendo
- B) do nervo isquiático
- C) do nervo cutâneo
- D) do plexo sacral
- E) paracervical

**76.** A profilaxia antibiótica para ruptura prematura das membranas no termo é recomendada em mulheres com período de latência superior a:

- A) 4 horas
- B) 6 horas
- C) 8 horas
- D) 10 horas
- E) 12 horas

77. Segundo o partograma abaixo, a seguinte alteração foi encontrada:



Fonte: SOGIMIG, Manual de ginecologia e obstetrícia da Associação de ginecologistas e obstetras de Minas Gerais. 5ª edição - Belo Horizonte: COOPMED 2012.

- A) parada secundária da dilatação
- B) parada secundária da descida
- C) período pélvico prolongado
- D) fase ativa prolongada
- E) parto precipitado

78. No atendimento, uma gestante de 35 anos, com idade gestacional de 30 semanas, com 3 gestações anteriores, todas cesarianas, tabagista, usuária de cocaína, chega à maternidade com sangramento vaginal, indolor sem contrações uterinas ou história de trauma. Não realizou exames anteriores de pré-natal.

A principal hipótese diagnóstica da causa desse sangramento é:

- A) ruptura uterina
- B) placenta prévia
- C) neoplasia uterina
- D) insuficiência cervical
- E) descolamento de placenta

79. No atendimento ao trabalho de parto de uma gestante autodeclarada preta, de baixa renda econômica, multipara, o médico assistente diz-lhe que "mulher negra é boa de parir, aguenta mais a dor" e retarda a sua analgesia de parto. Essa situação se refere:

- A) à equidade
- B) à integralidade
- C) à universalidade
- D) ao controle social
- E) ao racismo obstétrico

80. A Lei de nº 8.142, de 28/12/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Essa Lei define que a Conferência de saúde deverá ocorrer com a frequência de:

- A) 1 ano
- B) 2 anos
- C) 3 anos
- D) 4 anos
- E) 5 anos

RA SCUNHO