

POLÍCIA MILITAR

DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

QOS/2024 - DENTISTA - CIRURGIÃO DENTISTA
(Edital DRH/CRS nº 13/2023, de 07 de dezembro de 2023)

GABARITO PRELIMINAR

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D
21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D

26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D
41ª QUESTÃO	A	B	C	D
42ª QUESTÃO	A	B	C	D
43ª QUESTÃO	A	B	C	D
44ª QUESTÃO	A	B	C	D
45ª QUESTÃO	A	B	C	D
46ª QUESTÃO	A	B	C	D
47ª QUESTÃO	A	B	C	D
48ª QUESTÃO	A	B	C	D
49ª QUESTÃO	A	B	C	D
50ª QUESTÃO	A	B	C	D

Belo Horizonte, 15 de abril de 2024.

WILLDRÉ LUIZ SANTOS FORTUNATO, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



**DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2024.**

**QOS-PM/2024 – DENTISTA - CIRURGIÃO-DENTISTA
(Edital DRH/CRS nº 13/2023, de 07 de dezembro de 2023)**

Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Conhecimentos Específicos

NOME: _____
CPF: _____ **IDENTIDADE:** _____
NR PM: _____ **SALA:** _____
DATA: _____

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Prova sem consulta.
3. Esta prova contém 50 (cinquenta) questões, valendo 2,00 (dois) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma opção de resposta.
5. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares, bem como borracha ou corretivos.
6. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas, sendo que, as questões rasuradas, bem como as em branco ou com mais de uma marcação não serão computadas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 3 (três) horas, das 8h30min até as 11h30min: resolução da prova objetiva e preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira, borracha, corretivos, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
9. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, no intervalo de tempo abrangido dentro da 2ª (segunda) e 3ª (terceira) horas de realização da prova, devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de provas depois de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da aplicação. Os cadernos que não forem levados serão recolhidos e destruídos ou destinados à reciclagem pelo CRS.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
12. O gabarito da prova objetiva será publicado no site do CRS (<https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs>) e servirá de base/objeto para o recurso.

Assinatura do Candidato

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões propostas.

O poder criativo da imperfeição

Já escrevi sobre como nossas teorias científicas sobre o mundo são aproximações de uma realidade que podemos compreender apenas em parte. Nossos instrumentos de pesquisa, que tanto ampliam nossa visão de mundo, têm necessariamente limites de precisão. Não há dúvida de que Galileu, com seu telescópio, viu mais longe do que todos antes dele. Também não há dúvida de que hoje vemos muito mais longe do que Galileu poderia ter sonhado em 1610. E certamente, em cem anos, nossa visão cósmica terá sido ampliada de forma imprevisível.

No avanço do conhecimento científico, vemos um conceito que tem um papel essencial: simetria. Já desde os tempos de Platão, há a noção de que existe uma linguagem secreta da natureza, uma matemática por trás da ordem que observamos.

Platão – e, com ele, muitos matemáticos até hoje – acreditava que os conceitos matemáticos existiam em uma espécie de dimensão paralela, acessível apenas através da razão. Nesse caso, os teoremas da matemática (como o famoso teorema de Pitágoras) existem como verdades absolutas, que a mente humana, ao menos as mais aptas, pode ocasionalmente descobrir. Para os platônicos, a matemática é uma descoberta, e não uma invenção humana.

Ao menos no que diz respeito às forças que agem nas partículas fundamentais da matéria, a busca por uma teoria final da natureza é a encarnação moderna do sonho platônico de um código secreto da natureza. As teorias de unificação, como são chamadas, visam justamente a isso, formular todas as forças como manifestações de uma única, com sua simetria abrangendo as demais.

Culturalmente, é difícil não traçar uma linha entre as fés monoteístas e a busca por uma unidade da natureza nas ciências. Esse sonho, porém, é impossível de ser realizado. Primeiro, porque nossas teorias são sempre temporárias, passíveis de ajustes e revisões futuras. Não existe uma teoria que possamos dizer final, pois nossas explicações mudam de acordo como conhecimento acumulado que temos das coisas. Um século atrás, um elétron era algo muito diferente do que é hoje. Em cem anos, será algo muito diferente outra vez. Não podemos saber se as forças que conhecemos hoje são as únicas que existem.

Segundo, porque nossas teorias e as simetrias que detectamos nos padrões regulares da natureza são em geral aproximações. Não existe uma perfeição no mundo, apenas em nossas mentes. De fato, quando analisamos com calma as “unificações” da física, vemos que são aproximações que funcionam apenas dentro de certas condições.

O que encontramos são assimetrias, imperfeições que surgem desde as descrições das propriedades da matéria até as das moléculas que determinam a vida, as proteínas e os ácidos nucleicos (RNA e DNA). Por trás da riqueza que vemos nas formas materiais, encontramos a força criativa das imperfeições.

GLEISER, Marcelo. O poder criativo da imperfeição (adaptação). Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/columnas/marcelogleiser/2013/08/1331313-o-poder-criativo-da-imperfeicao.shtml> . Acesso em 12 jan 23.

1ª QUESTÃO – No texto *O poder criativo da imperfeição*, o autor propõe uma reflexão sobre os limites da ciência. Assinale a **ÚNICA ALTERNATIVA** que contém o ponto de vista que ele apresenta sobre o assunto:

- A. () Não se pode tomar as concepções científicas como absolutas, porque elas, apesar de indiscutivelmente precisas, podem apresentar falhas indetectáveis ao longo dos anos.
- B. () As concepções científicas sobre fenômenos da natureza são transitórias e vão sendo aprimoradas à medida que o ser humano evolui e adquire novos conhecimentos.
- C. () As teorias científicas são irrefutáveis, porquanto alicerçadas em métodos rigorosos de validação, que conduzem, inexoravelmente, à compreensão total do fenômeno estudado.
- D. () A linguagem secreta da natureza se consolida na perfeição simétrica absoluta, já comprovada por meio de vastos instrumentos que ampliam a visão de mundo dos cientistas.

2ª QUESTÃO – O texto “O poder criativo da imperfeição” pertence ao gênero artigo e foi publicado num jornal on-line. Sobre a estruturação do texto, é **INCORRETO** afirmar:

- A. () Encontra-se didaticamente estruturado, mas sem obedecer a uma evolução progressiva de ideias e argumentos.
- B. () É tipologicamente argumentativo-dissertativo e apresenta uma tese clara no primeiro parágrafo.
- C. () Foi empregada como uma das estratégias discursivas a exemplificação, que dinamiza e enriquece a construção argumentativa.
- D. () Ao mencionar ícones da ciência, o autor busca sofisticar e validar o texto por meio de argumentos de autoridade.

3ª QUESTÃO – Com relação ao sonho platônico de encontrar “um código secreto da natureza”, o autor do texto demonstra:

- A. () Esperança.
- B. () Ceticismo.
- C. () Indiferença.
- D. () Comprometimento.

4ª QUESTÃO – Sobre o enunciado: “*Nossos instrumentos de pesquisa, que tanto ampliam nossa visão de mundo, têm necessariamente limites de precisão*”, pode-se **AFIRMAR** que:

- A. () Não possui sujeito.
- B. () Caracteriza-se por ser um período simples.
- C. () Contém uma oração subordinada substantiva apositiva.
- D. () Contém uma oração subordinada adjetiva explicativa.

5ª QUESTÃO – Considerando os processos de formação de palavras, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () *Culturalmente* e *aproximações* são palavras formadas pelo mesmo tipo de derivação.
- B. () *Monoteístas* é uma palavra formada por hibridismo.
- C. () *Avanço* e *busca* são palavras formadas por derivação regressiva.
- D. () *Assimetrias* é uma palavra formada por derivação imprópria.

6ª QUESTÃO – Assinale a **ÚNICA** alternativa que **NÃO** contém **ERRO** gramatical:

- A. () Sempre haverão teorias novas e novos conceitos, porque a ciência evolui com os anos.
- B. () A despeito da existência de avançados instrumentos de pesquisa, nossas teorias são temporárias.
- C. () Esse sonho platônico, não é impossível de ser realizado, uma vez que corrobora com as teorias modernas.
- D. () A um século, um elétron era algo muito diferente do que é hoje.

7ª QUESTÃO – Observe a frase abaixo, retirada do texto “O poder criativo da imperfeição”:

“O que encontramos são assimetrias, imperfeições que surgem desde as descrições das propriedades da matéria até as das moléculas que determinam a vida[...]”

Com relação ao trecho sublinhado, assinale a **ÚNICA** alternativa **CORRETA**:

- A. () A expressão “descrições das propriedades” está em elipse.
- B. () A palavra que está subentendida é “assimetrias”.
- C. () Refere-se diretamente à palavra “vida”.
- D. () Tem seu sentido ampliado pela palavra “matéria”.

8ª QUESTÃO – Observe o excerto abaixo, do poema *No meio do caminho*, de Carlos Drummond de Andrade, e responda:

*“No meio do caminho tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho”.*

Qual é a **figura de linguagem** presente no trecho do poema acima?

- A. () Hipérbole.
- B. () Anacoluto.
- C. () Conversão.
- D. () Eufemismo.

9ª QUESTÃO – A flexão de número do substantivo está **CORRETA** em:

- A. () Pé-de-meia – pés-de-meias.
- B. () Esfíncter – esfíncters.
- C. () Hífen – hífens.
- D. () Verão – verãos.

10ª QUESTÃO – Assinale a **ÚNICA** alternativa em que a conjugação verbal está **CORRETA**:

- A. () Solicitei ao fiscal que reavesse o dinheiro que eu perdi.
- B. () Eu provejo uma família de onze pessoas.
- C. () Quando finalmente eu ver o resultado da prova, ficarei aliviado.
- D. () O juiz recomendou aos policiais que intervissem na discussão.

DIREITOS HUMANOS

11ª QUESTÃO – Considerando o que dispõe a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), analise as assertivas abaixo:

- I. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras responsabilidades legais em que se houver incorrido.
- II. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza.
- III. É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei e que sejam necessárias, numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas.
- IV. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência.
- V. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas.

Estão **CORRETAS** as assertivas:

- A. () Todas estão corretas.
- B. () II, III e IV, apenas.
- C. () I, II e V, apenas.
- D. () II, III e V, apenas.

12ª QUESTÃO – **A Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969) reservou um de seus capítulos para tratar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a qual detém competência para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes na Convenção. Acerca da organização da aludida Comissão, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembleia Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados membros.
- B. () A composição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é de 7 (sete) membros que deverão ser pessoas de reconhecido saber em matéria de direitos humanos e alta autoridade moral.
- C. () A Comissão representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos e não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo Estado.
- D. () Os membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos serão eleitos por um período de quatro anos, não sendo admitida reeleição.

13ª QUESTÃO – No tocante ao disposto na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos**, assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22 de novembro de 1969, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Em nenhuma circunstância os processados devem ficar juntos dos condenados. Os processados devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas.
- B. () Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.
- C. () Toda pessoa tem direito ao reconhecimento da sua personalidade jurídica.
- D. () A finalidade essencial das penas privativas da liberdade deve ser: a reforma e a readaptação social dos condenados.

14ª QUESTÃO – De acordo com a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), mormente ao tratamento dado à proibição da escravidão e da servidão, marque a alternativa **CORRETA**, cuja descrição possa constituir trabalho forçado ou obrigatório:

- A. () O serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameace a existência ou o bem da comunidade.
- B. () O serviço militar e, nos países onde se admite a isenção por motivos de consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele, não constitui trabalho forçado ou obrigatório.
- C. () Trabalho ou serviço normalmente exigido de pessoa reclusa em cumprimento de resolução formal expedida pelo diretor da Unidade Prisional.
- D. () O trabalho ou o serviço que faça parte das obrigações cívicas normais.

15ª QUESTÃO – No que tange à organização, competências e funções da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tratada na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () A Corte compor-se-á de sete juízes, todos nacionais dos Estados-Membros da Organização. Na sua composição, não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade.
- B. () A Corte submeterá à consideração da Assembleia Geral da Organização, em cada período ordinário de sessões, um relatório sobre suas atividades no ano anterior, indicando os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento às suas sentenças.
- C. () A Corte terá sua sede no lugar que for determinado, na Assembleia Geral da Organização, pelos Estados-Partes na Convenção, os quais podem, por dois terços dos seus votos, na Assembleia-Geral, mudar a sede da Corte.
- D. () Somente os Estados-Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte, a qual deliberará sempre com a totalidade dos seus membros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16ª QUESTÃO – As lesões cervicais não cáries são caracterizadas pelo desgaste da estrutura dentária na região cervical do dente. Considerando estas lesões, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () A erosão dental é a perda patológica, crônica, localizada e indolor de estrutura dentária pela dissolução por ácidos de origem bacteriana, alimentos, medicamentos, além de ácidos provenientes do próprio organismo.
- B. () A lesão de abfração tem como características apresentar-se em forma de cunha, com margens bem-definidas, podendo ser encontrada em apenas um dente, e estar localizada subgingivalmente.
- C. () A abrasão ocorre devido a microfraturas do esmalte desencadeadas por tensões de tração ou compressão provenientes de forças oclusais mal dirigidas ou exageradas.
- D. () As lesões cervicais não cáries não são fatores predisponentes para o surgimento de hipersensibilidade dentinária.

17ª QUESTÃO – Considerando as posições e movimentos mandibulares, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () A relação cêntrica (RC) pode ser definida como a posição mais superior e anterior que os côndilos podem assumir na cavidade glenóide, apoiados no disco articular e estabilizados pelos músculos e ligamentos, estando todos os dentes em contato oclusal.
- B. () A relação cêntrica (RC), conceitualmente, diz respeito à posição dos côndilos na cavidade glenóide e não está vinculada à presença ou não de dentes.
- C. () A máxima intercuspidação habitual (MIH), por ser uma posição dentária, não sofre alteração em função da modificação dos contatos oclusais pela erupção, migração ou procedimentos restauradores.
- D. () A relação de oclusão cêntrica (ROC) é uma posição mandibular decorrente da relação entre os dentes dos dois arcos e onde ocorre o maior número de contatos dentários.

18ª QUESTÃO – Considerando as recomendações atuais da American Heart Association (2007) para a prevenção da ocorrência de Endocardite Infecciosa (EI), está recomendada a profilaxia antibiótica para a realização de procedimentos odontológicos nas seguintes condições cardíacas, associadas ao risco mais elevado de resultado adverso da EI, **EXCETO**:

- A. () Portadores de válvula cardíaca protética.
- B. () Portadores de quaisquer Doenças Cardíacas Congênitas (DCC).
- C. () Histórico de Endocardite Infecciosa prévia.
- D. () Receptores de transplantes cardíacos que desenvolvem valvulopatia cardíaca.

19ª QUESTÃO – As restaurações de dentes posteriores com resina composta representam uma realidade dentro da clínica odontológica atual, em virtude das constantes melhorias no comportamento mecânico e químico destes materiais. Considerando as assertivas abaixo, marque “**V**” para a(s) **VERDADEIRA(S)** e “**F**” para a(s) **FALSA(S)** e, em seguida, marque a alternativa que contém a sequência de respostas **CORRETA**, na ordem de cima para baixo.

- () Dentre as vantagens da utilização das resinas compostas diretas em dentes posteriores, cita-se a característica conservadora do preparo cavitário, limitada ao acesso e à remoção da lesão cáriosa, além do reforço da estrutura dental remanescente.
- () A contração de polimerização é uma das principais limitações das resinas compostas, e deve ser controlada durante a realização da restauração para evitar a ocorrência de fendas marginais, sensibilidade pós-operatória, flexão das cúspides ou trincas no esmalte sem suporte dentinário.
- () Atualmente, a sensibilidade da técnica restauradora não se constitui em fator limitante ao uso das resinas compostas diretas em dentes posteriores, devido à padronização dos protocolos clínicos de uso dos materiais adesivos e restauradores.
- () As resinas compostas diretas em dentes posteriores são bem indicadas para restaurações de lesões cárias oclusais amplas com envolvimento de, no máximo, duas cúspides.

- A. () V, V, F, F.
- B. () V, F, F, V.
- C. () F, V, F, V.
- D. () V, F, V, F.

20ª QUESTÃO – “Acúmulo de pus localizado na parede gengival do sulco/bolsa periodontal, resultando em destruição tecidual significativa. Apresenta elevação ovoide da gengiva na parede lateral da raiz e sangramento à sondagem. Podem ainda ser observados: dor, supuração à sondagem, bolsa periodontal profunda e aumento da mobilidade dental.” Assinale a alternativa **CORRETA**, à qual se refere a descrição acima:

- A. () Cisto periapical residual.
- B. () Granuloma piogênico.
- C. () Abscesso periodontal.
- D. () Cisto periodontal lateral.

21ª QUESTÃO – As patologias pulpares e periapicais constituem uma realidade no cotidiano do atendimento odontológico, sendo fundamental seu conhecimento para a elaboração de um plano de tratamento adequado para cada situação. Considerando estas alterações, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Pacientes com pulpíte irreversível precoce apresentam sintomas que variam de nenhuma dor até uma dor leve mediante estímulo térmico, que se resolve logo após a remoção do estímulo.
- B. () A disseminação da infecção pulpar para o osso pode levar a complicações graves, como a trombose do seio cavernoso, a angina de Ludwig ou a sepse sistêmica com complicações potencialmente fatais.
- C. () A pulpíte reversível indica um nível de inflamação pulpar em que o tecido é capaz de voltar normalmente para um estado de saúde se os estímulos nocivos forem removidos.
- D. () Na pulpíte hiperplásica crônica, a irritação mecânica e a invasão bacteriana resultam em um nível de inflamação crônica que produz tecido de granulação hiperplásico, o qual se projeta na área de exposição pulpar.

22ª QUESTÃO – O uso de soluções anestésicas locais, na Odontologia, tem como finalidade bloquear a passagem dos impulsos nervosos que provocam a dor. Considerando as assertivas abaixo, marque “**V**” para a(s) **VERDADEIRA(S)** e “**F**” para a(s) **FALSA(S)** e, em seguida, marque a alternativa que contém a sequência de respostas **CORRETA**, na ordem de cima para baixo.

- () Os anestésicos locais são fármacos que suprimem a condução do estímulo nervoso de forma irreversível, promovendo a sensibilidade de uma determinada região.
- () Todos os anestésicos locais atravessam facilmente a barreira hematocefálica, de forma que a toxicidade sistêmica dos anestésicos locais, após sua absorção para a corrente sanguínea, ocorre primariamente pela depressão do Sistema Nervoso Central, mais sensível à ação desses fármacos.
- () A associação de vasoconstritores aos sais anestésicos produz uma interação farmacológica desejável, pois essa ação vasoconstritora faz com que o sal anestésico fique por mais tempo em contato com as fibras nervosas, prolongando a duração da anestesia e reduzindo o risco de toxicidade sistêmica.
- () Reações alérgicas graves associadas à anestesia local em odontologia são raramente observadas, principalmente após a introdução dos anestésicos do grupo éster e a diminuição do uso dos anestésicos do grupo amida.

- A. () V, V, F, F.
- B. () F, F, V, V.
- C. () F, V, F, V.
- D. () F, V, V, F.

23ª QUESTÃO – Em relação às soluções anestésicas locais de uso odontológico, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () A epinefrina é o vasoconstritor mais utilizado em todo o mundo, devendo ser o agente de escolha para a quase totalidade dos procedimentos odontológicos em pacientes saudáveis, incluindo crianças, gestantes e idosos.
- B. () O volume máximo de uma solução anestésica local, a ser utilizado de forma segura, deve ser calculado em função dos seguintes parâmetros: concentração do anestésico na solução, doses máximas recomendadas e peso corporal do paciente.
- C. () A articaína possui meia-vida plasmática mais curta do que a dos demais anestésicos, propiciando sua eliminação mais rápida pelos rins, sendo bem indicada para uso rotineiro em idosos e pacientes portadores de disfunção hepática.
- D. () A prilocaína, apesar de ser mais tóxica do que a lidocaína e a mepivacaína, produz o aumento dos níveis de metemoglobina no sangue, sendo seu uso recomendado para pacientes com deficiência de oxigenação, como portadores de anemias, alterações respiratórias ou cardiovasculares.

24ª QUESTÃO – Os anti-inflamatórios são utilizados, na Odontologia, para prevenir a hiperalgesia e controlar o edema inflamatório, decorrentes de intervenções odontológicas. Considerando as assertivas abaixo, marque a alternativa **CORRETA**:

- I. Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são fármacos que atuam inibindo a síntese da fosfolipase A2.
 - II. Os corticosteroides não interferem nos mecanismos de hemostasia, ao contrário de alguns AINEs que, pela ação antiagregante plaquetária, aumentam o risco de hemorragia pós-operatória.
 - III. Quando comparados aos AINEs e se empregados em dose única pré-operatória ou por tempo restrito, os corticosteroides são mais seguros para serem utilizados em gestantes ou lactantes, bem como em pacientes hipertensos, diabéticos, nefropatas ou hepatopatas, com a doença controlada.
 - IV. Todos os AINEs podem causar retenção de sódio e água, diminuição da taxa de filtração glomerular e aumento da pressão arterial sanguínea, particularmente em idosos.
- A. () Apenas duas assertivas são corretas.
 - B. () Todas as assertivas são corretas.
 - C. () Apenas uma assertiva é incorreta.
 - D. () Todas as assertivas são incorretas.

25ª QUESTÃO – Considerando os sistemas de adesão de uso na clínica odontológica, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Nos sistemas adesivos monocomponentes, todos os componentes (ácido, primer e adesivo) são aplicados simultaneamente sobre os tecidos dentais, realizando todas as etapas da hibridização em um único passo clínico.
- B. () O condicionamento ácido do esmalte tem como funções o aumento do “molhamento” e da “energia livre de superfície”, e a criação de microretenções, com o consequente aumento da área de contato.
- C. () A aplicação do ácido na dentina promove a remoção da “lama dentinária” e a desmineralização superficial da dentina, com a exposição de um emaranhado de fibras colágenas.
- D. () Com o uso dos sistemas adesivos autocondicionantes, a camada de “lama dentinária” não é removida, mas sim modificada e incorporada à camada híbrida.

26ª QUESTÃO – Considerando as lesões ou alterações dos tecidos orais, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, marque a alternativa **CORRETA**, na ordem de cima para baixo.

1. Linha alba () É uma alteração pálida branco-acinzentada e vermelha no lábio inferior, potencialmente maligna, que geralmente ocorre em homens adultos com histórico de exposição crônica à luz ultravioleta.
2. Queilite actínica () É uma condição comum da mucosa oral de etiologia desconhecida que representa mais uma variação da normalidade do que uma doença; caracteriza-se pela aparência difusa, opalescente e branco-acinzentada cremosa da mucosa; a superfície apresenta-se frequentemente pregueada, resultando em estrias esbranquiçadas ou rugosidades; as lesões não são destacáveis e, geralmente, acometem a mucosa jugal bilateralmente.
3. Leucoedema () É uma alteração comum da mucosa jugal, geralmente bilateral, e associada à pressão, irritação por fricção ou trauma de sucção das superfícies vestibulares dos dentes.
4. Líquen plano reticular () É uma alteração em geral assintomática, envolvendo a região posterior da mucosa jugal bilateralmente, podendo acometer outras áreas da mucosa bucal; apresenta padrão característico de linhas brancas entrelaçadas, conhecido como estrias de Wickham.

- A. () 3, 4, 2, 1.
- B. () 2, 4, 1, 3.
- C. () 3, 1, 2, 4.
- D. () 2, 3, 1, 4.

27ª QUESTÃO – “Também conhecido como cisto folicular, é um cisto odontogênico caracterizado pelo acúmulo de líquido entre a coroa de um dente não erupcionado e o epitélio reduzido do órgão do esmalte que a circunda. Radiograficamente, caracteriza-se por uma área radiolúcida, unilocular, que envolve a coroa de um dente não erupcionado.” Assinale a alternativa **CORRETA**, à qual se refere a descrição acima:

- A. () Cisto dentígero.
- B. () Odontoma.
- C. () Cisto de erupção.
- D. () Cisto epidermóide.

28ª QUESTÃO – O exercício da Odontologia no território nacional é regido pelo disposto na **Lei 5.081, de 24 de agosto de 1966**. Considerando as assertivas abaixo, referentes às competências do profissional de Odontologia, contidas **no art. 6 da referida lei**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- I - Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia.
- II - Empregar a analgesia e a hipnose, desde que comprovadamente habilitado, quando constituírem meios eficazes para o tratamento.
- III - Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente.
- IV - Utilizar, no exercício da função de perito-odontólogo, em casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça.

- A. () Apenas uma assertiva é correta
- B. () Todas as assertivas são corretas.
- C. () Apenas duas assertivas são corretas.
- D. () Apenas uma assertiva é incorreta.

29ª QUESTÃO – A reação adversa mais associada aos anestésicos locais é a reação tóxica que, em geral, resulta da injeção endovenosa inadvertida de solução anestésica ou de quantidades excessivas. Outros sinais e sintomas associados a reações adversas a um anestésico local podem ser, **EXCETO**:

- A. () Ansiedade.
- B. () Depressão do sistema nervoso central.
- C. () Efeitos vasodilatadores.
- D. () Reação alérgica.

30ª QUESTÃO – A categorização das doenças que afetam a gengiva necessita da avaliação do paciente, sinais e sintomas, história dentária e clínica, e exame clínico, que inclui extensão, distribuição, duração e descrição física das lesões. Analise as assertivas abaixo:

- I. Os achados clínicos de gengivite induzida pela placa em um periodonto reduzido são semelhantes aos achados na gengivite induzida por placa, exceto por perda óssea e de inserção preexistente.
- II. Nas crianças, a gengivite é muito mais intensa quando comparada à encontrada em adultos jovens com quantidades semelhantes de placa, e essa diferença relacionada à idade na progressão e na gravidade da gengivite pode estar associada com a qualidade da placa dental e a resposta do sistema imune.
- III. Considerando as alterações clínicas comuns da gengiva saudável para a gengivite, na gengivite, o tecido gengival edemaciado provoca perda de adaptação em forma de ponta de faca e tecido papilar bulboso, resultando em minimização dos contornos teciduais.

Estão **CORRETAS** as assertivas:

- A. () I, II e III.
- B. () I e II, apenas.
- C. () II e III, apenas.
- D. () I e III, apenas.

31ª QUESTÃO – Doença peri-implante é um termo geral usado para descrever os processos inflamatórios nos tecidos que circundam o(s) implante(s). Considerando as assertivas abaixo, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () O diagnóstico da peri-implantite requer a detecção de sangramento à sondagem e perda óssea nas radiografias.
- B. () As características clínicas da mucosite peri-implante são, em muitos aspectos, semelhantes às da gengivite adjacente aos dentes e incluem os sinais e sintomas clássicos da inflamação, como edema e rubor.
- C. () A mobilidade do implante não é um sinal essencial de peri-implantite, mas ocorre no estágio final da progressão da doença e indica completa perda da integração.
- D. () A mucosite peri-implante é definida como uma lesão inflamatória na mucosa, que pode afetar também o osso de suporte.

32ª QUESTÃO – Trauma de oclusão é o termo usado para descrever as alterações patológicas ou adaptativas que ocorrem no periodonto em consequência de forças indevidas produzidas pelos músculos da mastigação. Considerando as assertivas abaixo, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () No trauma de oclusão, as forças traumáticas podem atuar sobre um único dente ou sobre grupos de dentes que estejam em contato prematuro, podendo ocorrer em associação com hábitos parafuncionais.
- B. () Nos dentes envolvidos na doença periodontal progressiva associada à placa bacteriana, o trauma de oclusão, em determinadas condições, acelera a progressão da doença, atuando como um cofator no processo destrutivo.
- C. () Evidências científicas confirmam que forças unilaterais e forças alternadas, aplicadas em um periodonto sadio, resultam em formação de bolsa e na perda da inserção do tecido conjuntivo.
- D. () O trauma de oclusão pode resultar em reabsorção do osso alveolar, levando a aumento da mobilidade dentária, que pode ser de caráter transitório ou permanente.

33ª QUESTÃO – O preparo cavitário, do ponto de vista terapêutico, é o tratamento biomecânico da cárie e de outras lesões dos tecidos duros do dente, de forma que as estruturas remanescentes possam receber uma restauração que as proteja, seja resistente e previna a reincidência de cárie. Considerando os princípios gerais dos preparos cavitários, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () As estruturas de reforço dos dentes, como as cristas marginais, pontes de esmalte, arestas e vertentes de cúspide, devem ser preservadas durante o preparo da cavidade, a menos que tenham sido envolvidas pela cárie.
- B. () A “forma de conveniência” representa a característica dada à cavidade para que as estruturas remanescentes e a restauração sejam capazes de resistir às forças mastigatórias.
- C. () Em uma região de cicatrículas e fissuras, duas cavidades distintas, separadas por uma estrutura sadia de menos de 1 mm, devem ser unidas em um único preparo, a fim de eliminar essa estrutura dentária enfraquecida.
- D. () A “forma de retenção” é a forma dada à cavidade para torná-la capaz de reter a restauração, evitando seu deslocamento.

34ª QUESTÃO – Um dos aspectos mais importantes na compreensão da relação periodontal-restauradora é a localização da margem da restauração em relação ao tecido gengival adjacente, sendo fundamental a manutenção do espaço biológico para a preservação de tecidos gengivais saudáveis. Considerando as assertivas abaixo, assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. O posicionamento da margem da restauração em nível supragengival não é desejável devido à maior retenção de placa bacteriana, resultando em maior inflamação gengival.
 - II. Quando a margem da restauração é posicionada em nível equigengival, ela incide sobre o aparelho de inserção gengival e cria uma violação do espaço biológico.
 - III. As violações do espaço biológico podem ser corrigidas pela remoção cirúrgica do osso, afastando-o da margem da restauração, ou pela extrusão ortodôntica do dente.
 - IV. Uma margem de restauração que se estende para dentro da zona de inserção, com consequente violação do espaço biológico, pode resultar em perda óssea e retração do tecido gengival, ou em inflamação gengival persistente.
- A. () Apenas uma assertiva é correta.
 - B. () Todas as assertivas são incorretas.
 - C. () Apenas duas assertivas são corretas.
 - D. () Apenas uma assertiva é incorreta.

35ª QUESTÃO – O profissional da odontologia encontra-se exposto a diversos riscos na sua prática clínica diária, sendo que, para minimizar, prevenir ou reduzir estes riscos, é necessária a adoção de medidas de precauções básicas. Diante do exposto, marque nas assertivas abaixo, “**V**” para a(s) **VERDADEIRA(S)** e “**F**” para a(s) **FALSA(S)**. Em seguida, marque a alternativa que contém a sequência de respostas **CORRETA**, na ordem de cima para baixo.

- () Entende-se por medidas de precauções-padrão as medidas de prevenção que devem ser utilizadas diante dos casos de diagnóstico confirmado ou presumido de doença infecciosa transmissível no paciente odontológico.
- () Os riscos mais frequentes a que estão sujeitos os profissionais que atuam em assistência odontológica são os físicos, os químicos, os ergonômicos, os mecânicos e os biológicos.
- () Os resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipiente de vidro transparente contendo água suficiente para cobri-los, e serem encaminhados para coleta especial de resíduos contaminados.
- () O uso de isolamento absoluto, sempre que o procedimento permitir, reduz o risco de acidentes biológicos transmitidos por via aérea.
- () Em casos de acidentes biológicos, as quimioprofilaxias contra o HBV e o HIV serão iniciadas apenas no caso de o paciente-fonte ser confirmado laboratorialmente reagente para o HIV ou HBV.

- A. () F, V, F, V, F.
- B. () V, V, F, F, F.
- C. () V, F, V, V, V.
- D. () F, V, F, V, V.

36ª QUESTÃO – Sobre o processamento de artigos para limpeza, desinfecção e/ou esterilização em Estabelecimentos de saúde, marque nas assertivas abaixo, “**V**” para a(s) **VERDADEIRA(S)** e “**F**” para as **FALSA(S)**. Em seguida, marque a alternativa que contém a sequência de respostas **CORRETA**, na ordem de cima para baixo.

- () Para a limpeza de artigos/instrumentais que têm mais de uma parte, estas devem ser desmontadas; as pinças e tesouras devem ser abertas, de modo a expor ao máximo suas reentrâncias.
- () O álcool é um produto de desinfecção de alto nível com espectro bactericida, fungicida, virucida, microbactericida e esporicida.
- () A esterilização é o processo que visa destruir ou eliminar todas as formas de vida microbiana presentes, por meio de processos físicos ou químicos.
- () Para o monitoramento biológico do processo de esterilização os pacotes contendo os indicadores devem ser colocados em locais onde o agente esterilizante chega com maior dificuldade, como próximo à porta, junto ao dreno e no meio da câmara.
- () As fitas adesivas para autoclave são indicadores físicos para o monitoramento do processo de esterilização e apresentam listas brancas diagonais que se tornam pretas após a esterilização.

- A. () F, V, V, V, F.
- B. () V, F, V, V, F.
- C. () V, V, F, V, V.
- D. () F, F, V, F, V.

37ª QUESTÃO – O uso tópico e sistêmico de fluoretos (exemplo: água fluoretada) é reconhecido como o principal responsável pela redução da prevalência da cárie dentária no Brasil. Desta forma a utilização do íon flúor na forma de géis, vernizes e soluções para bochechos é amplamente utilizada na odontologia. Sobre o uso de fluoretos é **INCORRETO** afirmar:

- A. () A concentração recomendada para bochechos diários com solução fluoretada à base de fluoreto de sódio (NaF), é de 0,05% enquanto a concentração recomendada para bochechos semanais, com a mesma solução, é de 0,2%.
- B. () Dentifrícios com baixa concentração de fluoretos ou não fluoretados são sempre os indicados para crianças abaixo de 9 anos de idade.
- C. () Não há risco de fluorose dentária na aplicação tópica do gel fluoretado, mesmo em crianças em idade pré-escolar desde que seja respeitada a frequência de aplicação recomendada.
- D. () Elementos dentários acometidos por fluorose dentária não apresentam maior risco à cárie dentária.

38ª QUESTÃO – A Política Nacional de Saúde Bucal – Programa Brasil Sorridente constitui-se em uma série de medidas que visam a garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da população. Seu principal objetivo é a reorganização da prática e a qualificação das ações e serviços oferecidos, reunindo uma série de ações em saúde bucal voltada para os cidadãos de todas as idades, com ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito aos brasileiros por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre a Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- A. () Na organização da Rede de Atenção à Saúde Bucal do SUS, interconsulta é uma prática interdisciplinar para a construção do modelo integral de saúde, e tem como objetivo complementar ou elucidar aspectos da situação de cuidado em andamento, para traçar um plano terapêutico. Por exemplo: a necessidade de um parecer de outro profissional (ex.: médico, psicólogo) sobre determinado aspecto da saúde do paciente para que o dentista possa melhor elaborar seu plano de tratamento.
- B. () São elementos para a construção da Rede de Atenção à Saúde Bucal do SUS para uma dada população: definição das regiões de saúde/territórios; adstrição e vínculo da clientela da região à UBS; levantamento das condições de saúde bucal da população e planejamento das ações mediante a identificação dos grupos prioritários.
- C. () Na organização da Rede de Atenção à Saúde Bucal do SUS, a referência lateral é a referência que se faz internamente no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) para encaminhamento para outras especialidades, buscando a resolutividade do atendimento de forma que a necessidade do usuário seja atendida em sua totalidade, evitando que retorne para a atenção básica a fim de obter outro encaminhamento para a especialidade da qual necessita.
- D. () O Brasil Sorridente é composto por três níveis de atenção (Atenção Básica, Atenção Especializada Ambulatorial e Atenção Domiciliar) e é organizado de forma a se articular também com ações multidisciplinares, multiprofissionais e intersetoriais.

39ª QUESTÃO – Sobre os cremes dentais indicados para pacientes com xerostomia, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () Não devem possuir detergentes, sobretudo o lauril sulfato de sódio.
- B. () Aumentam o fluxo salivar, mesmo após a escovação.
- C. () Possuem baixa concentração de fluoreto.
- D. () Possuem potencial de irritação da mucosa.

40ª QUESTÃO – A prevalência e incidência da cárie dentária são usualmente avaliadas em estudos epidemiológicos a partir do emprego do índice CPOD. Nos inquéritos de saúde bucal realizados no Brasil em 2003 e 2010, observou-se uma queda do índice CPOD de 19%, em termos relativos, para a população adulta da faixa etária entre 35 e 44 anos (CPOD 20,1 em 2003 e CPOD 16,3 em 2010). Individualizando os componentes do índice, o estudo observou ainda que houve queda nos componentes “cariado” e “perdido”, enquanto houve crescimento do componente “obturado”. Em linhas gerais, baseado nas informações acima, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () A população adulta de 35 a 44 anos, ao longo dos sete anos entre 2003 e 2010, teve menor ataque de cárie e maior acesso a serviços odontológicos de caráter mutilador.
- B. () A população adulta de 35 a 44 anos, ao longo dos sete anos entre 2003 e 2010, teve maior ataque de cárie e maior acesso a serviços odontológicos de caráter restaurador em detrimento dos procedimentos mutiladores.
- C. () A população adulta de 35 a 44 anos, ao longo dos sete anos entre 2003 e 2010, teve menor ataque de cárie e maior acesso a serviços odontológicos de caráter restaurador em detrimento dos procedimentos mutiladores.
- D. () A população adulta de 35 a 44 anos, ao longo dos sete anos entre 2003 e 2010, teve menor ataque de cárie e menor acesso a serviços odontológicos de caráter restaurador.

41ª QUESTÃO – O traumatismo dentário é uma urgência odontológica que requer do clínico um exame criterioso para uma correta tomada de decisão quanto à sua abordagem e tratamento. É **INCORRETO** afirmar que:

- A. () Em dentes intruídos com rizogênese incompleta, recomenda-se uma extrusão ortodôntica.
- B. () A mobilidade concomitante de grupos de dentes indica uma possível fratura do processo alveolar.
- C. () No pós-operatório de uma luxação lateral pode ser observada uma rarefação do osso marginal e, neste caso, pode ser preciso manter a contenção por mais tempo.
- D. () A cobertura vacinal contra o tétano deve ser avaliada nos casos de avulsão dental.

42ª QUESTÃO – O ambiente odontológico, pelas suas particularidades, possibilita que o ar seja uma via potencial de transmissão de microrganismos, por meio das gotículas e dos aerossóis, que podem contaminar diretamente o profissional ao atingirem a pele e a mucosa, por inalação e ingestão, ou indiretamente, quando contaminam as superfícies. São estratégias para diminuir o risco de contaminação por aerossóis nos atendimentos odontológicos, **EXCETO**:

- A. () Usar dique de borracha sempre que possível.
- B. () Usar sugadores de alta potência.
- C. () Evitar usar a seringa tríplice na forma de spray.
- D. () Aumentar a saída de água dos motores refrigerados/irrigados.

43ª QUESTÃO – Mesmo que um determinado dente apresente indicação de remoção, em algumas situações, o dente não deve ser removido devido a outros fatores ou contraindicações específicas. Todas as alternativas abaixo constituem uma contraindicação para extração dentária, **EXCETO**:

- A. () Primeiro trimestre de gravidez.
- B. () Dentes localizados dentro de uma área de tumor, especialmente um tumor maligno.
- C. () Dentes com abscesso dentoalveolar agudo.
- D. () Pericoronarite severa.

44ª QUESTÃO – Na situação de uma fratura radicular onde os métodos fechados de remoção não obtiveram êxito e um método aberto for considerado muito traumático, o cirurgião-dentista deve avaliar a possibilidade de deixar a raiz no lugar. A seguir, são descritas condições necessárias para que um fragmento radicular possa ser deixado dentro do processo alveolar:

- I. O fragmento deve ser pequeno, idealmente não deve ser maior que 4 a 5mm.
- II. O fragmento deve estar superficialmente inserido no osso.
- III. O dente envolvido na fratura deve estar livre de infecção.

Estão **CORRETAS** as assertivas:

- A. () I, apenas.
- B. () II e III, apenas.
- C. () I e III, apenas.
- D. () III, apenas.

45ª QUESTÃO – Um dente impactado é aquele que não irrompeu na cavidade bucal. Podem estar totalmente inclusos ou semi-inclusos. Sobre os dentes impactados é **INCORRETO** afirmar que:

- A. () Em casos de pericoronarite, o elemento impactado deve sempre ser removido imediatamente para se evitar infecções dos espaços faciais da região de cabeça e pescoço.
- B. () Todos os dentes impactados devem ser encaminhados para exodontia a menos que contraindicações específicas justifiquem deixá-los na posição em que se encontram.
- C. () Dentes erupcionados adjacentes a dentes impactados são predispostos à doença periodontal.
- D. () O fóliculo dental associado a um dente completamente impactado pode originar um cisto dentígero, um ceratocisto ou até mesmo um ameloblastoma.

46ª QUESTÃO – O clínico geral é responsável tanto por solicitar quanto interpretar as radiografias solicitadas. Sobre a indicação de tomadas radiográficas intra e extraorais realizadas pelo cirurgião-dentista, é **INCORRETO** afirmar que:

- A. () A frequência dos exames radiográficos interproximais varia com as circunstâncias individuais de cada paciente.
- B. () A técnica da bisettriz fornece uma radiografia periapical menos distorcida da dentição em relação à técnica do paralelismo.
- C. () Quando um exame radiográfico intraoral completo é realizado em um paciente que será submetido a tratamento dentário, normalmente pouca ou nenhuma informação útil adicional é obtida através de uma radiografia panorâmica simultânea.
- D. () Um exame periapical completo é apropriado quando o paciente apresenta evidências clínicas de alterações dentárias generalizadas ou uma história de tratamento dentário extenso.

47ª QUESTÃO – É importante que o clínico esteja familiarizado com as manifestações radiográficas de patologias na região orofacial. Sobre os aspectos radiográficos de lesões císticas e tumorais, é **INCORRETO** afirmar que:

- A. () As raízes dos dentes podem ser reabsorvidas tanto por tumores benignos quanto por malignos, mas a reabsorção das raízes está associada, mais comumente, a processos benignos.
- B. () Tumores benignos e cistos na mandíbula de origem odontogênica ocorrem no processo alveolar superiormente ao canal mandibular.
- C. () As displasias ósseas, assim como a displasia fibrosa normalmente reabsorvem os dentes adjacentes.
- D. () O ameloblastoma benigno geralmente é bem definido e frequentemente delineado por uma cortical. A borda é curva e em lesões pequenas e uniloculares o formato e a borda podem ser indiferenciáveis de um cisto.

48ª QUESTÃO – O desgaste dentário é um sinal muito comum de colapso na dentição podendo ser um processo bastante destrutivo. Sobre os desgastes dentários, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () Embora as placas oclusais possam reduzir os efeitos nocivos do desgaste dentário e possam ajudar a reduzir as dores músculo-esqueléticas, elas não curam o paciente do bruxismo.
- B. () O desgaste dentário encontrado nas facetas de contatos dentários de movimentos excêntricos é, em sua maioria, devido a uma atividade funcional normal.
- C. () Se há desgaste dentário, mas a parte desgastada não contata os dentes antagonistas o paciente deve ser questionado sobre o uso frequente de goma de mascar.
- D. () A presença do desgaste dentário significa que o paciente está atualmente sofrendo bruxismo.

49ª QUESTÃO – Considerando a anamnese, exame clínico/radiográfico e plano de tratamento do paciente suspeito de abuso de álcool a ser submetido a um tratamento odontológico, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () Pacientes com alcoolismo não tendem a apresentar mais placa, cálculo e inflamação gengival do que os sem esta condição
- B. () Não é função do cirurgião-dentista fornecer informações ao paciente sobre prevenção ao alcoolismo.
- C. () No exame clínico do paciente, não é possível a identificação do paciente com alcoolismo.
- D. () O cirurgião-dentista deve estar familiarizado com as opções de tratamento existentes dentro da rede local de atenção e de programas ambulatoriais e hospitalares (por exemplo) para que possa instruir e discutir com seu paciente.

50ª QUESTÃO – Atualmente é aceito que lesões cervicais não cariosas têm uma etiologia multifatorial envolvendo tensão, fricção e biocorrosão. Sobre as lesões causadas por biocorrosão é **CORRETO** afirmar que:

- A. () O fluxo salivar não tem relação com a incidência de lesões cervicais não cariosas.
- B. () A biocorrosão é causada apenas por ácidos de origem endógena.
- C. () A dieta do paciente tem uma correlação direta com a incidência de lesões cervicais não cariosas causadas por biocorrosão.
- D. () O papel protetor da saliva contra as lesões cervicais não cariosas se refere apenas às suas ações de tamponamento, atividade antibacteriana e de mineralização dentária.

-----corte aqui-----

RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50