

CONCURSO PÚBLICO SALGUEIRO - G.2 - SUPERIOR



MÉDICO (PSF)

INSTITUTO
igeduc
CONCURSOS E SELEÇÕES COM INTEGRIDADE

100 QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será ELIMINADO.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
 - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
 - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
 - Nos itens que avaliam conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
 - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em concursos.igeduc.org.br.
-

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(de 1 a 70)**

Julgue os itens que se seguem.

01. No caso de pacientes com Chikungunya que apresentem dor de moderada intensidade (EVA de 1 a 3), tanto a dipirona como o paracetamol são bons analgésicos quando utilizados nas doses e intervalos corretos (Fluxograma 1A, Apêndice I). A dipirona vem sendo prescrita nas doses de 30 a 50 mg/kg/dose, em intervalos fixos de 6 horas. Em um adulto, habitualmente é recomendada a dose de 1 g a intervalos fixos de 6 horas.
02. Os macrolídeos são as drogas de escolha para as pessoas infectadas pela coqueluche. O tratamento com essas drogas é eficaz se administrado nas mais diversas fases da doença.
03. Em pacientes idosos, o tratamento para infecção por Influenza envolve a hospitalização imediata para suporte respiratório, incluindo oxigenoterapia e, se necessário, ventilação mecânica. Administração intravenosa de antivirais específicos para influenza, como oseltamivir, e antibióticos de amplo espectro para cobrir possíveis infecções bacterianas secundárias é fundamental.
04. De acordo com as normas de estudo relacionadas a Síndrome da Paralisia Flácida Aguda, em menores de 15 anos, em caso de suspeita de poliomielite, deve ser coletada oportunamente uma amostra de urina para identificação de possíveis poliovírus.
05. O tratamento inicial para Paralisia Facial Periférica (Nervo Facial - VII) envolve proteção do olho afetado com uso de lágrimas artificiais e oclusão noturna. O uso de corticosteroides, como prednisona, pode ser prescrito para reduzir a inflamação e promover a recuperação do nervo facial. Em alguns casos graves ou persistentes, pode ser considerada a cirurgia de descompressão do nervo facial.
06. Algumas estirpes de *H. influenzae* são capsuladas e podem ser divididas em seis serotipos (a-f) com base nos polissacarídeos capsulares. A presença de cápsula, em especial o serotipo d (Hid), tem sido associada a uma maior virulência.
07. Testes sorológicos para anticorpos IgM e IgG contra o *Toxoplasma gondii* são essenciais para o diagnóstico de Toxoplasmose. A presença de IgM sugere uma infecção aguda, enquanto a presença de IgG indica uma infecção prévia ou latente.
08. A amitriptilina é um antidepressivo tricíclico que inibe a receptação de serotonina e noradrenalina. Tem como principais efeitos colaterais a sensação de boca seca, a sonolência e o ganho de peso. A maioria desses efeitos é bem tolerada na dose de 50 mg/dia e tende a diminuir com o passar do tempo de tratamento. Não deve ser prescrita em associação com inibidores da monoaminooxidases (Imao), utilizados em depressão maior (fenelzina, tranilcipromina e isocarboxazida).
09. Uma paciente mulher de 50 anos, com histórico de consumo crônico de álcool, apresenta icterícia, dor abdominal no quadrante superior direito, hepatomegalia, ascite e encefalopatia hepática. Após avaliar a gravidade do caso, o mais correto é que o médico prescreva o uso de vasopressina para controlar a ascite, suplementação nutricional e monitoramento dos níveis de amônia no sangue.
10. O diagnóstico da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é desafiador e geralmente baseado na apresentação clínica dos sintomas, juntamente com exames complementares, como eletroencefalograma (EEG) e ressonância magnética (RM) do cérebro para detectar padrões característicos de atividade elétrica anormal e alterações estruturais.
11. O tratamento das complicações cardíacas associadas à esclerodermia envolve uma abordagem multidisciplinar. Isso pode incluir o uso de medicamentos para controlar sintomas como arritmia e refluxo gastroesofágico, dilatação esofágica endoscópica para tratar estenoses esofágicas, e modificações na dieta para facilitar a deglutição. Em casos graves, pode ser necessária a intervenção cirúrgica para corrigir complicações como obstrução intestinal.

12. O tramadol é uma boa escolha quando se suspeita de componente neuropático nas dores intensas relacionadas a casos de Chikungunya, pois além da ação em receptores opioides agem como antagonista de receptores NMDA (N-metyl-D-aspartato) envolvidos na cronificação da dor. Deve ser usado na dose de 150 a 200 mg a cada 8 horas.
13. A abordagem terapêutica do Abdome Agudo requer uma avaliação rápida e abrangente para determinar a causa subjacente da condição e iniciar o tratamento adequado. Em casos de apendicite aguda, por exemplo, a cirurgia de apendicectomia é frequentemente necessária para remover o apêndice inflamado e prevenir complicações graves, como a perfuração.
14. No homem, a viremia da Febre amarela dura aproximadamente 10-15 dias. Inicia-se entre 24 e 48 horas antes do aparecimento dos primeiros sintomas e se estende até 3 a 5 dias após o início da doença, período em que o homem pode servir como fonte de infecção para mosquitos transmissores. Nos PNH, a viremia pode ser mais intensa, dependendo da espécie afetada, mas o período de transmissibilidade é semelhante ao do homem.
15. Um paciente do sexo masculino chega ao pronto atendimento com queixa de dor abdominal, com suspeita de abdome agudo, que é uma condição clínica caracterizada por dor abdominal súbita e intensa, muitas vezes associada a distensão abdominal, náuseas, vômitos e alterações nos movimentos intestinais. O diagnóstico do Abdome Agudo geralmente envolve uma avaliação clínica detalhada, incluindo história clínica, exame físico e exames complementares, como exames de imagem (tomografia computadorizada, ultrassonografia) e exames laboratoriais (hemograma, bioquímica sérica).
16. Uma mulher de 30 anos nota uma ferida indolor em sua região genital e procura atendimento médico. Ela teve múltiplos parceiros sexuais ao longo do último ano. Após alguns exames que incluíram, por exemplo, o NAAT, detectou-se a presença da doença sexualmente transmissível sífilis. Nesse caso, o médico deverá prescrever como tratamento a penicilina G benzatina.
17. A toxoplasmose normalmente evolui sem sequelas em pessoas com imunidade adequada. Dessa forma, não se recomenda tratamento específico, apenas tratamento para combater os sintomas. Pacientes com imunidade comprometida ou que já tenham desenvolvido complicações da doença (cegueira, diminuição auditiva) deverão ser encaminhados para acompanhamento médico especializado.
18. O tratamento para SARS-CoV em idosos consiste na hospitalização imediata na unidade de terapia intensiva (UTI) para suporte respiratório intensivo, incluindo ventilação mecânica invasiva. Também é importante a administração de antivirais e corticosteroides, além de cuidados intensivos para o controle da glicemia e da pressão arterial. O uso de terapia anticoagulante pode ser considerado devido ao risco aumentado de eventos tromboembólicos em pacientes com SARS.
19. Um homem de 45 anos, com histórico de consumo excessivo de álcool, apresenta tremores, sudorese intensa, ansiedade, agitação, náuseas, vômitos e aumento da frequência cardíaca. Nessa situação, o melhor caminho para o tratamento seria: a administração de benzodiazepínicos para controlar os sintomas de abstinência, monitoramento da função hepática e cardiovascular, hidratação adequada com soluções eletrolíticas.
20. Um homem de 28 anos procura atendimento médico devido a dor e sensação de queimação ao urinar, após exames, foi detectada a presença da bactéria *Neisseria gonorrhoeae* e prescrito assim, de forma correta, o antibiótico ceftriaxona.
21. Durante os estágios finais da doença, os pacientes suspeitos de DCJ que desenvolvem doenças intercorrentes podem necessitar dos mesmos tipos de procedimentos diagnósticos que outros pacientes internados (exames oftalmoscópicos, endoscopia, cateterização vascular ou urinária e testes de função cardíaca ou pulmonar), além dos testes hematológicos e bioquímicos.
22. A Doença Invasiva por *Haemophilus influenzae* é uma infecção bacteriana causada pelo *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib), que pode resultar em uma variedade de doenças graves, incluindo meningite, sepse, epiglote e pneumonia. Os sintomas variam de acordo com o tipo de infecção, mas podem incluir febre alta, rigidez na nuca (em casos de meningite), dificuldade respiratória e sinais de choque séptico.
23. Os sintomas da Síndrome da Paralisia Flácida Aguda (SPFA) incluem fraqueza muscular progressiva, especialmente nos membros, diminuição dos reflexos tendinosos profundos e, em casos graves, paralisia respiratória. O diagnóstico da SPFA é baseado na apresentação clínica dos sintomas, exames neurológicos detalhados e exclusão de outras condições que possam causar sintomas semelhantes. O tratamento da SPFA é principalmente de suporte e visa minimizar complicações, como insuficiência respiratória, com ventilação mecânica, fisioterapia e reabilitação neuromuscular.
24. Um homem com 40 anos foi picado por várias abelhas africanizadas. Ele apresenta múltiplas picadas, dor intensa, vermelhidão, inchaço, dificuldade respiratória, urticária generalizada e confusão. O atendimento médico, nesse caso, deve começar por remover cuidadosamente os ferrões das abelhas e administrar difenidramina para reverter a reação alérgica.
25. Sobre a coleta do material para análise de secreção e detecção de SRAG, as amostras deverão ser colocadas em caixas térmicas de paredes rígidas, que mantenham a temperatura adequada de refrigeração (10°C a 25°C) até a chegada ao Lacen. O Lacen deverá acondicionar a amostra em caixas específicas para Transporte de Substâncias Infeciosas, preferencialmente em gelo seco. Na impossibilidade de se obter gelo seco, a amostra poderá ser congelada a -70°C e encaminhada em gelo reciclável.
26. Um paciente que está apresentando sinais de depressão procura atendimento médico. Nesse caso, como tratamento primário, deve ser indicado para ele a Electroconvulsioterapia (ECT), tratamento técnico que pode ser usado em qualquer casos de depressão.

27. O tratamento medicamentoso de Artrite Reumatoide inclui o uso de anti-inflamatórios esteroidais (AIE), glicocorticoides, imunossupressores e medicamentos modificadores do curso da doença (MMCD) – sintéticos e biológicos.
28. Um indivíduo começa a experimentar uma série de sintomas leves que, inicialmente, podem ser facilmente atribuídos ao estresse cotidiano. Ele relata sentir-se constantemente cansado, desinteressado em atividades que antes lhe traziam prazer, dificuldade para dormir e irritabilidade. Uma das etapas iniciais para o diagnóstico será o uso de escalas de avaliação de depressão, como o PHQ-9, para quantificar a gravidade dos sintomas relacionados a depressão.
29. A prevenção da Doença Invasiva por Haemophilus influenzae é realizada principalmente por meio da utilização e anitbióticos de amplo espectro. O antibiótico contra Hib é altamente eficaz na prevenção de infecções graves, especialmente em crianças pequenas, que são mais suscetíveis a complicações graves da doença.
30. Um paciente do sexo masculino com 62 anos de idade chega ao posto de saúde com dor, devido a uma picada de serpente, apresentando os seguintes sintomas: fraqueza muscular, insuficiência renal aguda e choque. O médico, baseado nos sintomas, pode inferir que a picada se trata de uma cobra coral.
31. De acordo com a bibliografia médica recente, a Fase catarral (1 a 2 semanas) da coqueluche possui manifestações respiratórias iniciais acompanhadas de sintomas leves caracterizadas por febre pouco intensa, mal-estar geral, coriza e tosse seca. A frequência e a intensidade dos acessos de tosse aumentam gradualmente até o surgimento das crises de tosse paroxística.
32. Um bebê de 6 meses é levado ao hospital com constipação, choro fraco, letargia e dificuldade para alimentar-se. A mãe relata que, alguns dias antes, o bebê foi alimentado com mel. Após exames laboratoriais, foi comprovado o botulismo e, dessa forma, o médico prescreveu a administração da Imunoglobulina Botulínica Intravenosa (BIG-IV) específica para crianças para neutralizar a toxina.
33. Um homem de 35 anos, com histórico de abuso de álcool e depressão, apresenta consumo contínuo de álcool como forma de automedicação para os sintomas depressivos. Nessa situação, o melhor encaminhamento para o tratamento do paciente consiste na avaliação psiquiátrica completa para diagnosticar e tratar a depressão, terapia cognitivo-comportamental para modificar padrões de pensamento e comportamento relacionados ao consumo de álcool, administração de antidepressivos se indicado.
34. A quimioprofilaxia é um procedimento que tem o uso justificado em exposições com baixo risco de transmissão do HIV.
35. Uma mulher idosa de 70 anos, com histórico de diabetes e hipertensão, é admitida no hospital com febre, tosse produtiva com expectoração sanguinolenta, dispneia grave e confusão mental. Ela teve contato com uma pessoa diagnosticada com SARS há uma semana. Para o diagnóstico, deve ser feita uma avaliação clínica e exames laboratoriais, incluindo radiografia de tórax e gasometria arterial para avaliar a função respiratória e a presença de hipoxemia. Testes de PCR para detecção do coronavírus SARS-CoV podem ser realizados para confirmar o diagnóstico.
36. O tratamento para esclerodermia localizada geralmente envolve medidas para aliviar os sintomas, como o uso de emolientes para hidratar a pele e terapia física para manter a amplitude de movimento e prevenir a atrofia muscular.
37. Em caso de falha da monoterapia inicial (MTX, LEF, SSZ, HCQ/cloroquina), isto é, de persistência da atividade de doença (de acordo com a meta terapêutica) após 7 meses de tratamento otimizado (dose máxima tolerada e adesão adequada) do medicamento usado na 1ª linha, passa-se para a terapia com a combinação dupla ou tripla de MMCDs. As associações de medicamentos modificadores do curso da doença sintéticos (MMCDs) mais comumente recomendadas são MTX ou LEF com HCQ/cloroquina ou MTX ou LEF com SSZ.
38. O tratamento para Paralisia do Nervo Oculomotor (III) envolve repouso ocular, especialmente do olho afetado, e uso de óculos prismáticos para alívio temporário da diplopia. Medicamentos para controle da dor, como analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides, podem ser prescritos. Em casos de paralisia completa do músculo elevador da pálpebra, pode ser considerada a injeção de toxina botulínica para elevar a pálpebra temporariamente.
39. A anosmia é mais comum no trauma frontal, quando comparado ao trauma occipital. Há recuperação funcional do nervo em aproximadamente um terço do casos nos primeiros três meses após o trauma. A frequência da anosmia é proporcional à intensidade do trauma.
40. Todos os casos de acidente com material biológico devem ser comunicados ao INSS por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e ao Ministério da Saúde por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), conforme previsto na Portaria n.º 777, de 28 de abril de 2004, do Ministério da Saúde.
41. Um homem saudável de 30 anos procura atendimento médico devido a febre súbita, calafrios, dor de garganta, dores musculares e fadiga. Ele relata que os sintomas começaram há cerca de 2 dias e que ele tem tido dificuldade para se levantar da cama. Após consulta e a realização do teste de diagnóstico rápido de influenza, o médico corretamente indicou repouso, hidratação adequada e controle da febre com medicamentos como paracetamol ou ibuprofeno. Antivirais específicos para influenza, como oseltamivir, podem ser prescritos se iniciados dentro das primeiras 48 horas do início dos sintomas.

42. Um homem de 30 anos foi picado por uma cobra cascavel. Ele apresenta dor intensa, inchaço localizado, palidez, sudorese, náuseas e vômitos. Nesse caso, o médico precisa administrar analgésicos para o alívio da dor, imobilizar o membro afetado, administrar soro antiofídico específico para cascavel e encaminhar para um centro médico para monitoramento e tratamento adicional.
43. A cegueira unilateral é a complicação menos frequente da lesão traumática do nervo óptico, quando comparada com qualquer grau de acometimento da acuidade visual que pode estar presente. No campo visual, os defeitos altitudinais inferiores são os mais frequentemente relatados.
44. A principal medida de prevenção da toxoplasmose é a promoção de ações de educação em saúde, principalmente para mulheres que estão em idade fértil e gestantes. É fundamental manter boas práticas de higiene pessoal e de higiene dos alimentos.
45. O vírus da influenza do Tipo B é encontrado em várias espécies de animais, além dos seres humanos, como suínos, cavalos, mamíferos marinhos e aves. As aves migratórias desempenham importante papel na disseminação natural da doença entre distintos pontos do globo terrestre. Eles são ainda classificados em subtipos, de acordo com as combinações de 2 proteínas diferentes, a Hemaglutinina (HA ou H) e a Neuraminidase (NA ou N). Dentre os subtipos de vírus influenza A, atualmente os subtipos A (H1N1)pdm09 e A (H3N2) circulam de maneira sazonal e infectam humanos. Alguns vírus influenza A de origem animal também podem infectar humanos causando doença grave, como os vírus A(H5N1), A(H7N9), A(H10N8), A(H3N2v), A(H1N2v) e outros.
46. Uma mulher de 35 anos apresenta febre, dor nas costas, oligúria e icterícia. Ela vive em uma área endêmica de febre amarela. Após confirmação com base em exames e detectado o vírus, o tratamento medicamentoso deverá ser o uso de anti-inflamatórios devido à suspeita de infecção secundária; e diuréticos para tratar a oligúria.
47. A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é uma doença neurodegenerativa rara e fatal causada pela formação de proteínas anormais chamadas príons no cérebro. Os sintomas típicos incluem deterioração rápida da função cerebral, incluindo demência, distúrbios de movimento, rigidez muscular e mioclônias.
48. Para o diagnóstico viral, as amostras que podem ter sido coletadas há vários dias, coletadas de diferentes sítios das vias respiratórias ou de qualquer outra localização anatômica, devem ser acondicionadas individualmente, em recipientes estéreis e imersas, em meio de transporte viral ou solução salina tamponada (PBS pH 8.2), suplementadas com antibióticos.
49. A prevenção da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é desafiadora devido à natureza incomum e pouco compreendida da doença. No entanto, medidas podem ser tomadas para reduzir o risco de exposição aos vírus potencialmente infecciosos, como evitar o consumo de produtos de origem animal suspeitos de conter príons, como carne de animais doentes, e aderir a práticas seguras em procedimentos médicos que possam envolver materiais biológicos contaminados.
50. Um jovem de 25 anos apresenta febre baixa, dor de cabeça leve, mialgia e náusea. Ele recentemente viajou para uma área endêmica de febre amarela. Nesse caso, o melhor teste para se comprovar a presença do vírus da febre amarela é a sorologia para detecção de anticorpos IgM e IgG específicos para o vírus da febre amarela.
51. A pancreatite aguda caracteriza-se por um processo inflamatório agudo do pâncreas por ativação indevida dos hormônios pancreáticos, ocorrendo a autodigestão. O quadro clínico cursa com dor abdominal aguda, vômitos recorrentes, náuseas, febre e taquicardia. No exame físico, está presente dor à palpação ou até mesmo irritação peritoneal, distensão abdominal, icterícia e, em apresentações hemorrágicas, os sinais de Grey-Turner (equimose em flancos), Cullen (equimose eriumbilical) e de Fox (equimose na base do pênis).
52. Os sintomas do indivíduo evoluem para uma forma mais grave de depressão. Ele relata sentimentos de tristeza profunda, perda de interesse em atividades diárias, alterações no apetite e pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. O funcionamento ocupacional e social está significativamente comprometido. Nesse caso, o melhor tratamento é o uso de Nortriptilina e o internamento médico.
53. No caso de um paciente que enfrenta uma crise aguda de depressão com ideação suicida ativa e tentativa de automutilação, relata-se sentir completamente desesperançoso e incapaz de continuar vivendo. Diante disso, deve-se usar como medida de tratamento a regulação da medicação e do uso de antidepressivos, a psicoterapia, o suporte social por meio de grupos de ajuda e manter o monitoramento constante.
54. Um bebê de 4 meses apresenta episódios de tosse intensa seguidos de um som agudo ao inspirar, conhecido como "guincho". A mãe relata que o bebê tem tido dificuldades para respirar, alimentação reduzida e episódios de vômito após os acessos de tosse. O bebê não completou o esquema vacinal. Após exames e confirmada a coqueluche, o médico deverá prescrever o uso de amoxicilina como tratamento primário.
55. A Síndrome da Paralisia Flácida Aguda (SPFA) é uma condição neurológica rara e grave caracterizada por fraqueza súbita e flacidez muscular, frequentemente associada a sintomas semelhantes aos da poliomielite. Embora a causa exata da SPFA não seja completamente compreendida, muitos casos estão relacionados à infecção pelo poliovírus selvagem ou por enterovírus não polio, como o enterovírus D25.
56. Uma jovem de 22 anos procura atendimento médico devido a um corrimento vaginal anormal e dor ao urinar. Ela teve múltiplos parceiros sexuais nos últimos meses e não usou preservativo em todas as relações. Após coleta de amostra de secreção vaginal para teste de amplificação de ácidos nucleicos (NAAT) para detecção de DNA de *Chlamydia trachomatis*, foi constatada a presença da mesma. Nesse caso, a administração de comprimidos de azitromicina é um dos tratamentos que pode ser indicado.

57. O diagnóstico da Doença Invasiva por *Haemophilus influenzae* é geralmente confirmado por meio de cultura de amostras clínicas, como sangue, líquido cerebrospinal ou escarro, para isolamento e identificação do patógeno. O tratamento primário para a Doença Invasiva por *Haemophilus influenzae* é a administração de antibióticos, como ceftriaxona ou ampicilina, dependendo da susceptibilidade do microrganismo.
58. O tratamento da esclerodermia difusa visa a controlar a pressão arterial elevada e reduzir a proteinúria para evitar complicações renais. Isso pode incluir o uso de medicamentos anti-hipertensivos, como inibidores da enzima de conversão da angiotensina (ECA) ou bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA), juntamente com medidas para proteger a função renal, como controle da ingestão de sal e monitoramento regular da função renal.
59. Um homem de 55 anos apresenta espessamento e endurecimento da pele nas mãos, face e antebraços, juntamente com dificuldade para respirar progressivamente, especialmente durante o exercício. Ele relata tosse seca e fadiga persistente. Para determinar a doença específica, o médico deverá realizar exame físico para avaliar o envolvimento cutâneo e auscultação pulmonar para detectar possíveis anormalidades respiratórias. Testes de função pulmonar e tomografia computadorizada de tórax deverão ser realizados para avaliar a função pulmonar e detectar fibrose pulmonar.
60. Um mulher de 28 anos relata ingestão causada pela ingestão, há dois dias, de conservas caseiras de vegetais. Ela apresenta fraqueza muscular generalizada, visão turva, dificuldade para engolir, boca seca, náuseas e visão dupla. Após exames, é constatado o botulismo. Dessa forma, a administração precoce de antitoxina botulínica pode ajudar a neutralizar a toxina circulante e reduzir a gravidade dos sintomas.
61. O tratamento da influenza em gestantes é diferente do tratamento em adultos não grávidos e geralmente envolve repouso, hidratação adequada, mas evita-se o uso de antipiréticos para controlar a febre, uma vez que esses podem acarretar problemas ao feto. O uso de antivirais específicos para influenza, como oseltamivir, pode ser considerado em gestantes com sintomas graves ou com maior risco de complicações, sob orientação médica.
62. São características laboratoriais da Febre amarela: ausência de leucocitose e proteína reativa C baixa. A suspeita do diagnóstico de FA enfraquece na presença de proteína reativa C elevada e leucocitose. Na presença de PCR elevada e/ou, leucocitose deve-se suspeitar de outro diagnóstico ou de complicação bacteriana superposta ao quadro de FA.
63. Uma mulher de 65 anos, com histórico de hipertensão e diabetes mellitus, apresenta febre alta, dores articulares severas, edema nas mãos e pés, além de erupção cutânea. Ela relata ter sido picada por mosquitos enquanto visitava familiares em uma área rural recentemente. Para início do tratamento, o paracetamol é a primeira linha para febre e dor.
64. Existe uma infinidade de síndromes de doenças sexualmente transmissíveis relacionadas a diversos agentes infecciosos, isso porque as DST são causadas por muitos microrganismos diferentes.
65. A prevenção da Síndrome da Paralisia Flácida Aguda é desafiadora devido à sua relação com infecções virais, como o poliovírus e o enterovírus. No entanto, medidas podem ser tomadas para reduzir o risco de infecção, como a promoção da higiene pessoal, incluindo lavagem frequente das mãos com água e sabão, especialmente após o contato com pessoas doentes ou superfícies contaminadas. Além disso, a vacinação contra a poliomielite é fundamental para prevenir a transmissão do poliovírus e reduzir o número de casos de SPFA relacionados a esse patógeno.
66. Um paciente do sexo feminino, com 18 anos de idade, chega ao posto de saúde relatando ter sido picada por escorpião não identificado, apresenta dor intensa, inchaço, vermelhidão, formigamento, sudorese, taquicardia, náuseas, vômitos e alterações neurológicas e cardiovasculares. Nesse caso, o médico pode administrar analgésicos e anti-histamínicos, se necessário, para alívio dos sintomas, e concomitante a isso administrar o soro antiescorpiônico.
67. Um homem de 30 anos, usuário de drogas injetáveis, apresenta fraqueza muscular, ptose palpebral e dificuldade para respirar. Há uma ferida purulenta no braço direito, onde ele relatou ter injetado drogas há aproximadamente uma semana. Após a confirmação do exame da presença de toxina botulínica, foi receitado o uso de azitromicina para o tratamento correto.
68. Em um determinado plantão, uma mulher de 55 anos, apresentando sintomas agudos de artrite reumatoide, incluindo dor, inchaço e rigidez nas articulações das mãos e dos pés, chega ao posto de saúde e relata dificuldade para realizar tarefas simples, como segurar objetos e caminhar. Após a correta análise de exames, é diagnosticada a artrite reumatoide. Nessa situação, o médico deve começar o tratamento com medicamentos modificadores do curso da doença (DMARDs), como metotrexato, hidroxicloroquina ou sulfassalazina, para controlar a inflamação e retardar a progressão da doença.
69. Um adolescente de 15 anos apresenta episódios de tosse persistente que duram mais de duas semanas. Os acessos de tosse são seguidos por um "guincho" inspiratório e, ocasionalmente, por vômito. Ele não teve contato recente com pessoas doentes e está com o calendário vacinal desatualizado. Nesse caso, para determinar ou não o diagnóstico de coqueluche, o ideal é que se faça uma cultura de nasofaringe ou PCR para *Bordetella pertussis* e Sorologia para detecção de anticorpos contra a toxina pertussis.
70. Ao se acidentar com exposição ao HCV, é necessário que o profissional da saúde exposto a esse vírus faça um monitoramento contínuo e efetivo para identificação do vírus e também utilize o coquetel antiviral para a prevenção da duplicação e multiplicação viral.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 71 a 100)

Julgue os itens a seguir.

71. A competência privativa do Município de Salgueiro inclui a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, como consta no Art. 10, III da lei Orgânica do Município de Salgueiro - PE.
72. A pedido direto do prefeito do município, que representa a autoridade máxima da cidade, o servidor público pode utilizar sua posição para agilizar processos em benefício de familiares, desde que não obtenha vantagens pessoais.
73. Em alguns casos permitidos pela lei, o servidor público pode aceitar presentes de terceiros que mantêm contratos com a administração pública, desde que sejam de valor simbólico e não influenciem suas decisões.
74. Em algumas situações, é aceitável que um servidor público use informações confidenciais a que tem acesso em sua função para beneficiar um amigo, desde que não haja prejuízo direto à administração pública.
75. Excepcionalmente, é aceitável que um servidor público participe ativamente de campanhas políticas durante seu horário de trabalho, desde que não prejudique suas responsabilidades profissionais.
76. Em situações de falha técnica, é fundamental que o usuário do dispositivo esteja familiarizado com métodos alternativos para contornar o problema até que seja solucionado. Por exemplo, para acessar a Central de Segurança do Windows, sem o uso do mouse, e realizar funções como desligar e reiniciar o computador, é necessário pressionar as teclas CTRL + ALT + ENTER.
77. A alteração de divisão administrativa do Município de Salgueiro só pode ser feita quadrienalmente, conforme o Art. 8 da sua Lei Orgânica.
78. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Salgueiro - PE, no seu artigo 9, a instalação de um distrito deve ser realizada perante o Juiz de Direito da Comarca para estabelecimento concreto e legal.
79. Para converter um arquivo do formato .DOC para um formato .DOCX Aberto, é necessário abrir o arquivo utilizando o bloco de notas e salvar como docx.
80. A detecção de malware em computadores requer a observação cuidadosa de diversos indicadores, que incluem, entre outros, a redução do espaço de armazenamento interno, uma vez que muitos malwares têm o hábito de baixar e instalar arquivos adicionais no dispositivo infectado. Além disso, a ocorrência excessiva de pop-ups e o superaquecimento do computador também podem ser sintomas reveladores da presença de malware.
81. Conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 17 da Lei Orgânica, essa disposição determina o processo de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o segundo biênio, especificando a data e as condições de posse dos eleitos.
82. A implementação de procedimentos de backups é fundamental para preservar a integridade dos arquivos. Existem três metodologias para o armazenamento de cópias de segurança: Full (completo), que replica todos os dados integralmente; Incremental, que registra apenas os novos ou alterados; e Diferencial, similar ao Incremental, porém copia tudo o que foi modificado desde o último Backup completo.
83. A existência de um código de ética é suficiente para garantir comportamentos éticos entre os servidores públicos, independentemente da implementação de medidas de fiscalização e treinamento contínuo.
84. Um servidor público pode manifestar suas opiniões políticas em redes sociais, desde que não faça referência à sua instituição de trabalho.
85. O artigo 25 da Lei Orgânica estabelece a existência de comissões permanentes e especiais na Câmara Municipal, delineando suas competências e atribuições específicas.
86. O número de vereadores será fixado pela Câmara Municipal de Salgueiro até o final da Sessão Legislativa do ano subsequente às eleições, conforme o Art. 16 da Lei Orgânica do Município de Salgueiro - PE.
87. Worms são programas instalados em um computador sem o conhecimento do usuário durante a execução de outro software. Eles capturam informações sobre o usuário, como padrões de navegação e senhas, e as enviam remotamente para outro computador.
88. A responsabilidade, uma qualidade essencial da ética no serviço público, deve ser evidente nas ações dos funcionários públicos. Sem essa responsabilidade, é improvável que a administração pública e os cidadãos ajam de forma ética.
89. Mesmo na ausência de alguém de sua chefia imediata que o fiscalize diretamente, é dever do servidor público zelar pela correta utilização dos recursos públicos, evitando desperdícios e promovendo a eficiência na gestão.
90. Para identificar os vários tipos de arquivos (arquivos de textos, de som, imagem etc), é necessário observar a extensão, entendendo que, no caso do Windows, "ppsx" significa que o documento é uma apresentação de slides do PowerPoint; "PDF" é um arquivo de formato de documento portátil; "JPG" ou "JPEG" são arquivos de foto Join Photographic Experts Group; "doc" e "docm" são documentos do Microsoft Word. Para alterar a extensão do arquivo, é necessário alterar o nome do mesmo, trocando a sigla após o ".", por exemplo: "RELATÓRIO 2024.pdf", para "RELATÓRIO 2024.docm".
91. Para habilitar o uso do mouse por meio do teclado em todas as versões do Windows, é preciso pressionar simultaneamente as teclas Alt esquerda + Shift esquerda + Num Lock. Isso abrirá uma janela chamada "Teclas para Mouse". Para ativar o recurso, deve-se usar a tecla "Tab" para selecionar entre "Sim" ou "Não", e em seguida pressionar "Enter" no teclado para confirmar a seleção.
92. Ao organizar audiências públicas sobre um novo projeto de infraestrutura, um servidor público está promovendo a cidadania ativa e garantindo que a comunidade tenha voz nas decisões que impactam sua vida.

93. A iniciativa de elaboração de leis cabe a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado que a exercerá sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por cinco por cento do total de número de eleitores do município.
94. O artigo 23 da Lei Orgânica define o período de mandato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salgueiro, bem como veda a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente, garantindo a alternância de poder.
95. O Google Planilhas representa uma solução tecnológica de acesso apenas gratuito, oferecendo diversas facilidades ao usuário. Entre suas funcionalidades mais avançadas destaca-se o recurso do botão "Explorar", que mobiliza a inteligência artificial do Google para pesquisar tendências, criar gráficos e produzir visualizações personalizadas.
96. O conceito de ética no setor público está relacionado à transparência nas decisões e ações administrativas, garantindo que os processos sejam claros e compreensíveis para a sociedade.
97. O Google Classroom é uma plataforma que facilita a aplicação de métodos de ensino a distância de maneira simples, eficaz e unificada. Essa plataforma é adequada tanto para instituições educacionais quanto para empresas, pois proporciona um ambiente online onde professores, alunos e equipes podem interagir de forma organizada e eficiente. Uma das grandes vantagens do Google Classroom é sua capacidade de oferecer feedbacks personalizados.
98. De acordo com o artigo 5º da Lei Orgânica do Município de Salgueiro PE, a Câmara Municipal se reunirá anualmente de 15 de janeiro a 15 de junho e de 15 de julho a 15 de dezembro, para realizar as sessões necessárias em plenário.
99. Para distinguir entre a presença de vírus em um computador e o acúmulo de cookies no navegador, é necessário atentar para determinados indicadores, uma vez que ambos compartilham um sintoma comum: a exaustão do armazenamento e a coleta não autorizada de dados. Essa diferenciação pode ser realizada por meio de uma análise do desempenho do sistema após a remoção dos excessos de cookies. Esse procedimento deve ser conduzido através das configurações de Privacidade, ou Privacidade e Segurança, disponíveis no navegador.
100. No ato da posse e ao término do mandato, os vereadores deverão fazer declaração dos seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara, constando das respectivas atas o seu resumo de acordo com a Lei Orgânica do Município de Salgueiro - PE.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR

RASCUNHO