

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (TODAS AS ÁREAS)

igeduc

80 QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de **ELIMINAÇÃO** do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será **ELIMINADO**.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
 - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
 - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
 - Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
 - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em concursos.igeduc.org.br.
-

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(de 1 a 60)**

Julgue os itens a seguir.

01. A Gonorreia é uma doença infecciosa do trato digestivo superior, de transmissão por via aérea. Essa infecção possui baixa morbidade e manifestar-se desde uma infecção assintomática até uma doença de gravidade moderada. Em geral, as práticas de prevenção à Gonorreia devem estimular o uso de máscara entre o público com idade entre 13 e 27 anos de idade.
02. A introdução precoce de outros alimentos na dieta de bebês com menos de 2 anos está associada a uma menor absorção de nutrientes importantes do leite materno, como o ferro e o zinco.
03. A transmissão sanguínea do HIV associada ao uso de drogas injetáveis é um meio ineficaz de transmissão do HIV, devido ao uso compartilhado de seringas e agulhas.
04. Frequentemente, a dengue relacionada ao trabalho ocorre em trabalhadores que exercem atividades em zonas endêmicas – como os profissionais que atuam em trabalhos de saúde pública – onde a exposição ocupacional do trabalhador ao bacilo que causa essa doença pode ser identificada.
05. A vacina BCG – ID é aplicada em dose única e evita formas graves de Tuberculose.
06. Diabetes Mellitus é o nome dado a um conjunto de mais de cem doenças causadas pelo crescimento desordenado de células no corpo humano. Dividindo-se rapidamente, estas células agrupam-se formando tumores, que invadem tecidos e podem invadir órgãos vizinhos e até distantes da origem do tumor (metástases).
07. Alta viremia e imunodeficiência avançada são fatores que aumentam o risco de transmissão do HIV em uma relação sexual.
08. A promoção do uso de preservativos e a promoção do uso de agulhas e seringas esterilizadas ou descartáveis são exemplos de estratégias de prevenção empregadas pelos programas de controle do HIV e Aids exclusivamente entre pessoas que utilizam drogas injetáveis.
09. A 1ª dose da vacina Pentavalente (DTP + HB + Hib) evita Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, Meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo B.
10. As 2 doses da vacina SRC (tríplice viral) tem por objetivo evitar as infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18.
11. O vírus que causa a dengue possui quatro variações, classificadas como DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. A pessoa infectada adquiriu um destes tipos. Se essa pessoa contrair a doença outras vezes e por outros tipos do vírus, aumentam as chances de desenvolver a dengue hemorrágica ou a dengue com complicações.
12. A baciloscopia de escarro para diagnóstico da tuberculose deve ser realizada em duas amostras: uma coletada no momento da identificação da pessoa com sintoma respiratório e outra amostra na manhã do dia seguinte, preferencialmente ao despertar, independentemente do resultado da primeira amostra.
13. A suscetibilidade ao vírus da Dengue é restrita a indivíduos imunodeficientes, sendo mais comum o desenvolvimento da forma grave da doença em pessoas com o sistema imunológico comprometido por outra infecção viral.
14. São sintomas comuns da infecção pelo Novo Coronavírus (Covid-19): coriza, tosse, dor de garganta e dificuldade para respirar.
15. A todos os pacientes com diabetes, é recomendável a prática regular de atividade física. Esse comportamento melhora o controle metabólico e aumenta a necessidade de hipoglicemiantes, além de ajudar a promover o emagrecimento nos pacientes obesos.

16. Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, e em sua saúde no longo prazo, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe.
17. As úlceras resultantes de infecções sexualmente transmissíveis – como cancro mole, sífilis e herpes genital – mitigam muito o risco de transmissão do HIV entre pacientes portadores dessas doenças.
18. Para o bebê em fase de amamentação, a introdução precoce de outros alimentos está associada a um menor número de episódios de diarreia e a um maior número de hospitalizações por doença respiratória.
19. A Dengue clássica apresenta um espectro clínico reduzido, ou seja, seus sintomas são limitados, o que facilita o diagnóstico dessa infecção. Assim, as principais doenças a serem consideradas no diagnóstico diferencial são: gripe, rubéola, sarampo, candidíase e outras infecções virais, bacterianas e exantemáticas.
20. A presença de outra DST – principalmente as ulcerativas – é um fator que aumenta o risco de transmissão do HIV em uma relação sexual.
21. O processo de atendimento corresponde ao ato de atender, ou seja, ao ato de prestar atenção às pessoas com as quais mantemos contato. Quem pratica o atendimento deve ser responsável, adotando um estado de espírito baseado na gentileza.
22. A educação popular em saúde compreende um conjunto de práticas educativas que têm por objetivo inibir o autocuidado entre os indivíduos das comunidades rurais do Brasil.
23. O paciente com dengue clássica deve ser orientado a praticar exercícios diariamente e reduzir o consumo de água para que a bactéria causadora da infecção possa ter seu ritmo de reprodução desacelerado.
24. O controle do sangue e derivados e a adoção de cuidados na exposição ocupacional a material biológico são exemplos de estratégias de prevenção empregadas pelos programas de controle do HIV e Aids, especialmente entre profissionais de saúde.
25. Nas localidades não infestadas, quando for detectada a presença do *Aedes aegypti*, deverá ser realizada a delimitação de foco, ou seja, a partir do foco encontrado, serão realizados a pesquisa larvária e o tratamento focal em 100% dos imóveis incluídos em um raio de 300m, abrindo-se novos raios a cada foco detectado.
26. A 1ª dose da vacina Pneumocócica 10 (valente) evita doenças invasivas e otite média aguda causadas por *Streptococcus pneumoniae* sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F.
27. O conceito de “bom atendimento” é aquele que procura verdadeiramente atender às expectativas do público. Por isso, é bom ter em mente que ele é, antes de tudo, a razão do seu trabalho.
28. O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e desassociadas de complicações ou disfunções de qualquer órgão. Assim, em geral, um indivíduo pode passar toda a vida com um quadro de diabetes grave sem, no entanto, apresentar qualquer sintoma perceptível.
29. A introdução precoce de outros alimentos na dieta do bebê está associada ao risco de desnutrição se os alimentos introduzidos forem nutricionalmente inferiores ao leite materno, como, por exemplo, quando os alimentos são muito diluídos.
30. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
31. A principal forma de exposição ao Vírus da Imunodeficiência Humana em todo o mundo é a sexual, através das relações sem o uso de preservativo.
32. O aleitamento materno complementado ocorre quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo.
33. Para prestar um atendimento de qualidade, é necessário demonstrar boa vontade, profissionalismo e, acima de tudo, respeito ao público, buscando sempre ouvir o que as pessoas têm a dizer.
34. É recomendável que as gírias sejam evitadas no ambiente de trabalho. Claro que é compreensível falar uma ou outra gíria, mas carregar o vocabulário com elas torna a fala inconveniente para o usuário dos serviços e para os demais colaboradores.
35. Evitar a proliferação do mosquito *Aedes Aegypti* é a melhor forma de prevenção da dengue. Isso pode ser feito eliminando a água armazenada em locais que podem se tornar possíveis criadouros do vetor, como em vasos de plantas, pneus e garrafas.
36. São sintomas comuns do câncer de pulmão a tosse e o sangramento pelas vias respiratórias.
37. O aleitamento materno exclusivo ocorre quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.
38. Uma das ações do Agente Comunitário de Saúde (ACS) é estimular o aleitamento materno, enfatizando a importância do aleitamento exclusivo até os seis meses de idade. O ACS deve registrar mensalmente se a criança está amamentando, durante todo o período em que a criança fizer uso de aleitamento materno. Esse registro será feito na parte inferior do gráfico peso-idade, logo abaixo do número do mês correspondente.
39. Toda pessoa que foi exposta ao caso índice ou caso fonte, no momento da descoberta do caso de tuberculose é considerada como contato. A avaliação do risco de infecção dos contatos de tuberculose deve ser individualizada, considerando a forma da doença do caso índice, o ambiente e o tempo de exposição.

40. Praticar, sem preservativo, relação anal receptiva ou relação sexual durante a menstruação são formas de aumentar o risco de transmissão do HIV em uma relação sexual.
41. As ações de educação em saúde partem do pressuposto de que o cidadão já possui todos os conhecimentos necessários para cuidar da própria saúde e, portanto, não precisa adquirir novas informações.
42. A primeira manifestação da Dengue clássica compreende o aparecimento de manchas vermelhas nos órgãos genitais, cefaleia, mialgia, prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor retroorbital, náuseas e epifora.
43. O principal resultado esperado das ações de educação em saúde é a redução do interesse da população sobre as formas de promover os cuidados com a saúde.
44. A gonorreia é uma doença sexualmente transmissível, proveniente da bactéria *Neisseria gonorrhoeae*, que afeta indivíduos através de gotículas de saliva ou das lágrimas. Os sintomas dessa infecção aparecem entre doze e dezoito meses após o contato com material biológico contaminado.
45. No aleitamento materno predominante, a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.
46. A qualificação da Estratégia Saúde da Família e de outras estratégias de organização da Atenção Básica deverá seguir as diretrizes da Atenção Básica e do SUS.
47. Os preservativos masculinos e femininos são barreiras comprovadamente efetivas contra o HIV, e o uso correto e consistente destes métodos pode reduzir substancialmente o risco de transmissão do HIV e das outras DST.
48. Um dos objetivos primários da Estratégia Saúde da Família é promover a desestruturação das ações da Atenção Básica e torná-las ineficientes.
49. Em relação ao Novo Coronavírus (Covid-19), é correto afirmar que os vírus podem se propagar de pessoa para pessoa por meio de gotículas do nariz ou da boca que se espalham quando alguém doente tosse ou espirra.
50. A Estratégia Saúde da Família busca reduzir a resolutividade e o impacto dos serviços de saúde nas pessoas, especialmente quando elas moram em comunidades rurais ou são beneficiárias de programas sociais.
51. Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe.
52. Ao atender o público, é necessário informar e esclarecer as dúvidas, além de agilizar o atendimento e eventualmente acalmar os ânimos quando necessário.
53. A 1ª dose da vacina HPV quadrivalente evita Sarampo, Caxumba e Rubéola.
54. No Câncer de Pulmão em fumantes, o ritmo habitual da tosse é alterado e aparecem crises em horários incomuns para o paciente. A Pneumonia de repetição pode, também, ser uma manifestação inicial da doença.
55. Na Ficha B-GES, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) cadastra e acompanha mensalmente o estado de saúde das gestantes. Em cada visita, no campo correspondente ao mês da gestação, o ACS deve anotar as letras D (desnutrida) e N (nutrida) para registrar o estado nutricional da gestante. O estado nutricional pode ser avaliado através da "curva peso x idade gestacional" que consta do cartão da gestante ou através da fita braquial.
56. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social.
57. A educação em saúde é um processo subjetivo de desestímulo à busca pela qualidade de vida na população. Através dela, os profissionais de saúde e a população reúnem-se para debater problemas concretos e adotam medidas para ampliar a propagação de doenças e agravos à saúde em um território.
58. Comparativamente aos demais indivíduos sem diabetes, as doenças isquêmicas cardiovasculares são menos frequentes e menos precoces em indivíduos com diabetes.
59. A educação permanente em saúde desestimula a população a buscar a resolução de problemas concretos de saúde entre os cidadãos.
60. O aleitamento materno exclusivo ocorre quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite misturados.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 61 a 80)

Julgue os itens subsequentes.

61. Para fazer uma receita, foram utilizados 4/16 dos ovos disponíveis em uma cozinha. Assim, é correto dizer que 25% de todos os ovos foram utilizados na elaboração dessa receita.
62. Do ponto de vista da gramática normativa, o enunciado seguinte não é aceitável: "ele trabalhou arduamente durante toda a semana".
63. Se em uma garrafa há 1 litro de água e em um tanque há mil litros, então o volume da garrafa corresponde a 0,00001% do volume do tanque.
64. Considere que R\$ 157,00 era o preço inicial de um determinado produto. Certo dia, foi aplicado um desconto promocional de R\$ 26,00 sobre esse preço. Assim, para voltar ao seu preço inicial, é necessário aplicar um aumento de preço maior que 14,667% sobre esse produto.
65. Estão corretas as seguintes grafias da conjugação do verbo Pôr: ponho, pões, põe, pomos, pones, põem.
66. Um determinado produto é vendido por R\$ 442 em uma loja e por R\$ 84 a menos na loja vizinha. Com base nessa informação, é correto afirmar que o preço desse produto na primeira loja é 19,80% maior do que na loja vizinha.

67. Um carro do modelo X consegue percorrer a distância de 300 quilômetros consumindo apenas 20 litros de etanol. Assim, com apenas 1 litro desse combustível, esse veículo consegue percorrer quinze quilômetros.
68. A fração $1/3$, se reproduzida em forma de porcentagem, resultará em uma dízima periódica.
69. Na Língua Portuguesa, as palavras "censo" e "senso" possuem a pronúncia idênticas, mas carregam significados distintos: enquanto censo refere-se a um estudo estatístico; senso está relacionado a juízo, prudência e percepção, por exemplo.
70. Graficamente, acentuam-se os seguintes monossílabos tônicos: chá e pá.
71. A fração $1/17$ representa um valor maior que 4% e menor que 7,33%.
72. Considerando a norma culta da Língua Portuguesa, a grafia dos vocábulos seguintes está correta: reforso, hipinose e elencar.
73. Na Língua Portuguesa, usa-se letra maiúscula no início de uma frase ou oração, no início de um substantivo e nas oxítonas terminadas em sílaba tônica.
74. Considere que, em uma sala, há 1 adulto para cada 4 crianças. Com base nessa informação, é correto afirmar que a porcentagem de adultos corresponde a mais de 24%.
75. Está correta a grafia do trecho seguinte: Maria conquistou seu maior sonho profissional ainda jovem, quanto foi promovida a gerente da fábrica.
76. No trecho "Caminharemos juntos à luz do luar", a concordância verbal foi realizada devidamente, assim como no exemplo: "Todos somos independentes e olho para o futuro".
77. Durante 65 dias, Maria produziu 12 bolos por dia, totalizando uma quantidade X. Se ela tivesse produzido 30 bolos por dia, teria produzido X bolos em menos de 24 dias.
78. Em "Ele correu rapidamente", o verbo deveria estar no plural para concordar com o advérbio.
79. As palavras café, cipó e coração são oxítonas, pois a sílaba tônica se encontra demarcada na última sílaba.
80. O resultado da multiplicação de 50% por 50% é igual a X. Assim, é correto afirmar que 50% de X equivale a um valor maior que 15%.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR

RASCUNHO