

**DOMINGO DE MANHÃ**

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC  
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022**

**MÉDICO (GASTROENTEROLOGIA)**

**INSTRUÇÕES**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
  - contém 40 (quarenta) questões;
  - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1\_21/10/2022 15:15:13



**POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**

**QUESTÃO 01** – De acordo com o disposto no Art. 2º da Portaria nº 2.436/2017, a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e \_\_\_\_\_ que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, \_\_\_\_\_, redução de danos, cuidados paliativos e \_\_\_\_\_ em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) coletivas – reabilitação – vigilância
- B) comunitárias – recuperação – regulação
- C) coletivas – recuperação – vigilância
- D) comunitárias – reabilitação – regulação
- E) coletivas – reabilitação – regulação

**QUESTÃO 02** – Em relação às atribuições comuns dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Gerenciar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.
- ( ) Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria.
- ( ) Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) F – F – F.
- E) V – V – F.

**QUESTÃO 03** – Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos princípios orientadores do processo de regulação de acordo com a Portaria nº 399/GM/MS/2006.

- A) Cada prestador poderá responder a vários gestores.
- B) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, deve ser pactuada na CIB (Comissão Intergestores Bipartite).
- C) A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor estadual.
- D) A regulação dos prestadores de serviços deve ser preferencialmente do município, conforme desenho da rede da assistência pactuado na CIB.
- E) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, pode ser operada pelo gestor municipal com cogestão do estado e representação dos municípios da região.

**QUESTÃO 04** – Assinale a alternativa correta quanto às disposições essenciais que deverão constar no Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, de acordo com o Decreto nº 7.508/2011.

- A) As responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante os serviços de saúde no processo de regionalização.
- B) A identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
- C) A disponibilidade de recursos financeiros do Ministério da Saúde para sua execução.
- D) A adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas na RENAME.
- E) A oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito nacional.

**QUESTÃO 05** – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o direito à saúde, de acordo com a Lei nº 10.741/2003.

- A) O cadastramento da população idosa em base territorial será uma das formas para prevenção e manutenção da saúde.
- B) Os planos de saúde poderão ter cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- C) Os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- D) É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos.
- E) A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 06** – No campo da ética médica e da bioética, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) O Código de Ética Médica, a respeito de ensino e pesquisa médica, estabelece que o acesso aos prontuários será permitido aos médicos, em estudos retrospectivos com questões metodológicas justificáveis e autorizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
- ( ) É vedado ao médico, relativamente ao ensino e pesquisa médica estabelecidos pelo Código de Ética Médica, deixar de declarar relações com a indústria de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos, implantes de qualquer natureza e outras que possam configurar conflitos de interesse, ainda que em potencial.
- ( ) Para ajudar no desempenho ético da prática médica da atenção à saúde do paciente, é possível orientar-se pelos princípios bioéticos da igualdade ("fazer o bem"), autonomia ("a pessoa escolhe"), justiça ("priorizar com equilíbrio"), e não maleficência ("evitar danos").

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) F – F – V.
- D) F – V – F.
- E) V – F – V.

**QUESTÃO 07** – No campo da epidemiologia, um(a) médico(a) conduziu um estudo em um pequeno número de casos identificados em um centro de referência especializado em doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Os casos foram acompanhados ao longo do tempo, durante dez meses, para descrever o curso clínico da Covid-19, os tratamentos instituídos e o estado atual da doença, com uma amostra de casos prevalentes, não necessariamente representativa dos casos incidentes. O desenho desse estudo é mais especificamente relacionado com:

- A) Estudo de caso-controle.
- B) Estudo de coorte histórica.
- C) Ensaio clínico randomizado.
- D) Regra de predição clínica.
- E) Série de casos.

**QUESTÃO 08** – Um teste diagnóstico é geralmente compreendido como um teste realizado em laboratório, porém pode ser aplicado às informações clínicas obtidas pela anamnese, pelo exame clínico e por procedimentos de imagem. Sobre os testes ou exames diagnósticos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Um teste sensível deve ser escolhido quando houver uma penalidade importante ao deixar de detectar uma doença, pois serve para descartar uma condição.
- B) As curvas ROC (*Receiver Operator Characteristic*) são úteis para comparar testes alternativos para um mesmo diagnóstico e a acurácia global de um determinado teste pode ser descrita como a área sob a curva ROC.
- C) As razões de verossimilhança são uma forma alternativa de descrever o desempenho de um teste diagnóstico, podendo ser usadas em múltiplos níveis de resultados de testes.
- D) A incidência da doença, também chamada de probabilidade anterior ou pré-teste, é a probabilidade de doença antes do resultado do teste ser conhecido.
- E) Os testes executados em série, ou consecutivos, como consequências tendem a diminuir a sensibilidade e a aumentar a especificidade.

**QUESTÃO 09** – A respeito do tratamento com fármacos anti-hipertensivos e seus respectivos efeitos adversos mais comuns, analise as assertivas abaixo:

- I. Di-hidropiridinas – cefaleia, edema periférico e palpitação.
- II. Inibidores da ECA – hipocalemia e tosse seca.
- III. Diuréticos tiazídicos – hiperuricemia e hipocalemia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 10** – Uma atleta amadora com 22 anos de idade, enquanto jogava futebol, ao correr velozmente buscando alcançar a bola, sofreu uma queda brusca devido à perda transiente da consciência, com perda correspondente do tônus postural, seguida de recuperação espontânea e total. No exame médico imediato, estava lúcida, orientada, sem traumatismo aparente e sem dispneia. Negava história prévia de sintomas, de eventos semelhantes, de jejum e não fazia uso de fármacos ou estimulantes. Na investigação diagnóstica de síncope dessa paciente, qual o achado de seu eletrocardiograma será mais preocupante, suscitando uma investigação mais aprofundada?

- A) Bradicardia sinusal.
- B) Onda P bifásica em V1, com pequena deflexão positiva inicial e pequena deflexão negativa terminal.
- C) Onda P positiva na derivação II e invertida em aVR.
- D) Frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto.
- E) Intervalo QT corrigido de 480 ms.

**QUESTÃO 11** – A respeito de doenças cerebrovasculares que devem ser encaradas como situações de emergência médica, analise as seguintes assertivas:

- I. A etiologia do acidente vascular cerebral isquêmico pode ser classificada pelos critérios TOAST (*Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment*) em cardioembólico, aterotrombótico, lacunar, outras etiologias e indeterminado.
- II. Fontes potenciais de alto risco para cardioembolia, segundo os critérios TOAST, incluem a prótese valvar sintética e o trombo ventricular esquerdo após infarto agudo do miocárdio.
- III. O delirium sem demência prévia ou sobreposto a ela, a convulsão e os tumores intracranianos estão entre os diagnósticos mais confundidos com acidente vascular cerebral.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 12** – No âmbito das estratégias preventivas para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou sua 3ª Reunião de Alto Nível sobre Cobertura Universal de Saúde em 2018 e foi estabelecida a chamada Agenda 5x5 para enfrentamento dessas DCNTs. As cinco doenças incluídas são as cardiovasculares, respiratória crônica, diabetes, câncer e \_\_\_\_\_. Os cinco fatores de risco incluem alimentação inadequada, atividade física inadequada, consumo prejudicial de álcool, tabagismo e \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) transtornos mentais – poluição atmosférica
- B) doenças renais – trabalho fatigante
- C) transtornos comportamentais – direção veicular descuidada
- D) doenças endócrinas – destinação inadequada de lixo
- E) doenças de pele – uso abusivo de medicamentos

**QUESTÃO 13** – Na Gastreenterologia dispomos de vários scores de avaliação. Sobre esses scores, é correto afirmar que:

- A) O MELD não usa critérios subjetivos.
- B) O índice de Maddrey utiliza os níveis de hemoglobina nos seus cálculos.
- C) O APACHE II só utiliza variáveis laboratoriais.
- D) O score de Rockall nos prediz mortalidade na pancreatite aguda.
- E) No CHILD C, o transplante hepático é contraindicado.

**QUESTÃO 14** – Na hemorragia digestiva aguda, o estigma endoscópico classificado como \_\_\_\_\_, equivale ao achado de \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Forrest IIA – sangramento em jato
- B) Glasgow 10 pontos – úlcera duodenal
- C) Forrest IB – sangramento em porejamento
- D) Sakita A2 – mamilo de variz gástrica
- E) Mallory-Weiss – vaso visível

**QUESTÃO 15** – Um marcador genético da doença celíaca é a positividade para:

- A) HLA DR3 ou DR4.
- B) C282Y e H65C.
- C) HLA DQ2 e HLA DQ8.
- D) NOD2/CARD15.
- E) O gene CFTR.

**QUESTÃO 16** – Sobre Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), é correto afirmar que:

- A) O uso de procinético é recomendado em paciente com sintomas típicos de DRGE.
- B) O Achado de Esofagite erosiva Los Angeles A não permite o diagnóstico de DRGE.
- C) A terapia com sucralfato não pode ser prescrita em gestantes.
- D) A pHmetria deve ser realizada rotineiramente em paciente com esôfago de Barrett.
- E) DRGE com sintomas típicos podem ser tratados com baclofen, 1 vez ao dia por 8 semanas.

**QUESTÃO 17** – Sobre a Gastrite Autoimune, é correto afirmar que:

- A) Está associada à deficiência da Niacina.
- B) Existe atrofia predominante das células G do antro gástrico.
- C) Está associado a desenvolvimento de tumores neuroendócrinos.
- D) Pode levar a distúrbios neurológicos, como síndrome de Parkinson.
- E) Está associado à síndrome de neoplasia endócrina múltipla do tipo II.

**QUESTÃO 18** – Sobre cirrose, analise as assertivas abaixo:

- I. Pacientes cirróticos não devem ser anticoagulados devido ao risco de hemorragia digestiva alta.
- II. O uso de estatinas está contraindicado no paciente cirrótico com varizes de esôfago.
- III. O consumo de café pode reduzir o risco de desenvolver hepatocarcinoma.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

**QUESTÃO 19** – Homem previamente hígido, 62 anos, com história de 1 dia com dor abdominal baixa aguda, náuseas e vômitos. TC abdominal confirmou o diagnóstico de diverticulite colônica aguda do lado esquerdo sem complicações. Sobre esse caso, é INCORRETO afirmar que:

- A) Deve ser tratado com ácido 5-aminossalicílico, ou rifaximina para prevenir diverticulite recorrente.
- B) Uma colonoscopia deve ser realizada em 6 a 8 semanas após resolução completa dos sintomas.
- C) Uma dieta líquida clara é recomendada durante a fase aguda da diverticulite.
- D) Após recuperação, deve evitar uso regular ( $\geq 2$  vezes por semana) de anti-inflamatórios não esteroidais.
- E) Complicações da diverticulite, exceto formação de fístula, ocorrem mais no primeiro episódio de diverticulite do que nos episódios subsequentes.

**QUESTÃO 20** – No paciente com hemorragia digestiva baixa, quando o \_\_\_\_\_ pontua \_\_\_\_\_, nesse cenário, a investigação a nível \_\_\_\_\_ é adequada.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Escore de Boston –  $< 2$  – ambulatorial
- B) Critério de Navarro –  $\geq 8$  – hospitalar
- C) AIMS65 –  $< 1$  – ambulatorial
- D) Glasgow-Blatchford –  $> 2$  – hospitalar
- E) Escore de Oakland –  $\leq 8$  – ambulatorial

**QUESTÃO 21** – O Protocolo de Seattle corresponde a:

- A) 2 biópsias de corpo e antro para avaliar a metaplasia gástrica e ou atrofia.
- B) 4 biópsias de segunda porção duodenal e bulbo para identificação de doença celíaca.
- C) 4 biópsias a cada 1-2 cm em mucosa de aspecto colunar no esôfago.
- D) Biópsias colônicas a cada 10 cm em paciente com retocolite ulcerativa.
- E) Biópsias de áreas lugol negativas em esôfago, nos pacientes com câncer de cabeça e pescoço.

**QUESTÃO 22** – São critérios de dispepsia funcional, tipo dor epigástrica, segundo o ROMA IV, EXCETO:

- A) Dor ou queimação localizada no epigástrio.
- B) Sem alívio pela defecção ou eliminação de flatos.
- C) Caráter intermitente da dor.
- D) Critérios presentes há 3 semanas, com início há pelo menos 6 meses.
- E) A dor não é generalizada ou localizada em outras regiões abdominais ou torácicas.

**QUESTÃO 23** – Sobre hepatite medicamentosa (DILI), é correto afirmar que:

- A) A presença de comorbidades, como obesidade e diabetes, estão associadas a maior severidade da DILI.
- B) A lesão é idiossincrática, estando associada à dose e ao tempo de uso do fármaco.
- C) O impacto da idade, sexo, raça ou etnia do paciente na suscetibilidade ao DILI está bem estabelecido.
- D) DILI só é suspeita se a AST ou ALT estiverem  $> 5X$  o limite superior da normalidade.
- E) Normalmente, DILI aparece dentro de 6 semanas após o início de um novo medicamento.

**QUESTÃO 24** – Dos anti-hipertensivos abaixo, qual está fortemente associado ao desenvolvimento de enteropatia?

- A) Carvedilol.
- B) Perindopril.
- C) Olmesartana.
- D) Clortalidona.
- E) Metildopa.

**QUESTÃO 25** – Sabendo que a principal causa de úlcera péptica é a infecção pelo *Helicobacter pylori* (HP), é correto afirmar que:

- A) A transmissão se dá unicamente pela via fecal-oral.
- B) Os humanos são o único reservatório e fonte primária de transmissão do HP.
- C) Em crianças com menos de 10 anos, a prevalência da infecção é menor que 50%.
- D) O nível socioeconômico da população não interfere nas taxas de prevalência da infecção do HP.
- E) No Brasil, a taxa de infecção na população rural é menor que na urbana.

**QUESTÃO 26** – Mulher de 25 anos, previamente hígida, procura atendimento para realização de exames complementares. A única informação relevante é que o pai tinha hemocromatose e realizava sangrias terapêuticas. Analise as seguintes orientações:

- I. Exames de screening para hemocromatose hereditária só são recomendados para familiares do sexo masculino.
- II. Os exames de screening só são recomendados após os 30 anos.
- III. Saturação da transferrina e ferritina sérica são os exames de screening recomendados.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 27** – Paciente com histórico de lesão submucosa gástrica localizada na parede anterior do antro gástrico foi submetido à ecoendoscopia que demonstrou tratar-se de uma lesão hiperecoica, nitidamente de origem na camada 3 da parede gástrica, medindo 2,0 cm de diâmetro. É correto afirmar que se trata de:

- A) Leiomioma, e deve ser encaminhado para ressecção cirúrgica com margens oncológicas.
- B) Pâncreas ectópico, e não necessita de acompanhamento.
- C) Tumor neuroendócrino, e deve ser submetido a biópsias.
- D) Lipoma, e não necessita acompanhamento.
- E) GIST, e deve ser submetido à biópsia por agulha fina.

**QUESTÃO 28** – Na terapia de manutenção em um paciente com doença de Crohn, é INCORRETO administrar:

- A) Prednisona.
- B) Mesalazina.
- C) Metotrexato.
- D) Infliximab.
- E) Budesonida.

**QUESTÃO 29** – São consideradas complicações locais da pancreatite aguda, EXCETO:

- A) Trombose da veia porta.
- B) Isquemia mesentérica.
- C) Obstrução gástrica.
- D) Nódulo de Virchow.
- E) Síndrome compartimental abdominal.

**QUESTÃO 30** – Paciente de 77 anos, com histórico de diabetes mellitus, AVC isquêmico há 6 meses, insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, utiliza carvedilol, enalapril espirolactona, AAS 100 mg/dia e rivaroxabana é internada com hematêmese e melena, com PA 100/80 e FC 84. Em relação a esse caso, é correto afirmar que:

- A) A rivaroxabana deve ser interrompida no momento da admissão, mas não o AAS.
- B) O uso de ácido tranexâmico deve ser prescrito em caso de úlcera Forrest IIa.
- C) O anticoagulante deve ser reiniciado em até 7 dias para diminuir as taxas de ressangramento.
- D) A endoscopia só deve ser realizada após reversão da anticoagulação com antídoto específico.
- E) O paciente deveria estar usando inibidor de bomba de prótons como profilaxia de hemorragia digestiva.

**QUESTÃO 31** – Sobre diarreia do viajante, é INCORRETO afirmar que:

- A) Costuma se manifestar em até 10 dias do retorno de uma viagem.
- B) O risco é maior quando o viajante é procedente de países desenvolvidos.
- C) Causada pelo excesso de secreção e/ou diminuição da absorção de fluidos e eletrólitos.
- D) O uso de antibióticos é útil em reduzir o tempo e a severidade dos sintomas.
- E) O germe mais comum identificado é a *E. coli* entero-hemorrágica.

**QUESTÃO 32** – Em relação aos Pólipos Serrilhados (PS), é correto afirmar que:

- A) Não são considerados precursores do tumor colorretal.
- B) Pólipos hiperplásicos são considerados um tipo de PS.
- C) Pólipos serrilhados sésseis tendem a ocorrer mais em cólon distal.
- D) A síndrome poliposa serrilhada é diagnosticada, em geral, na segunda década de vida.
- E) Pacientes tabagistas tendem a ter prevalência menor de PS que os não tabagistas.

**QUESTÃO 33** – Sobre Budd-Chiari, é correto afirmar que:

- A) Ocorre trombose aguda da veia porta.
- B) Biópsia hepática deve ser sempre realizada para confirmar o diagnóstico.
- C) A anticoagulação deve ser instituída preferencialmente com heparina não fracionada.
- D) O transplante hepático é contraindicado devido à lesão vascular.
- E) Nessa síndrome, a maioria dos nódulos hepáticos são benignos.

**QUESTÃO 34** – No paciente com diagnóstico de síndrome do intestino irritável, com predominância de diarreia, é recomendado administrar, EXCETO:

- A) Citalopram.
- B) Rifaximina.
- C) Loperamida.
- D) Amitriptilina.
- E) Hioscina.

**QUESTÃO 35** – A esofagite eosinofílica exige as biópsias de \_\_\_\_\_ em que se visualiza \_\_\_\_\_ eosinófilos em campo de grande aumento para o seu diagnóstico.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 5 fragmentos do esôfago médio – >25
- B) 2 fragmentos do esfíncter esofágico superior – >15
- C) 1 fragmento a cada 2 cm – >50
- D) 4 fragmentos do esôfago distal – >25
- E) no mínimo 3 fragmentos do esôfago distal e proximal – >15

**QUESTÃO 36** – A ascite de etiologia pós-sinusoidal, na análise do líquido ascítico, encontramos o GASA (Gradiente Soro Ascite) e as proteínas totais, respectivamente, em quais valores?

- A)  $\geq 1,1$  g/dL e  $\geq 1,5$  g/dL.
- B)  $< 1,1$  g/dL e  $< 1,5$  g/dL.
- C)  $\geq 1,1$  g/dL e  $< 2,5$  g/dL.
- D)  $< 1,1$  g/dL e  $\geq 2,5$  g/dL.
- E)  $\geq 1,1$  g/dL e  $\geq 2,5$  g/dL.

**QUESTÃO 37** – O achado nas biópsias duodenais de mucosa intestinal intensamente infiltrada por macrófagos contendo material *Periodic Acid-Schiff* (PAS) positivo e que distorce as vilosidades é compatível com infecção pelo patógeno:

- A) *Giardia lamblia*.
- B) *Entamoeba histolytica*.
- C) *Clonorchis sinensis*.
- D) *Tropheryma whipplei*.
- E) *Mycobacterium avium*.

**QUESTÃO 38** – Sobre colite microscópica, analise as seguintes assertivas:

- I. A colite linfocítica é definida por mais de 20 linfócitos intraepiteliais por 100 células epiteliais de superfície.
- II. A colite colagenosa é definida pela presença de uma banda de colágeno subepitelial que é tipicamente maior que 20 micrômetros.
- III. O quadro clínico é diarreia aquosa não sanguinolenta crônica ou intermitente, com fezes noturnas, urgência fecal, dor abdominal, artralgias e perda de peso.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 39** – Em relação a corpo estranho na via digestiva, é INCORRETO afirmar que:

- A) Não se recomenda realização de RX com contraste baritado para avaliar a localização da obstrução.
- B) Objetos menores que 2,0 X 5,0, que estejam no estômago, podem ser manejados conservadoramente.
- C) A ingestão de baterias em disco causa queimadura elétrica no esôfago.
- D) Em caso de impactação de bolo alimentar no esôfago, nunca se deve empurrar o bolo alimentar para o estômago.
- E) Deve-se realizar endoscopia com urgência (<24 horas) para corpos estranhos pontiagudos no estômago.

**QUESTÃO 40** – Sobre prevenção secundária de sangramento digestivo varicoso, são aceitos os usos de, EXCETO:

- A) Atenolol.
- B) Carvedilol.
- C) Ligadura elástica das varizes.
- D) Propranolol.
- E) Nadolol.