

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022**

MÉDICO (DERMATOLOGIA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_21/10/2022 15:15:13



POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – De acordo com o disposto no Art. 2º da Portaria nº 2.436/2017, a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e _____ que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, _____, redução de danos, cuidados paliativos e _____ em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) coletivas – reabilitação – vigilância
- B) comunitárias – recuperação – regulação
- C) coletivas – recuperação – vigilância
- D) comunitárias – reabilitação – regulação
- E) coletivas – reabilitação – regulação

QUESTÃO 02 – Em relação às atribuições comuns dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Gerenciar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.
- () Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria.
- () Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) F – F – F.
- E) V – V – F.

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos princípios orientadores do processo de regulação de acordo com a Portaria nº 399/GM/MS/2006.

- A) Cada prestador poderá responder a vários gestores.
- B) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, deve ser pactuada na CIB (Comissão Intergestores Bipartite).
- C) A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor estadual.
- D) A regulação dos prestadores de serviços deve ser preferencialmente do município, conforme desenho da rede da assistência pactuado na CIB.
- E) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, pode ser operada pelo gestor municipal com cogestão do estado e representação dos municípios da região.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa correta quanto às disposições essenciais que deverão constar no Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, de acordo com o Decreto nº 7.508/2011.

- A) As responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante os serviços de saúde no processo de regionalização.
- B) A identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
- C) A disponibilidade de recursos financeiros do Ministério da Saúde para sua execução.
- D) A adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas na RENAME.
- E) A oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito nacional.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o direito à saúde, de acordo com a Lei nº 10.741/2003.

- A) O cadastramento da população idosa em base territorial será uma das formas para prevenção e manutenção da saúde.
- B) Os planos de saúde poderão ter cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- C) Os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- D) É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos.
- E) A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – No campo da ética médica e da bioética, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O Código de Ética Médica, a respeito de ensino e pesquisa médica, estabelece que o acesso aos prontuários será permitido aos médicos, em estudos retrospectivos com questões metodológicas justificáveis e autorizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
- () É vedado ao médico, relativamente ao ensino e pesquisa médica estabelecidos pelo Código de Ética Médica, deixar de declarar relações com a indústria de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos, implantes de qualquer natureza e outras que possam configurar conflitos de interesse, ainda que em potencial.
- () Para ajudar no desempenho ético da prática médica da atenção à saúde do paciente, é possível orientar-se pelos princípios bioéticos da igualdade ("fazer o bem"), autonomia ("a pessoa escolhe"), justiça ("priorizar com equilíbrio"), e não maleficência ("evitar danos").

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) F – F – V.
- D) F – V – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 07 – No campo da epidemiologia, um(a) médico(a) conduziu um estudo em um pequeno número de casos identificados em um centro de referência especializado em doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Os casos foram acompanhados ao longo do tempo, durante dez meses, para descrever o curso clínico da Covid-19, os tratamentos instituídos e o estado atual da doença, com uma amostra de casos prevalentes, não necessariamente representativa dos casos incidentes. O desenho desse estudo é mais especificamente relacionado com:

- A) Estudo de caso-controle.
- B) Estudo de coorte histórica.
- C) Ensaio clínico randomizado.
- D) Regra de predição clínica.
- E) Série de casos.

QUESTÃO 08 – Um teste diagnóstico é geralmente compreendido como um teste realizado em laboratório, porém pode ser aplicado às informações clínicas obtidas pela anamnese, pelo exame clínico e por procedimentos de imagem. Sobre os testes ou exames diagnósticos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Um teste sensível deve ser escolhido quando houver uma penalidade importante ao deixar de detectar uma doença, pois serve para descartar uma condição.
- B) As curvas ROC (*Receiver Operator Characteristic*) são úteis para comparar testes alternativos para um mesmo diagnóstico e a acurácia global de um determinado teste pode ser descrita como a área sob a curva ROC.
- C) As razões de verossimilhança são uma forma alternativa de descrever o desempenho de um teste diagnóstico, podendo ser usadas em múltiplos níveis de resultados de testes.
- D) A incidência da doença, também chamada de probabilidade anterior ou pré-teste, é a probabilidade de doença antes do resultado do teste ser conhecido.
- E) Os testes executados em série, ou consecutivos, como consequências tendem a diminuir a sensibilidade e a aumentar a especificidade.

QUESTÃO 09 – A respeito do tratamento com fármacos anti-hipertensivos e seus respectivos efeitos adversos mais comuns, analise as assertivas abaixo:

- I. Di-hidropiridinas – cefaleia, edema periférico e palpitação.
- II. Inibidores da ECA – hipocalemia e tosse seca.
- III. Diuréticos tiazídicos – hiperuricemia e hipocalemia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Uma atleta amadora com 22 anos de idade, enquanto jogava futebol, ao correr velozmente buscando alcançar a bola, sofreu uma queda brusca devido à perda transiente da consciência, com perda correspondente do tônus postural, seguida de recuperação espontânea e total. No exame médico imediato, estava lúcida, orientada, sem traumatismo aparente e sem dispneia. Negava história prévia de sintomas, de eventos semelhantes, de jejum e não fazia uso de fármacos ou estimulantes. Na investigação diagnóstica de síncope dessa paciente, qual o achado de seu eletrocardiograma será mais preocupante, suscitando uma investigação mais aprofundada?

- A) Bradicardia sinusal.
- B) Onda P bifásica em V1, com pequena deflexão positiva inicial e pequena deflexão negativa terminal.
- C) Onda P positiva na derivação II e invertida em aVR.
- D) Frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto.
- E) Intervalo QT corrigido de 480 ms.

QUESTÃO 11 – A respeito de doenças cerebrovasculares que devem ser encaradas como situações de emergência médica, analise as seguintes assertivas:

- I. A etiologia do acidente vascular cerebral isquêmico pode ser classificada pelos critérios TOAST (*Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment*) em cardioembólico, aterotrombótico, lacunar, outras etiologias e indeterminado.
- II. Fontes potenciais de alto risco para cardioembolia, segundo os critérios TOAST, incluem a prótese valvar sintética e o trombo ventricular esquerdo após infarto agudo do miocárdio.
- III. O delirium sem demência prévia ou sobreposto a ela, a convulsão e os tumores intracranianos estão entre os diagnósticos mais confundidos com acidente vascular cerebral.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 12 – No âmbito das estratégias preventivas para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou sua 3ª Reunião de Alto Nível sobre Cobertura Universal de Saúde em 2018 e foi estabelecida a chamada Agenda 5x5 para enfrentamento dessas DCNTs. As cinco doenças incluídas são as cardiovasculares, respiratória crônica, diabetes, câncer e _____. Os cinco fatores de risco incluem alimentação inadequada, atividade física inadequada, consumo prejudicial de álcool, tabagismo e _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) transtornos mentais – poluição atmosférica
- B) doenças renais – trabalho fatigante
- C) transtornos comportamentais – direção veicular descuidada
- D) doenças endócrinas – destinação inadequada de lixo
- E) doenças de pele – uso abusivo de medicamentos

QUESTÃO 13 – Sobre vasculopatias, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Livedo racemoso é geralmente encontrado em pacientes com síndrome do anticorpo antifosfolípide.
- () Atrofia alba de Milian é considerada uma vasculopatia trombótica localizada que, ao cicatrizar, deixa área de atrofia branca, que costuma ser dolorosa.
- () Doença de Degos-símile se caracteriza por pequenas lesões papulosas, eritematosas, com depressão central, que envolvem deixando cicatriz atrófica branca com telangiectasias na periferia.
- () Eritromelalgia cursa predominantemente com eritema, calor, dor intolerável nas mãos e nos pés. Piora com exposição ao calor e alivia com o frio.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) V – F – F – V.
- C) F – V – F – V.
- D) F – V – V – F.
- E) V – F – V – F.

QUESTÃO 14 – Em relação ao acometimento de anexos no lúpus eritematoso, é INCORRETO afirmar que:

- A) No Lúpus Eritematoso Cutâneo Crônico (LECC), a alopecia cicatricial ocorre secundária à destruição folicular, caso não haja tratamento apropriado a tempo.
- B) Lesões de Lúpus Eritematoso Cutâneo Subagudo (LECSA) e Agudo (LECA) no couro cabeludo podem gerar alopecia não cicatricial.
- C) O eflúvio telógeno é uma manifestação inespecífica e não é indicativo de atividade de doença.
- D) O uso do antimalárico pode ocasionar barba, cabelos e cílios acinzentados, hiperpigmentação difusa da pele e das bordas ungueais.
- E) Alterações ungueais, como estilhas hemorrágicas, *pitting*, leuconíquia, onicólise, baqueteamento digital e lúnula vermelha podem ser encontradas.

QUESTÃO 15 – Sobre púrpuras, assinale a alternativa correta.

- A) Estão associadas a doenças graves e potencialmente fatais, sendo rara sua ocorrência em condições crônicas comuns e benignas.
- B) A morfologia da púrpura auxilia tanto em sua distinção quanto no mecanismo fisiopatogênico envolvido. Podem ser resultantes de um processo hemorrágico simples, uma hemorragia secundária à inflamação dos vasos ou uma hemorragia oclusiva com secundária inflamação mínima.
- C) As púrpuras pigmentares crônicas e a púrpura hipergamaglobulinemia de Waldenström acometem vasos mais calibrosos da derme e costumam ser bastante inflamatórias.
- D) A vasculite por IgG, mais conhecida como púrpura de Henoch Schönlein, é a vasculite mais comum da infância e geralmente se apresenta como pápulas eritematosas que surgem de forma ascendente, a partir da região distal dos membros inferiores e evoluem para púrpura palpável.
- E) A poliarterite nodosa sistêmica é uma vasculite necrotizante de artérias de grande calibre com glomerulonefrite, associada ao ANCA.

QUESTÃO 16 – Sobre infecções e granulomas não infecciosos, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Sarcoidose.
2. Necrobiose lipoídica.
3. Granuloma anular.

Coluna 2

- () Tem associação com diversas doenças sistêmicas, como diabetes, doença tireoidiana, dislipidemia, infecções (HIV e borreliose) e malignidades.
- () Clinicamente se apresenta como placas irregulares, ovoides, com a periferia violácea, endurecida e com centro atrófico, amarelo e brilhante.
- () Sua apresentação mais comum costuma acometer cabeça e pescoço, áreas periorbital, perinasal e perioral.
- () Uveíte, febre, artrite e linfadenomegalia hilar bilateral podem ocorrer.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1 – 3.
- B) 2 – 2 – 3 – 1.
- C) 3 – 1 – 2 – 1.
- D) 1 – 2 – 1 – 3.
- E) 3 – 2 – 1 – 1.

QUESTÃO 17 – No que diz respeito aos xantomas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O xantoma tuberoso surge como pequenas pápulas, moles, amareladas, eritematosas, localizadas em áreas de pressão. São indolores e se agrupam formando lesões tumorais. Sua presença sugere elevação do colesterol sérico e LDL, mas também pode ser visto com aumento de triglicérides.
- B) O xantoma tendinoso corresponde a nódulos firmes de tamanhos variados e observados em áreas sobre tendões. Estão associados à hipercolesterolemia familiar ou secundária.
- C) O xantoma eruptivo caracteriza-se por múltiplas pápulas, medindo de 1 a 4 mm, amareladas, com halo eritematoso. Ocorre mais comumente sobre pontos de pressão e superfícies extensoras dos braços. Ao contrário dos outros xantomas, pode ser pruriginoso.
- D) Os xantelasma são pápulas poligonais amareladas, localizadas nas pálpebras (mais comumente no canto medial). A grande maioria dos pacientes com xantelasma apresenta dislipidemia, sendo os triglicérides a fração geralmente elevada.
- E) O xantoma estriado palmar apresenta-se como lesões planas, de amarelado a laranja, nas dobras palmares e que ocorrem apenas em pacientes com níveis elevados de colesterol e triglicérides.

QUESTÃO 18 – Genodermatose de herança autossômica recessiva por mutações do gene ABCC6 no cromossomo 16, caracterizada pela mineralização (depósito de cálcio e outros minerais) e degeneração das fibras elásticas. A que condição se refere essa descrição?

- A) Complexo de Carney.
- B) Síndrome de Leopard.
- C) Pseudoxantoma elástico.
- D) Esclerose tuberosa.
- E) Síndrome de Ehlers-Danlos.

QUESTÃO 19 – São alterações ungueais que podem ser encontradas em pacientes com doença renal:

- I. Unhas meio-a-meio (unhas de Lindsay).
- II. Linhas de Muehrcke (dupla linha transversa branca).
- III. Leuconíquia.
- IV. Coiloníquia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20 – Assinale a alternativa que melhor define a Síndrome de Peutz-Jeghers.

- A) Caracterizada por polipose hamartomatosa intestinal e hiperpigmentação perioral típica. As lesões pigmentares são lentigos que se localizam preferencialmente ao redor dos lábios, mucosa oral, língua e nariz.
- B) Caracterizada por polipose adenomatosa intestinal. Na pele, é típico surgirem áreas de hipermelanose lentiginosa, alterações ungueais atróficas e alopecia com características sugestivas da alopecia areata, podendo acometer também sobrancelhas, cílios, região axilar e pubiana.
- C) Caracterizada pela presença de nódulos eritemato-violáceos dolorosos, mais tipicamente encontrados na face anterior da região tibial, presente em até 15% dos pacientes com doença inflamatória intestinal.
- D) Caracterizada pela associação de manchas café-au-lait, sardas axilares e inguinais, neurofibromas cutâneos e neuromas plexiformes.
- E) Nenhuma das alternativas acima define essa síndrome.

QUESTÃO 21 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os diagnósticos às suas características.

Coluna 1

- 1. Herpes genital.
- 2. Cancro duro.
- 3. Cancro mole.

Coluna 2

- () Úlceras dolorosas de borda bem definida que coalescem e apresentam configuração policíclica (coalescência das pequenas lesões circulares que são secundárias às vesículas).
- () Os casos são acompanhados por Linfadenopatia regional, constitui-se de gânglios múltiplos com um de maior dimensão: o "gânglio prefeito".
- () Úlcera única, bem delimitada, redonda ou ovalada, com fundo limpo, vermelho brilhante, geralmente indolor. Sua borda apresenta-se em rampa suave acompanhada ou não de alguma elevação da borda.
- () Úlceras sem infiltração, serpiginosas e subminadas, com fundo "sujo" e linfadenite inguinal inflamatória, dolorosa e geralmente unilateral. A autoinoculação resulta nas chamadas "úlceras de cerco".

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 3 – 3 – 1.
- B) 1 – 2 – 2 – 3.
- C) 1 – 1 – 2 – 3.
- D) 3 – 2 – 2 – 1.
- E) 1 – 3 – 2 – 3.

QUESTÃO 22 – Sobre psicodermatoses e o uso de psicofármacos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A prevalência de comorbidades psiquiátricas é menos frequente em pacientes dermatológicos do que na população em geral.
- B) Os inibidores seletivos de recaptção de serotonina apresentam um bom perfil de segurança e costumam apresentar maior tolerabilidade em relação aos tricíclicos.
- C) Estão descritos entre os efeitos adversos dos antidepressivos tricíclicos: boca seca, constipação, tonturas, visão turva, taquicardia e retenção urinária.
- D) A doxepina é um antidepressivo tricíclico que tem propriedades anti-histamínicas potentes e é usado para pacientes com prurido crônico e urticária, sendo uma opção ao uso de difenidramina e hidroxizine.
- E) Os antipsicóticos podem ser usados principalmente nos transtornos delirantes, que têm como principais exemplos o delírio de parasitose e a dermatite artefacta.

QUESTÃO 23 – Em relação à escabiose, assinale a alternativa correta.

- A) É uma doença reconhecidamente contagiosa cujo principal agente etiológico é o ácaro *Sarcoptes scabiei var. hominis* que afeta homens e animais através de contato e fômites.
- B) O tratamento de escolha é a ivermectina, que pode ser utilizada a partir dos 6 meses de idade.
- C) A escabiose nodular caracteriza-se pela presença de lesões pápulo-nodulares que se localizam na genitália, axilas, tronco e cotovelos. São muito pruriginosas e apresentam boa resposta com uso de permetrina.
- D) A permetrina é um piretroide sintético, eficaz e atóxico, empregado na forma de creme ou loção 5%. Pode ser usado em crianças, adultos, gestantes e nutrízes.
- E) A escabiose do couro cabeludo é uma apresentação comum em adultos e pode acompanhar ou assemelhar-se à dermatite seborreica.

QUESTÃO 24 – Em relação às dermatoses parasitárias, assinale a alternativa correta.

- A) A pediculose do púbis é causada pelo *Pthirus pubis* que parasita os pelos da região genitoanal e, eventualmente, de coxas, tronco, axilas, barba, cílios, supercílios e margens do couro cabeludo. Ao contrário das demais pediculoses, não costuma cursar com prurido.
- B) A tungíase é ocasionada pela *Tunga penetrans* e seu tratamento de escolha consiste no uso de ivermectina 200 µg/Kg de peso em dose única.
- C) A cimidíase provoca lesões urticadas, pruriginosas, muitas vezes em disposição linear. As picadas ocorrem mais comumente em face, pescoço, braços e mãos. Podem ocorrer lesões à distância por sensibilização, inclusive lesões bolhosas.
- D) Os quadros mais graves de miíase cavitária são causados pela espécie *D. hominis* e tem como tratamento padrão a retirada das larvas e o uso de ivermectina a 1% em propilenoglicol.
- E) O agente etiológico mais frequente da larva migrans cutânea é o *Ancylostoma caninum*. A clínica consiste na presença de lesões lineares, salientes, eritematosas e serpiginosas, sendo as áreas mais afetadas tronco, axilas e pênis.

QUESTÃO 25 – Em relação às ceratoses actínicas, assinale a alternativa correta.

- A) Os carcinomas espinocelulares provenientes de ceratoses actínicas apresentam menor risco de metástase.
- B) O 5-fluoracil atua como receptor *tool-like* na expressão de RNA mensageiro de genes imunomodulatórios que induzem a produção de citocinas.
- C) A crioterapia possui os melhores índices de resposta terapêutica, sendo um método eficaz, prático e com bom custo-benefício para o tratamento de campo de cancerização.
- D) O chamado "sinal da bandeira" pode ser observado na histopatologia e decorre da alternância de paraceratose e de hiperkeratose no estrato córneo.
- E) Seu diagnóstico requer a realização de exames complementares, como a microscopia confocal e o exame histopatológico.

QUESTÃO 26 – Qual das alternativas abaixo NÃO é um achado dermatoscópico descrito como essencial nas ceratoses actínicas faciais?

- A) Eritema que forma pseudorede vascular róseo-avermelhada e circunda folículos pilosos.
- B) Áreas brancas sem estruturas, vasos irregulares em ponto e em grampo.
- C) Escamas branco-amareladas.
- D) Vasos finos e ondulados que circundam os folículos.
- E) Aberturas foliculares preenchidas por plugs queratóticos amarelados.

QUESTÃO 27 – Em relação ao melanoma, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O sentido da excisão elíptica deve ser longitudinal quando localizada nos membros e, preferencialmente, no sentido da drenagem linfática nas lesões do tórax.
- B) Para o diagnóstico histopatológico, sempre que possível, o melhor procedimento é a biópsia excisional, uma vez que a biópsia incisional impossibilita o patologista de definir com segurança o grau de invasão histológica do melanoma.
- C) O melanoma acrolentiginoso é o subtipo de melanoma menos comum nos caucasianos, porém, é o mais frequente em indivíduos da raça negra e amarela.
- D) A conduta cirúrgica é o tratamento de escolha para a lesão primária, e as margens cirúrgicas são definidas conforme a espessura de Breslow.
- E) O melanoma nodular é o tipo de melanoma mais frequente em pacientes jovens e o seu crescimento vertical confere uma evolução mais lenta e, conseqüentemente, um melhor prognóstico.

QUESTÃO 28 – Sobre os carcinomas basocelulares, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Nodular.
- 2. Superficial.
- 3. Esclerodermiforme.

Coluna 2

- () Histologicamente, apresenta lóbulos de células basais atípicas distribuídas horizontalmente na derme papilar, conectando-se com a epiderme, com pouca invasão em profundidade.
- () É a forma mais comum de carcinoma basocelular.
- () Apresenta-se normalmente como placa infiltrada com limites mal definidos e presença de telangiectasias.
- () Considerado de comportamento biológico agressivo, mostra células basaloides com arranjo em forma de cordões ou como espículas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 2 – 3.
- B) 2 – 1 – 3 – 3.
- C) 1 – 3 – 2 – 1.
- D) 1 – 1 – 2 – 3.
- E) 3 – 1 – 3 – 2.

QUESTÃO 29 – São definidas como neoplasias epiteliais benignas, EXCETO:

- A) Nevo verrucoso.
- B) Pilomatricoma.
- C) Siringocistoadenoma papilífero.
- D) Fibroepitelioma de Pinkus.
- E) Queratose seborreica.

QUESTÃO 30 – Nesta doença hereditária recessiva ligada ao X, a deficiência da alfa-galactosidase A determina a deposição de glicolípídeos nos pequenos vasos da pele e das vísceras. A lipidúria conduz à doença renal de estágio final. Ocorrem manifestações clínicas, tais como os angioqueratomas cutâneos difusos, o prolapso da valva mitral, distúrbios de condução cardíaca, infarto do miocárdio e acidentes cerebrovasculares. A que condição se refere essa descrição?

- A) Cutis laxa.
- B) Síndrome de Marfan.
- C) Amiloidose.
- D) Doença de Fabry.
- E) Pseudoxantoma elástico.

QUESTÃO 31 – Em relação à utilização da luz de Wood como método semiológico auxiliar para o diagnóstico de algumas dermatoses, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Na pitíriase versicolor, a substância responsável pela fluorescência avermelhada é uma coproporfirina.
- () A tinea capitis, causada pelo *Microsporum canis*, apresenta fluorescência verde-azulada quando iluminada.
- () No eritrasma, a bactéria *Corynebacterium minutissimum* produz porfirinas, que são responsáveis pela fluorescência vermelho-coral brilhante.
- () As infecções por *Pseudomonas* apresentam uma coloração branco-esverdeada brilhante sob a lâmpada de Wood, decorrente da produção de um pigmento hidrossolúvel, a pioverdina.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V – V.
- B) F – F – V – V.
- C) F – V – F – F.
- D) V – V – F – V.
- E) V – F – V – F.

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa que melhor se encaixe nos seguintes achados histopatológicos: hiperqueratose folicular, áreas de orto e paraqueratose horizontal e vertical alternadas, hipergranulose focal e acantose irregular, degeneração de liquefação da basal e infiltrado linfo-histiocitário perivascular na derme.

- A) Psoríase em placas.
- B) Pitíriase rubra pilar.
- C) Dermatite seborreica.
- D) Pitíriase rósea.
- E) Ictiose vulgar.

QUESTÃO 33 – São exemplos de afecções de pele causadas/agravadas pelo frio, EXCETO:

- A) Eritema pérmio.
- B) Crioglobulinemia.
- C) Eritema *ab igne*.
- D) Livedo reticular.
- E) Acrocianose.

QUESTÃO 34 – Em relação às dermatoses da gravidez, assinale a alternativa correta.

- A) O penfigoide gestacional inicia-se no primeiro trimestre da gravidez, e o primeiro episódio ocorre, usualmente, nas multíparas. No início, manifesta-se no abdome (região periumbilical) e depois se estende para dorso, glúteos e membros superiores.
- B) Na erupção polimórfica da gravidez, são característicos o prurido e as lesões em alvo na face, região palmo-plantar e periumbilical.
- C) Na erupção atópica da gravidez, o prurido e as lesões eczematosas predominam nas áreas extensoras e têm início no terceiro trimestre, sem tendência a recorrer nas gestações subsequentes.
- D) Linha alba abdominal, eritema palmar, hiperemia gengival, melasma e *granuloma gravidarum* são exemplos de alterações dermatológicas fisiológicas da gravidez.
- E) Doenças dermatológicas como hidradenite supurativa, dermatite atópica, acne vulgar e psoríase não costumam ser influenciadas, positiva ou negativamente, pela gravidez.

QUESTÃO 35 – Sobre as manifestações dermatológicas associadas à infecção pelo HIV, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A foliculite pustulosa eosinofílica caracteriza-se por lesões disseminadas, assintomáticas, que coalescem formando placas com bordas pápulo-vesiculares. O exame histológico permite distinguir das outras formas de foliculite, e os patógenos microbianos estão presentes.
- B) As neoplasias malignas induzidas pelo dano imunitário causado pelo HIV estão relacionadas a vírus oncogênicos como o vírus Epstein-Barr, o herpes vírus humano tipo 8 e o papiloma vírus humano.
- C) As micoses superficiais no portador de HIV são frequentes e podem produzir manifestações clínicas atípicas e recorrentes.
- D) A dermatite seborreica pode ser uma das primeiras expressões da doença induzida pelo HIV. Acredita-se que esteja associada à reatividade anormal às leveduras do gênero *Malassezia*.
- E) As infecções por herpes vírus são as infecções virais mais comuns em indivíduos HIV positivos. Os dois sorotipos, HSV-1 e HSV-2, podem determinar quadros atípicos, persistentes e agressivos.

QUESTÃO 36 – Em pacientes com alopecia areata, pode-se encontrar os seguintes achados dermatoscópicos:

- I. Cabelos em ponto de exclamação.
- II. Pontos amarelos.
- III. Pontos pretos.
- IV. Pelos velos.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 37 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os sinais clínicos às doenças descritas abaixo.

Coluna 1

1. Sinal de Auspitz.
2. Sinal de Hertoghe.
3. Sinal de Darier.
4. Sinal de Nikolsky.

Coluna 2

- () Necrólise Epidérmica Tóxica.
- () Psoríase.
- () Dermatite atópica.
- () Mastocitose.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 4 – 1 – 3.
- B) 4 – 1 – 2 – 3.
- C) 4 – 1 – 3 – 2.
- D) 3 – 4 – 2 – 1.
- E) 4 – 2 – 1 – 3.

QUESTÃO 38 – Presença de bolha intraepitelial de localização suprabasal com depósitos imunes, especialmente IgG e C3, no epitélio intercelular. Levando em consideração o exame histopatológico e imunofluorescência direta descritos, qual das doenças abaixo melhor se encaixa na descrição?

- A) Pênfigo vulgar.
- B) Penfigoide bolhoso.
- C) Pênfigo foliáceo.
- D) Dermatite herpetiforme.
- E) Epidermólise bolhosa adquirida.

QUESTÃO 39 – Em relação às hidroses, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Na miliária rubra, a oclusão do ducto sudoríparo é intermediária na camada malpighiana.
- B) A doença de Fox-Fordyce afeta as glândulas sudoríparas écrinas e acomete, principalmente, mulheres acima dos 60 anos de idade.
- C) As bromidroses de origem apócrina são as mais frequentes. As principais bactérias envolvidas são as do gênero *Propionibacterium*, *Corynebacterium*, *Micrococcus* e *Staphylococcus*.
- D) A síndrome de Frey caracteriza-se por sudorese e eritema no trajeto do nervo auriculotemporal desencadeados por mastigação e gustação.
- E) A hidradenite supurativa é uma afecção inflamatória crônica que acomete axilas e virilhas e, menos comumente, tórax, nádegas, região perianal, mamas e pescoço. É mais comum em mulheres jovens e há forte associação com tabagismo.

QUESTÃO 40 – São classificadas histopatologicamente como paniculites predominantemente lobulares, EXCETO:

- A) Poliarterite nodosa cutânea.
- B) Paniculite esclerosante.
- C) Paniculite traumática.
- D) Paniculite lúpica.
- E) Paniculite ao frio.