

CONCURSO PÚBLICO

013. PROVA OBJETIVA

ANALISTA JUDICIÁRIO

ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO | ESPECIALIDADE: MEDICINA (PSIQUIATRIA)

- Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas, e o caderno de prova discursiva.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração das provas objetiva e discursiva é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas e para a transcrição das respostas definitivas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração das provas.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova discursiva, a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

Leia a charge para responder às questões de números 01 e 02.



(Chargista Ricardo Manhães. <https://ndmais.com.br/opiniaio/charges>, 31.03.2023)

01. O diálogo entre os mosquitos permite concluir corretamente que

- (A) os casos confirmados negam de fato o avanço da dengue.
- (B) as medidas de combate à dengue deixam-nos aprensivos.
- (C) o avanço da dengue é fato incontestado e pode recrudescer.
- (D) a dengue é um problema que eles preferem ignorar por ora.
- (E) a disseminação da dengue é algo em que eles não creem.

02. Na frase – E se bobear chega a mil facinho! –, a palavra “se” tem o mesmo emprego que a destacada em:

- (A) O agente de saúde visitou as casas e queria saber **se** as famílias estavam tomando todas as precauções necessárias para combater a dengue.
- (B) Os moradores do local resolveram ajudar no combate à dengue e **se** puseram a procurar os focos do mosquito, eliminando-os o mais rápido possível.
- (C) A população prometeu acabar com a dengue no bairro e, depois de muita ação contra os focos da doença, alcançaram seu objetivo e **se** abraçaram felizes.
- (D) Muitos focos da dengue foram eliminados em vários bairros da cidade, encontrando-**se** os mosquitos em locais onde pensavam que eles não estariam.
- (E) O combate à dengue dependerá de todos, **se** houver empenho para exterminar o mosquito, que facilmente prolifera nos locais onde há água parada.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 07.

Dengue prevista

A dengue é uma doença periódica e cíclica: os casos crescem no verão e há picos epidêmicos a cada 4 ou 5 anos. Trata-se, portanto, de enfermidade de atuação previsível. Supõe-se que o poder público se adiantaria com medidas de prevenção e tratamento. Contudo, há décadas os números de casos e mortes só aumentam no Brasil.

Entre 2000 e 2010, foram registrados 4,5 milhões de ocorrências e 1.869 óbitos. Na década seguinte, os números saltaram para 9,5 milhões e 5.385, respectivamente. O primeiro semestre deste ano registra 1,4 milhão de casos, ante 1,5 milhão em 2022. A tendência é piorar.

Segundo a OMS, urbanização descontrolada e sistema sanitário precário contribuem para o descontrole da moléstia.

No Brasil, cerca de 50% da população não tem acesso a redes de esgoto, em grande parte devido à ineficiência estatal, que só agora começa a mudar com o novo marco do setor. E o desmatamento para a construção de moradias irregulares grassa nos grandes centros. A dimensão de áreas verdes derrubadas para esse fim na cidade de São Paulo atingiu, nos primeiros dois meses de 2023, 85 hectares.

Neste ano, o município já conta com 11.444 casos de dengue – 3,7% a mais em relação ao mesmo período de 2022. Dez pessoas morreram, o maior número em oito anos, quando houve pico epidêmico.

A OMS ressaltou a importância da vacinação. Mas, devido à burocracia, o Brasil protela a distribuição do imunizante japonês Qdenga – já aprovado para venda pela Anvisa – no sistema público de saúde.

O combate à dengue deve ser contínuo, não apenas no verão, e em várias frentes complementares (saúde, infraestrutura e moradia). Com o alerta da OMS, espera-se que o poder público, local e federal, se prepare para receber as consequências do fenômeno climático El Niño.

(Editorial. *Folha de S. Paulo*, 27.07.2023. Adaptado)

03. O editorial enfatiza que o aumento dos casos de dengue é

- (A) improvável, o que dispensa o poder público de organizar os mecanismos de prevenção, como a vacinação da população com o imunizante japonês Qdenga.
- (B) desesperador, aumentando a insegurança da população que se vê acuada nos picos epidêmicos da doença, mesmo com prevenção e tratamento.
- (C) sazonal, dispensando atenção sistemática das instâncias governamentais, uma vez que os picos epidêmicos têm sido satisfatoriamente controlados.
- (D) esperado, configurando um problema de saúde pública que deve ser combatido por meio de frentes complementares orquestradas pelo poder público.
- (E) insignificante, uma vez que as consequências do El Niño para a população não afetam o sistema de saúde, a infraestrutura e a moradia do país.

04. Considere as passagens:

- E o desmatamento para a construção de moradias irregulares **grassa** nos grandes centros. (4º parágrafo)
- ... o Brasil **protela** a distribuição do imunizante japonês Qdenga... (6º parágrafo)
- O combate à dengue deve ser **contínuo**... (7º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) difunde-se; prioriza; infrequente.
- (B) combate-se; cancela; intermitente.
- (C) espalha-se; acelera; interminável.
- (D) propaga-se; posterga; ininterrupto.
- (E) amplia-se; retarda; irregular.

05. Na passagem do primeiro parágrafo do texto – **Supõe-se que o poder público se adiantaria com medidas de prevenção e tratamento**. Contudo, há décadas os números de casos e mortes só aumentam no Brasil. –, o trecho destacado e o trecho posterior expressam, correta e respectivamente, sentidos de

- (A) contestação e concessão.
- (B) hipótese e adversidade.
- (C) afirmação e conclusão.
- (D) hipótese e comparação.
- (E) afirmação e explicação.

06. A reescrita de informações do texto em que se atende à norma-padrão de concordância verbal é:

- (A) São Paulo é um desses grandes centros que convivem com o desmatamento para a construção de moradias.
- (B) Há picos epidêmicos da dengue a cada 4 ou 5 anos. Tratam-se, portanto, de situações de atuação previsível.
- (C) Ocorre a cada 4 ou 5 anos os picos epidêmicos da dengue, por isso é enfermidade de atuação previsível.
- (D) Segundo a OMS, devem-se à urbanização descontrolada e ao sistema sanitário precário o descontrole da moléstia.
- (E) Aumenta-se, no verão, os casos de dengue e constata-se picos epidêmicos a cada 4 ou 5 anos.

07. No trecho do primeiro parágrafo – A dengue é uma doença periódica e cíclica: os casos crescem no verão e há picos epidêmicos a cada 4 ou 5 anos. Trata-se, portanto, de enfermidade de atuação previsível. –, os dois-pontos e as vírgulas são empregados, correta e respectivamente, para sinalizar

- (A) a inclusão de um contra-argumento; separar conjunção condicional.
- (B) o resumo das informações precedentes; separar expressão adverbial.
- (C) o detalhamento de uma informação; separar conjunção conclusiva.
- (D) a retificação de uma informação; separar aposto explicativo.
- (E) a inclusão de informação nova; separar oração intercalada.

Leia o texto para responder às questões de números 08 a 10.

Minha empregada, Mme. Thérèse, que já ia se conformando em ser chamada de dona Teresa, caiu doente. Mandou-me um bilhete com a letra meio trêmula, falando em reumatismo. Dias depois apareceu, mas magra, mais pálida e menor; explicou-me que tudo fora consequência de uma corrente de ar. Que meu apartamento tem um *courant d'air* terrível, de tal modo que, _____, chegando em casa, nem teve coragem de tirar a roupa, caiu na cama. “Dói-me o corpo inteiro, senhor; o corpo inteiro.”

O mesmo caso, ajuntou, houve cerca de 15 anos atrás, quando trabalhava em um apartamento que tinha uma corrente de ar exatamente igual _____ essa de que hoje sou sublocatário. Fez uma pausa. Fungou. Contou o dinheiro que eu lhe entregava, agradeceu _____ dispensa do troco. Foi lá dentro apanhar umas pobres coisas que deixara. Entregou-me a chave, fez qualquer observação sobre o aquecedor _____ gás – e depois, no lugar de sair _____ rua, deixou-se ficar imóvel e calada, de pé, em minha frente.

(Rubem Braga, “Dona Teresa”. 200 crônicas escolhidas. Adaptado)

08. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) aquela tarde ... à ... à ... à ... a
- (B) àquela tarde ... à ... à ... a ... a
- (C) aquela tarde ... a ... a ... à ... à
- (D) àquela tarde ... à ... a ... a ... à
- (E) àquela tarde ... a ... a ... a ... à

09. Assinale a alternativa em que o primeiro termo destacado é um pronome com valor possessivo, e o segundo, um adjetivo.

- (A) Mandou-**me** um bilhete com a letra **meio** trêmula, falando em reumatismo.
- (B) O **mesmo** caso, ajuntou, houve cerca de 15 anos **atrás**...
- (C) Entregou-me a chave, fez **qualquer** observação **sobre** o aquecedor...
- (D) ... já ia **se** conformando em ser chamada de dona Teresa, caiu **doente**.
- (E) “Dói-**me** o corpo inteiro, senhor; o corpo **inteiro**.”

10. Nos enunciados reescritos a partir das informações do texto, a colocação pronominal e a regência atendem à norma-padrão em:

- (A) Não fosse a corrente de ar que lhe acometera, Mme. Thérèse já teria-se conformado em ser chamada de dona Teresa.
- (B) Dona Teresa certamente vira-se abalada com a corrente de ar, pois veio no meu apartamento magra, mais pálida e menor.
- (C) Dona Teresa me contou que, há cerca de 15 anos atrás, tinha exposto-se em uma corrente de ar em um outro apartamento.
- (D) Quando voltou, Mme. Thérèse informou-me de que sua debilidade era proveniente de uma corrente de ar no meu apartamento.
- (E) Eu entreguei o dinheiro a dona Teresa, ela contou-o. Depois foi lá dentro apanhar umas pobres coisas que se esquecera.

11. O preço unitário de venda de um produto, que era praticado em 2020, teve um único aumento, em 2021, de 10%. Em 2022, foi concedido, sobre o preço de venda reajustado em 2021, um único desconto de 5%.

É correto afirmar que o desconto concedido em 2022 correspondeu, do preço do produto que era praticado em 2020, a:

- (A) 6,0%
- (B) 5,0%
- (C) 6,5%
- (D) 5,5%
- (E) 4,5%

12. Considere a seguinte afirmação: “Existe, pelo menos, um candidato que, se ele não dormiu bem à noite, então não foi aprovado no concurso.”

Uma negação lógica para a afirmação apresentada é:

- (A) Todos os candidatos não dormiram bem à noite e foram aprovados no concurso.
- (B) Existe mais de um candidato que, se ele não dormiu bem à noite, então não foi aprovado no concurso.
- (C) Não existe candidato que não dormiu bem à noite e foi aprovado no concurso.
- (D) Existe candidato que, se foi aprovado no concurso, então dormiu bem à noite.
- (E) Todos os candidatos dormiram bem à noite e foram aprovados no concurso.

R A S C U N H O

13. Qual princípio fundamental da Reforma Sanitária Brasileira é expresso na frase: "Saúde é direito de todos e dever do Estado"?
- (A) Igualdade.
 - (B) Universalidade.
 - (C) Equidade.
 - (D) Integralidade.
 - (E) Descentralização.
14. O que caracteriza um estudo epidemiológico do tipo ecológico?
- (A) Ter como objeto de estudo questões ambientais e seus efeitos sobre os indivíduos.
 - (B) Coleta de dados em nível individual e acompanhamento longitudinal dos participantes.
 - (C) Coleta de dados por meio de entrevistas com pacientes diagnosticados com a doença.
 - (D) Investigação de casos isolados de doenças em diferentes regiões geográficas.
 - (E) Análise de informações agregadas em grupos populacionais, em vez de dados individuais.
15. Além de outras vacinas oferecidas em campanhas nacionais, o Ministério da Saúde preconiza que as gestantes recebam, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, vacinas contra
- (A) tétano, sarampo, caxumba e rubéola.
 - (B) hepatite B, difteria, coqueluche e tétano.
 - (C) papiloma vírus humano 6, tétano, meningite meningocócica e rubéola.
 - (D) tétano e rubéola.
 - (E) hepatite B, sarampo, rubéola e tétano.

16. Hermes é servidor público federal e, injustificadamente, recusou-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente.
- Nessa situação hipotética, considerando o disposto na Lei nº 8.112/90, no tocante às penalidades disciplinares cabíveis, é correto afirmar que Hermes está sujeito à
- (A) suspensão de até 30 (trinta) dias, sendo vedada a conversão da penalidade em multa.
 - (B) suspensão de até 15 (quinze) dias, sendo vedada a conversão da penalidade em multa.
 - (C) suspensão de até 15 (quinze) dias, mas, por conveniência do serviço, a penalidade poderá ser convertida em multa, ficando obrigado a permanecer em serviço.
 - (D) advertência e, não atendida a determinação pela segunda vez, multa de até 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração.
 - (E) advertência e, não atendida a determinação pela segunda vez, suspensão por até 30 (trinta) dias.
17. Simplício, no exercício de suas funções como servidor público, exigiu dolosamente de Tércio, um cidadão, taxa em valor superior ao devido por um serviço público prestado e, ainda, não recolheu aos cofres públicos a importância paga por Tércio, tendo desviado o dinheiro em proveito próprio.
- Nessa situação hipotética, considerando o disposto no Código Penal, é correto afirmar que Simplício cometeu o crime de
- (A) excesso de exação qualificado.
 - (B) corrupção ativa.
 - (C) peculato qualificado.
 - (D) excesso de exação e peculato.
 - (E) peculato mediante erro de outrem.

- 18.** Considerando o disposto na Constituição Federal a respeito do Poder Judiciário e seus órgãos, assinale a alternativa correta.
- (A) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a homologação de sentenças estrangeiras e a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados.
 - (B) Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, entre eles um quinto dentre juizes dos Tribunais Regionais Federais e um quinto dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça.
 - (C) Os Tribunais Regionais Federais terão em sua composição, além de advogados e membros do Ministério Público Federal, juizes federais, por meio de promoção, com mais de 10 (dez) anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.
 - (D) É da competência dos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, originariamente, os juizes federais da área de sua jurisdição, exceto os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.
 - (E) Com exceção das falências, dos acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, aos juizes federais compete processar e julgar causas em que a União for autora, ré, assistente ou oponente e as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País.
- 19.** Assinale a alternativa que está de acordo com a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, considerando os termos da Resolução CNJ nº 400/2021 no tocante ao Plano de Logística Sustentável (PLS).
- (A) O PLS é instrumento que se alinha à Estratégia Nacional do Judiciário, e aos Planos Estratégicos dos órgãos, com objetivos e responsabilidades definidas, indicadores, metas, prazos de execução, mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, que objetivem um ambiente de trabalho sustentável e harmonioso aos servidores.
 - (B) O Balanço Socioambiental do Poder Judiciário passa a ser denominado Balanço da Sustentabilidade do Poder Judiciário e será elaborado e publicado, anualmente, pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), com informações recebidas via PLS-Jud.
 - (C) A Presidência de cada tribunal do Poder Judiciário proporá a revisão do plano, que será promovida pela unidade de sustentabilidade com o apoio das unidades gestoras responsáveis pela execução do PLS, no máximo, a cada 2 (dois) anos.
 - (D) O relatório de desempenho do PLS deve ser publicado no sítio eletrônico do respectivo órgão do Poder Judiciário e encaminhado ao órgão gestor do Supremo Tribunal Federal, por meio do PLS-Jud, até o dia 28 de fevereiro do ano posterior ao que se refere.
 - (E) As aquisições e contratações efetuadas pelos órgãos do Poder Judiciário devem observar os critérios de sustentabilidade quanto aos bens, serviços e obras, salvo na execução de reformas, na locação, aquisição e manutenção predial de bens imóveis utilizados na função jurisdicional.
- 20.** No tocante ao tema da Gestão Estratégica do Poder Judiciário, a Resolução CNJ nº 325/2020 dispõe que a execução da Estratégia Nacional do Poder Judiciário é de responsabilidade de ministros, conselheiros, magistrados de primeiro e segundo grau, servidores e colaboradores do Poder Judiciário.
- E, nesse sentido, a Estratégia do Judiciário é executada de forma colaborativa e participativa sob a coordenação
- (A) dos Conselhos de Justiça.
 - (B) do Coordenador Geral de Assuntos Estratégicos do Poder Judiciário.
 - (C) do Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça.
 - (D) da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário.
 - (E) do Presidente do Supremo Tribunal Federal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21.** No tratamento farmacológico dos transtornos por uso de álcool, qual é a principal classe de medicamentos utilizada para auxiliar na abstinência e redução do consumo?
- (A) Benzodiazepínicos.
 - (B) Antipsicóticos atípicos.
 - (C) Estabilizadores de humor.
 - (D) Antidepressivos tricíclicos.
 - (E) Inibidores seletivos da recaptação de serotonina.
- 22.** No tratamento não farmacológico de indivíduos com transtornos por uso de álcool e dependência física, a abordagem terapêutica que tem se mostrado eficaz na redução do consumo de álcool e na promoção da abstinência é a
- (A) hipnoterapia.
 - (B) acupuntura.
 - (C) terapia de reminiscência.
 - (D) terapia cognitivo-comportamental (TCC).
 - (E) aromaterapia.

Leia o caso para responder às questões de números **23** e **24**.

Um rapaz de 18 anos, sem histórico prévio de uso de substâncias psicoativas, decidiu experimentar maconha pela primeira vez em uma festa com amigos. Ele compartilhou um cigarro de maconha com alguns colegas e inicialmente relatou uma sensação de euforia leve, risos e relaxamento. No entanto, após alguns minutos, ele começou a sentir-se estranhamente desconfortável e inquieto. O adolescente passou a apresentar sintomas físicos intensos, como aumento da frequência cardíaca, sudorese excessiva e tremores. Ele também começou a sentir um medo extremo de desfalecer ou ficar “louco”. Esses sentimentos desconfortáveis se intensificaram rapidamente, fazendo com que ele se sentisse cada vez mais apreensivo e assustado. Ele relatou sentir como se estivesse “perdendo o controle” e teve dificuldade em entender o que estava acontecendo com ele.

Foi então levado ao hospital pelos amigos, quando a equipe médica observou que a sua pressão arterial estava elevada e que ele estava respirando rapidamente. Ele estava agitado, suando profusamente e demonstrando um nível acentuado de ansiedade. Os exames laboratoriais foram negativos para as condições clínicas comuns.

- 23.** Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto dessa reação adversa à maconha.
- (A) Abstinência por maconha.
 - (B) Choque anafilático por hipersensibilidade à substância.
 - (C) Crise ou ataque de pânico.
 - (D) Síndrome de Munchausen.
 - (E) Surto psicótico esquizofreniforme.

- 24.** Caso o rapaz descrito no caso tenha consumido cocaína, quais dos seguintes sinais e sintomas são típicos de intoxicação aguda por cocaína?
- (A) Hipotermia, midríase e agitação.
 - (B) Pupilas dilatadas, bradicardia e sonolência.
 - (C) Bradicardia, midríase e hipotermia.
 - (D) Sonolência, taquicardia e hipertensão.
 - (E) Taquicardia, midríase e hipertermia.
- 25.** Assinale a alternativa que apresenta biomarcadores que têm sido associados à doença de Alzheimer e são utilizados para auxiliar no diagnóstico e monitoramento da progressão da doença.
- (A) Glicose e lipídeos séricos.
 - (B) Anticorpos IgG e IgM.
 - (C) Hemoglobina e proteína C-reativa.
 - (D) Vitamina D e cálcio sérico.
 - (E) Tau total, tau fosforilada (p-tau) e proteína beta-amiloide (A β).
- 26.** Na avaliação clínica de um paciente idoso com queixas de memória e cognição comprometidas, como é possível diferenciar entre as alterações do declínio cognitivo leve (DCL) e a depressão?
- (A) A ocorrência de distúrbios alimentares e de perda de peso é indicativa de DCL, ao passo que a depressão se associa a ganho de peso.
 - (B) A presença de anedonia e interesse diminuído é característica exclusiva da depressão, diferenciando-a do DCL.
 - (C) A ausência de queixas de humor deprimido exclui a possibilidade de depressão, apontando para um diagnóstico de DCL.
 - (D) A avaliação de déficits em múltiplos domínios cognitivos e a evidência de comprometimento funcional indicam o DCL.
 - (E) A presença de alterações no padrão de sono indica depressão, enquanto a progressão lenta dos sintomas sugere DCL.
- 27.** Os “sinais de primeira ordem” propostos por Kurt Schneider são características patognomônicas associadas à esquizofrenia. De acordo com este autor, a percepção delirante e a vivência de influência são comuns entre os pacientes afetados. Assinale a alternativa que apresenta a dimensão psicopatológica a que esses dois sintomas pertencem.
- (A) Dimensão negativa.
 - (B) Dimensão positiva.
 - (C) Dimensão cognitiva.
 - (D) Dimensão afetiva.
 - (E) Dimensão comportamental.

- 28.** No tratamento da esquizofrenia, a utilização de medicação antipsicótica de ação prolongada tem sido uma abordagem importante para promover a estabilização do quadro clínico. A principal vantagem dessa abordagem em relação às formulações de medicação convencional é:
- (A) ação mais rápida no alívio dos sintomas positivos.
 - (B) melhor resposta aos sintomas negativos.
 - (C) redução da necessidade de adesão diária à medicação.
 - (D) menor potencial de efeitos colaterais.
 - (E) maior biodisponibilidade oral.
- 29.** Pacientes com epilepsia temporal apresentam um maior risco de comportamento suicida do que a população geral. Assinale a alternativa que apresenta o fator que pode contribuir para essa associação.
- (A) O foco temporal preserva as áreas do cérebro associadas ao controle das emoções e do comportamento, aumentando o risco de problemas psiquiátricos, incluindo o suicídio.
 - (B) As alterações na cognição de um paciente com epilepsia temporal estão relacionadas ao risco de ideação suicida.
 - (C) A epilepsia temporal é uma doença de difícil controle, o que aumenta a carga emocional e, conseqüentemente, o risco de suicídio.
 - (D) Pacientes com epilepsia temporal têm um acesso prioritário a tratamentos psicoterapêuticos, o que aumenta o risco de comportamento suicida.
 - (E) As alucinações visuais são comuns em portadores de epilepsia temporal, o que pode aumentar o risco de comportamento suicida.
- 30.** A ciclagem rápida é uma característica específica do transtorno bipolar que envolve a ocorrência de múltiplos episódios de mania, hipomania, depressão ou mistos em um período de um ano. Pelo menos quantos episódios o paciente deve apresentar antes de firmar o diagnóstico de ciclagem rápida?
- (A) 6 episódios.
 - (B) 4 episódios.
 - (C) 2 episódios.
 - (D) 3 episódios.
 - (E) 5 episódios.
- 31.** De acordo com a descrição de neurose proposta por William Cullen, um influente médico escocês do século XVIII, assinale a alternativa que contém a caracterização dos quadros de neurose.
- (A) Um desequilíbrio entre os quatro humores corporais, bile amarela, bile negra, fleuma e sangue.
 - (B) Um distúrbio orgânico do sistema nervoso central, principalmente após o paciente sofrer uma concussão cerebral.
 - (C) Uma alteração genética progressiva que afeta a função cerebral.
 - (D) Um transtorno mental grave com sintomas psicóticos, como delírios erotomaníacos.
 - (E) Uma condição resultante de conflitos emocionais e estresse que afeta a motilidade e as sensações.
- 32.** De acordo com o conceito de neuroses desenvolvido por Sigmund Freud na sua teoria psicanalítica, é um aspecto característico das neuroses atuais:
- (A) sintomas desencadeados por conflitos emocionais contemporâneos.
 - (B) manifestação predominante de sintomas psicóticos, como alucinações e delírios.
 - (C) ausência de sintomas físicos ou somáticos.
 - (D) envolvimento exclusivo de fatores biológicos e genéticos.
 - (E) conflitos conscientes com origem na infância.
- 33.** Assinale a alternativa que melhor apresenta uma diferença fundamental entre o transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e o transtorno de ansiedade social (TAS).
- (A) O TAG é caracterizado pela evitação extrema de situações sociais, enquanto o TAS envolve ansiedade em relação a avaliações negativas por parte dos outros.
 - (B) O TAG é marcado por sintomas físicos, como sudorese e tremores, durante interações sociais, enquanto o TAS envolve preocupação constante com diversas situações sociais.
 - (C) O TAS envolve preocupação generalizada e crônica em várias áreas da vida, enquanto o TAG está restrito a situações sociais específicas.
 - (D) O TAS envolve preocupação excessiva com avaliações negativas dos outros, enquanto o TAG é caracterizado por preocupação excessiva com diversas situações do cotidiano.
 - (E) O TAG se manifesta principalmente na adolescência, enquanto o TAS é mais prevalente em adultos na sua terceira década.

34. Quais dos seguintes traços de personalidade são considerados universais, de acordo com a teoria dos Cinco Grandes Fatores (*Big Five*)?
- (A) Amabilidade e Humildade.
 - (B) Neuroticismo e Desonestidade.
 - (C) Extroversão e Conscienciosidade.
 - (D) Agressividade e Egocentrismo.
 - (E) Criatividade e Introversão.
35. O traço de neuroticismo na Teoria dos Cinco Grandes Fatores é caracterizado por
- (A) propensão a ser cooperativo, compassivo e altruísta.
 - (B) tendência a ser reservado, introvertido e quieto em situações sociais.
 - (C) baixa propensão a experimentar emoções negativas e instabilidade emocional.
 - (D) alta tendência a ser organizado, metódico e disciplinado.
 - (E) inclinação a sentir ansiedade, depressão e outras emoções negativas de maneira intensa.
36. A depressão unipolar é uma condição complexa que envolve fatores biológicos, psicológicos e sociais. Assinale a alternativa que representa uma abordagem terapêutica recomendada como eficaz para o tratamento da depressão unipolar.
- (A) Terapia cognitivo-comportamental (TCC) focada na exposição prolongada de fatores de estresse para dessensibilizar os sintomas depressivos.
 - (B) Abordagem integrativa que combina medicamentos antidepressivos com terapia cognitivo-comportamental (TCC).
 - (C) Terapia de eletroconvulsoterapia (ECT) como primeira opção de tratamento.
 - (D) Terapia psicodinâmica que explora o inconsciente e a infância do paciente com depressão unipolar.
 - (E) Uso exclusivo de antidepressivos tricíclicos para alívio imediato dos sintomas.
37. A biodisponibilidade dos psicofármacos no cérebro, que se refere à quantidade e velocidade com que um medicamento é absorvido, distribuído, metabolizado e excretado, pode ser influenciada por vários fatores. Qual dos seguintes fatores influencia significativamente a biodisponibilidade dos psicofármacos no cérebro, afetando sua absorção e eliminação?
- (A) Idade do paciente.
 - (B) Estação do ano em que o medicamento é administrado.
 - (C) Apresentação da cápsula ou comprimido.
 - (D) Composição química do psicofármaco.
 - (E) Local de fabricação do psicofármaco.
38. Um homem de 38 anos com diagnóstico de transtorno depressivo maior não respondeu ao primeiro tratamento com um antidepressivo Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina (ISRS), em dose adequada e tempo suficiente. O paciente foi aderente ao medicamento e não apresentou efeitos colaterais intolerantes. De acordo com as diretrizes clínicas modernas, uma estratégia adequada antes de tentar outro antidepressivo seria
- (A) interromper o tratamento farmacológico e considerar terapias alternativas.
 - (B) indicar eletroconvulsoterapia como tratamento adjuntivo ao ISRS.
 - (C) substituir a farmacoterapia pela psicoterapia como a próxima intervenção.
 - (D) adicionar um medicamento potencializador (agonista parcial) ao ISRS.
 - (E) utilizar fitoterápicos com propriedades antidepressivas, tipo *Hypericum perforatum*.
39. A Eletroconvulsoterapia (ECT) é uma intervenção médica utilizada em casos graves de transtornos mentais, como depressão resistente ao tratamento, mania grave e catatonia. Os principais tipos de ECT utilizados no tratamento de transtornos mentais graves são:
- (A) ECT bilateral e ECT unilateral.
 - (B) ECT de alta voltagem e ECT de baixa voltagem.
 - (C) ECT pulsátil e ECT contínuo.
 - (D) ECT breve e ECT prolongado.
 - (E) ECT bifrontal e ECT occipital.
40. Assinale a alternativa que apresenta a principal vantagem e desvantagem da Eletroconvulsoterapia (ECT) como tratamento para transtornos mentais graves.
- (A) Ausência de efeitos colaterais cognitivos, mas requer uma longa duração do tratamento.
 - (B) Baixo custo, mas a ECT não apresenta efeito sustentado, com alta taxa de recaída.
 - (C) Rápida resposta terapêutica, mas tem risco de convulsões prolongadas e déficits cognitivos.
 - (D) Permite seletividade no alvo cerebral, mas a sua aplicação é bastante invasiva.
 - (E) Adequado para todos os tipos de transtornos mentais, sem nenhuma desvantagem significativa quando a ECT é comparada com a farmacoterapia e psicoterapia.

41. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é uma abordagem terapêutica amplamente utilizada no tratamento de diversos transtornos mentais. A técnica de exposição e a dessensibilização sistemática são indicadas para pacientes que apresentam
- (A) transtornos de ansiedade.
 - (B) transtorno bipolar.
 - (C) transtornos de personalidade esquizoide.
 - (D) transtornos do espectro autista.
 - (E) transtornos psicóticos e esquizofrenia.
42. Qual dos seguintes eventos históricos está fundamentalmente relacionado ao desenvolvimento da teoria da psicanálise?
- (A) A fundação da “Abordagem Centrada na Pessoa” por Carl Rogers.
 - (B) O estabelecimento da “Associação Americana de Psicologia” nos Estados Unidos em 1892.
 - (C) A publicação do “Estudo sobre Histeria” por Freud e Breuer.
 - (D) A criação da terapia cognitivo-comportamental por Aaron Beck.
 - (E) A apresentação da “Teoria da Aprendizagem Social” por Albert Bandura.
43. O tratamento do transtorno de personalidade borderline frequentemente envolve uma abordagem que combina diferentes modalidades de intervenção. Uma abordagem terapêutica que tem apresentado bons resultados e deve ser considerada como um componente essencial no tratamento do transtorno de personalidade borderline é a
- (A) socioterapia.
 - (B) terapia cognitivo-comportamental.
 - (C) terapia de exposição prolongada.
 - (D) eletroconvulsoterapia.
 - (E) terapia do grito primal.
44. O Transtorno de Personalidade Antissocial é caracterizado por um padrão persistente de desrespeito e violação dos direitos dos outros. São exemplos desse padrão os comportamentos desviantes, como mentir, manipular, agir impulsivamente, ser agressivo e desrespeitar normas sociais. Qual dos seguintes padrões comportamentais é frequentemente observado na história natural de indivíduos portadores de Transtorno de Personalidade Antissocial?
- (A) Estabilidade dos sintomas de crueldade desde a infância até a idade adulta.
 - (B) Remissão espontânea dos comportamentos antissociais na adolescência.
 - (C) Início tardio e progressão lenta dos comportamentos problemáticos, extinguindo-se após 70 anos.
 - (D) Desenvolvimento de empatia e conformidade progressiva com as normas sociais na fase adulta.
 - (E) Início precoce de comportamentos desviantes e com persistência ao longo da vida adulta.
45. A fenomenologia teve um papel significativo na história da psiquiatria. Na prática da psiquiatria, a fenomenologia
- (A) contribuiu para a compreensão das experiências subjetivas dos indivíduos e para a análise das estruturas da consciência.
 - (B) desempenhou um papel central na rejeição da abordagem psicodinâmica na psiquiatria.
 - (C) foi responsável pelo desenvolvimento da terapia eletroconvulsiva como tratamento padrão para transtornos mentais.
 - (D) enfatizou a importância das causas biológicas dos transtornos mentais.
 - (E) permitiu reformular a classificação e o diagnóstico de transtornos mentais.
46. Na primeira revolução psiquiátrica, muitos consideram o “pai da psiquiatria moderna” um médico que introduziu abordagens humanitárias e científicas no tratamento de pacientes mentais, desafiando práticas antiquadas. Trata-se de
- (A) Johann Christian Reil.
 - (B) Sigmund Freud.
 - (C) Emil Kraepelin.
 - (D) Philippe Pinel.
 - (E) Anton Mesmer.

47. Considerando a evolução moderna na consideração da doença mental, assinale a alternativa que apresenta a principal contribuição da psiquiatria biológica na prática da psiquiatria.
- (A) Desenvolver abordagens terapêuticas baseadas em psicoterapia.
 - (B) Destacar a importância do ambiente familiar na etiologia dos transtornos mentais.
 - (C) Investigar as bases neurobiológicas dos transtornos mentais e desenvolver intervenções farmacológicas.
 - (D) Fornecer um entendimento completo das causas psicossociais dos transtornos mentais.
 - (E) Excluir a abordagem psicodinâmica na avaliação e tratamento dos transtornos mentais.
48. João, um senhor idoso de 80 anos, foi diagnosticado com demência avançada, que afetou significativamente suas habilidades cognitivas e funcionamento diário. Ele tem dois filhos e havia acumulado uma considerável propriedade e ativos financeiros durante a sua vida profissional. Após o diagnóstico de demência, a sua capacidade de tomar decisões e gerenciar seus assuntos pessoais e financeiros foi severamente comprometida. Ele tinha dificuldade em reconhecer as pessoas, lembrar-se de eventos recentes e realizar tarefas diárias básicas. João não conseguia mais compreender a complexidade de suas finanças ou tomar decisões informadas sobre sua propriedade.
- A situação se tornou complicada quando surgiu uma disputa de herança entre os filhos. O filho mais velho alegou ter o direito de administrar os assuntos financeiros de João, além de tomar decisões em seu nome. A filha mais nova acreditava que sua relação mais próxima com o pai a qualificava para ser a curadora e cuidadora de suas finanças, enquanto o filho argumentava que ele era o filho mais velho e tinha mais experiência de gerenciamento. Diante dessa disputa, o caso do João foi encaminhado para avaliação por uma equipe multidisciplinar.
- Considerando o exemplo ilustrado nesse caso, a principal atribuição do psiquiatra forense na avaliação da capacidade civil é
- (A) avaliar a capacidade do indivíduo de cuidar de si mesmo e de tomar decisões pessoais.
 - (B) avaliar a capacidade do indivíduo de tomar decisões financeiras complexas.
 - (C) determinar a má fé ou a inocência dos filhos em processos de sucessão hereditária.
 - (D) fornecer apoio psicoterapêutico e intermediação para pessoas em conflito com a legislação.
 - (E) identificar os possíveis fatores de risco que podem perturbar o bem-estar do idoso demenciado.
49. A internação involuntária de pacientes psiquiátricos em hospitais especializados de saúde mental levanta questões éticas e legais complexas. Assinale a alternativa que apresenta o critério que deve ser atendido para indicar uma internação involuntária.
- (A) Violação à ordem judicial de tratamento ambulatorial.
 - (B) Decisão exclusiva do médico psiquiatra.
 - (C) Ausência de familiares próximos.
 - (D) Perigo iminente para si mesmo ou para terceiros.
 - (E) Consentimento prévio do paciente.
50. As linhas de atuação clínica são baseadas em diferentes abordagens que ajudam a compreender a origem dos problemas psiquiátricos e a adaptar as intervenções terapêuticas de acordo com as circunstâncias específicas de cada paciente. Assinale corretamente a alternativa que descreve a particularidade da abordagem da psiquiatria social na prática clínica.
- (A) Ênfase na utilização de técnicas de hipnose para acessar o inconsciente do paciente.
 - (B) Enfoque centrado na compreensão das interações sociais e contextos culturais do paciente.
 - (C) Ênfase na investigação de causas biológicas subjacentes aos transtornos mentais.
 - (D) Enfoque em intervenções psicodinâmicas para explorar conflitos inconscientes.
 - (E) Foco na prescrição de medicamentos para tratar os sintomas psiquiátricos.
51. Serviços de saúde mental mais próximos à comunidade, como Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e serviços de atenção primária vêm sendo implementados como uma abordagem mais humanizada e são exemplos atuais de atendimento das pessoas com transtornos mentais na sociedade. Considerando essas práticas assistenciais, assinale a alternativa que contém os pontos em conformidade com a política de saúde mental no Brasil.
- (A) Priorização de abordagens farmacológicas para o tratamento de transtornos mentais.
 - (B) Promoção da desinstitucionalização, atenção comunitária e valorização dos dispositivos de cuidado territorial.
 - (C) Restrição do acesso a serviços de saúde mental para pacientes com transtornos graves.
 - (D) Ênfase na terapia eletroconvulsiva como principal abordagem terapêutica para transtornos psiquiátricos.
 - (E) Foco na internação hospitalar como principal forma de tratamento psiquiátrico.

- 52.** Os conceitos de prevenção primária, secundária e terciária foram formulados pelos médicos e epidemiologistas Leavell e Clark. Eles desenvolveram esses conceitos no contexto da medicina preventiva e da saúde pública para descrever diferentes níveis de intervenção com o objetivo de prevenir doenças e promover a saúde. Na prevenção primária do suicídio, o foco principal das estratégias adotadas seria
- (A) realizar avaliações psicológicas detalhadas em grupos de risco para identificar potenciais comportamentos suicidas.
 - (B) proporcionar acompanhamento e monitoramento frequente para pessoas que já fizeram tentativas de suicídio.
 - (C) promover a conscientização pública e implementar programas de educação que reduzam os fatores de risco.
 - (D) identificar indivíduos em risco de suicídio e fornecer intervenções terapêuticas intensivas.
 - (E) oferecer suporte emocional e tratamento para indivíduos que já tentaram suicídio anteriormente.
- 53.** A depressão puerperal, também conhecida como depressão pós-parto, é um problema de saúde mental que afeta mulheres após o parto, geralmente nos primeiros meses após o nascimento do bebê. No Brasil, assim como em outros países, a depressão pós-parto é uma preocupação relevante de saúde pública devido aos impactos negativos que pode ter na saúde da mãe, no relacionamento com o bebê e na dinâmica familiar como um todo.
- Qual abordagem preventiva é fundamental para minimizar o impacto dos casos de depressão puerperal na saúde mental das mães nos serviços materno-infantis da atenção primária?
- (A) Implementação de programas psicoterapêuticos de adaptação à maternidade em puérperas que desenvolveram a depressão pós-parto.
 - (B) Uso rotineiro de eletroconvulsoterapia para estabilizar o humor da mãe após o parto.
 - (C) Realização de hospitalização preventiva para mães com histórico de depressão anterior.
 - (D) Administração de antidepressivos durante a amamentação para prevenir a ocorrência da depressão pós-parto.
 - (E) Monitoramento e rastreamento de quadros depressivos logo no início do período puerperal.
- 54.** Assinale a alternativa que apresenta um autor conhecido por suas críticas à medicalização excessiva e à falta de bases científicas sólidas para muitos diagnósticos de transtornos mentais, sendo um crítico proeminente da abordagem tradicional da psiquiatria.
- (A) Aaron T. Beck.
 - (B) Sigmund Freud.
 - (C) Carl Rogers.
 - (D) Michel Foucault.
 - (E) Thomas Szasz.
- 55.** Assinale a alternativa correta sobre uma diretriz fundamental da atual Política Nacional de Saúde Mental.
- (A) Restrição da participação da sociedade civil na formulação, gestão e avaliação das políticas de saúde mental.
 - (B) Fortalecimento da atenção primária em saúde mental, com ênfase na prevenção e no tratamento de transtornos mentais comunitários.
 - (C) Fomento à criação de comunidades terapêuticas como principal modelo de cuidado para pessoas com transtornos mentais graves.
 - (D) Centralização da atenção em saúde mental em hospitais especializados.
 - (E) Promoção da internação prolongada em hospitais psiquiátricos como forma de tratamento prioritário.
- 56.** Em um programa de saúde mental comunitária, o principal objetivo da inserção do psiquiatra na atenção básica de saúde é
- (A) promover a internação hospitalar imediata de pacientes com transtornos mentais agudos.
 - (B) fornecer atendimento psiquiátrico exclusivamente a pacientes com transtornos psicóticos.
 - (C) realizar procedimentos neurocirúrgicos em pacientes com transtornos mentais graves.
 - (D) facilitar o acesso a avaliações psiquiátricas e tratamento de saúde mental na comunidade.
 - (E) substituir os médicos de família no atendimento a pacientes com sintomas psiquiátricos leves.
- 57.** Durante a condução de uma terapia individual com um paciente, um psiquiatra descobre que o paciente está envolvido em atividades ilegais. O paciente confidenciou essas informações ao psiquiatra, mas não manifestou intenção de prejudicar ninguém. De acordo com a ética profissional, o psiquiatra
- (A) deve respeitar o sigilo profissional e manter as informações confidenciais do paciente.
 - (B) deve compartilhar as informações com colegas de trabalho para discutir possíveis abordagens de tratamento.
 - (C) possui a liberdade de decidir se deve ou não manter as informações confidenciais, dependendo da gravidade do crime.
 - (D) deve utilizar as informações para chantagear o paciente a fim de promover a sua recuperação.
 - (E) tem obrigação de denunciar o paciente imediatamente às autoridades, independentemente do contexto.

- 58.** Qual foi o principal marco histórico da reforma psiquiátrica no Brasil, que desencadeou uma mudança significativa na abordagem do tratamento de saúde mental no país?
- (A) A fundação da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) no Ministério da Saúde.
 - (B) A promulgação da Lei de Saúde Mental que determinou o fechamento progressivo de hospitais psiquiátricos no Brasil.
 - (C) A introdução da psicofarmacoterapia como tratamento padrão para transtornos mentais graves.
 - (D) A implementação do primeiro programa de terapia ocupacional para pacientes psiquiátricos.
 - (E) A criação do primeiro hospital psiquiátrico em São Paulo.
- 59.** Indique corretamente qual foi a principal repercussão na prática assistencial da psiquiatria após a promulgação da Lei Federal nº 10.216/01 no Brasil.
- (A) A criação de novos hospitais psiquiátricos para melhorar o atendimento aos pacientes.
 - (B) A obrigatoriedade da internação involuntária de pacientes com transtornos mentais graves.
 - (C) A desinstitucionalização e o fechamento progressivo de hospitais psiquiátricos, priorizando a assistência comunitária.
 - (D) A proibição do uso de psicofármacos no tratamento de transtornos mentais.
 - (E) A exigência de pagamento particular para acesso aos serviços de saúde mental.
- 60.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma estratégia de política pública que é considerada uma abordagem eficaz na prevenção do uso de álcool nas estradas e redução de acidentes relacionados à direção sob efeito de álcool.
- (A) Reduzir a idade mínima para consumo de álcool, permitindo que os motoristas jovens desenvolvam maior tolerância ao álcool.
 - (B) Fornecer a venda de bebidas alcoólicas em postos de gasolina para relaxar os motoristas antes da viagem.
 - (C) Reduzir a velocidade máxima nas estradas para 60 km/hora.
 - (D) Permitir que motoristas consumam álcool enquanto dirigem, desde que não excedam um limite específico de concentração no sangue.
 - (E) Implementar uma política de “tolerância zero” para o consumo de álcool antes de dirigir.

