

CONCURSO PÚBLICO

005. PROVA OBJETIVA

ANALISTA JUDICIÁRIO

ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO | ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM

- Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas, e o caderno de prova discursiva.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração das provas objetiva e discursiva é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas e para a transcrição das respostas definitivas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração das provas.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova discursiva, a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

Leia a charge para responder às questões de números 01 e 02.



(Chargista Ricardo Manhães. <https://ndmais.com.br/opiniaio/charges>, 31.03.2023)

01. O diálogo entre os mosquitos permite concluir corretamente que

- (A) os casos confirmados negam de fato o avanço da dengue.
- (B) a disseminação da dengue é algo em que eles não creem.
- (C) as medidas de combate à dengue deixam-nos apreensivos.
- (D) a dengue é um problema que eles preferem ignorar por ora.
- (E) o avanço da dengue é fato incontestável e pode recrudescer.

02. Na frase – E se bobear chega a mil facinho! –, a palavra “se” tem o mesmo emprego que a destacada em:

- (A) A população prometeu acabar com a dengue no bairro e, depois de muita ação contra os focos da doença, alcançaram seu objetivo e **se** abraçaram felizes.
- (B) O combate à dengue dependerá de todos, **se** houver empenho para exterminar o mosquito, que facilmente prolifera nos locais onde há água parada.
- (C) Os moradores do local resolveram ajudar no combate à dengue e **se** puseram a procurar os focos do mosquito, eliminando-os o mais rápido possível.
- (D) Muitos focos da dengue foram eliminados em vários bairros da cidade, encontrando-**se** os mosquitos em locais onde pensavam que eles não estariam.
- (E) O agente de saúde visitou as casas e queria saber **se** as famílias estavam tomando todas as precauções necessárias para combater a dengue.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 07.

Dengue prevista

A dengue é uma doença periódica e cíclica: os casos crescem no verão e há picos epidêmicos a cada 4 ou 5 anos. Trata-se, portanto, de enfermidade de atuação previsível. Supõe-se que o poder público se adiantaria com medidas de prevenção e tratamento. Contudo, há décadas os números de casos e mortes só aumentam no Brasil.

Entre 2000 e 2010, foram registrados 4,5 milhões de ocorrências e 1.869 óbitos. Na década seguinte, os números saltaram para 9,5 milhões e 5.385, respectivamente. O primeiro semestre deste ano registra 1,4 milhão de casos, ante 1,5 milhão em 2022. A tendência é piorar.

Segundo a OMS, urbanização descontrolada e sistema sanitário precário contribuem para o descontrole da moléstia.

No Brasil, cerca de 50% da população não tem acesso a redes de esgoto, em grande parte devido à ineficiência estatal, que só agora começa a mudar com o novo marco do setor. E o desmatamento para a construção de moradias irregulares grassa nos grandes centros. A dimensão de áreas verdes derrubadas para esse fim na cidade de São Paulo atingiu, nos primeiros dois meses de 2023, 85 hectares.

Neste ano, o município já conta com 11.444 casos de dengue – 3,7% a mais em relação ao mesmo período de 2022. Dez pessoas morreram, o maior número em oito anos, quando houve pico epidêmico.

A OMS ressaltou a importância da vacinação. Mas, devido à burocracia, o Brasil protela a distribuição do imunizante japonês Qdenga – já aprovado para venda pela Anvisa – no sistema público de saúde.

O combate à dengue deve ser contínuo, não apenas no verão, e em várias frentes complementares (saúde, infraestrutura e moradia). Com o alerta da OMS, espera-se que o poder público, local e federal, se prepare para receber as consequências do fenômeno climático El Niño.

(Editorial. *Folha de S. Paulo*, 27.07.2023. Adaptado)

03. O editorial enfatiza que o aumento dos casos de dengue é

- (A) desesperador, aumentando a insegurança da população que se vê acuada nos picos epidêmicos da doença, mesmo com prevenção e tratamento.
- (B) sazonal, dispensando atenção sistemática das instâncias governamentais, uma vez que os picos epidêmicos têm sido satisfatoriamente controlados.
- (C) improvável, o que dispensa o poder público de organizar os mecanismos de prevenção, como a vacinação da população com o imunizante japonês Qdenga.
- (D) esperado, configurando um problema de saúde pública que deve ser combatido por meio de frentes complementares orquestradas pelo poder público.
- (E) insignificante, uma vez que as consequências do El Niño para a população não afetam o sistema de saúde, a infraestrutura e a moradia do país.

04. Considere as passagens:

- E o desmatamento para a construção de moradias irregulares **grassa** nos grandes centros. (4º parágrafo)
- ... o Brasil **protela** a distribuição do imunizante japonês Qdenga... (6º parágrafo)
- O combate à dengue deve ser **contínuo**... (7º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) espalha-se; acelera; interminável.
- (B) combate-se; cancela; intermitente.
- (C) propaga-se; posterga; ininterrupto.
- (D) difunde-se; prioriza; infrequente.
- (E) amplia-se; retarda; irregular.

05. Na passagem do primeiro parágrafo do texto – **Supõe-se que o poder público se adiantaria com medidas de prevenção e tratamento**. Contudo, há décadas os números de casos e mortes só aumentam no Brasil. –, o trecho destacado e o trecho posterior expressam, correta e respectivamente, sentidos de

- (A) hipótese e adversidade.
- (B) contestação e concessão.
- (C) afirmação e conclusão.
- (D) hipótese e comparação.
- (E) afirmação e explicação.

06. A reescrita de informações do texto em que se atende à norma-padrão de concordância verbal é:

- (A) Segundo a OMS, devem-se à urbanização descontrolada e ao sistema sanitário precário o descontrole da moléstia.
- (B) Aumenta-se, no verão, os casos de dengue e constata-se picos epidêmicos a cada 4 ou 5 anos.
- (C) Há picos epidêmicos da dengue a cada 4 ou 5 anos. Tratam-se, portanto, de situações de atuação previsível.
- (D) São Paulo é um desses grandes centros que convivem com o desmatamento para a construção de moradias.
- (E) Ocorre a cada 4 ou 5 anos os picos epidêmicos da dengue, por isso é enfermidade de atuação previsível.

07. No trecho do primeiro parágrafo – A dengue é uma doença periódica e cíclica: os casos crescem no verão e há picos epidêmicos a cada 4 ou 5 anos. Trata-se, portanto, de enfermidade de atuação previsível. –, os dois-pontos e as vírgulas são empregados, correta e respectivamente, para sinalizar

- (A) o detalhamento de uma informação; separar conjunção conclusiva.
- (B) a inclusão de um contra-argumento; separar conjunção condicional.
- (C) o resumo das informações precedentes; separar expressão adverbial.
- (D) a retificação de uma informação; separar aposto explicativo.
- (E) a inclusão de informação nova; separar oração intercalada.

Leia o texto para responder às questões de números 08 a 10.

Minha empregada, Mme. Thérèse, que já ia se conformando em ser chamada de dona Teresa, caiu doente. Mandou-me um bilhete com a letra meio trêmula, falando em reumatismo. Dias depois apareceu, mas magra, mais pálida e menor; explicou-me que tudo fora consequência de uma corrente de ar. Que meu apartamento tem um *courant d'air* terrível, de tal modo que, _____, chegando em casa, nem teve coragem de tirar a roupa, caiu na cama. “Dói-me o corpo inteiro, senhor; o corpo inteiro.”

O mesmo caso, ajuntou, houve cerca de 15 anos atrás, quando trabalhava em um apartamento que tinha uma corrente de ar exatamente igual _____ essa de que hoje sou sublocatário. Fez uma pausa. Fungou. Contou o dinheiro que eu lhe entregava, agradeceu _____ dispensa do troco. Foi lá dentro apanhar umas pobres coisas que deixara. Entregou-me a chave, fez qualquer observação sobre o aquecedor _____ gás – e depois, no lugar de sair _____ rua, deixou-se ficar imóvel e calada, de pé, em minha frente.

(Rubem Braga, “Dona Teresa”. 200 crônicas escolhidas. Adaptado)

08. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) aquela tarde ... a ... a ... à ... à
- (B) aquela tarde ... à ... à ... à ... a
- (C) àquela tarde ... à ... a ... a ... à
- (D) àquela tarde ... à ... à ... a ... a
- (E) àquela tarde ... a ... a ... a ... à

09. Assinale a alternativa em que o primeiro termo destacado é um pronome com valor possessivo, e o segundo, um adjetivo.

- (A) ... já ia **se** conformando em ser chamada de dona Teresa, caiu **doente**.
- (B) “Dói-**me** o corpo inteiro, senhor; o corpo **inteiro**.”
- (C) Mandou-**me** um bilhete com a letra **meio** trêmula, falando em reumatismo.
- (D) O **mesmo** caso, ajuntou, houve cerca de 15 anos **atrás**...
- (E) Entregou-me a chave, fez **qualquer** observação **sobre** o aquecedor...

10. Nos enunciados reescritos a partir das informações do texto, a colocação pronominal e a regência atendem à norma-padrão em:

- (A) Quando voltou, Mme. Thérèse informou-me de que sua debilidade era proveniente de uma corrente de ar no meu apartamento.
- (B) Não fosse a corrente de ar que lhe acometera, Mme. Thérèse já teria-se conformado em ser chamada de dona Teresa.
- (C) Eu entreguei o dinheiro a dona Teresa, ela contou-o. Depois foi lá dentro apanhar umas pobres coisas que se esquecera.
- (D) Dona Teresa me contou que, há cerca de 15 anos atrás, tinha exposto-se em uma corrente de ar em um outro apartamento.
- (E) Dona Teresa certamente vira-se abalada com a corrente de ar, pois veio no meu apartamento magra, mais pálida e menor.

11. O preço unitário de venda de um produto, que era praticado em 2020, teve um único aumento, em 2021, de 10%. Em 2022, foi concedido, sobre o preço de venda reajustado em 2021, um único desconto de 5%.

É correto afirmar que o desconto concedido em 2022 correspondeu, do preço do produto que era praticado em 2020, a:

- (A) 6,0%
- (B) 5,0%
- (C) 5,5%
- (D) 4,5%
- (E) 6,5%

12. Três terrenos retangulares, um ao lado outro, têm as laterais com a mesma medida. O primeiro terreno tem a medida de frente correspondente a 3 m a menos que metade da medida lateral; o segundo terreno tem medida de frente correspondente à quinta parte da medida lateral; e o terceiro terreno tem 9 m a mais de frente que tem o segundo terreno.

Sabendo-se que a média aritmética simples das áreas dos três terrenos é 850 m^2 , a medida da frente do primeiro terreno é de

- (A) 21 m.
- (B) 19 m.
- (C) 20 m.
- (D) 18 m.
- (E) 22 m.

13. Considere verdadeiras as seguintes afirmações:

- I. Se o evento é hoje, então descansei ontem.
- II. O evento não é hoje ou amanhã vou descansar.
- III. Ou estudo hoje ou não descansarei amanhã.
- IV. Não descansarei amanhã.

Uma conclusão verdadeira que se pode extrair das informações apresentadas é:

- (A) Não descansei hoje.
- (B) Descansei ontem.
- (C) O evento é hoje.
- (D) Estudo hoje.
- (E) Não estudo hoje.

14. Considere a seguinte afirmação: "Existe, pelo menos, um candidato que, se ele não dormiu bem à noite, então não foi aprovado no concurso."

Uma negação lógica para a afirmação apresentada é:

- (A) Existe candidato que, se foi aprovado no concurso, então dormiu bem à noite.
- (B) Existe mais de um candidato que, se ele não dormiu bem à noite, então não foi aprovado no concurso.
- (C) Todos os candidatos dormiram bem à noite e foram aprovados no concurso.
- (D) Todos os candidatos não dormiram bem à noite e foram aprovados no concurso.
- (E) Não existe candidato que não dormiu bem à noite e foi aprovado no concurso.

15. Uma senha de seis dígitos, todos numéricos, corresponde ao 10º elemento da seguinte sequência numérica:

2, 11, 47, 191, 767, 3071, ...

Considerando-se que a senha seja **mpqxyz**, em que **m**, **p**, **q**, **x**, **y**, **z** representam os algarismos dessa senha, o número que representa **y** é

- (A) 7.
- (B) 3.
- (C) 1.
- (D) 5.
- (E) 9.

16. Hermes é servidor público federal e, injustificadamente, recusou-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente.

Nessa situação hipotética, considerando o disposto na Lei nº 8.112/90, no tocante às penalidades disciplinares cabíveis, é correto afirmar que Hermes está sujeito à

- (A) suspensão de até 15 (quinze) dias, mas, por conveniência do serviço, a penalidade poderá ser convertida em multa, ficando obrigado a permanecer em serviço.
- (B) suspensão de até 30 (trinta) dias, sendo vedada a conversão da penalidade em multa.
- (C) suspensão de até 15 (quinze) dias, sendo vedada a conversão da penalidade em multa.
- (D) advertência e, não atendida a determinação pela segunda vez, multa de até 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração.
- (E) advertência e, não atendida a determinação pela segunda vez, suspensão por até 30 (trinta) dias.

17. Simplício, no exercício de suas funções como servidor público, exigiu dolosamente de Tércio, um cidadão, taxa em valor superior ao devido por um serviço público prestado e, ainda, não recolheu aos cofres públicos a importância paga por Tercio, tendo desviado o dinheiro em proveito próprio.

Nessa situação hipotética, considerando o disposto no Código Penal, é correto afirmar que Simplício cometeu o crime de

- (A) peculato mediante erro de outrem.
- (B) excesso de exação qualificado.
- (C) corrupção ativa.
- (D) excesso de exação e peculato.
- (E) peculato qualificado.

18. Considerando o disposto na Constituição Federal a respeito do Poder Judiciário e seus órgãos, assinale a alternativa correta.

- (A) É da competência dos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, originariamente, os juízes federais da área de sua jurisdição, exceto os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.
- (B) Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, entre eles um quinto dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um quinto dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça.
- (C) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a homologação de sentenças estrangeiras e a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados.
- (D) Com exceção das falências, dos acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, aos juízes federais compete processar e julgar causas em que a União for autora, ré, assistente ou oponente e as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País.
- (E) Os Tribunais Regionais Federais terão em sua composição, além de advogados e membros do Ministério Público Federal, juízes federais, por meio de promoção, com mais de 10 (dez) anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 19.** Assinale a alternativa que está de acordo com a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, considerando os termos da Resolução CNJ nº 400/2021 no tocante ao Plano de Logística Sustentável (PLS).
- (A) O PLS é instrumento que se alinha à Estratégia Nacional do Judiciário, e aos Planos Estratégicos dos órgãos, com objetivos e responsabilidades definidas, indicadores, metas, prazos de execução, mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, que objetivem um ambiente de trabalho sustentável e harmonioso aos servidores.
 - (B) A Presidência de cada tribunal do Poder Judiciário proporá a revisão do plano, que será promovida pela unidade de sustentabilidade com o apoio das unidades gestoras responsáveis pela execução do PLS, no máximo, a cada 2 (dois) anos.
 - (C) O relatório de desempenho do PLS deve ser publicado no sítio eletrônico do respectivo órgão do Poder Judiciário e encaminhado ao órgão gestor do Supremo Tribunal Federal, por meio do PLS-Jud, até o dia 28 de fevereiro do ano posterior ao que se refere.
 - (D) As aquisições e contratações efetuadas pelos órgãos do Poder Judiciário devem observar os critérios de sustentabilidade quanto aos bens, serviços e obras, salvo na execução de reformas, na locação, aquisição e manutenção predial de bens imóveis utilizados na função jurisdicional.
 - (E) O Balanço Socioambiental do Poder Judiciário passa a ser denominado Balanço da Sustentabilidade do Poder Judiciário e será elaborado e publicado, anualmente, pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), com informações recebidas via PLS-Jud.
- 20.** No tocante ao tema da Gestão Estratégica do Poder Judiciário, a Resolução CNJ nº 325/2020 dispõe que a execução da Estratégia Nacional do Poder Judiciário é de responsabilidade de ministros, conselheiros, magistrados de primeiro e segundo graus, servidores e colaboradores do Poder Judiciário.
- E, nesse sentido, a Estratégia do Judiciário é executada de forma colaborativa e participativa sob a coordenação
- (A) do Presidente do Supremo Tribunal Federal.
 - (B) do Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça.
 - (C) da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário.
 - (D) do Coordenador Geral de Assuntos Estratégicos do Poder Judiciário.
 - (E) dos Conselhos de Justiça.
- 21.** No que diz respeito à atuação do enfermeiro na saúde digital, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) estabelece que:
- (A) todas as ações mediadas por TIC, que envolvem um ou mais usuários/pacientes, deverão ser realizadas por meio de plataformas adequadas e seguras registradas no Conselho Regional de Enfermagem responsável pela jurisdição onde a sede da instituição prestadora do serviço se localiza.
 - (B) no âmbito do SUS, bem como na saúde suplementar e privada, a consulta de enfermagem mediada por Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) poderá gerar prescrição de medicamentos, solicitação de exames e encaminhamentos, desde que previstos em protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas.
 - (C) é responsabilidade do enfermeiro técnico responsável da instituição garantir a infraestrutura necessária para o desempenho das ações de Telenfermagem, bem como o armazenamento, a guarda e os mecanismos de segurança dos dados gerados por elas.
 - (D) a realização de consultoria entre pares e com outros profissionais de saúde, mediada por TIC, poderá ser realizada apenas no âmbito da jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem onde o enfermeiro tenha seu registro profissional ativo.
 - (E) a prática de Telenfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro.
- 22.** É vedada aos profissionais de enfermagem a execução de prescrição eletrônica, validada por assinatura digital ou eletrônica, fora da validade. No âmbito ambulatorial, as receitas e prescrições, com a indicação do tipo de medicamento e doses, são válidas
- (A) por 24 horas.
 - (B) por 72 horas.
 - (C) por 7 dias.
 - (D) por 10 dias.
 - (E) pelo período de tratamento definido pelo prescritor.
- 23.** Recentemente, a comissão de gestão de materiais de uma instituição de saúde decidiu adotar o sistema de classificação XYZ, em que os materiais são classificados em escala gradativa, nas atividades em que serão utilizados, de acordo com sua criticalidade ou imprescindibilidade. Assim sendo, devem ser classificados(as) como material X, entre outros itens,
- (A) canetas, tinta e papel para impressora.
 - (B) luvas de procedimentos e máscaras cirúrgicas.
 - (C) esparadrapo e fita hipoalergênica.
 - (D) seringas descartáveis e tubos para a coleta de sangue para exames.
 - (E) solução de hipoclorito de sódio e soro glicosado a 25%.

24. Em um hospital, são utilizados como indicadores de qualidade:

- I. Incidência de quase falha relacionada ao processo de administração de medicação.
- II. Taxa de absenteísmo de profissionais de enfermagem.
- III. Índice de satisfação no trabalho em unidade de tratamento intensivo pediátrica.
- IV. Índice de treinamento de profissionais de enfermagem.

Os itens apresentados são exemplos de indicadores de

- (A) I = resultado; II = estrutura; III = resultado; IV = processo.
- (B) I = processo; II = estrutura; III = resultado; IV = resultado.
- (C) I = resultado; II = estrutura; III = processo; IV = processo.
- (D) I = processo; II = estrutura; III = resultado; IV = estrutura.
- (E) I = processo; II = resultado; III = resultado; IV = estrutura.

25. A matriz SWOT (FOFA) constitui uma das ferramentas gerenciais utilizadas no planejamento estratégico para a análise de cenário sobre o ambiente interno e externo de uma Organização. Sua estrutura possibilita a construção de um inventário dos quatro aspectos que a influenciam, de forma positiva ou negativa: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. Em relação a esses aspectos, é correto afirmar:

- (A) Ameaças: diz respeito às competências que não geram vantagem competitiva, mesmo estando sob influência da Organização.
- (B) Oportunidades: diz respeito às forças e situações externas à Organização que influenciam positivamente seu desempenho.
- (C) Fraquezas: diz respeito às forças externas que não estão sob controle da Organização e a impactam negativamente.
- (D) as Forças e Fraquezas são aspectos do ambiente externo da Organização, e Oportunidades e Ameaças estão relacionadas ao ambiente interno.
- (E) Forças: diz respeito às situações externas à Organização, que podem ser por ela modeladas e influenciam positivamente seu desempenho.

26. Em uma instituição, periodicamente, os protocolos assistenciais de enfermagem são revistos e atualizados. Para tal, entre outras ações, os enfermeiros responsáveis por essa tarefa, por meio da prática de enfermagem baseada em evidências, buscam identificar e sintetizar a melhor evidência disponível sobre o assunto em questão. Atualmente, a proposta da Pirâmide dos Níveis de Evidências, que propõe uma hierarquia de qualidade da informação para estudos clínicos, considera que

- (A) os estudos com delineamento caso-controle estão no topo da pirâmide dos estudos de maior qualidade.
- (B) os estudos com delineamento de coorte estão no topo da pirâmide dos estudos de maior qualidade.
- (C) no processo de análise, tanto o desenho quanto a qualidade metodológica dos estudos devem ser avaliadas.
- (D) os estudos de metanálise são o único tipo de estudo que permite encontrar as melhores evidências sobre o assunto de interesse.
- (E) os estudos de revisão sistemática da literatura são o único tipo de estudo que permite encontrar as melhores evidências sobre o assunto de interesse.

27. Em uma unidade ambulatorial, estão disponíveis dois tipos de equipamentos para a medida da pressão arterial (PA): esfigmomanômetro e dispositivo eletrônico de medida da pressão arterial. Ao orientar a equipe de enfermagem sobre o uso desses equipamentos, o enfermeiro deve esclarecer que

- (A) ao utilizar o esfigmomanômetro, deve ser selecionado o manguito com largura equivalente a 80% da circunferência do ponto médio do membro no qual o manguito será utilizado para aferir a PA.
- (B) independentemente do tipo de equipamento utilizado, repetir as medidas muito rapidamente resulta em leitura da pressão sistólica falsa-baixa.
- (C) o dispositivo eletrônico de medida da pressão arterial não é apropriado para a aferição da PA em indivíduos que apresentam tremores por frio ou pressão sistólica inferior a 90 mmHg.
- (D) independentemente do tipo de equipamento utilizado, manter o braço abaixo do nível do coração ao aferir a PA resulta em leitura falsa-baixa.
- (E) o dispositivo eletrônico de medida da pressão arterial só deve ser ligado após a colocação do manguito no braço do paciente/cliente.

Para responder as questões de números **28 a 30**, considere o relato a seguir.

Em 06.10.2023, C.T., 36 anos, sexo feminino, cozinheira, procurou o ambulatório da empresa porque havia sofrido queimadura com água quente. Ao examinar o local, o enfermeiro constatou que partes do antebraço, abdome e coxa esquerdos apresentavam eritema e flictenas com base rósea e úmida. Ao avaliar a extensão da superfície corporal queimada (SCQ), o enfermeiro constatou que a área de interesse correspondia a três vezes a superfície palmar da vítima, incluindo os dedos. Dando prosseguimento ao atendimento, entre outras ações, realizou o curativo nas áreas queimadas, orientou C.T. sobre os cuidados com o ferimento e retorno ao ambulatório para acompanhamento e avaliou sua carteira de vacinas para verificação do status vacinal em relação à profilaxia do tétano, observando os seguintes registros:

dT	dT	dTpa
16.06.2016	17.10.2016	09.06.2023

28. Em relação à avaliação da superfície corporal queimada realizada pelo enfermeiro, é correto afirmar que

- (A) SCQ = 1,5%.
- (B) SCQ = 6%.
- (C) SCQ = 15%.
- (D) não é possível estimar a extensão da superfície corporal queimada porque o enfermeiro deveria ter considerado como referência apenas a superfície palmar de C.T.
- (E) SCQ = 3%.

29. Ao realizar o curativo das áreas com queimadura de 2º grau, o enfermeiro deve, entre outros cuidados,

- (A) aplicar sulfadiazina de prata a 1%, para prevenir a colonização da ferida.
- (B) aplicar pomada à base de colagenase, para promover o desbridamento autolítico da ferida.
- (C) proceder à limpeza com soro fisiológico 0,9%, em jato, utilizando uma seringa de 20 mL, montada com agulha 40 x 12.
- (D) após limpeza, aplicar, preferencialmente, curativo de alginato de cálcio e sódio, como cobertura primária da ferida, para prevenir infecção.
- (E) higienizar a ferida com solução de Parkland.

30. Após analisar os registros vacinais apresentados, em relação à profilaxia do tétano, o enfermeiro deve considerar que

- (A) C.T. deve receber a terceira dose da vacina dT.
- (B) no momento, é desnecessária a aplicação de dose de reforço de vacina com componente toxoide tetânico e diftérico para a profilaxia do tétano.
- (C) C.T. deve receber a segunda dose da vacina dTpa.
- (D) C.T. deve receber uma dose de reforço com a vacina TT.
- (E) o esquema vacinal de C.T. deve ser reiniciado porque os intervalos entre as doses da vacina dT superaram em muito tempo o intervalo preconizado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

31. Durante o exame físico de um indivíduo adulto, com história de asma brônquica, ao aferir o pulso, o enfermeiro observou que este apresentava uma queda exagerada na amplitude durante a inspiração com aumento na amplitude durante a expiração, alterações essas que caracterizam o pulso

- (A) bigeminado.
- (B) em martelo d'água.
- (C) alternante.
- (D) paradoxal.
- (E) bisferiens.

32. Funcionária gestante, com 36^{5/7} semanas de gestação, Ilgesta, Ipara, procurou o ambulatório de saúde relatando perda de sangue vermelho vivo, via vaginal, com início há 15 minutos. Ao realizar a anamnese, a gestante negou contrações e dor abdominal. Ao exame físico, o enfermeiro observou que a gestante estava normotensa, normocárdica, eupneica e apresentava altura uterina compatível com a idade gestacional, abdome indolor, dinâmica uterina ausente e presença de sangramento vaginal vermelho vivo, em moderada quantidade. Constatou, ainda, feto vivo, apresentação cefálica, normocárdico. Frente a essa situação, o enfermeiro deve solicitar apoio médico e, suspeitando se tratar de um caso de _____, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde (2022), deve, entre outras ações, _____ e prepará-la para remoção para hospital/maternidade de referência.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto.

- (A) descolamento prematuro de placenta ... obter um acesso venoso calibroso que permita a reposição de volume para manter a estabilidade hemodinâmica da gestante
- (B) síndrome HELLP em curso ... obter um acesso venoso, realizar o controle dos sinais vitais, dinâmica uterina e frequência cardíaca fetal a cada 15 minutos, manter a gestante em repouso na posição que se sinta mais confortável
- (C) placenta prévia ... obter dois acessos venosos calibrosos que permitam a reposição de volume para manter a estabilidade hemodinâmica da gestante
- (D) descolamento prematuro de placenta ... realizar o controle dos sinais vitais, dinâmica uterina e frequência cardíaca fetal a cada 15 minutos, manter a gestante em decúbito lateral esquerdo
- (E) placenta prévia ... realizar o exame de toque vaginal para confirmação da suspeita diagnóstica, providenciar acesso venoso periférico

33. Considerando as recomendações das Diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE) da *American Heart Association* (AHA, 2020), assinale a alternativa correta.

- (A) Frente a um indivíduo adulto apresentando fibrilação ventricular sem pulso, os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar devem ser iniciados com a oferta de oxigênio seguida da aplicação de 1 mg de epinefrina, por via intravenosa, e compressões torácicas com frequência de 100 a 120 movimentos por minuto e profundidade de, pelo menos, 5 cm.
- (B) Em lactentes, o acesso intraósseo é preferível ao acesso intravenoso para a administração dos fármacos utilizados no atendimento à criança em parada cardiorrespiratória.
- (C) Em gestantes, está contraindicada a aplicação de choque como procedimento de ressuscitação cardiopulmonar, devendo este ficar restrito ao uso de medicamentos.
- (D) Frente a um indivíduo adulto apresentando taquicardia ventricular sem pulso, os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar devem ser iniciados com aplicação de choque com carga de 120 J, se monofásica.
- (E) Frente a uma gestante, com diagnóstico de eclâmpsia, em parada cardiorrespiratória, as intervenções obstétricas compreendem o deslocamento uterino lateral, a desconexão de monitores fetais e o preparo para cesariana de urgência caso seja indicada.

34. Ao longo do dia de trabalho, J.J., 63 anos, sexo masculino, hipertenso, técnico judiciário, passou a se mostrar confuso e com dificuldades na fala. Notando as mudanças no comportamento de J.J., um colega o acompanhou ao departamento de saúde para avaliação. Ao realizar o atendimento e exame físico do servidor, o enfermeiro obteve: temperatura axilar = 36,7 °C; frequência cardíaca = 78 batimentos por minuto, pressão arterial = 138 x 94 mmHg e observou que J.J. estava confuso e com a marcha alterada.

Considerando se tratar de um caso de acidente vascular encefálico em curso, como parte do exame neurológico, deve aplicar

- (A) o “teste do relógio”.
- (B) a Escala de Cincinnati.
- (C) o Mini exame do Estado Mental.
- (D) a Escala de Avaliação do Equilíbrio e da Marcha de Tinetti.
- (E) o Questionário de Pfeffer.

35. A embolia pulmonar (EP) é um distúrbio potencialmente fatal causado, de modo geral, por coágulos sanguíneos que se formam nas veias profundas das pernas e migram para as artérias pulmonares, obstruindo parte da árvore vascular pulmonar.

Em relação a essa condição, é correto afirmar que

- (A) medidas comumente adotadas para minimizar ou prevenir atelectasias, tais como o estímulo à respiração profunda e a espirometria de incentivo, estão contraindicadas para todos os pacientes com EP.
- (B) obesidade, repouso no leito por mais de três dias e catéteres venosos centrais consistem em fatores de risco moderados para o tromboembolismo.
- (C) os portadores de EP nem sempre apresentam sinais e sintomas óbvios, mas, quando presentes, os mais comuns são dispneia, dor torácica pleurítica, hipoxia, tosse e apreensão.
- (D) quando um trombo obstrui, de modo completo ou parcial, a artéria pulmonar ou seus ramos, o espaço morto alveolar é reduzido, e a área passa a receber pouco ou nenhum fluxo sanguíneo. Além disso, substâncias liberadas pelo coágulo fazem com que vasos e bronquíolos se contraíam, resultando em redução na resistência pulmonar, agravando o desequilíbrio ventilação-perfusão.
- (E) frente à suspeita de EP de grau leve, deve ser realizada, imediatamente, a administração de 500 mg de ácido acetilsalicílico, VO, com a finalidade de reduzir a adesão plaquetária, o que interfere na produção de trombos.

36. Funcionários de um departamento chegaram ao ambulatório da instituição acompanhando P.P., que apresentava agitação psicomotora, apreensão, pseudo-alucinações, movimentos estereotipados e tiques. Informaram ter observado que a servidora vinha apresentando comportamento estranho, com constantes mudanças de humor, mostrando-se muito feliz em um momento e, de uma hora para outra, depressiva, triste e introspectiva. Ao realizar o exame físico, o enfermeiro constatou que P.P. apresentava palidez, taquicardia, hipertensão, midríase e tremores não intencionais de face e dedos das mãos.

O quadro clínico apresentado é sugestivo de intoxicação por

- (A) cocaína, e o tratamento compreende a administração de benzodiazepínicos.
- (B) benzodiazepínicos, e a descontaminação compreende a realização de lavagem gástrica e a administração de carvão ativado.
- (C) canabinoides, e as medidas de suporte incluem: monitorizar sinais vitais, manter acesso venoso calibroso e hidratação adequada.
- (D) cocaína, e o tratamento compreende a administração do antídoto Naloxona.
- (E) heroína, e o tratamento compreende a administração do antídoto Naloxona.

37. Um servidor, com história de angina estável, procurou o departamento de saúde apresentando dispneia e relatando sensação de peso na parte superior do tórax e dor retroesternal, com início após vivenciar uma situação de conflito intenso com um colega de trabalho. Frente a essa situação, considerando se tratar de uma crise de angina, enquanto solicitava apoio médico e remoção do servidor para o hospital, entre outros cuidados, o enfermeiro realizou as seguintes intervenções:

- I. colocou o paciente em posição de semi-Fowler, mantendo-o em repouso;
- II. se certificou de que a boca do paciente estava úmida e administrou o comprimido de nitroglicerina que o paciente portava consigo, por via sublingual, orientando-o a não deglutir a saliva até que o comprimido estivesse dissolvido;
- III. instalou o monitor cardíaco e o oxímetro de pulso;
- IV. administrou oxigênio a 2 L/min, por cânula nasal;
- V. verificou os sinais vitais, obtendo a pressão arterial em ambos os braços do paciente;
- VI. administrou novo comprimido de nitroglicerina, por via sublingual, após 5 minutos, uma vez que o paciente relatou que ainda não havia sentido alívio da dor.

Para esse caso, são apropriadas as intervenções apresentadas em

- (A) I, II, III, IV, V, VI.
- (B) II, III, IV e V, apenas.
- (C) I, IV, V e VI, apenas.
- (D) III e V, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

38. O eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações é um exame diagnóstico padrão para os pacientes com angina e deve ser obtido imediatamente nos pacientes com desconforto torácico. Considerando-se que cada uma de suas derivações representa, topograficamente, uma determinada parede cardíaca, relacione as colunas do quadro apresentado a seguir de modo a tornar correta a relação entre as derivações e a parede do coração.

Derivações		Parede do coração	
a	V1 e V2	I	Lateral
b	V3 e V4	II	Septal
c	DI, aVL, V5 e V6	III	Inferior
d	DII, DIII e aVF	IV	anterior

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

- (A) a - II; b - I; c - III; d - IV.
- (B) a - IV; b - III; c - II; d - I.
- (C) a - II; b - III; c - I; d - IV.
- (D) a - II; b - IV; c - I; d - III.
- (E) a - I; b - II; c - III; d - IV.

39. No que diz respeito ao período de isolamento para casos de covid-19, suspeitos ou confirmados, atualmente o Ministério da Saúde (MS, 2023) recomenda que indivíduos
- (A) com quadro de síndrome gripal leve, para os quais não foi possível confirmação para covid-19 por critério clínico-epidemiológico e que apresentem resultado de exame laboratorial não reagente ou não detectável, as medidas de isolamento podem ser suspensas, independentemente da condição clínica do doente.
 - (B) assintomáticos, confirmados laboratorialmente para covid-19, devem iniciar, imediatamente, o isolamento respiratório domiciliar, que poderá ser suspenso no 7º dia completo após a data de coleta da amostra, sem a necessidade de realizar novo teste, observadas as medidas adicionais recomendadas pelo MS.
 - (C) com quadro de síndrome gripal leve, com confirmação para covid-19 por critério clínico-epidemiológico ou laboratorial, iniciem o isolamento respiratório domiciliar imediatamente, que poderá ser suspenso no 5º dia completo do início dos sintomas, caso esteja afebril há, pelo menos, 24 horas, sem a necessidade de testes de biologia molecular.
 - (D) imunocompetentes, com quadro de síndrome respiratória aguda grave, com confirmação para covid-19 por qualquer critério clínico-epidemiológico ou laboratorial, as medidas de isolamento e precaução devem ser iniciadas imediatamente e só podem ser suspensas após 14 dias do início dos sintomas, desde que permaneçam afebris, sem o uso de antitérmicos há, pelo menos, 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios.
 - (E) com quadro de síndrome gripal leve, com confirmação para covid-19 por critério clínico-epidemiológico ou laboratorial, que permaneçam sem melhora dos sintomas ou ainda apresentam febre no 5º dia completo do início dos sintomas ou apresentam novo exame positivo para SARS-CoV-2 realizado a partir do 5º dia completo do início dos sintomas, deve ser mantido em isolamento respiratório domiciliar até que novos testes realizados para covid-19 apresentem resultado negativo ou não reagente.
40. Um servidor foi afastado do trabalho por apresentar a doença mão-pé-boca contraída de seu filho acometido por essa infecção. Frente a essa situação, o enfermeiro deve considerar que
- (A) casos individuais da doença são de notificação compulsória semanal.
 - (B) a vacina contra varicela confere alguma proteção contra a doença, portanto os servidores devem ser orientados a atualizar as carteiras de vacinas com foco na aplicação desse imunobiológico.
 - (C) a doença é altamente contagiosa e em adultos cursa de forma grave; portanto, visando o diagnóstico precoce, os contatos do servidor na instituição deverão ser monitorados por 10 dias quanto aos sinais e sintomas da doença, tais como: febre, erupções maculopapulares e papulovesiculares pruriginosas nas mãos e pés e a presença de úlceras na mucosa oral e ao redor da boca.
 - (D) o servidor deverá ser mantido afastado do trabalho por três dias, período de transmissibilidade da doença.
 - (E) a ocorrência de dois ou mais casos em uma instituição ou ambiente de convivência é de notificação imediata e obrigatória.
41. Considere os diferentes aspectos relacionados ao diagnóstico da hipertensão e das emergências hipertensivas e assinale a alternativa correta.
- (A) A obtenção de valores da pressão arterial, em medida única e com a técnica de aferição adequada, superiores a 160 x 100 mmHg, com evidência de lesão de órgão alvo, configura crise hipertensiva.
 - (B) A hipertensão mascarada consiste na situação clínica em que a pressão arterial sistólica apresenta valores entre 121 e 139 mmHg e/ou pressão diastólica entre 81 e 89 mmHg no consultório, porém está normal na monitorização ambulatorial (MAPA) ou nas medidas residenciais da pressão arterial (MRPA), realizadas com técnica de aferição adequada.
 - (C) O efeito do avental branco não muda o diagnóstico, pois, se o indivíduo é normotenso, permanecerá normotenso, e, se é hipertenso, permanecerá hipertenso, no entanto pode alterar o estágio e/ou dar a falsa impressão de necessidade de adequações no tratamento.
 - (D) O diagnóstico de hipertensão pode ser definido em uma única visita se a pressão arterial do cliente adulto estiver maior ou igual a 160 x 100 mmHg e houver evidência de doença cardiovascular.
 - (E) O Ministério da Saúde recomenda que, em campanhas de rastreamento da hipertensão, homens com mais de 18 anos de idade, que apresentem pressão arterial com valores entre 120 x 80 mmHg e 130 x 85 mmHg, devem ser encaminhados para consulta de enfermagem para estratificação de risco cardiovascular.

42. Diversas drogas devem ser sempre lembradas e avaliadas por estarem relacionadas com o aumento da pressão arterial. Assim sendo, assinale a alternativa correta no que diz respeito ao medicamento (M) e as ações sugeridas (AS) pela linha de cuidado do adulto com hipertensão arterial sistêmica (MS, 2021), diante da indicação de seu uso.

- (A) M = vasoconstritores nasais; AS = usar por período curto, determinado.
- (B) M = anti-inflamatórios não esteroides; AS = substituir por tratamento não medicamentoso.
- (C) M = anticoncepcional oral; AS = administrar diurético, orientar restrição do uso de sal.
- (D) M = terapia de reposição estrogênica; AS = diminuir a dose, administrar diurético, orientar restrição do uso de sal.
- (E) M = glicocorticoide; AS = substituir por tratamento não medicamentoso.

43. Considere os fatores de risco apresentados a seguir.

- I. Hipertensão arterial sistêmica ou uso de anti-hipertensivo.
- II. Mulheres com gestação prévia com feto maior ou igual a 4 kg.
- III. Familiar em primeiro e segundo grau com diabetes melito.
- IV. Mulheres com história de endometriose.
- V. Colesterol HDL menor ou igual a 35 mg/dL e/ou triglicérides maior ou igual a 250 mg/dL.

Ao realizar a consulta de enfermagem, o enfermeiro deve considerar que o Ministério da Saúde (2020) recomenda o rastreamento de diabetes melito tipo 2 para todos os indivíduos assintomáticos, com IMC maior ou igual a 25 kg/m² e, pelo menos, mais um fator de risco para diabetes melito tipo 2, tais como os apresentados em

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e V, apenas.
- (C) I, II, III, IV, V.
- (D) I, II, III e V, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

44. A medida da hemoglobina glicada constitui uma ferramenta útil para a avaliação do controle glicêmico de portadores de diabetes melito. Ao interpretar os resultados obtidos para HbA1c, o enfermeiro deve considerar, de acordo com as metas no tratamento do diabetes propostas na Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes atualizada, que

- (A) níveis próximos a 7% correspondem a glicemias médias diárias de, aproximadamente, 125 mg/dL, variando de 90 a 180 mg/dL.
- (B) doenças que alteram a sobrevivência das hemácias, como a anemia hemolítica e hemorragia, podem resultar em valores falsamente altos.
- (C) portadores de anemia por carência de ferro, de vitamina B12 ou de folato podem apresentar valores falsamente elevados.
- (D) a variabilidade glicêmica (média das glicemias diárias) é corretamente representada por esse parâmetro.
- (E) é o indicador mais eficiente para o controle glicêmico da gestante diabética.

45. Considere os itens a seguir.

- I. Imunização com a vacina HPV.
- II. Rastreamento de lesões precursoras do câncer do colo do útero.
- III. Uso de preservativo feminino ou masculino nas relações sexuais.

No que diz respeito à prevenção do câncer do colo do útero, constitui medida de prevenção primária o apresentado em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II, III.
- (D) III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

46. De acordo com orientação do Ministério da Saúde, a aplicação da vacina _____ está contraindicada para indivíduos _____.

Selecione a alternativa que completa de forma correta a afirmação apresentada acima.

- (A) do HPV ... que apresentaram reações intensas tais como cefaleia e febre superior a 39 °C, no primeiro dia pós-vacinação, em dose anterior
- (B) da hepatite B (recombinante) ... que apresentaram dor, endurecimento e rubor intensos nas primeiras 24 horas após a aplicação da vacina, anteriormente
- (C) tríplice viral ... com mais de 39 anos de idade
- (D) da febre amarela ... submetidos a transplante de órgãos sólidos
- (E) adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) ... com história de febre superior a 39 °C, após ter recebido a vacina anteriormente

47. Atualmente, a instituição oferece a vacinação contra gripe para todos os servidores. Considerando que, para a campanha de vacinação, será utilizada a vacina influenza trivalente, de acordo com o Ministério da Saúde (2023), o enfermeiro deve estar ciente de que

- (A) pode ser administrada na mesma ocasião da aplicação de outras vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI) e com outros medicamentos, procedendo-se às administrações com seringas e agulhas diferentes, em locais anatômicos distintos.
- (B) a imunização ativa contra a influenza causada pelos tipos A e B de vírus influenza contidos nessa vacina está indicada para indivíduos a partir dos 12 anos de idade.
- (C) quando houver disponibilidade de pessoal capacitado, a via subcutânea profunda é preferível à via intramuscular, pois propicia melhor soroconversão.
- (D) indivíduos asmáticos devem ser orientados e monitorados, pois podem apresentar exacerbação dos sintomas nas primeiras 24 horas após a vacinação.
- (E) não existe impedimento para a doação de sangue após 2 horas da aplicação da vacina.

48. Segundo Carvalho (2008), citado em Tannure e Pinheiro (2021), “a validade de um diagnóstico de enfermagem (DE) refere-se ao grau em que este representa a verdadeira condição do paciente requerer determinada intervenção de enfermagem”. Entre os diferentes modelos utilizados para a validação de diagnósticos de enfermagem (DE), o mais utilizado é o Método de Validação de Fehring, que propõe três métodos distintos, a saber:
- (A) validação conceitual; validação por especialistas e validação clínica.
 - (B) validação a partir de revisão da literatura, validação por auditoria de prontuários e validação por especialistas.
 - (C) validação a partir de estudos retrospectivos, clínicos e de validação por especialistas.
 - (D) validação a partir de revisão integrativa da literatura e validação por enfermeiros peritos.
 - (E) validação de conteúdo diagnóstico, validação clínica de diagnóstico e validação diferencial de diagnósticos.
49. Em uma UBS, durante a consulta de enfermagem de A.B., sexo feminino, 48 anos, recém-diagnosticada como portadora de pré-hipertensão, após pactuar com a usuária as metas a serem alcançadas em relação ao peso corporal, atividade física e níveis pressóricos, o enfermeiro deu continuidade à aplicação do Processo de Enfermagem.
- Considerando-se as especificidades do processo de enfermagem na atenção básica, é correto afirmar que, em relação ao modelo tradicional, esse momento equivale à etapa de
- (A) diagnóstico de enfermagem.
 - (B) avaliação de enfermagem.
 - (C) prescrição de enfermagem.
 - (D) coleta de dados de enfermagem.
 - (E) evolução de enfermagem.
50. Entre outras situações, são condições que indicam o encaminhamento da gestante à urgência/ emergência obstétrica:
- (A) teste rápido positivo para sífilis e teste rápido positivo para HIV.
 - (B) hipertermia (Tax maior ou igual a 37,8 °C), sem sinais ou sintomas clínicos de infecção das vias respiratórias e suspeita de trombose venosa profunda.
 - (C) polidrâmnio e glicemia capilar de jejum maior que 200 mg/dL.
 - (D) pressão arterial maior que 140 x 90 mmHg e sorologia positiva para toxoplasmose.
 - (E) edema de membros inferiores 3+/4+ e restrição do crescimento fetal.
51. C.C., 54 anos, sexo feminino, procurou o enfermeiro solicitando ajuda para entender o resultado da mamografia de rastreamento para câncer de mama. Informou que não tinha queixas e que o exame fora realizado como procedimento de rotina. Ao consultar o laudo do exame, o enfermeiro constatou que o resultado apontava “Categoria BI-RADS 2”. Para esse caso, a interpretação (I), o risco de câncer (R) e a conduta (C) são:
- (A) I = achados provavelmente benignos; R = < 2%; C = solicitar ultrassom da mama e encaminhar C.C. para uma unidade de referência especializada para investigação e acompanhamento.
 - (B) I = sem achados; R = 0%; C = controle radiológico de rotina (a cada 2 anos).
 - (C) I = achados provavelmente benignos; R = < 2%; C = controle radiológico por três anos, com repetição do exame a cada 6 meses.
 - (D) I = achados provavelmente benignos; R = 0%; C = controle radiológico de rotina a cada 2 anos.
 - (E) I = achados provavelmente benignos; R = < 2%; C = controle radiológico por três anos, com repetição anual do exame.
52. Considere os métodos anticoncepcionais apresentados a seguir.
- I. Injetável trimestral
 - II. Pílulas combinadas
 - III. Minipílula
 - IV. DIU de cobre
 - V. Injeção mensal
- São métodos anticoncepcionais **NÃO** recomendados para a nutriz, pois afetam a qualidade e/ou quantidade do leite materno, apenas os apresentados em
- (A) I.
 - (B) I, II e V.
 - (C) III e IV.
 - (D) II e V.
 - (E) I, II, IV e V.
53. Ao fim da licença maternidade, B.B., analista judiciário, procurou o enfermeiro com dúvidas sobre os cuidados que deveria observar em relação ao seu leite, armazenado com o propósito de alimentar seu bebê ao retornar ao trabalho. Frente a essa situação, entre outras orientações, o enfermeiro deve esclarecer que
- (A) o degelo do leite deve ser realizado em banho maria.
 - (B) após a ordenha, o leite pode permanecer em temperatura ambiente por até 4 horas.
 - (C) o leite materno pode ser mantido no freezer por até 30 dias.
 - (D) pode ser utilizado o forno de micro-ondas para o degelo do leite, desde que programado para potência média e tempo máximo de aquecimento de três minutos.
 - (E) caso não seja utilizado todo o leite descongelado, a sobra, desde que não tenha sido oferecida à criança, pode ser mantida em geladeira por até 12 horas.

54. De acordo com determinação da ANVISA (2012), materiais semicríticos utilizados na assistência ventilatória, após serem rigorosamente limpos, devem ser submetidos, no mínimo
- (A) a desinfecção de alto nível.
 - (B) a desinfecção de nível intermediário.
 - (C) a esterilização por vapor sob pressão.
 - (D) a esterilização por método físico-químico.
 - (E) a processamento em lavadoras de descarga, para a desinfecção de nível intermediário, por meio físico.

55. Observe atentamente o quadro a seguir e relacione suas colunas de modo a tornar verdadeira a associação entre o princípio ativo de desinfetantes e as desvantagens no seu uso.

Princípio ativo		Desvantagens	
a	Glutaraldeído	I	Possui poder corrosivo em cobre, latão, bronze, aço comum e ferro galvanizado
b	Soluções cloradas	II	Corrosivo para metais, é incompatível com detergentes, tem odor forte, ação descolorante e é irritante para mucosas do trato respiratório
c	Ácido peracético	III	Fixa a matéria orgânica residual nos materiais, causando incrustações e até obstrução de lúmens

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

- (A) a- I; b-II; c-III.
- (B) a-II; b-I; c-III.
- (C) a-II; b-III; c-I.
- (D) a-III; b-I; c-II.
- (E) a-III; b-II; c-I.

56. Assinale a alternativa correta em relação aos controles de rotina dos processos de esterilização por meio de indicadores químicos.

- (A) Indicadores tipo I devem ser fixados externamente em todos os pacotes e caixas de instrumental, e sua mudança de cor garante que as condições para esterilização foram alcançadas.
- (B) Indicadores tipo IV são indicadores integradores utilizados para monitorar os três parâmetros críticos do ciclo de esterilização em autoclave: a temperatura, o tempo de exposição e a qualidade do vapor.
- (C) O teste de Bowie-Dick, utilizado para testar a competência da bomba de vácuo e a integridade das guarnições que vedam as portas da autoclave, deve ser realizado diariamente, antes de a primeira carga ser processada, com a autoclave vazia e pré-aquecida.
- (D) O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado com indicador químico, no mínimo tipo III, em cada carga, no centro do pacote de material de densidade de maior volume.
- (E) Os indicadores emuladores (simuladores) tipo VI são utilizados, exclusivamente, no processo de validação de equipamentos e ciclos.

57. Em relação ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde/estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, é correto afirmar:

- (A) os agentes comunitários de saúde (ACS) devem ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 500 pessoas.
- (B) a atividade do ACS deve se dar pela lógica do planejamento do processo de trabalho a partir das necessidades do território, com priorização para a população com maior grau de vulnerabilidade e de risco epidemiológico.
- (C) o número de ACSs por equipe é definido de acordo com os recursos orçamentários disponíveis para esse fim.
- (D) a equipe é constituída por um enfermeiro supervisor, um técnico ou auxiliar de enfermagem, e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- (E) todos os componentes da equipe devem cumprir, totalmente, a carga horária de 30 horas semanais.

58. A Política Nacional de Humanização tem como um de seus princípios

- (A) a indissociabilidade entre atenção e gestão.
- (B) a defesa dos direitos dos usuários.
- (C) a valorização do trabalhador.
- (D) o acolhimento.
- (E) a gestão participativa e cogestão.

- 59.** O risco de morte por uma determinada doença é medido por meio do indicador
- (A) índice de Swaroop & Uemura.
 - (B) coeficiente de mortalidade geral.
 - (C) curvas de mortalidade proporcional.
 - (D) coeficiente de letalidade.
 - (E) coeficiente de mortalidade proporcional por causas.
- 60.** Em grupo de WhatsApp, um profissional de enfermagem publicou mensagem difamatória sobre um colega, que, ao tomar o conhecimento do ocorrido, comunicou formalmente o Conselho Regional de Enfermagem responsável pela região onde ocorreu o fato, juntando as provas cabíveis. Configurada a infração ao artigo 71 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que estabelece como proibição “promover ou ser conivente com injúria, calúnia e difamação de pessoa e família, membro das equipes de enfermagem e de saúde, organizações de enfermagem, trabalhadores das outras áreas e instituições em que exerce sua atividade profissional”, o infrator estará sujeito a penalidade de
- (A) multa, que consiste no pagamento de até 100 vezes o valor da anuidade vigente para a categoria à qual pertence o infrator.
 - (B) advertência verbal, que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN/CORENs.
 - (C) cassação do direito ao exercício profissional, que pode vir a ser de caráter definitivo, divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN/CORENs, jornais de grande circulação e comunicada ao(s) empregador(es).
 - (D) censura, que consiste em repreensão que será publicada em jornal de grande circulação do município onde ocorreu o fato.
 - (E) suspensão do exercício profissional, por até 90 dias, que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN/CORENs, jornais de grande circulação e comunicada ao(s) empregador(es).