





Leia o texto e responda as questões de 01 a 03

Buscando o sentido

Paulo Leminski

O sentido, acho, é a entidade mais misteriosa do universo.

Relação, não coisa, entre a consciência, a vivência e as coisas e os eventos.

O sentido dos gestos. O sentido dos produtos. O sentido do ato de existir.

Me recuso a viver num mundo sem sentido.

Estes anseios/ensaios são incursões em busca do sentido.

Por isso o próprio da natureza do sentido: ele não existe nas coisas, tem que ser buscado, numa busca que é sua própria fundação.

Só buscar o sentido faz, realmente, sentido.

Tirando isso, não tem sentido.

LEMINSKI, P. Buscando o sentido. Disponível em: <<https://www.culturagenial.com/leminski-melhores-poemas/>>. Acesso em: 15 out 2019.

### QUESTÃO 1

As observações registradas pelo eu-lírico nesse poema permitem compreender que para o autor, o sentido é um(a)

- A) busca
- B) coisa
- C) evento
- D) produto

### QUESTÃO 2

No poema, ocorre o emprego do termo "sentido" em funções sintáticas distintas que podem ser classificadas majoritariamente como

- A) sujeito
- B) complemento verbal
- C) adjunto adnominal
- D) adjunto adverbial

### QUESTÃO 3

Na frase "ele não existe nas coisas", o termo "ele" estabelece uma função referencial em relação ao substantivo

- A) ato.
- B) evento.
- C) sentido.
- D) produto.

### QUESTÃO 4

O uso do pronome relativo "que" na frase "numa busca que é sua própria fundação." se justifica pela:

- A) função referencial de retomada anafórica do termo "sentido".
- B) função expressiva demarcada pela subjetividade do eu-lírico.
- C) antecipação coordenativa da oração sobre o sentido de buscar sentido.
- D) organização oracional para enfatizar o caráter metalinguístico do poema.

Leia o texto e responda a questão 05.



### QUESTÃO 5

A fala da personagem no último quadrinho produz ironia porquê?

- A) esclarece algo que nunca tinha sido dito pela mãe.
- B) questiona a veracidade dos fatos relacionados a existência do mundo.
- C) insinua que a mãe esteja apenas brincando ao apresentar razões tão nobres para as pessoas estarem no mundo.
- D) revela a admiração da personagem pela capacidade da mãe de explicar uma pergunta muito complexa.

## MATEMÁTICA

### QUESTÃO 6

Amanda recebeu uma herança de R\$ 30.000,00. Ela aplicou esse dinheiro a uma taxa de juros simples de 0,5% ao mês durante 10 meses. Qual será o montante ao final da aplicação?

- A) R\$ 1500,00
- B) R\$ 15.000,00
- C) R\$ 31.500,00
- D) R\$ 45.000,00

### QUESTÃO 7

Observe a tirinha abaixo:



Na pastelaria o vendedor informou ao pai de Magali que tinha pastéis de carne e de frango. Já o sorveteiro sugeriu, para a menina, sorvete de chocolate, flocos e morango. De quantos modos distintos Magali poderá fazer um lanche sabendo que ela poderá se servir com apenas um pastel e uma bola de sorvete?

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) 10

**QUESTÃO 8**

A professora de Português vai sortear um aluno da classe para apresentar um trabalho. Se na classe há 12 meninos e 18 meninas, qual é a probabilidade, em porcentagem, de uma menina ser sorteada para essa apresentação?

- A) 80%
- B) 40%
- C) 60%
- D) 70%

**QUESTÃO 9**

Ao se dividir o número 60 em partes diretamente proporcionais a 2, 4 e 8, essas partes são respectivamente:

- A) 10, 20 e 30.
- B) 8, 16 e 36.
- C) 6, 12 e 42.
- D) 12, 24 e 24.

**QUESTÃO 10**

O gráfico abaixo fornece informações relacionadas às exportações da Zedelândia, um país que utiliza o zed como sua moeda corrente.



Qual foi a diferença (em milhões de zeds) das exportações da Zedelândia em 2000 e 1996?

- A) 20,4 milhões
- B) 42,6 milhões
- C) 27,1 milhões
- D) 22,2 milhões

**CONHECIMENTOS GERAIS****QUESTÃO 11**

Em 1939, o governo do Estado Novo no Brasil criou um Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) encarregado de efetuar a censura às ideias opositoras ao regime e propagar as convicções políticas do governo. O DIP implantou vários meios de comunicação para abranger a maior parte da população com a ideologia do Estado Novo, objetivando mobilizar a sociedade em torno de seus ideais políticos. Dentre esses meios de comunicação e propaganda, é possível destacar um novo instrumento persuasivo, que, em especial, permitiu às ideias deste regime atingirem o operariado e as classes médias urbanas.

O texto está se referindo:

- A) À imprensa operária.
- B) À televisão.
- C) Ao rádio.
- D) Ao cinema.

---

**QUESTÃO 12**

O Brasil se destaca entre todos os países da América Sul em extensão territorial, estabelece fronteiras com a maioria das nações que compõe esse subcontinente. Indique a alternativa que relaciona aos dois países sul-americanos que não estabelecem limites com o território brasileiro.

- A) Chile e Peru
- B) Equador e Peru
- C) Equador e Chile
- D) Argentina e Uruguai

---

**QUESTÃO 13**

Esse ideal desenvolvimentista foi consolidado num conjunto de 30 objetivos a serem alcançados em diversos setores da economia, [...]. Na última hora o plano incluiu [...] a construção de Brasília e a transferência da capital federal, o grande desafio de governo. [...] Para os analistas da época, o Brasil vinha passando, desde a década de 1930, por um processo de substituição de importações não planejado, e a falta de planejamento seria a causa dos constantes desequilíbrios no balanço de pagamentos. O Plano [...] pretendia suprir essa falta. A introdução de uma meta de consolidação da indústria automobilística no país tinha como objetivo, entre outras coisas, a redução planejada e gradativa da importação de veículos.

(Fonte: Disponível em:<<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies...>>. Acesso em 03 nov. 2019.)

Considerando o processo de industrialização brasileiro, no texto acima é possível apreender a caracterização de um momento histórico que associa a atuação de:

- A) Juscelino Kubitschek ao Plano de Metas
- B) Gaspar Dutra ao Plano Salte
- C) governos militares ao milagre econômico
- D) Getúlio Vargas em seu retorno ao governo à política nacionalista

---

**QUESTÃO 14**

As quatro maiores cidades goianas pela ordem são:

- A) Brasília, Goiânia, Anápolis e Luziânia
- B) Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Rio Verde
- C) Goiânia, Anápolis, Luziânia e Aparecida de Goiânia
- D) Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Trindade

**QUESTÃO 15**

Observe a imagem e responda:



Localização de Santo Antônio da Barra no Brasil e em Goiás

Leia as afirmações sobre o município de Santo Antônio da Barra

- I. O município se estende por 451,6 km<sup>2</sup> e contava com 4 423 habitantes no último censo (2010). A densidade demográfica é de 9,8 habitantes por km<sup>2</sup> no território do município.
- II. Santo Antônio da Barra é vizinho dos municípios de Rio Verde, Santa Helena de Goiás e Acreúna e está situado a 564 metros de altitude, e possui as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 17° 32' 27" Sul, Longitude: 50° 38' 31" Oeste.
- III. Está localizado no Sudoeste Goiano, e sua ocupação teve início com a família de Joaquim Domingos da Silva e Alventina Borges da Silva, quando este casal instalou um cruzeiro na região em devoção a Santo Antônio no dia 13 de julho de 1951.
- IV. O distrito intitulado Santo Antônio da Barra foi criado pela Lei Municipal n.º 549, de 20/04/1962, submetido ao município de Rio Verde.

Está correto o que se afirma em:

- A) Apenas, I e III
- B) Apenas, I, II e III
- C) Apenas, II, III e IV
- D) I, II, III e IV

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 16**

O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente, **EXCETO**:

- A) Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 desta Lei;
- B) Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar;
- C) Participar da equipe de saúde.
- D) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

**QUESTÃO 17**

Presença de tosse é indicativa da existência de alguma doença e, portanto, sua etiologia deve ser pesquisada. Define-se como tosse persistente a presença desse sintoma por, pelo menos, três semanas. Suas principais causas são rinosinusopatias (rinite e rinosinusite), asma e refluxo gastroesofágico. A tosse pode ser classificada em:

- A) Aguda até três semanas de duração, subaguda de três a oito semanas e crônica se superior a oito semanas.
- B) Aguda até duas semanas de duração, subaguda de quatro a oito semanas e crônica se superior a oito semanas.
- C) Aguda até quatro semanas de duração, subaguda de quatro a oito semanas e crônica se superior a oito semanas.
- D) Aguda até três semanas de duração, subaguda de quatro a nove semanas e crônica se superior a dez semanas.

### QUESTÃO 18

Taquipneia é definida pelo aumento da frequência respiratória. Dispnéia é caracterizada por:

- A) Falta de ar ou respiração difícil.
- B) Aumento da frequência respiratória.
- C) Aumento da frequência cardíaca.
- D) Diminuição da frequência respiratória.

### QUESTÃO 19

DPOC é uma doença com repercussões sistêmicas, prevenível e tratável, caracterizada por limitação do fluxo aéreo pulmonar, parcialmente reversível e geralmente progressiva. Essa limitação é causada por uma associação entre doença de pequenos brônquios (bronquite crônica obstrutiva) e destruição de parênquima (enfisema). A bronquite crônica é definida clinicamente pela presença de tosse e expectoração na maioria dos dias por no mínimo três meses/ano durante dois anos consecutivos. O enfisema pulmonar é definido anatomicamente como:

- A) Diminuição dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, com destruição das paredes alveolares;
- B) Aumento dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, com obstrução das paredes alveolares;
- C) Aumento dos espaços aéreos intercostais ao bronquíolo inicial, com destruição das paredes alveolares;
- D) Aumento dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, com destruição das paredes alveolares.

### QUESTÃO 20

Em situações especiais para a medida da pressão arterial, a determinação da pressão arterial em crianças é recomendada como parte integrante de sua avaliação clínica. Marque a alternativa **CORRETA**, quanto aos Critérios a serem observados:

- I- A largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 40% da circunferência do braço;
- II- O comprimento da bolsa de borracha do manguito deve envolver 80% a 100% da circunferência do braço;
- III- O comprimento da bolsa de borracha do manguito deve envolver 60% a 80% da circunferência do braço;
- IV- A pressão diastólica deve ser determinada na fase V de Korotkoff.

Está correta a alternativa:

- A) Apenas, I, II e IV
- B) Apenas, II e III
- C) Apenas, III e IV
- D) Apenas, IV

### QUESTÃO 21

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário pelo tecido hepático, que podem apresentar características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais semelhantes, porém, com importantes particularidades. A principal via de contágio do vírus da hepatite A é:

- A) A fecal-oral; por contato inter-humano ou através de água e alimentos contaminados.
- B) A oral; por contato inter-humano com pacientes que ainda não iniciaram o tratamento;
- C) A fecal-oral; através de gotículas espalhadas pelo ar e alimentos contaminados por agrotóxicos.
- D) A fecal; por contato direto ou através do sangue e alimentos.

### QUESTÃO 22

O estilo de vida é claramente um dos maiores responsáveis pela morbidade e pela alta prevalência das doenças crônicas. Entre os aspectos associados estão, principalmente, os hábitos e as atitudes que contribuem para o aumento do sobrepeso corporal, especialmente associado ao aumento da obesidade visceral, alto consumo energético e excesso ou deficiência de nutrientes associados ao padrão alimentar baseado em alimentos industrializados (BRASIL, 2001; CANAAN et al., 2006). A alimentação está relacionada diretamente a alguns fatores que interferem na prevenção e/ou controle das doenças crônicas e seus agravos. São eles:

- I- Excesso de peso,
- II- Dislipidemia,
- III- Mau controle glicêmico e padrão alimentar com consumo excessivo de gordura saturada e pouca ingestão de frutas e vegetais (BRASIL, 2001; OMS, 2003)
- IV- Baixo peso.

Está correto o que se afirma em:

- A) Apenas, I
- B) Apenas, I, II e III
- C) Apenas, III
- D) Apenas, III e IV

### QUESTÃO 23

O conceito da criança "gordinha" como sinônimo de saúde deve ser reconstruído por meio de um processo educativo compartilhado entre profissionais de saúde e a família, no sentido de sensibilizar para a necessidade de um acompanhamento nutricional, estimulando a formação de práticas alimentares saudáveis. Desta forma torna-se imprescindível a valorização do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, a partir da caderneta da criança. Marque a alternativa **CORRETA** quanto a promoção da alimentação saudável a criança:

- I- Promoção, apoio e estímulo ao aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementar até dois anos de vida ou mais;
- II- Valorização do acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento, a partir da caderneta da criança;
- III- Busca ativa dos não vacinados e supervisão na caderneta de imunização;
- IV- Prevenção a doenças autoimunes do sexto ao oitavo mês de vida.

Está correta a alternativa:

- A) Apenas, I e II
- B) Apenas, II e III
- C) Apenas, III
- D) I,II,III e IV.

### QUESTÃO 24

A obesidade na gestação está cada vez mais colocada como um problema de saúde pública, contribuindo para a morbimortalidade gestacional e fetal. O excesso de peso materno é fator de risco para:

- A) Diabetes Mellitus, síndrome hipertensiva arterial, tromboembolia, macrossomia fetal, prematuridade, e defeitos do tubo neural;
- B) Diabetes gestacional, síndrome do pânico, tromboembolia, microssomia fetal, prematuridade, e defeitos do tubo neural;
- C) Diabetes gestacional, síndrome hipertensiva arterial, tromboembolia, microssomia fetal, prematuridade, e cardiopatia crônica;
- D) Diabetes gestacional, síndrome hipertensiva arterial, tromboembolia, macrossomia fetal, prematuridade, e defeitos do tubo neural.

### QUESTÃO 25

Na perimenopausa e no climatério as mudanças endócrinas clínicas, biológicas e psicossociais começam a ocorrer. A menopausa em si tem grande impacto na composição corporal pelas mudanças metabólicas que promove, como:

- A) A diminuição da taxa metabólica ao repouso;
- B) O aumento da síntese de colágeno;
- C) Ganho de massa magra e aumento de gordura corporal total, principalmente a abdominal, fatores que concorrem para o aumento da massa corporal (COUTINHO, 1999, LINS, 1999; MONTILLA, 2003 REIS et al.,2000);
- D) Aumento da taxa metabólica ao repouso.

### QUESTÃO 26

A esquistossomose é uma doença infecciosa parasitária provocada por vermes do gênero Schistosoma, que pode evoluir desde a forma assintomática até aquelas formas clínicas extremamente graves. A fase inicial da esquistossomose coincide com a penetração da cercária na pele, que pode ser assintomática ou apresentar intensa manifestação pruriginosa - dermatite cercariana - caracterizada por micropápulas "avermelhadas" semelhantes às picadas de insetos. Essas manifestações duram, em geral, de:

- A) 12 a 24 horas, podendo chegar até 10 dias;
- B) 24 a 36 horas, podendo chegar até 15 dias;
- C) 24 a 72 horas, podendo chegar até 15 dias;
- D) 36 a 72 horas, podendo chegar até 20 dias;

### QUESTÃO 27

A Malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários do gênero Plasmodium, caracterizada por febre alta acompanhada de calafrios, suores e cefaléia, que ocorrem em padrões cíclicos, a depender da espécie do parasito infectante. Possui uma fase sintomática inicial, caracterizada por:

- A) Mal-estar, com ausência cefaléia, cansaço, mialgia, náuseas e vômitos, que geralmente precede à clássica febre da malária ;
- B) Mal-estar, ausência de cefaleia e presença de cansaço, mialgia, vômitos, e febre da malária ;
- C) Mal-estar, cefaléia, cansaço, mialgia, vômitos, e ausência de febre ;
- D) Mal-estar, cefaléia, cansaço, mialgia, náuseas e vômitos, que geralmente precede à clássica febre da malária .

### QUESTÃO 28

Influenza sazonal é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e distribuição global. Um indivíduo pode contrai-la várias vezes ao longo da vida. Em geral, tem evolução autolimitada, podendo, contudo, apresentar-se de forma grave. Alguns casos podem evoluir com complicações, especialmente em indivíduos com doença crônica, idosos e crianças menores de 2 anos, o que acarreta elevados níveis de morbimortalidade. As mais comuns são:

- I- Pneumonia bacteriana e por outros vírus;
- II- Sinusite;
- III- Otite;
- IV- Desidratação.

Está correto o que se a firma em:

- A) Apenas, I e II
- B) Apenas, II
- C) Apenas, III e IV
- D) I,II,III e IV

### QUESTÃO 29

A Coqueluche é uma doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade, de distribuição universal. Importante causa de morbimortalidade infantil. Compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. Em lactentes, pode resultar em um número elevado de complicações e até em morte. Para efeito de controle, considera-se que o período de transmissão se estende do:

- A) 6º dia após a exposição do doente até a 4ª semana do início das crises paroxísticas (acessos de tosse típicos da doença). Em lactentes menores de 6 meses, pode prolongar-se por até 4 ou 6 semanas após o início da tosse;
- B) 5º dia após a exposição do doente até a 3ª semana do início das crises paroxísticas (acessos de tosse típicos da doença). Em lactentes menores de 6 meses, pode prolongar-se por até 4 ou 6 semanas após o início da tosse;
- C) 6º dia após a exposição do doente até a 3ª semana do início das crises paroxísticas (acessos de tosse típicos da doença). Em lactentes menores de 6 meses, pode prolongar-se por até 5 ou 6 semanas após o início da tosse.
- D) 5º dia após a exposição do doente até a 2ª semana do início das crises paroxísticas (acessos de tosse típicos da doença). Em lactentes menores de 6 meses, pode prolongar-se por até 4 ou 6 semanas após o início da tosse.

### QUESTÃO 30

Doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa. A viremia provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento das diversas manifestações clínicas. O período de incubação pode variar entre 7 e 21 dias, desde a data da exposição até o aparecimento do exantema. O texto discorre sobre a doença:

- A) Sarampo;
- B) Coqueluche;
- C) Hanseníase;
- D) Sífilis.

### QUESTÃO 31

O Tétano Neonatal é uma doença infecciosa aguda, grave, não contagiosa, que acomete o recém-nascido nos primeiros 28 dias de vida, tendo como manifestação clínica inicial a dificuldade de sucção, irritabilidade e choro constante. Seu período de incubação é de:

- A) Aproximadamente 10 dias, podendo variar de 12 a 28 dias;
- B) Aproximadamente 7 dias, podendo variar de 2 a 10 dias;
- C) Aproximadamente 8 dias, podendo variar de 11 a 14 dias;
- D) Aproximadamente 7 dias, podendo variar de 2 a 28 dias.

### QUESTÃO 32

A Cólera é uma doença infecciosa intestinal aguda, causada pela enterotoxina do *Vibrio cholerae* O1 ou O139, com manifestações clínicas variadas. Frequentemente, a infecção é assintomática ou oligossintomática, com diarreia leve. Pode também se apresentar de forma grave, com diarreia aquosa e profusa, com ou sem vômitos, dor abdominal e câibras. Quando não tratada prontamente, pode ocorrer desidratação intensa, levando a graves complicações e ao óbito. As manifestações clínicas mais frequentes da cólera são diarreia e vômitos, com diferentes graus de intensidade. Também pode ocorrer dor abdominal e, nas formas severas:

- A) Câibras, desidratação e choque;
- B) Diarreia leve, vômitos e cansaço;
- C) Câibras, vômitos e diarreia moderada;
- D) Desidratação, prostração e diarreia leve.

### QUESTÃO 33

As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Atribuições Comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica:

- A) Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares;
- B) Garantir a atenção à saúde da população geral, buscando a integralidade por meio apenas da promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos.
- C) Garantir a atenção à saúde da população municipal, buscando a demanda por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos e da garantia de atendimento agendado, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares;
- D) Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando os usuários do SUS por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos e da garantia de atendimento da demanda por quantidade de consultas através de agendamento, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares;

### QUESTÃO 34

O calendário de vacinação brasileiro é definido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e corresponde ao conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país. Atualmente é constituído por 17 produtos recomendados à população, desde o nascimento até a terceira idade. A Portaria nº 1533 de 18 de agosto de 2016 delibera o Calendário Nacional de Vacinação. Quanto à eficácia da vacina BCG, marque a alternativa **CORRETA**:

- A) Quando administrada antes da infecção pelo Mycobacterium pode reduzir os riscos das formas graves de tuberculose (miliar e meníngea) em até 75%, mas não eliminará o risco;
- B) Quando administrada depois da infecção pelo Mycobacterium pode reduzir os riscos das formas graves de tuberculose (miliar e meníngea) em até 75%, mas não eliminará o risco;
- C) Quando administrada antes da infecção pelo Mycobacterium pode reduzir os riscos das formas graves de tuberculose (miliar e meníngea) em até 80%, mas não eliminará o risco;
- D) Quando administrada antes da infecção pelo Mycobacterium pode reduzir os riscos das formas graves de tuberculose (miliar e meníngea) em até 65%, mas não eliminará o risco.

### QUESTÃO 35

A Rede de Frio ou Cadeia de Frio é um sistema logístico que compreende uma equipe técnica qualificada, equipamentos e procedimentos padronizados para o recebimento, armazenamento, conservação, manuseio, distribuição e transporte de imunobiológicos em condições adequadas de temperatura e protegidos da luz, desde o fabricante até o momento de sua utilização. As câmaras refrigeradas são aplicáveis aos imunobiológicos armazenáveis à temperatura positiva, de:

- A) +5°C a 8°C;
- B) +2°C a +6°C;
- C) +4°C a +2°C;
- D) +2°C a +8°C.