

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG1A1-I

Uma forte tendência na moderna medicina americana é buscar, na prática médica milenar oriental, explicações para paradigmas existentes no século em que vivemos. Essa medicina entende que o bem-estar mental e o espiritual fazem parte da saúde. Existe uma preocupação especial, nesta prática, com o funcionamento normal do organismo.

Esse conceito novo de atuar na preservação da qualidade de vida do paciente vem sendo denominado como medicina de gerenciamento do envelhecimento. O fundamento desta área da medicina baseia-se na ideia de que o paciente pode envelhecer com doenças ou com saúde. Com o avanço da tecnologia e das pesquisas, muitos estudos já consolidaram o que então era apenas uma hipótese: que o corpo humano foi desenvolvido para não adoecer e que, quando há uma falha, ocasionando alguma doença, isso ocorre por motivos que podem, sim, ser evitados. Talvez o que mais tenha corroborado essa afirmação tenha sido a descoberta do radical livre, em 1900.

Em 50 anos, se conheceu toda a sua química. Em 1954, pela primeira vez, essas substâncias reativas e tóxicas foram relacionadas a uma doença inexorável, o envelhecimento. O radical livre é um elemento gerado no organismo desde o momento da concepção, e sua produção é contínua, durante toda a nossa existência. Até certa idade, o organismo consegue neutralizar esses elementos, mas chega uma fase em que sua produção excede a sua degradação e sobrepuja a dos mecanismos de defesa naturais (antioxidantes). Ocorre, então, o início das alterações estruturais que culminam na lesão celular. Doenças relacionadas com o envelhecimento estão intimamente associadas com o aumento de radicais livres.

A medicina do gerenciamento do envelhecimento preocupa-se em conceituar e promover a saúde de forma diferente. Em vez de aguardar passivamente pelo dano ou pelas doenças, ela atua na vida das pessoas de forma preventiva e preditiva, muito antes que as patologias se manifestem. A proposta consiste em ajustar todos os parâmetros biológicos, metabólicos e hormonais aos mesmos níveis encontrados em um indivíduo de aproximadamente 30 anos – fase em que todos nós atingimos o apogeu de nossa *performance* e idade a partir da qual começamos a envelhecer.

Internet: <revistainterativa.org> (com adaptações).

Julgue os itens subsequentes, considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto CG1A1-I.

- 1 A moderna medicina americana é baseada na prática médica milenar oriental.
- 2 A medicina oriental tem preocupação com o bem-estar mental e espiritual, para além do bem-estar físico.
- 3 De acordo com as ideias do texto, para envelhecer sem doenças, é preciso impedir a produção de radicais livres no organismo.
- 4 O texto indica que, para prevenir-se de doenças relacionadas ao envelhecimento, o ideal é que o indivíduo inicie o tratamento preventivo com aproximadamente trinta anos.
- 5 A omissão da preposição “em”, no trecho “explicações para paradigmas existentes no século em que vivemos” (primeiro período do primeiro parágrafo), prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto.
- 6 Sem prejuízo da correção gramatical do texto e de seu sentido original, o trecho “Talvez o que mais tenha corroborado esta afirmação tenha sido a descoberta do radical livre, em 1900” (último período do segundo parágrafo) poderia ser reescrito da seguinte forma: Possivelmente o que mais tenha ratificado esta hipótese tenha sido a descoberta, em 1900, do radical livre.
- 7 O pronome “sua” empregado no primeiro período do terceiro parágrafo remete a “radical livre”, no último período do parágrafo anterior.
- 8 O trecho “essas substâncias reativas e tóxicas foram relacionadas a uma doença inexorável, o envelhecimento” (primeiro período do terceiro parágrafo) poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: relacionou-se essas substâncias reativas e tóxicas a uma doença inexorável: o envelhecimento.
- 9 No trecho “O fundamento desta área da medicina baseia-se na ideia de que o paciente pode envelhecer com doenças ou com saúde” (segundo parágrafo), o verbo **poder** foi empregado no sentido de **ter capacidade de**.
- 10 No trecho “mas chega uma fase em que sua produção excede a sua degradação e sobrepuja a dos mecanismos de defesa naturais (antioxidantes)” (terceiro parágrafo), o verbo “sobrepujar” foi empregado no texto com o sentido de **impedir, interromper**.
- 11 No trecho “A proposta consiste em ajustar todos os parâmetros biológicos, metabólicos e hormonais aos mesmos níveis encontrados em um indivíduo de aproximadamente 30 anos — fase em que todos nós atingimos o apogeu de nossa *performance* e idade a partir da qual começamos a envelhecer” (último período), o travessão foi empregado para introduzir uma ideia adicional, sendo correta sua substituição pelo sinal de ponto e vírgula.

Texto CG1A1-II

Para uma criança pequena, é muito mais difícil racionalizar a emergência vivida em uma pandemia. Ela ainda não tem os recursos cognitivos necessários para compreender algo tão abstrato como o coronavírus. Ainda nos estágios iniciais do desenvolvimento da afetividade e da inteligência, as crianças se guiam pelas experiências, pelo que podem ver, ouvir, tocar, cheirar, imaginar, imitar, dizer, brincar. Muito mais do que atentar para os conceitos que explicam a situação excepcional, elas se guiam pela observação de seus pais ou familiares: como eles interagem entre si e com elas? Estão próximos e carinhosos? Estão juntos, mas “distantes”, ansiosos, sem tempo para ficar com elas?

Esse tipo de conduta dos pais é, por definição, particular. O mesmo estímulo ou situação ambiental não provoca necessariamente as mesmas reações em diferentes crianças ou até em diferentes momentos de uma mesma criança, ou seja, a resposta da criança a um estímulo do ambiente depende, em alto grau, de sua condição cognitiva e emocional, e essa condição tem a ver com os adultos que a cercam.

Internet: <portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br> (com adaptações).

Julgue os itens subsequentes, considerando as ideias e as construções linguísticas do texto CG1A1-II.

- 12 Sugere-se no texto que o bem-estar das crianças guarda estreita relação com o comportamento dos adultos que a cercam.
- 13 Depreende-se da leitura do segundo parágrafo do texto que reações das crianças aos estímulos são, em geral, imprevisíveis e repentinas.
- 14 O texto defende a ideia de que as crianças pequenas toleram melhor do que os adultos o momento de pandemia porque elas não racionalizam bem a emergência dos fatos vividos.
- 15 O segundo período do texto apresenta uma explicação para a afirmação que é feita no primeiro período.
- 16 No trecho “Muito mais do que atentar para os conceitos que explicam a situação excepcional” (quarto período do primeiro parágrafo), a oração “que explicam a situação excepcional” delimita o sentido do termo “conceitos”.
- 17 No último período do texto, o deslocamento da forma pronominal “a” para logo depois da forma verbal “cercam” — escrevendo-se **cercam-na** — preservaria a correção gramatical do texto.
- 18 A omissão da vírgula logo após “emocional”, no último período do texto, preservaria sua correção gramatical.

A Lei estadual n.º 6.754/2006 determina a criação de comissões de ética em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo do estado de Alagoas, as quais são responsáveis, entre outras atribuições, pela apuração da prática de atos contrários ao Código de Ética Funcional do Servidor Público do Estado de Alagoas. Acerca do processo de apuração desses atos, julgue os seguintes itens.

- 19 O servidor público será oficiado para manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre a instauração de processo de apuração de ato em desrespeito ao citado código de ética.
- 20 Provas documental e testemunhal serão produzidas pelos interessados, sendo vedado à comissão de ética fazê-lo.
- 21 A violação das normas estipuladas no referido código de ética acarretará a cominação de advertência ou censura ética, que será transcrita na ficha funcional do servidor faltoso, pelo período de dez anos.
- 22 Encerrada a instrução do processo, a comissão de ética oficiará o servidor público para nova manifestação, no prazo de três dias.

Com relação à atuação do servidor público em consonância com o Código de Ética Funcional do Servidor Público do Estado de Alagoas, julgue os itens a seguir.

- 23 Os servidores públicos deverão comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis.
- 24 A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público no exercício de cargo, emprego ou função; os atos, os comportamentos e as atitudes praticados fora de tal exercício não influenciarão na vida funcional do servidor, uma vez que não estão a ela relacionados.
- 25 É dever do servidor público ser probo, reto, legal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum.
- 26 A participação em movimentos e estudos relacionados com a melhoria do exercício de suas funções não constitui dever fundamental do servidor público.

O Código de Ética Funcional do Servidor Público do Estado de Alagoas estabelece uma série de infrações funcionais atribuíveis aos servidores públicos estaduais. A respeito dessas infrações, julgue os itens subsequentes.

- 27 O servidor público poderá, em função do espírito de solidariedade, ser conivente com erro praticado por colega, desde que tal erro não configure infração grave ao referido código de ética.
- 28 Ao servidor público é vedado deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
- 29 Embora seja vedado ao servidor público fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito de seu serviço em benefício próprio ou de parentes, o referido código de ética não faz menção expressa à vedação de uso de tais informações por amigos do servidor ou por terceiros.
- 30 É vedado ao servidor público permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores.

Com base na Constituição do estado de Alagoas, julgue os itens a seguir.

- 31 Se um servidor público civil aposentado do estado de Alagoas for aprovado em concurso público para uma secretaria do mesmo estado, os proventos da inatividade que ele recebe não serão considerados para efeito de acumulação de cargos.
- 32 A municipalização dos recursos e ações dos serviços de saúde são diretrizes a serem observadas no sistema único de saúde e são expressamente previstas na Constituição do estado de Alagoas.
- 33 Se um militar médico do estado de Alagoas for aprovado em concurso público para o cargo de médico, como servidor público civil de determinada secretaria do estado, ao tomar posse no novo cargo, ele deverá ser transferido para reserva, independentemente dos horários dos cargos.

Julgue os itens a seguir, com base na Lei n.º 5.247/1991, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos civis do estado de Alagoas, das autarquias e das fundações públicas estaduais.

- 34 Cancelada a penalidade disciplinar de suspensão aplicada a um servidor público civil, esta não terá efeitos retroativos.
- 35 Suponha que determinado servidor público civil, ao completar 69 anos de idade, tenha sido aposentado por invalidez, e que, três anos depois, a junta médica oficial tenha declarado insubsistentes os motivos da aposentadoria. Nessa situação, deverá ocorrer a reversão do servidor no mesmo cargo.
- 36 Se um servidor público civil não for aprovado em estágio probatório no cargo público em que tenha tomado posse, poderá ocorrer o seu aproveitamento, se anteriormente ele ocupava cargo efetivo.
- 37 Servidor público civil que estiver em débito com o erário e requerer a exoneração do cargo que ocupa não poderá deixar de ser exonerado pelo seu débito; a ele será dado o prazo de sessenta dias para quitação do débito, sob pena de ser inscrito em dívida ativa.
- 38 Servidor público civil que estiver em gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família não poderá exercer qualquer atividade remunerada, mas poderá exercê-la se a licença for por motivo de afastamento de cônjuge.

Levando-se em consideração os aspectos sociais da saúde pública previstos no ordenamento legal, julgue os itens subsecutivos.

- 39 Prevê-se a participação de representantes de entidades patronais nos conselhos de saúde, não havendo exigência de que essas entidades sejam da área da saúde.
- 40 A participação de organizações religiosas nos conselhos de saúde é permitida apenas àquelas que desenvolvam projetos sociais ou outros tipos de atuação na área de saúde.
- 41 O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é estabelecido entre cada nível de governo e o respectivo conselho de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), constituindo uma forma de controle social do sistema.
- 42 Cada município deve promover, quadrienalmente, uma conferência de saúde para propor diretrizes para a formulação da política municipal de saúde.
- 43 Comissões constituídas pelo conselho de saúde podem contar com integrantes que não sejam conselheiros.
- 44 Resoluções do Pleno do conselho municipal de saúde que não forem homologadas pelo prefeito em trinta dias devem ser encaminhadas à câmara municipal, com o objetivo de ganharem força de lei.

Considerando a evolução legal, histórica e social da organização do sistema de saúde no Brasil e do SUS, julgue os itens a seguir.

- 45 Quando foi implantada, a assistência médica prestada pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) era oferecida de forma segregada a cada categoria de beneficiários e na medida que os recursos próprios permitissem.
- 46 Antes da criação do SUS, o setor de saúde brasileiro esteve organizado em um Sistema Nacional de Saúde.

Com base nas disposições da Lei n.º 8.080/1990 e da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens seguintes.

- 47 O Estado brasileiro é suficiente para prover as condições necessárias e indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, o que exclui o dever da sociedade em geral.
- 48 Cabe ao SUS identificar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- 49 A criação do SUS ocorreu após a implantação de um sistema nacional eletrônico e integrado de informações sobre prestação de serviços em saúde.
- 50 A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde encontra-se no campo de atuação do Ministério da Educação, não no campo do SUS.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Sabendo que, para a realização de procedimentos cirúrgicos e hospitalização do segmento pediátrico, há necessidade do conhecimento sobre a fisiologia dessa etapa do crescimento e do desenvolvimento, julgue os itens a seguir.

- 51 A estimativa de volume de sangue por quilograma de peso corporal (mL/kg) a partir do terceiro mês de vida se aproxima da do indivíduo adulto.
- 52 A diminuição da produção de células vermelhas sanguíneas frequentemente contribui para a anemia da prematuridade, sendo a liberação da eritropoietina iniciada entre 30 e 34 semanas de idade gestacional.
- 53 No planejamento de um procedimento cirúrgico pediátrico, deve-se considerar a termoneutralidade, que é a faixa de temperatura ambiente em que o recém-nascido consegue manter uma temperatura corporal normal com uma taxa metabólica mínima por controle vasomotor.
- 54 A hiperglicemia em recém-nascido de muito baixo peso ao nascimento em uso de nutrição parenteral pode causar hemorragia intraventricular e perda de água e eletrólitos renais devido à glicosúria.
- 55 O cálcio é transportado ativamente pela placenta, e, da quantidade total de cálcio transferido através da placenta, a maior parte ocorre após 28 semanas de gestação, o que explica parcialmente a elevada incidência de hipocalcemia em recém-nascidos prematuros.

Defeitos congênitos são frequentes, causam morbidade e mortalidade significativas e têm impacto substancial na saúde pública. Considerando as anomalias congênitas da face e do pescoço e assuntos correlacionados, julgue os itens subsequentes.

- 56 A conduta médica é expectante para os cistos tireoglossos pequenos, devendo-se fazer acompanhamento anual e intervir cirurgicamente apenas se houver quadros infecciosos.
- 57 O cisto branquial mais comum é derivado do primeiro arco branquial.
- 58 A excisão do ducto tireoglossos juntamente com o cisto diminui a recorrência deste último.
- 59 Cistos do segundo arco branquial comumente se apresentam como massa próxima do polo superior da glândula parótida e são mais comumente vistos em crianças maiores e adultos jovens.

Em qualquer idade a tireoide pode apresentar alterações com repercussões clínicas. Considerando esse assunto e aspectos a ele relacionados, julgue os itens que se seguem.

- 60 Nódulos solitários da tireoide em crianças apresentam uma taxa muito maior de risco de câncer, em comparação com a população adulta.
- 61 A tireoidectomia total é o procedimento mais recomendado em pacientes que apresentam nódulos solitários da tireoide que estejam causando sintomas de compressão e (ou) tireotoxicose ou que sejam suspeitos de malignidade.

Sabendo que o torcicolo congênito é definido como uma contratura unilateral do músculo esternocleidomastoideo que, em geral, se manifesta no período neonatal ou em lactentes, julgue os itens subsequentes.

- 62 Em se tratando de torcicolo congênito, a intervenção operatória é necessária em mais de 90% dos recém-nascidos e lactentes de até três meses de vida.
- 63 A avaliação por microscopia óptica comum do músculo esternocleidomastoideo envolvido no torcicolo congênito demonstra substituição de feixes musculares por tecido fibroso denso.

A correção de alterações da parede torácica da criança e adolescente, principalmente do *pectus excavatum* constitui um procedimento não só estético, mas também necessário para melhora da performance respiratória. Considerando esse assunto, julgue os itens seguintes.

- 64 A rotação do esterno (*sternal turnover*) geralmente é o procedimento preconizado para crianças com *pectus excavatum*.
- 65 A configuração mais comum do *pectus excavatum* é uma combinação de depressão ipsilateral e protrusão carinada contralateral.

Um recém-nascido apresentou, imediatamente ao nascimento, dificuldade respiratória, taquipneia, grunhido e cianose. A hipótese diagnóstica foi de anomalia congênita do diafragma.

Considerando o caso clínico descrito e assuntos correlatos, julgue os itens subsequentes.

- 66 A toracosopia é o procedimento indicado em recém-nascido com hérnia diafragmática congênita em uso de ECMO (membrana de oxigenação extracorpórea).
- 67 Recém-nascido com hipertensão pulmonar importante e algum grau de hipoplasia pulmonar refratária à terapia convencional deverá ser transferido para reanimação com ECMO (membrana de oxigenação extracorpórea).

Estando presentes, na infância, sintomas como vômitos, disfagia, dores torácicas e infecções respiratórias recorrentes com perda de peso, deve-se avaliar a ocorrência de anomalias cirúrgicas do esôfago. Considerando esse assunto, julgue os itens a seguir.

- 68 A combinação de polihidrânio com estômago fetal pequeno ou ausente não apresenta valor preditivo positivo para atresia esofágica.
- 69 A avaliação histoquímica de biópsia do esôfago de pacientes com acalasia demonstra uma redução significativa em todos os neuropeptídeos, particularmente polipeptídeo intestinal vasoativo, galanina e neuropeptídeo Y.

Sabendo que, em geral, os princípios da cirurgia pulmonar são semelhantes em adultos e crianças, julgue os itens subsequentes.

- 70 Malformações das vias aéreas pulmonares, anteriormente conhecidas como malformações adenomatoideas císticas (CAM), são lesões diagnosticadas com ultrassom pré-natal e, embora elas constituam cerca de 25% de todas as malformações pulmonares congênitas, ainda são raras.
- 71 As crianças geralmente têm maior reserva fisiológica e suportam ressecções melhor do que pacientes mais velhos: nos primeiros sete anos de vida, existe desenvolvimento alveolar contínuo, o que pode diminuir o impacto da ressecção.

A respeito das doenças infecciosas associadas aos procedimentos cirúrgicos, julgue os itens que se seguem.

- 72 No estágio I do empiema conhecido como estágio agudo ou exsudativo (estágio I), desenvolve-se um derrame parapneumônico caracterizado por líquido pleural límpido de baixa viscosidade com pH e glicose normais e baixo nível de lactato desidrogenase (LDH) e as pleuras visceral e parietal não estão fundidas.
- 73 Constituem indicações absolutas para cirurgia em bebês com enterocolite necrosante aguda: aumento da sensibilidade abdominal, distensão de alça intestinal fixa, paracentese positiva e trombocitopenia.

A demanda de correção das anomalias da região inguinal na criança é elevada, constituindo um dos principais procedimentos na cirurgia pediátrica. Considerando essa temática e assuntos correlacionados, julgue os itens a seguir.

- 74** Os meninos são mais comumente afetados com as hérnias inguinais do que as meninas, geralmente no lado esquerdo em ambos os sexos, devido à descida testicular posterior e à obliteração do processo vaginal à esquerda.
- 75** A maioria das hérnias inguinais em bebês e crianças são hérnias indiretas.

Considerando que a avaliação ultrassonográfica no pré-natal permite diagnosticar precocemente anomalias da parede abdominal na criança, julgue os itens seguintes.

- 76** Na gastrosquise há incidência muito maior de anomalias e defeitos cromossômicos associados.
- 77** A gastrosquise normalmente ocorre à esquerda da haste umbilical, sendo a hipótese prevacente a de que o defeito ocorre no local da involução da segunda veia umbilical (esquerda).

A orientação dos pais e cuidadores em relação ao segmento pediátrico na prevenção de acidente constitui um trabalho preventivo fundamental para evitar mortes e sequelas. A esse respeito, julgue os itens subsequentes.

- 78** O baço é o órgão intra-abdominal mais comumente lesado em crianças.
- 79** O trauma é a principal causa de morte e incapacidade em crianças: mais de 90% das admissões de trauma pediátrico em todo o mundo são o resultado de um mecanismo contuso.

Sabendo que o diagnóstico precoce é fundamental para a indicação cirúrgica em patologia envolvendo as vias biliares no segmento pediátrico, a fim de evitar repercussões clínicas irreversíveis, julgue os itens a seguir.

- 80** O aspecto histológico do fígado na atresia biliar é caracterizado por edema do trato portal, obstrução e proliferação do ducto biliar, um pequeno infiltrado de células e quantidade variável de formação de células gigantes.
- 81** Em crianças, a hipertensão portal é causada principalmente por cirrose hepática secundária a atresia de vias biliares em até 50% dos casos.
- 82** Em cirurgia pediátrica, o diagnóstico de colelitíase é comum, e a maioria dos cálculos biliares tem como causa as anomalias congênitas do trato biliar.

No que se refere a abordagem cirúrgica de patologia do pâncreas e assuntos correlacionados, julgue os itens seguintes.

- 83** A causa mais comum de pancreatite na infância e adolescência é o trauma contuso, cujo diagnóstico pode ser confirmado pela elevação da amilase sérica.
- 84** O regulador da condutância transmembrana da fibrose cística (CFTR), o inibidor da serina protease Kazal tipo 1 (SPINK1), o tripsinogênio catiônico sérico (PRSS1) e a quimiotripsina C (CTRC) foram todos implicados na pancreatite aguda recorrente e na pancreatite crônica.

Sabendo que o papel do baço na defesa do organismo contra infecções bacterianas tem sido cada vez mais demonstrado, julgue o próximo item.

- 85** Em se tratando de “baço errante”, as crianças podem apresentar uma massa abdominal, com dor episódica, mas também com torção e infarto.

Com relação às patologias pediátricas do trato gastrointestinal, julgue os itens a seguir.

- 86** A estenose hipertrófica do piloro acomete mais o sexo feminino e seu diagnóstico feito a partir do exame físico médico.
- 87** A patologia mais comumente associada à atresia pilórica congênita é a epidermólise bolhosa.
- 88** Segundo a classificação de Grosfeld, são achados clínicos da atresia jejunoileal tipo II alça intestinal proximal dilatada, de fundo cego, conectada por um cordão fibroso ao intestino distal colapsado, e mesentério intacto.
- 89** A hiperplasia do tecido linfóide próximo à base do apêndice é uma causa comum de obstrução do apêndice em criança, que leva à apendicite.
- 90** A presença de mucosa gástrica ectópica ocorre na maioria das duplicações císticas de intestino delgado.
- 91** Em crianças maiores de dois anos de idade, o adenovírus e, em menos medida, o rotavírus têm sido responsáveis por até metade dos casos de intussuscepção secundária.

A respeito de patologias intestinais pediátricas, julgue os itens que se seguem.

- 92** Recém-nascidos prematuros que desenvolvem enterocolite necrosante são mais propensos a ter fatores de risco predisponentes como doença cardíaca congênita, sepse, doença respiratória ou eventos hipóxicos.
- 93** O plicoma anal raramente é uma indicação de outra doença, embora possa ser resultado de uma fissura curada.
- 94** Pneumatose intestinal é um achado radiológico incomum em casos de enterocolite necrosante.
- 95** O achado patognomônico e encontrado em todos os casos da doença de Hirschsprung é uma zona de transição entre o segmento não acometido do intestino e aquele com aganglionose.
- 96** Constipação em crianças com anomalia anorretal (AAR) é extremamente comum, especialmente nos tipos mais benignos.
- 97** Aproximadamente metade dos casos de abscessos perianais pediátricos progredem para uma fístula perianal, geralmente localizada lateralmente ao ânus, em vez de se situar na linha média.

No que se refere às patologias pediátricas do trato urinário, julgue os itens a seguir.

- 98** Uma reação positiva de nitrito é indicativa da presença de bactérias, com especificidade e valor preditivo positivo próximo de 100% no diagnóstico de infecção urinária pediátrica.
- 99** A endopielotomia resolve, com maior sucesso que a pieloplastia, a obstrução primária da JUP (junção ureteropélvica) em crianças.
- 100** Em se tratando de síndrome isolada de frequência urinária em crianças (polaciúria), o uso de anticolinérgicos tem bom resultado como intervenção conservadora e não cirúrgica.
- 101** É recomendando que o reparo primário completo da extrofia vesical seja efetuado no período neonatal, pois isso otimiza a chance de haver uma ciclagem vesical mais precoce e pode ajudar no desenvolvimento da bexiga.
- 102** A forma distal da hipospádia é mais comumente encontrada.
- 103** Devido à gravidade e a maiores limitações funcionais, a epispádia deve ser corrigida o mais precocemente possível, ainda no período neonatal, junto com a correção primária da extrofia vesical.

Em relação às patologias, aos métodos diagnósticos e aos tratamentos recomendados em cirurgia pediátrica, julgue os itens subseqüentes.

- 104** No mundo ocidental, a hiperplasia adrenal congênita (HAC) é a causa mais comum de genitália ambígua neonatal.
- 105** Em crianças portadoras de meningomielocoele, a hidrocefalia é bastante comum, sendo aquelas de localização torácica as que têm a maior incidência dessa associação, quando comparadas às de localizações sacrais inferiores.
- 106** Anticorpos quiméricos recombinantes, apesar de promissores no tratamento de neuroblastomas de alto risco em crianças, ainda não são recomendados como opção terapêutica *in vivo*.
- 107** O encontro de herniação anormal das tonsilas cerebelares abaixo do nível do forame magno e espinha bífida aberta em recém-nascidos classifica-se como malformação de Chiari grau I.
- 108** Em crianças com rim displásico multicístico, devido à eventual malignidade, a nefrectomia profilática não se justifica, sendo recomendado o acompanhamento ultrassonográfico até por volta dos 4 anos de idade, para decisão cirúrgica ou não.
- 109** O tumor de Wilms, de maneira geral, invade o rim, enquanto o neuroblastoma surge do interior do rim e distorce sua configuração interna.

Acerca de hemangiomas em cirurgia pediátrica, julgue os itens a seguir.

- 110** A incidência de hemangiomas infantis é maior em bebês nascidos a termo, de cor negra e do sexo masculino.
- 111** Os betabloqueadores, como o Propranolol, são usados raramente e com muita cautela no tratamento dos hemangiomas infantis, pois são muito pouco tolerados por crianças, por causarem bradicardia, hipoglicemia e hipotensão arterial.
- 112** Lesões internas viscerais são comuns em associação com hemangiomas cutâneos, acometendo principalmente o fígado e o trato gastrintestinal.
- 113** A fase proliferativa do hemangioma infantil é marcada por um crescimento rápido durante os primeiros 6 a 8 meses de vida, e geralmente atinge o platô com a idade de 10 a 12 meses.
- 114** A ultrassonografia dos hemangiomas na fase proliferativa demonstra massa com parênquima denso e vascularização de fluxo rápido.
- 115** A inibição da angiogênese pelos corticosteroides é uma ótima opção de tratamento, quando necessário, dos hemangiomas infantis, com altas taxas de boa resposta terapêutica.

Em relação à ética e às estratégias de ação para a saúde em cirurgia pediátrica, julgue os itens subsecutivos.

- 116** Havendo solicitação dos pais, ainda que não haja indicação médica, o cirurgião pediátrico não pode se negar a realizar a circuncisão em lactentes e crianças muito novas, que ainda não possam fornecer concordância clara para a realização do procedimento.
- 117** Do ponto de vista ético, a tomada de decisão médica, dos pais para seus filhos, pode ser considerada como uma responsabilidade, mais do que um direito, centrada no melhor interesse da criança.
- 118** Uma das explicações para o fato de os adolescentes tomarem decisões de forma diferente dos adultos sobre procedimentos médicos (assim como outros assuntos) é a lenta neuromaturação, que pode limitar a capacidade de tomada de decisão do adolescente, mesmo que ele possua boas habilidades cognitivas.
- 119** Se determinada patologia do paciente pediátrico for tratada pela via A ou B com base simplesmente na opinião do médico responsável e houver evidências para dar suporte a um ou outro caminho, configura-se um viés com evidência, sujeito a um desfecho errado e responsabilidade profissional.
- 120** Quando os responsáveis pela criança são pais adolescentes, a tomada de decisão em termo de consentimento livre e esclarecido para um procedimento cirúrgico precisa de amparo legal de adultos, em geral os avós.

Espaço livre