

**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE - CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL**

 **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no Caderno de Provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo pleiteado, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
- Verifique se este caderno de prova contém **50 questões**. Com **quatro** alternativas identificadas pelas letras **A, B, C e D** das quais apenas uma será a resposta correta.
- Preencha o Cartão de Respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração:  

- **Atenção:** Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas objetivas, salvo à disposição do IDCAP.
- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o Cartão de Respostas da Prova Objetiva**, a não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
- **Assine a Lista De Presença, Cartão Resposta e transcreva a frase de segurança presente no Cartão Resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**

 **NÃO SERÁ PERMITIDO:**

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.

 **TEMPO DE PROVA:**

- A prova objetiva terá duração máxima de **4h (quatro horas)**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

1	6	11	16	21	26	31	36	41	46
2	7	12	17	22	27	32	37	42	47
3	8	13	18	23	28	33	38	43	48
4	9	14	19	24	29	34	39	44	49
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

## RASCUNHO

## Sistema Único de Saúde - SUS

### Questão 01

(Correta: C)

Segundo o anexo IX da Portaria de consolidação nº 02/2017, a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer tem como objetivo:

- (A) A redução da mortalidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a prevalência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento inoportuno e cuidados paliativos.
- (B) A redução da morbidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção tardia, tratamento inoportuno e cuidados paliativos.
- (C) A redução da mortalidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos.
- (D) A redução da morbidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a prevalência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos.

### Questão 02

(Correta: D)

De acordo com a Portaria de consolidação nº 02/2017, que dispõe sobre a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, **NÃO** constitui um dos princípios gerais desta Política:

- (A) Organização de redes de atenção regionalizadas e descentralizadas, com respeito a critérios de acesso, escala e escopo.
- (B) Articulação intersetorial e garantia de ampla participação e controle social.
- (C) Reconhecimento do câncer como doença crônica prevenível e necessidade de oferta de cuidado integral, considerando-se as diretrizes da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- (D) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

### Questão 03

(Correta: C)

Com base no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências, analise as afirmativas abaixo, no que se refere a hierarquização no Sistema Único de Saúde:

I.O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

II.Os serviços de atenção psicossocial consistem em uma porta de entrada para as ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde.

III.Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intragestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando os recursos financeiros disponibilizados pela união.

É CORRETO afirmar que:

- (A) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

### Questão 04

(Correta: D)

Conforme estabelecido na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Sistema Único de Saúde (SUS), contará, com duas instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. No que diz respeito a essas duas instâncias, registre V para verdadeiro, e F, para falso.

(\_\_ )A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos, convocada pelo Poder Legislativo ou, comumente, pelo Conselho de Saúde.

(\_\_ )O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

(\_\_ ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, V, F.
- (B) V, F, V.
- (C) V, V, F.
- (D) F, V, V.

## Questão 05

(Correta: D)

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), obedecem aos seguintes princípios:

I. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

II. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 06

(Correta: D)

A técnica indicada para se realizar a redução da luxação da ATM é movimentar a mandíbula da seguinte maneira:

- (A) Para frente, para o lado e para cima.
- (B) Para cima e para baixo.
- (C) Para baixo e para frente.
- (D) Para baixo, para trás e para cima.

### Questão 07

(Correta: C)

Para técnicas anestésicas em Odontologia, o conhecimento em anatomia é fundamental. Dessa forma, são nervos que inervam a maxila:

- (A) Nervo lingual; nervo bucal.
- (B) Nervo palatino menor; nervo bucal.
- (C) Nervo nasopalatino; nervo palatino maior.
- (D) Nervo palatino maior; nervo mental.

### Questão 08

(Correta: B)

Em relação as lesões orais que se estendem sobre a superfície da mucosa, é correto afirmar que:

- (A) O hematoma é qualquer área adesiva ou plana ligeiramente elevado à superfície.
- (B) A pústula é preenchida por secreção purulenta (pus).

(C) As bolhas, também conhecidas como vesículas, são preenchidas com sangue.

(D) Placa se assemelha com bola e é preenchida com líquido aquoso.

### Questão 09

(Correta: D)

Marque a opção correta sobre o tratamento cirúrgico de um cisto ósseo aneurismático.

- (A) Marsupialização é Técnica de Parstth I
- (B) Enucleação parcial e Técnica de Parstth II
- (C) Enucleação parcial e Marsupialização.
- (D) Fenestração da loja e curetagem.

### Questão 10

(Correta: D)

Os agentes quimioterápicos são drogas potentes que destroem ou desativam rapidamente as células cancerígenas em divisão. O efeito colateral significativo dessas drogas frequentemente envolve os tecidos orais. São implicações orais da quimioterapia:

- (A) Estimulo da cicatrização; correta formação dentinária.
- (B) Ulceras aftosas; queilite angular; hipersalivação.
- (C) Aumento da salivação; aceleração na cicatrização.
- (D) Mucosite; úlceras aftosas; xerostomia.

### Questão 11

(Correta: A)

The mental canal has a lateral, superior and posterior route, opening into the \_\_\_\_\_, and gives passage to mental vessels and nerves."

The alternative that completes the sentence correctly is:

- (A) Mental foramen
- (B) Incisive foramen
- (C) Alveolar canal
- (D) Lingual canal

### Questão 12

(Correta: B)

Um carcinoma é uma neoplasia maligna do epitélio que tende a invadir o osso e o tecido conjuntivo circundante. O câncer de boca se espalha em metástase rapidamente para outras regiões do corpo, mais frequentemente o pescoço e os linfonodos cervicais. Sobre o câncer de boca, marque a alternativa que apresenta sinais de alerta do câncer oral:

- (A) Dificuldade na fala, mastigação, deglutição e mobilidade mecânica; lesão de mancha branca cavitada em dentina; lesão cariada radicular; fissura labial e palatina; lesões escurecidas e com textura lisa nos lábios ou cavidade oral; ardência e queimação.
- (B) Qualquer afta na boca que não cicatrize; lesões brancas ou com textura áspera nos lábios ou cavidade oral; secura na boca sem nenhuma razão aparente; sensação de ardência ou dor na cavidade oral sem nenhuma razão aparente; dificuldade na fala, mastigação e deglutição.
- (C) Lesões brancas ou com textura áspera nos lábios ou cavidade oral; sensação de ardência ou dor na cavidade oral sem nenhuma razão aparente; lesão de mancha branca em esmalte não cavitado; qualquer afta na boca que não cicatrize.
- (D) Hemorragias repetidas em área específica na cavidade oral sem nenhuma razão aparente; dor, calor e rubor na cavidade oral; lesão cariada na primeira infância; qualquer nódulo ou inchaço no pescoço, lábio ou na cavidade oral; dor ou ardência na cavidade oral.

### Questão 13

**(Correta: D)**

A porção contrátil do músculo, formado por fibras musculares que se contraem, leva o nome de:

- (A) Tendão.  
(B) Fascículo  
(C) Fáscia.  
(D) Ventre.

### Questão 14

**(Correta: A)**

The condylar process is in the bone:

- (A) mandible.  
(B) nasal.  
(C) coronoid.  
(D) maxillary.

### Questão 15

**(Correta: C)**

Há um fenômeno traumático, de retenção de muco, cuja lesão fundamental é bolha, e que acomete soalho bucal, chamado:

- (A) Mucoglosso.  
(B) Glossite romboide  
(C) Rânula.  
(D) Glossite traumática.

### Questão 16

**(Correta: C)**

Preencha a lacuna:

\_\_\_\_\_ são lesões hemorrágicas traumáticas, localizadas no interior dos tecidos e que produzem aumento de volume.

- (A) Petéquias  
(B) Equimose  
(C) Hematoma  
(D) Pústula

### Questão 17

**(Correta: C)**

Na parede do átrio direito, próximo a desembocadura da veia cava superior, há uma pequena massa de células musculares cardíacas especializadas. Essas células formam o conhecido "marca-passo biológico" dos vertebrados. Assinale a alternativa que corresponda a esse marca-passo.

- (A) Nó sistólico.  
(B) Nó átrio-ventricular.  
(C) Nó sinoatrial.  
(D) Nó diáslico.

### Questão 18

**(Correta: D)**

René Le Fort (1901) estudou as fraturas da maxila em cadáveres, atirando-os ao solo e, posteriormente, dissecando-os. Ele, então, classificou as zonas de fragilidade da maxila e descreveu as fraturas tipo Le Fort I, Le Fort II e Le Fort III. A fratura descrita como "Esta linha de fratura ocorre imediatamente acima dos ápices dos dentes e estende-se posteriormente até a parte inferior do processo pterigoide do esfenóide. Separa-se, assim, o processo alveolar do corpo da maxila de cada lado; e fraturam-se, ainda, o septo nasal ósseo (vômer), os dois palatinos e os dois processos pterigóideos. Ocorre, portanto, fratura dos três pilares de sustentação da maxila na base destes, próximo aos alvéolos." representa uma fratura do tipo:

- (A) Le Fort II  
(B) Le Fort III  
(C) Le Fort IV  
(D) Le Fort I

### Questão 19

**(Correta: D)**

Paciente com fratura bilateral parassinfisária, a língua é tracionada para frente a fim de se evitar a ocorrência de:

- (A) Hematoma.  
(B) Hemorragia.

- (C) Aumento do edema.
- (D) Obstrução da orofaringe.

### Questão 20

(Correta: A)

Na área de Patologia, para fazer um diagnóstico preciso, o cirurgião dentista depende muito de uma variedade de informações. É preciso lembrar sempre que só uma peça de informação não é suficiente para fazer um diagnóstico. Oito fontes de informações podem ser usadas para se chegar a um diagnóstico final: achados históricos, clínicos, radiográficos, microscópicos, laboratoriais, terapêuticos, cirúrgicos, e achados diferenciais. Leia as afirmativas abaixo:

I. Diagnóstico histórico é baseado na história pessoal, história familiar, história médica e dental e história da lesão, que são muitas vezes usadas para fazer o diagnóstico, sendo importante em virtude de distúrbios genéticos.

II. Diagnóstico radiográfico é baseado em exames radiográficos que excelentes para fornecer informações sobre patologia periapical, reabsorção interna e dentes impactados, por exemplo.

III. Diagnóstico clínico é baseado na aparência clínica da lesão incluindo cor, tamanho, forma e localização.

São verdadeiras as afirmativas:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) II e III apenas.

### Questão 21

(Correta: A)

Marque a alternativa formada por zonas de fragilidade na mandíbula:

- (A) Região do colo; região do forame e canais mentuais.
- (B) Região do processo alveolar; região de forame e canais incisivo.
- (C) Região do ângulo da mandíbula; região de tuberosidade da maxila.
- (D) Região de espinha nasal anterior; região de ápice.

### Questão 22

(Correta: C)

Dentre as principais Coagulopatias Hereditárias, assinale a que é causada pela deficiência ou ausência de coagulação IX.

- (A) Hemofilia A.
- (B) Trombofilia.
- (C) Hemofilia B.
- (D) Doença de Von Willebrand.

### Questão 23

(Correta: D)

Paciente necessita realizar uma exodontia, porém, durante a anamnese relatou fazer uso de heparina intravenosa devido a problemas cardiovasculares. Após quanto tempo de suspensão de heparina intravenosa o paciente poderá realizar a exodontia?

- (A) Quatro horas.
- (B) Duas horas.
- (C) Uma hora.
- (D) Seis horas.

### Questão 24

(Correta: C)

In facial bones, the only movable bone is:

- (A) Zygomatic.
- (B) Frontal.
- (C) Mandible.
- (D) Maxilla.

### Questão 25

(Correta: D)

Um paciente com intoxicação aguda por paracetamol poderá ter dano significativo em qual estrutura/órgão?

- (A) Mucosa gástrica.
- (B) Rins.
- (C) Intestino delgado.
- (D) Fígado.

### Questão 26

(Correta: A)

Em relação a anatomia e as técnicas anestésicas, sabe-se que o conhecimento da anatomia é fundamental para eficácia nas técnicas anestésicas. São nervos que inervam a mandíbula:

- (A) Nervo mental; nervo lingual; nervo glossofaríngeo.
- (B) Nervo lingual; nervo bucinador; nervo incisal.
- (C) Nervo mental; nervo lingual; nervo nasopalatino.
- (D) Nervo palatino maior; nervo palatino médio; nervo palatino menor.

### Questão 27

(Correta: C)

Segundo os princípios da cirurgia oral menor, em pacientes que necessitam de antibioticoterapia profilaxia, assinale a medicação indicada.

- (A) Penicilina iniciada no pós-operatório.
- (B) Cefalosporina para pacientes alérgicos a penicilina.
- (C) Penicilina iniciada no pré-operatório.

(D) Metronidazol por via parenteral.

### Questão 28

(Correta: C)

Assinale a alternativa que corresponde a técnica radiográfica que tem o objetivo de facilitar a visualização das raízes dos terceiros molares superiores, que anteriormente apareciam sobrepostas pelo processo zigomático da maxila.

- (A) Bissetriz.
- (B) Clarck.
- (C) Le Master.
- (D) Oclusal.

### Questão 29

(Correta: A)

Assinale a alternativa que completa a sequência corretamente: "A fratura Le Fort \_\_\_\_\_ é uma fratura mais alta, em que ocorre disjunção completa entre o viscerocrânio e o neurocrânio. Todos os pilares de sustentação da maxila são fraturados na base do crânio. Essa fratura segue pelas paredes medial e lateral da órbita, passando pela sutura frontozigomática. Fraturam-se, ainda, o arco zigomático e os processos pterigoides e o septo nasal na base do crânio."

- (A) III
- (B) V
- (C) I
- (D) II

### Questão 30

(Correta: A)

A diplopia geralmente está relacionada a fratura de:

- (A) Osso zigomático.
- (B) Cêndilo nasal.
- (C) Maxilar superior.
- (D) Apófise coronóide.

### Questão 31

(Correta: D)

Assinale a alternativa correta. Para as fraturas dos ossos próprios do nariz o cirurgião deve solicitar uma radiografia com incidência de:

- (A) Hirtz.
- (B) Towne.
- (C) Bretton.
- (D) Waters.

### Questão 32

(Correta: C)

Qual o sítio preferido de um câncer bucal?

- (A) Palato.
- (B) Lábio.
- (C) Língua.
- (D) Gengiva.

### Questão 33

(Correta: D)

São considerados anestésicos locais do tipo éster, assinale a opção correta.

- (A) Lidocaína e procaína.
- (B) Tetracaína e prilocaína.
- (C) Procaína e prilocaína.
- (D) Tetracaína e procaína .

### Questão 34

(Correta: A)

Assinale a alternativa que retrata uma manifestação frequentemente encontrada em pacientes portadores de diabetes mellitus.

- (A) Hipossalivação.
- (B) Xerostomia.
- (C) Cárie dentária.
- (D) Disgeusia.

### Questão 35

(Correta: A)

Após a exodontia de um dente que não apresenta lesão periapical, não será necessário o cirurgião realizar:

- (A) Curetar o alvéolo.
- (B) Suturar o alvéolo.
- (C) Comprimir as corticais bucal e lingual.
- (D) Remover espículas ósseas .

### Questão 36

(Correta: A)

Sobre os efeitos colaterais do tratamento oncológico, como o tratamento por radiação para o câncer de cabeça e pescoço afeta as glândulas salivares, vasos sanguíneos e ossos da maxila, os pacientes que recebem esse tratamento podem desenvolver alterações específicas. São implicações orais da terapia de radiação:

- (A) Xerostomia; carie por radiação; osteorradionecrose.
- (B) Osteorradionecrose; lesão de mancha branca ativa; aumento na salivação.
- (C) Carie na primeira infância; hipossalivação; sialolito.
- (D) Osteoporose; aumento da salivação; carie de mamadeira.

### Questão 37

(Correta: B)

Assinale a alternativa que corresponde a uma complicação periférica a um terceiro molar impactado, que indica a sua remoção cirúrgica como prevenção.

- (A) Osteomielite.
- (B) Infecção pericoronar.
- (C) Abscesso dentoalveolar agudo.
- (D) Pericementite

### Questão 38

(Correta: A)

Assinale a alternativa que representa a maior prevalência de crianças no qual as mães fizeram uso de estreptomicina (antibiótico aminoglicosídeo) na gravidez.

- (A) Surdez.
- (B) Lábio leporino.
- (C) Amelogenese imperfeita.
- (D) Cegueira.

### Questão 39

(Questão anulada)

De acordo com a classificação de Pindborg, assinale a alternativa que corresponde a um dos Tumores odontogênicos mesodérmicos.

- (A) Fibroma cementificante.
- (B) Ameloblastoma.
- (C) Mixoma odontogênico.
- (D) Dentinoma.

### Questão 40

(Correta: D)

Sobre lesões que se estendem abaixo da superfície da mucosa, analise as afirmativas:

I. Uma úlcera é uma ruptura da mucosa que se parece com uma área exposta externamente, semelhante a uma cratera. Uma úlcera pode ser tão pequena quanto 2mm ou tão grande que pode chegar a vários centímetros.

II. Uma erosão do tecido mole é uma lesão superficial na mucosa causada por trauma mecânico, como a mastigação. As margens podem ser irregulares e vermelhas e muito dolorosas.

III. Um abscesso é uma coleção de pus em uma área específica. Os abscessos são comumente achados no ápice dos dentes (abscesso periapical). Um abscesso pode ser causado por bactéria em dentes cariados ou por bactéria que resulta em infecção periodontal grave.

IV. Um cisto é uma bolsa cheia de líquido, fluida ou semissólida. O material dentro do cisto nem sempre é infeccioso. Na odontologia, um cisto pode se formar em torno de uma coroa de dente incluso.

São corretas as afirmativas:

- (A) II, III e IV.
- (B) III e IV apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I, II, III e IV.

### Questão 41

(Correta: C)

Em relação a patologia oral, são sinais clássicos da inflamação:

- (A) Hematoma; secreção purulenta; calor.
- (B) Secreção purulenta; odor; dor; ardência.
- (C) Vermelhidão; inchaço; calor; dor.
- (D) Febre; ardência; odor fétido; calor.

### Questão 42

(Correta: D)

Em relação a anestesia na Odontologia e cirurgia odontológica, marque a alternativa que completa a sentença corretamente:

"A sensibilidade geral da região posterior do palato duro é dada pelo nervo \_\_\_\_\_, enquanto a da região anterior (até caninos), pelo nervo \_\_\_\_\_."

- (A) Palatino menor; nasopalatino
- (B) Palatino menor; palatino maior
- (C) Nasopalatino; palatino maior
- (D) Palatino maior; nasopalatino

### Questão 43

(Correta: A)

Assinale a alternativa que corresponde a uma infecção endógena de origem bacteriana anaeróbia, que tem o trauma como agente catalisador do processo.

- (A) Actinomicose.
- (B) Abscesso dentoalveolar.
- (C) Sinusite maxilar.
- (D) Alveolite granulomatosa.

### Questão 44

(Correta: B)

A dor é a experiência sensorial e emocional desagradável associada a estímulos nociceptivos e que possui um poderoso componente afetivo. Para o controle de algumas dores, há os analgésicos de ação periférica, que atuam impedindo a atividade dos mediadores químicos liberados nas terminações nervosas livres.

Sabendo dessa característica, analise as assertivas.

I- A dipirona tem ação analgésica e antitérmica eficiente, porém, não é um analgésico de ação periférica.

II- O paracetamol é um analgésico de ação periférica.

III- O propoxifeno tem ação apenas periférica.

IV- A codeína tem ação apenas periférica.

Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s):

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III e IV, apenas.

### Questão 45

(Correta: D)

Sobre os conhecimentos sobre anatomia oral e cirurgia oral menor, sobre a língua, é correto afirmar que:

- (A) A língua é um órgão ósseo móvel que participa direta e indiretamente de diversas funções importantes, como gustação, mastigação, sucção, deglutição e fonação.
- (B) A língua está fixada por feixes musculares à maxila, ao osso hioide e ao processo estiloide do temporal.
- (C) A língua apresenta uma parte móvel e livre, a raiz ou base da língua e uma parte fixa, o corpo da língua, o qual apresenta faces dorsal (superior) e inferior, margens e ápice.
- (D) A língua está constituída por músculos intrínsecos, responsáveis pela forma e pelo volume da língua, e por músculos extrínsecos, importantes nos movimentos linguais.

### Questão 46

(Correta: B)

Os músculos são divididos em três grupos com relação à sua função fisiológica, sendo que um deles define-se: "músculo controlado pelo sistema nervoso autônomo e sua contratilidade é exercida aos poucos e por períodos de tempo mais espaçados, sendo que seu relaxamento também se dá de forma muito mais lenta. Esse tipo de músculo é encontrado nas vísceras."

É correto afirmar sobre esse grupo:

- (A) Músculos involuntários de contração rápida.
- (B) Músculos involuntários de contração lenta.
- (C) Músculos voluntários de contração lenta.
- (D) Músculos voluntários de contração rápida.

### Questão 47

(Correta: A)

The mandibular canal runs through the ramus of mandible and protect the nerve:

- (A) Inferior alveolar.
- (B) Mental.
- (C) Palatine.

(D) Lingual.

### Questão 48

(Correta: C)

Em tomografia computadorizada, assinale o artefato de imagem que está relacionado com problemas nos detectores do equipamento

- (A) de volume parcial.
- (B) de movimento.
- (C) em anel.
- (D) de extinção.

### Questão 49

(Correta: A)

Complete a frase corretamente: "Ao se tratar de fraturas de face, como os músculos da língua inserem-se na\_\_\_\_\_, fraturas bilaterais do corpo da mandíbula são potencialmente graves devido ao risco de\_\_\_\_\_. Nesses casos, a língua perde sua sustentação anterior e é deslocada para trás, provocando obstrução das\_\_\_\_\_."

- (A) Face interna do corpo da mandíbula; ptose da língua; vias respiratórias
- (B) Face anterior da maxila; deslocamento da língua; vias digestórias
- (C) Face superior da maxila; deslocamento da língua; vias sanguíneas
- (D) Face posterior do corpo da mandíbula; ptose da língua; vias linfáticas

### Questão 50

(Correta: D)

The posterior region of the hard palate is supplied by the:

- (A) Greater bucal vein.
- (B) Minor palatine artery.
- (C) Bucal palatine vein.
- (D) Greater palatine artery.