


MÉDICO CLÍNICO GERAL

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:**
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;**
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;
- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;
- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h00min. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h30min (duas horas e trinta minutos). A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;

- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	03 (três)
Raciocínio Lógico	02 (dois)
Conhecimentos Gerais e Atualidades	03 (três)
Conhecimentos Específicos	12 (doze)
Total de Questões	20 (vinte)

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

Língua Portuguesa

Questão 01

A Colocação Pronominal é a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase.

A Próclise é a colocação pronominal antes do verbo. A próclise é usada:

I. Em orações iniciadas por palavras interrogativas ou em orações iniciadas por palavras exclamativas.

II. Em orações que exprimem desejo (orações optativas).

III. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo ou quando o verbo estiver no infinitivo impessoal.

IV. Quando houver pausa antes do verbo.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 02

Na frase "A professora explicou QUE a apresentação do trabalho será adiada", a palavra destacada "QUE" é classificada como:

- (A) Conjunção Subordinativa Integrante.
- (B) Preposição.
- (C) Pronome Relativo.
- (D) Conjunção Coordenativa Explicativa.
- (E) Conjunção Subordinativa Adverbial.

Questão 03


Em "Esse filme é análogo àquele outro", o fenômeno linguístico da crase teve de ocorrer porque:

- (A) Trata-se de uma locução adverbial feminina que sempre é apresentada com a contração à.
- (B) No contexto em que foi empregada, a crase é facultativa, por se tratar de regência nominal implícita.
- (C) Está atendendo à regência verbal de "é" que, no contexto em que foi inserida, exige a preposição "a" e pela presença do pronome demonstrativo aquele.
- (D) No contexto em que foi empregada, a crase é dispensada, por se tratar de palavra masculina (aquele).
- (E) Está atendendo à regência nominal de "análogo" que exige a preposição "a" e pela presença do pronome demonstrativo aquele.

Raciocínio Lógico

Questão 04

Tiago fez um cone de cartolina, conforme imagem abaixo, e vai encher de areia para realizar uma apresentação sobre sólidos geométricos na aula de matemática.



Qual é o volume (V) de areia necessário para encher completamente o cone? (faça $\pi = 3,14$)

- (A) $V = 3.790 \text{ cm}^3$
- (B) $V = 5.320 \text{ cm}^3$
- (C) $V = 4.260 \text{ cm}^3$
- (D) $V = 2.958 \text{ cm}^3$
- (E) $V = 4.710 \text{ cm}^3$

Questão 05

Luiz, Karla e o filho deles, Luka, trabalham por escala. Luiz tem folga de 6 em 6 dias, Karla de 4 em 4 dias e Luka de 5 em 5 dias. De quanto tempo os três estão de folga no mesmo dia? (faça 1 mês = 30 dias)

- (A) De 6 em 6 meses.
- (B) De 2 em 2 meses.
- (C) De mês em mês.
- (D) A cada um mês e meio.
- (E) A cada 3 meses.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 06

Uma triste realidade brasileira é a ocorrência cada vez mais frequente de crimes contra mulheres, principalmente por motivos passionais, levando inclusive à caracterização dos casos de morte que é chamado de:

- (A) Femicídio.
- (B) Fratricídio.
- (C) Latrocínio.
- (D) Infanticídio.
- (E) Xenofobia.

Questão 07

A história do Brasil é marcada por grandes movimentos de luta por direitos ou ideologias, entre os quais consta um dos mais importantes do país, que aconteceu no estado de Santa Catarina. Estamos falando da:

- (A) Revolta da Vacina.
- (B) Guerra do Contestado.
- (C) Revolta da Chibata.
- (D) Revolta do Chá.
- (E) Guerra de Canudos.

Questão 08

O cenário político brasileiro foi marcado em 2022 por movimentos que evidenciaram a prevalência de duas grandes correntes ideológicas, levando a divergências focais entre dois grandes grupos, que defendem suas ideias como verdade, chegando a desprezar o diálogo. Este movimento de divisão da política brasileira em dois grupos principais que se opunham é chamado de:

- (A) Supremacia.
- (B) Absolutismo.
- (C) Polarização.
- (D) Soberania.
- (E) Desconstrução.

Conhecimentos Específicos

Questão 09

Em relação a bronquiolite obliterante pós-infecciosa, registre V, para verdadeiro, e F, para falso, nos itens abaixo:

() É uma enfermidade respiratória pouco frequente e potencialmente grave que acomete crianças após infecção respiratória grave.

() Em crianças, a bronquiolite obliterante pode ser secundária a várias causas, como infecções, principalmente virais, pós-transplante e aspiração de gases tóxicos.

() Um dos critérios utilizados para se chegar ao diagnóstico de bronquiolite obliterante pós infecciosa é a evidência obstrução persistente de via aérea após o evento agudo, identificada por exame físico e/ou função pulmonar. Essa obstrução é responsiva a, no mínimo, duas semanas de corticoide sistêmico associado a broncodilatador.

() A azitromicina tem sido utilizada em outras formas de bronquiolite obliterante pelo efeito anti-inflamatório, com evidências em BOPI.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, F, F, V.

Questão 10

Com base nos mecanismos de concentração e diluição urinária, julgue as afirmativas abaixo:

I. A ureia filtrada pelo glomérulo e não reabsorvida pelo túbulo contornado proximal junta-se à secretada pela *pars recta* antes de atingir a porção fina descendente da alça de Henle.

II. O equilíbrio osmótico medular é obtido pela circulação sanguínea rápida e pela entrada de ureia, novamente, para a alça fina ascendente, conservando-a dentro do néfron.

III. No processo de formação da medula hipertônica, os *vasa recta* têm um papel importante, pois deve existir uma troca intensa entre o interstício medular e a luz dos vasos que penetram nesse interstício para que se mantenha o gradiente de concentração medular.

IV. A alta permeabilidade à água e a solutos de suas paredes, em associação à sua disposição em forma de *hairpin*, como a alça de Henle, possibilita a remoção de água e solutos do interstício medular também por meio de um mecanismo de troca em contracorrente alterando a formação do gradiente de concentração medular e auxiliando diretamente o mecanismo de contracorrente multiplicador que ocorre na luz tubular.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, I, III e IV.
- (B) Apenas, I e IV.
- (C) Apenas, II e III.
- (D) Apenas, I e III.
- (E) Apenas, II e IV.

Questão 11

É CORRETO afirmar que a mepivacaína na concentração de 1,0 a 1,5% tem seu uso clínico para:

- (A) Bloqueio de nervos periféricos.
- (B) Infiltração.
- (C) Tópico na pele.
- (D) Anestesia raquidiana.
- (E) Regional intravenoso.

Questão 12

Classificar a fratura exposta é importante, porque permite a comparação dos resultados, mas, em especial, porque dá ao cirurgião a orientação quanto ao prognóstico da lesão e, com isso, orienta na escolha do melhor método de tratamento (Hebert. 2017). Com base na classificação de Gustilo e Anderson, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao Tipo IIIB.

- (A) Ferida da pele de até 1 cm, com descolamento mínimo de periósteo e/ou partes moles. Contaminação mínima. Fratura transversa ou oblíqua curta. Lesão de dentro para fora.

- (B) Qualquer fratura associada à lesão arterial que necessita de reparo cirúrgico para manter a viabilidade do membro.
- (C) Ferida com mais de 10 cm. Extensa lesão de partes moles e descolamento do periósteo e/ou esmagamento. Contaminação significativa. Trauma de alta energia, fraturas multifragmentárias ou perda óssea.
- (D) Ferida na pele entre 1 e 10 cm. Descolamento de periósteo e/ou partes moles de moderado a extenso (retalhos, avulsão). Esmagamento mínimo ou moderado. Contaminação moderada. Fratura transversa ou oblíqua curta ou cominuição mínima da fratura.
- (E) Lesão extensa, que não permite cobertura óssea no primeiro tempo, necessitando, com frequência, de reconstrução com retalhos e enxertias posteriores.

Questão 13

Com base nos tipos de histerectomia, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma descrição do tipo IV.

- (A) Histerectomia simples extrafacial.
- (B) Histerectomia com remoção da porção distal dos ureteres e bexiga.
- (C) Histerectomia com remoção e todo o tecido periuretral, ligadura da artéria vesical superior e ressecção de 3/4 da vagina.
- (D) Histerectomia com remoção de metade dos paramétrios e uterossacros, com ressecção do terço superior da vagina.
- (E) Histerectomia com remoção completa dos paramétrios e uterossacros, incluindo terço superior da vagina.

Questão 14

Em relação aos aspectos clínicos da uropatia obstrutiva, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Litíase urinária é causa frequente de uropatia obstrutiva, mas pode ser também complicação da própria obstrução.
- (B) Hipertensão arterial pode ocorrer em decorrência da ativação do sistema renina-angiotensina, na obstrução aguda unilateral. Há elevação da atividade plasmática de renina na veia do rim obstruído, similar à encontrada na hipertensão renovascular. Contudo, em pacientes com obstrução bilateral, a hipertensão decorre da retenção de sódio e água e da diminuição do volume extracelular.
- (C) Alterações miccionais, como disúria, polaciúria e urgência miccional, são comuns nas obstruções baixas (infravesicais). Esses sintomas de armazenamento são ocasionados por contrações involuntárias do músculo detrusor e/ou infecção urinária secundária.

- (D) Na obstrução completa ou parcial bilateral, pode-se observar também sinais e sintomas decorrentes da insuficiência renal, como anorexia, náuseas, vômitos, palidez cutânea, fraqueza, perda da atenção/memória, sonolência, edema, dispneia e insuficiência cardíaca.
- (E) Polidipsia, poliúria, noctúria e sinais de acidose tubular renal, como dispneia, náuseas e vômitos, podem ocorrer nos casos de obstrução crônica caracterizando alteração funcional e patológica renal, conhecida como nefropatia obstrutiva.

Questão 15

Com base no estadiamento do câncer do endométrio, assinale a alternativa CORRETA relacionada ao Estádio IIIC 2.

- (A) Metástases a distância incluindo metástases intra-abdominais e linfonodos regionais.
- (B) Linfonodos para-aórticos positivos com ou sem linfonodos pélvicos comprometidos.
- (C) Invasão de metade ou mais da espessura miometrial.
- (D) Invasão parametrial ou vaginal.
- (E) Invasão até a serosa do corpo uterino ou dos anexos.

Questão 16

A classificação de Bosniak foi criada para diagnosticar e gerenciar as lesões renais, com base nas características morfológicas e de realce na tomografia computadorizada (Riella, 2018). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a categoria com lesões císticas benignas, nas quais pode haver alguns septos finos e paredes que podem conter calcificações finas. Lesões hiperdensas < 3 cm sem realce após administração de contraste.

- (A) Categoria II.
- (B) Categoria II F.
- (C) Categoria III.
- (D) Categoria IV.
- (E) Categoria I.

Questão 17

Nos últimos anos, observou-se um aumento do conhecimento científico sobre a composição e a importância do leite humano para o crescimento e o desenvolvimento neurológico e cognitivo da criança e na prevenção de doenças no adulto (Silva, 2022). Em relação ao leite humano, registre V, para verdadeiro, ou F, para falso, nos itens abaixo:

(__) Considerando as vantagens nutricionais e imunológicas do leite humano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até seis meses de vida como a melhor prática nutricional.

(__) O leite materno é produzido pelos lactócitos e fica armazenado nos alvéolos, que nada mais são que um

conjunto dessas células. A produção de leite é dinâmica e ocorre somente antes a mamada.

(__)O leite produzido pela mediação da prolactina acumula-se no intervalo das mamadas - leite anterior - e corresponde a um terço do leite total produzido durante cada mamada e é mais diluído e com maior teor de gordura.

(__)O colostro difere do leite maduro em sua composição, principalmente nos seguintes aspectos: contém o dobro de proteínas, mais albumina e globulina; menor conteúdo de lactose e gordura; maior concentração de sais minerais, fatores de crescimento e fatores imunológicos, principalmente a imunoglobulina A secretora (IgAs).

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, F, V, F.
- (E) F, F, V, V.

Questão 18

O crescimento é um processo biológico, dinâmico e contínuo de multiplicação (hiperplasia) e aumento do tamanho (hipertrofia) das células, que ocorre desde a concepção até o final da vida, considerando-se os fenômenos de substituição e regeneração celulares e teciduais (Fonseca, 2021). Em relação ao crescimento, julgue as afirmativas abaixo:

I. Todo indivíduo nasce com um potencial ou alvo genético de crescimento, o qual está relacionado com a energia hereditária e o sistema neuroendócrino. Poucas funções biológicas dependem tanto do potencial genético quanto o crescimento.

II. O período de crescimento intrauterino é de vital importância para o ser humano. O 1º trimestre da gestação é o de maior risco em relação às injúrias, com repercussões mais graves e mais generalizadas.

III. A velocidade de crescimento pós-natal é especialmente elevada nos 5 primeiros anos de vida, com declínio acentuado até o final da fase pré-escolar (5 a 6 anos de idade). No 1º ano, a criança cresce em torno de 12 cm e ganha em torno de 6 kg; no 2º ano, cresce em torno de 24 cm e ganha mais ou menos 2,5 kg.

IV. A avaliação do crescimento deve ser realizada periodicamente. O Ministério da Saúde (MS) preconiza pelo menos 1 consultas no 1º ano de vida (iniciando-se na 1ª semana de vida), 5 consultas no 2º ano e 7 consulta/ano até os 14 anos.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, I e III.
- (B) Apenas, II e IV.

(C) Apenas, III e IV.

(D) Apenas, I.

(E) Apenas, I e II.

Questão 19

Assinale a alternativa CORRETA que constitui o principal método diagnóstico para confirmar a sensibilidade clínica induzida por grande variedade de alérgenos encontrados naturalmente no ambiente.

- (A) Pesquisa de eosinofilia.
- (B) Dosagem de imunoglobulina E (IgE) sérica.
- (C) Testes de provocação.
- (D) Testes cutâneos de hipersensibilidade mediata.
- (E) Métodos para avaliar IgE específica a antígenos.

Questão 20

Em relação as causas de agitação dos pacientes durante os cuidados monitorados de anestesia, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um dos fatores menos evidentes e que às vezes passam despercebidos.

- (A) Hipoxemia.
- (B) Hipoperfusão cerebral.
- (C) Distensão da bexiga.
- (D) Hipoventilação.
- (E) Toxicidade por anestésico local.