



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ / RJ
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ

FEMMAR
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ
EDITAL
2023-1

EDITAL FEMAR Nº 01/2023

Emprego: MÉDICO INFECTOLOGISTA PEDIÁTRICO	Nível SUPERIOR	Código 149
--	--------------------------	----------------------

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Confira se o **Caderno de Questões** recebido está de acordo com o **Emprego** ao qual está concorrendo. Caso haja divergência, notifique imediatamente ao fiscal. A inobservância deste item poderá implicar na eliminação do candidato.
- Confira se constam do **Caderno de Questões**, de forma legível, **50 (cinquenta)** questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
- Confira se no **Cartão de Respostas** recebido os seus dados estão corretos. Caso afirmativo, assine-o e transcreva a frase para o exame grafotécnico no campo apropriado. Leia atentamente as instruções para seu preenchimento. No caso de divergência, notifique imediatamente ao fiscal.
- Assinale no **Cartão de Respostas**, com caneta de tinta azul ou preta, apenas uma opção, caso contrário, será atribuída pontuação zero à questão da prova que contiver mais de uma resposta assinalada ou nenhuma resposta assinalada, emenda ou qualquer tipo de rasura.
- O tempo disponível para realizar esta prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas**, é de no mínimo, **uma hora e trinta minutos**, e de no máximo, **quatro horas**.
- O candidato só poderá portar sobre a mesa a caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**, não sendo permitido fazer uso de qualquer outro objeto para assinalar as respostas ou para efeito rascunho.
- **Evite a eliminação no concurso.** Se estiver portando: celular, instrumento auxiliar para cálculo ou desenho, qualquer dispositivo eletrônico que sirva de consulta ou comunicação, mantenha-os acondicionados no envelope de segurança, fornecido pelo fiscal de sala, lacrado e devidamente desligados no caso de aparelhos de comunicação.
- O candidato poderá levar o seu **Caderno de Questões**, faltando **uma hora** para o término da prova, com a devida permissão da equipe de fiscalização.
- É de responsabilidade do candidato entregar ao fiscal de sala, o **Cartão de Respostas** devidamente assinado e com a frase para o exame grafotécnico contida na Capa do Caderno de Questões, transcrita no Campo apropriado. A não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- No caso de dúvida, solicite esclarecimento à equipe de aplicação.

BOA PROVA

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO
QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

A Saúde do Corpo começa pela Educação da Mente.

Rangel Lima

Parte I – Língua Portuguesa

Texto 1

O menino do alto

Eliane Brum

A tragédia do menino é ter nascido no lado errado da cidade. No alto do Morro da Polícia, em um barraco encarapitado sobre uma ironia. Suspenso sobre um cartão-postal 5 de Porto Alegre, sobre a visão do Guaíba escavando a capital como um Michelangelo. O drama do menino é que nasceu duas vezes. Nos primeiros 12 anos descia a cidade vertical aos trambolhões de criança, resvalando pelos 10 barrancos, rindo das pedras. Espantando a fome que assombrava a família com aquela inocência que protege a infância. Suspirando por um videogame que jamais chegaria no Natal, mas mesmo assim sonhando como só os 15 meninos são capazes. Numa das incursões à planície, aconteceu. Não viu o carro, não viu mais nada. Despertou cinco meses depois. Acordou para o horror. Tinha as pernas retorcidas, as mãos em garras. O menino 20 renasceu. Como prisioneiro. (...)

Quando se mergulha no coma, o corpo dorme. Os membros, as articulações desmaiam como se perdessem a vida. Para que não se cristalizem no lugar errado, é 25 preciso que um fisioterapeuta movimente os pés, as mãos, dia após dia. Não fizeram com o menino do alto. Selaram seu destino com a displicência com que a planície trata a cidade de cima. Não foi o acidente que roubou a 30 liberdade do menino. Não foi o traumatismo craniano que retorceu seus pés. Foi o crime. (...)

Há menos de um mês aconteceu o que raramente acontece. A enfermeira do posto de 35 saúde descobriu o menino. Horrorizou-se com a indecência cometida, com o tanto que lhe roubaram. Aliou-se a ele. Uma luta invisível é travada agora duas vezes por semana. (...)

Fonte: BRUM, Eliane. O menino do alto. In: _____. **A vida que ninguém vê**. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2006. p. 70-75. Fragmento.

Eliane Brum, jornalista e escritora brasileira, é autora de “crônicas-reportagem” como “O menino do alto”, que aliam a realidade dos fatos a uma linguagem poética, em um estilo bastante peculiar.

01 A estrutura do texto “Menino do alto” é predominantemente:

- (A) descritiva
- (B) injuntiva
- (C) narrativa
- (D) argumentativa
- (E) expositiva

02 Lê-se logo no início do texto: “A tragédia do menino é ter nascido no lado errado da cidade” (Linhas 1-2). Dessa frase, de acordo com o restante do texto, infere-se que:

- (A) o acidente com o menino só aconteceu porque ele brincava “na planície” e não “na cidade vertical”.
- (B) a expressão “a tragédia do menino” teve como referência seu atropelamento.
- (C) o nascimento do menino foi uma ironia da vida por ter ocorrido dentro de um barraco.
- (D) o sofrimento do menino deveu-se ao não atendimento de direitos básicos, fruto da desigualdade social.
- (E) a sequela do menino foi fruto da inconsequência de brincar do outro lado da cidade.

03 Assinale a opção em que o sujeito se classifica da mesma forma que na oração “Quando se mergulha no coma, ...” (Linha 21):

- (A) “Nos primeiros 12 anos descia a cidade vertical aos trambolhões de criança, ...” (Linhas 8-9)
- (B) “Selaram seu destino com a displicência ...” (Linhas 27-28)
- (C) “Há menos de um mês ...” (Linha 33)
- (D) “Acordou para o horror.” (Linha 18)
- (E) “A enfermeira do posto de saúde descobriu o menino.” (Linhas 34-35)

04 “Os membros, as articulações desmaiam como se perdessem a vida.” (Linhas 22-23)

O enunciado acima sublinhado configura um exemplo da figura de linguagem:

- (A) sinestesia
- (B) eufemismo
- (C) ironia
- (D) hipérbole
- (E) personificação

Texto 2

HEROÍNAS...



Disponível em: <https://jeonline.com.br/noticia/21882/super-mulheres>. Acesso em: 16 out 2023.

05 O título do texto – “Heroínas...” – se justifica porque:

- (A) a menina confunde a enfermeira com a atriz que representa a Mulher Maravilha.
- (B) procura-se aproximar a imagem das enfermeiras à de heroínas.
- (C) a menina conversa com a enfermeira sobre a Mulher Maravilha.
- (D) as personagens são mulheres.
- (E) a menina diz ser fã da Mulher Maravilha.

06 As reticências em “Heroínas...” se explicam para:

- (A) assinalar uma inflexão de natureza emocional
- (B) destacar uma suspensão marcada por surpresa ou timidez de quem fala
- (C) indicar o corte da fala de um personagem pela interferência de outro
- (D) marcar que a fala do personagem continua após uma interferência de outro personagem
- (E) indicar que a ideia expressa não se completa, devendo ser suprida pelo leitor

Texto 3

Quem é Katalin Karikó, a bioquímica que ganhou o Nobel de Medicina

Gabriela Guido

Katalin Karikó é uma pesquisadora conhecida principalmente por suas contribuições na criação de vacinas de mRNA – RNA mensageiro – que possibilitaram o desenvolvimento das vacinas 5 contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech e da Moderna, além das doses de reforço dadas nos últimos anos. Nesta segunda-feira (2) a húngara conquistou o Nobel de Medicina, junto do colega Drew Weissman, pela “impressionante 10 flexibilidade e rapidez de desenvolvimento e adaptação das vacinas de mRNA”, segundo a organização da premiação.

O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram 15 administradas no mundo todo, embora esse número também inclua vacinas sem a tecnologia de mRNA. Hoje, Karikó é professora e pesquisadora na Universidade de Szeged, na Hungria, e professora temporária na Universidade 20 da Pensilvânia, nos EUA. Entre 2013 e 2022, foi VP sênior da Pfizer-BioNTech no segmento de substituição de proteínas de RNA.

Originária de uma pequena cidade na Hungria, Karikó disse em entrevista após a premiação do 25 Nobel que sua mãe, que já morreu, acreditava que um dia ela poderia receber tal reconhecimento, mesmo quando nem conseguia uma bolsa para manter sua pesquisa. “Ela disse: ‘mas você trabalha tanto’. E eu disse que muitos cientistas 30 trabalham muito, muito duro”, disse Karikó, que estava dormindo quando recebeu a ligação de Estocolmo com a notícia e chegou a achar que era uma piada.

Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-mulher/2023/10/quem-e-katalin-kariko-a-bioquimica-que-ganhou-o-nobel-de-medicina/> Acesso em: 16 out 2023. Fragmento.

07 Em “Nesta segunda-feira (2) a húngara conquistou o Nobel de Medicina, junto do colega Drew Weissman,...”, o vocábulo sublinhado é uma forma coesiva e retoma:

- (A) Drew Weissman, por um mecanismo anafórico
- (B) a bioquímica, por um mecanismo gramatical
- (C) a vacina, por uma substituição por elipse
- (D) Katalin Karikó, por uma substituição lexical
- (E) a Pfizer, por um mecanismo catafórico

08 “O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, embora esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.” (Linhas 13-17)

A forma verbal sublinhada no enunciado acima está na voz passiva analítica. De acordo com a norma culta, na voz passiva sintética, o enunciado teria a seguinte estrutura:

- (A) O Nobel destaca que já se administraram mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, ...
- (B) O Nobel destaca que já se administrou mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, ...
- (C) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já teriam sido administradas no mundo todo,...
- (D) O Nobel destaca que já se administram mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, ...
- (E) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já havia sido administradas no mundo todo,...

09 Ainda sobre o enunciado “O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, embora esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA” (Linhas 13-17), aponte a opção em que a troca de conectivo ALTERA o sentido original do enunciado acima:

- (A) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, uma vez que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.
- (B) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, ainda que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.
- (C) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, mesmo que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.
- (D) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, se bem que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.

(E) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, conquanto esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.

10 “E eu disse que muitos cientistas trabalham muito, muito duro”,... (Linhas 29-30)
O recurso à repetição dos vocábulos sublinhados no enunciado acima, estilisticamente, expressa:

- (A) intensificação
- (B) ironia
- (C) oposição
- (D) comparação
- (E) continuidade

Parte II - Legislação do Sus

11 A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 estabelece no artigo 24 que quando as disponibilidades do sistema único de saúde (SUS) forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, poder-se-á recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nessa participação complementar,

- (A) serão utilizadas regras de consórcios de direito privado, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (B) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos nestes casos não terão preferência para participar do SUS por expressa previsão legal.
- (C) os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do SUS, aprovados no conselho nacional de saúde.
- (D) a formalização contratual dos serviços privados será mediante consórcio, observadas a respeito, as normas de direito público.
- (E) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados somente será possibilitado exercer função de confiança no SUS desde que expressamente autorizado pelos órgãos de fiscalização do contrato.

12 No artigo 40 do decreto 7508 de 28 de junho de 2011, está previsto que o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde será realizado pelo

- (A) sistema nacional de auditoria e avaliação do SUS, por meio de serviço especializado.
- (B) Tribunal de Contas da União com auxílio do serviço de auditoria da receita federal.
- (C) Tribunal de Contas do Estado.
- (D) Tribunal de Contas do Município (onde houver) ou pelas Secretarias Municipais de Saúde.
- (E) Ministério da Saúde com auxílio do Tribunal de Contas da União.

13 Por determinação constitucional (artigo 198, parágrafo 2º, inciso I) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso da União, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a

- (A) 3%.
- (B) 5%.
- (C) 10%.
- (D) 15%.
- (E) 20%.

14 Considere a afirmação:

O sistema único de saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- I Conferência de Saúde.
- II Conselho de Saúde.
- III Fundo Nacional (União) e Regional (Estados da Federação) de Saúde.
- IV Comissões Bipartite.
- V Comissão Tripartite.

Fazem parte do artigo 1º da lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, os itens:

- (A) I, II, III e IV, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, III, IV e V, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

15 As diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos serão pactuados pelas (os):

- (A) Conselhos estaduais de saúde
- (B) Conselhos municipais de saúde
- (C) Conferências de saúde
- (D) Comissões intersetoriais
- (E) Comissões intergestores

16 A telessaúde, prevista na Lei 8080/90, abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo federal e obedecerá aos seguintes princípios, EXCETO:

- (A) Assistência segura e com qualidade ao paciente
- (B) Autonomia do profissional de saúde
- (C) Consentimento livre e informado do paciente
- (D) Direito de recusa ao atendimento na modalidade telessaúde, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado
- (E) Ampla divulgação dos dados

17 O artigo 35 da Lei nº 8.080/1990, estabelece que os valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios devem ser estabelecidos a partir da combinação dos seguintes critérios, dentre outros, segundo análise técnica de programas e projetos, EXCETO:

- (A) Previsão do plano bienal de investimentos na rede.
- (B) Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
- (C) Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior.
- (D) Perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- (E) Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais.

18 Segundo a Lei nº 8.080/90, a definição dos serviços de vigilância epidemiológica no âmbito do Sistema Único de saúde (SUS) é competência

- (A) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- (B) do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde.
- (C) do Ministério da Saúde.
- (D) do Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
- (E) da direção nacional do SUS.

19 Sobre os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) previstos no artigo 2º da lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, considere as afirmações:

Tais recursos serão alocados como:

- I despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
- II investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
- III investimentos previstos no plano bienal do Ministério da Saúde;
- IV cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito

Estão corretas apenas:

- (A) I, II, e III
- (B) II, III e IV
- (C) I, II e IV
- (D) I, III e IV
- (E) I, II

20 Nos termos da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (artigo 3º) serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a(ao):

- (A) ações de assistência social.
- (B) merenda escolar e outros programas de alimentação.
- (C) pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.
- (D) manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças.
- (E) saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

Parte III – Conhecimentos Específicos

21 Observando os marcos do desenvolvimento de acordo com a faixa etária da criança, percebe-se ao avaliá-la a ausência de dois ou mais marcos para a faixa etária anterior da mesma, sendo assim, a impressão diagnóstica é:

- (A) Provável atraso no desenvolvimento.
- (B) Alerta para o desenvolvimento.
- (C) Desenvolvimento adequado com fatores de risco.
- (D) Falta de estímulo familiar.
- (E) Alterações no comportamento.

22 Lactente com 1 ano e 2 meses é levado pela mãe ao ambulatório para consulta de puericultura. No momento o calendário vacinal está em dia.

Indique as vacinas que para serem aplicadas quando a criança completar 15 meses de vida segundo o Ministério da Saúde.

- (A) Reforço da anti-pneumocócica decavalente +tríplice viral.
- (B) Tetraviral + Hepatite A + 1º reforço da DTP + 1º reforço da VOP.
- (C) Segunda dose da varicela + 1º reforço da meningocócica.
- (D) Primeiro reforço da VOP + 2ª dose da tríplice viral.
- (E) Primeiro reforço da dTPa + 1ª dose da tetraviral + 3ª dose da VIP.

23 O período de armazenamento do leite materno com segurança, no freezer ou no congelador, contados a partir da data da primeira retirada é de até:

- (A) 15 dias.
- (B) 24 horas.
- (C) 5 dias.
- (D) 7 dias.
- (E) 48 horas.

24 Escolar realiza exame parasitológico de fezes por orientação de seu pediatra. O exame foi positivo para *Ascaris lumbricoides* e *Giardia lamblia*.

Indique o fármaco, dentre os abaixo relacionados, a ser prescrito como terapia preferencial para este paciente.

- (A) Ivermectina.
- (B) Clindamicina.
- (C) Nitazoxanida.
- (D) Levamizol.
- (E) Secnidazol.

25 Mais de noventa por cento das exposições tóxicas em crianças ocorrem em casa e a maioria envolve apenas uma única substância.

A N-acetilcisteína pode ser utilizada como antídoto na criança com intoxicação por:

- (A) carbamatos.
- (B) organofosforados.
- (C) monóxido de carbono.
- (D) difenidramina.
- (E) paracetamol.

26 Um menino de 8 anos vítima de atropelamento por automóvel é atendido em serviço de emergência. O exame físico revela feridas corto-contusas em face, escoriações em flanco esquerdo, dor à palpação abdominal e uretrorragia. A radiografia de abdome revela fratura no lado esquerdo do quadrante superior do púbis.

O melhor procedimento inicial para avaliar o sangramento uretral deste paciente é realizar:

- (A) ultrassonografia renal.
- (B) urografia excretora.
- (C) lavagem peritoneal diagnóstica.
- (D) uretrografia retrógrada.
- (E) tomografia computadorizada do abdome.

27 A pneumonia é definida como recorrente quando:

- (A) persistem os sintomas além do tempo esperado.
- (B) ocorrem dois ou mais episódios em um único ano.
- (C) ocorrem dois ou mais episódios em qualquer tempo nos primeiros cinco anos.
- (D) persistem as anormalidades radiológicas além do tempo esperado.
- (E) não responde a um ciclo completo de antibioticoterapia.

28 Em relação ao desenvolvimento motor do lactente, é correto afirmar que:

- (A) aos 6 meses transfere objetos de uma mão para outra.
- (B) o reflexo de Moro permanece até 12 meses.
- (C) aos 5 meses consegue sentar-se sozinho.
- (D) aos 10 meses a principal aquisição é a marcha.
- (E) aos 2 meses o bebê mantém a cabeça elevada em um ângulo de 90 graus.

29 Analise as afirmações abaixo sobre as manifestações clínicas (além da febre) presentes na doença de Kawasaki.

- I Congestão conjuntival bilateral purulenta.
- II Exantema polimorfo com acentuação na área da virilha.
- III Adenomegalia cervical não supurativa geralmente unilateral.
- IV Eritema da mucosa oral e faríngea com língua em “frambroesa”.
- V Lábios secos e fissurados sem ulcerações.

Estão corretas, apenas:

- (A) II, III, IV e V.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I, III e V.
- (D) II, IV e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

30 Aponte o defeito da parede abdominal de um recém-nascido que se caracteriza pela presença de herniação ou protrusão do conteúdo abdominal no interior da base do cordão umbilical e cujo saco herniário é recoberto por peritônio sem cobertura por pele.

- (A) Gastrosquise.
- (B) Hérnia congênita de Spigel.
- (C) Cisto de úraco.
- (D) Hérnia congênita de Richter.
- (E) Onfalocele congênita.

31 Mãe leva seu filho, lactente do sexo masculino, com 40 dias de vida, à serviço de emergência pediátrica, relatando que o mesmo apresenta regurgitações e vômitos não biliosos desde o nascimento, principalmente após as mamadas. A criança não está ganhando o peso adequado desde o nascimento e apresenta irritabilidade ao exame. Ao exame físico o lactente encontrava-se hipoativo, peso de 3400 gramas, com desidratação moderada. Ausculta cardiopulmonar sem alterações. Abdome: inspeção, ausculta e percussão sem anormalidades, porém a palpação encontrou-se pequena tumoração na região epigástrica. Indique a principal hipótese diagnóstica e o exame complementar inicial a ser realizado.

- (A) Atresia duodenal e rotina radiológica de abdome agudo com 3 incidências incluindo decúbito lateral.
- (B) Pâncreas anular e ressonância nuclear magnética sob sedação.

- (C) Estenose hipertrófica do piloro e ultrassonografia de abdome superior.
- (D) Invaginação intestinal e tomografia do abdome.
- (E) Megacólon congênito e clister opaco.

32 A dose de vitamina D que deve ser prescrita profilaticamente para o lactente a partir do primeiro ano de vida é:

- (A) 300 UI.
- (B) 400 UI.
- (C) 200 UI.
- (D) 600 UI.
- (E) 1000 UI.

33 No atual cenário brasileiro, a obesidade infantil tem aumentado de forma acentuada, podendo gerar prejuízo a longo prazo na adolescência e vida adulta.

Na prevenção da obesidade infantil pode-se considerar como fator que exerce um impacto positivo a (o):

- (A) Uso precoce de metformina.
- (B) Aleitamento materno.
- (C) Alimentação com predomínio de cereais.
- (D) Suplementação nutricional com produtos ultraprocessados.
- (E) Uso de fluoxetina.

34 Aponte a opção que representa uma possível causa para icterícia neonatal com hiperbilirrubinemia às custas de bilirrubina conjugada.

- (A) Atresia de vias biliares.
- (B) Doença hemolítica do recém-nascido.
- (C) Deficiência de vitamina K.
- (D) Síndrome de Crigler-Najjar.
- (E) Síndrome de Gilbert.

35 Indique a manifestação clínica que pode estar presente no exantema súbito.

- (A) Fotofobia.
- (B) Convulsão febril.
- (C) Conjuntivite purulenta.
- (D) Cefaleia persistente.
- (E) Prurido intenso.

36 Indique as alterações hematológicas da síndrome hemolítica-urêmica secundária à gastroenterite por *Shigella dysenteriae*.

- (A) Anemia normocítica, reticulócitos aumentados, coombs direto negativo, plaquetopenia
- (B) Anemia normocítica, reticulócitos normais, coombs direto positivo, plaquetas normais
- (C) Anemia normocítica, reticulócitos diminuídos, coombs direto positivo, plaquetopenia
- (D) Anemia microcítica, reticulócitos diminuídos, coombs direto negativo, plaquetas normais
- (E) Anemia microcítica, reticulócitos diminuídos, coombs direto positivo, plaquetopenia

37 Recém-nascido de mãe com BK, bacilífera em tratamento há uma semana com esquema básico para tuberculose.

A orientação adequada para o RN é:

- (A) Vacinar e encerrar o caso se PPD < ou igual 5mm, após 3 meses
- (B) Não vacinar, fazer PPD e iniciar quimioprofilaxia primária se PPD > ou igual 5mm
- (C) Iniciar quimioprofilaxia primária e manter se PPD, após três meses, estiver alterado
- (D) Não vacinar e iniciar esquema básico para tuberculose se PPD > ou igual 10mm
- (E) Iniciar quimioprofilaxia primária e fazer PPD após três meses, se <5mm, suspender a quimioprofilaxia e vacinar

38 Menino de 6 anos de idade apresenta edema, eritema e ferida corto-contusa na mão esquerda após mordida de cão da sua família (com vacinação em dia) que ocorreu cinco horas antes de seu atendimento no serviço de emergência (SE). No SE foram realizados os procedimentos adequados de tratamento da ferida seguida de curativo.

A profilaxia de infecção deve ser feita preferencialmente com um dos fármacos abaixo relacionados.

Indique-o.

- (A) eritromicina.
- (B) clindamicina.
- (C) amoxicilina-clavulanato.
- (D) gentamicina.
- (E) sulfametaxol-trimetropim.

39 Aponte os agentes etiológicos da *tinha capitis* e o seu tratamento de escolha.

- (A) *Trichophyton tonsurans* e *microsporum canis*; griseofulvina
- (B) *Trichophyton tonsurans*; cetoconazol
- (C) *Microsporum canis*; terbinafina
- (D) *Mycoplasma*; azitromicina
- (E) *Trichophyton mentagrophytes*; itraconazol

40 Escolar do sexo masculino é avaliado em unidade de pronto atendimento apresentando febre >38° C, cefaleia, mialgia intensa, dor retro-orbitária e exantema. Diante da possibilidade de ser arbovirose, indique o que se constitui um sinal de alarme da dengue.

- (A) Presença de febre alta.
- (B) Hipertensão arterial.
- (C) Diurese aumentada.
- (D) Hipotensão postural e/ou lipotimia.
- (E) Redução do hematócrito.

41 Escolar é levado à unidade de pronto atendimento devido a quadro de febre alta (39°C) e odinofagia há 3 dias. O paciente está em uso de azitromicina há 3 dias, sem melhora do quadro. Ao exame físico: apresenta exsudato purulento sobre as amígdalas, petéquias em palato, linfadenomegalia generalizada, fígado doloroso à palpação e baço palpável a 3cm, da reborda costal esquerda.

Aponte a principal hipótese diagnóstica e a conduta a ser tomada.

- (A) Difteria; iniciar soro antidiftérico
- (B) Escarlatina; iniciar amoxicilina
- (C) Amigdalite estreptocócica; iniciar amoxicilina
- (D) Mononucleose infecciosa; suspender a azitromicina
- (E) Difteria; substituir azitromicina por eritromicina

42 Analise as afirmações abaixo sobre o atual Programa Nacional de Imunização.

- I A segunda dose da vacina oral de rotavírus pode ser administrada até 7 meses e 29 dias de idade.
- II A vacina HPV4 recombinante (papiloma vírus humano) deve ser administrada em 2 doses com intervalo de 6 meses entre elas, a partir de 9 anos de idade em meninos e meninas.
- III A primeira dose da vacina de febre amarela deve ser administrada com 8 meses de idade.
- IV No adolescente que já recebeu a primeira dose da vacina tríplice viral basta completar o esquema vacinal com a segunda dose.

Estão corretas:

- (A) somente I, II e IV.
- (B) somente II, III e IV.
- (C) somente I, II e III.
- (D) somente I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

43 Lactente de 6 meses, não apresentando imunização prévia, é admitido para tratamento de artrite séptica, causada por *Streptococcus pneumoniae*.

A conduta adequada no momento da alta é:

- (A) Não indicar vacina contra *Streptococcus pneumoniae*, pois a doença confere imunidade permanente.
- (B) Indicar a vacina conjugada pneumocócica 10-valente, pois a doença não confere imunidade prévia permanente e o lactente não tem imunização.
- (C) Indicar aos 2 anos a vacina tetravalente.
- (D) Indicar a vacina polissacarídica pneumocócica por ser melhor indutora de imunidade nessa faixa etária.
- (E) Indicar a vacina conjugada anti-pneumocócica 15 dias após a alta.

- 44** Gestante é admitida na maternidade com VDRL positivo de 1/64, não tratada na gestação, por não ter feito pré-natal. Após o nascimento, o VDRL sérico do recém-nascido (RN) foi reagente até 1/128. O exame do líquido também apresentou positividade para o VDRL além de alterações na celularidade, nível de glicose e de proteínas. Com relação ao seguimento ambulatorial desse RN é correto afirmar que:
- (A) O acompanhamento oftalmológico e auditivo é dispensável.
 (B) A realização do VDRL deve ser feita mensalmente até a negatificação do mesmo.
 (C) Após o tratamento ter sido feito adequadamente, não está indicada nova punção liquórica.
 (D) Como o líquido inicial se mostrou alterado, deve ser realizada uma reavaliação liquórica a cada seis meses até a normalização do mesmo.
 (E) Deve-se realizar FTA-Abs para sífilis no 1º, 3º, 6º e 12º meses, interrompendo o seguimento laboratorial com 2 exames negativos.
- 45** Mãe com varicela, ainda com lesões cutâneas vesiculares, deu à luz a um recém-nascido (RN) a termo, de parto cesáreo, pesando 3kg. A conduta adequada em relação ao RN deverá ser:
- (A) Iniciar aciclovir oral.
 (B) Iniciar aciclovir EV.
 (C) Iniciar aciclovir oral e aplicar VZIG.
 (D) Informar a mãe que não há risco de transmissão.
 (E) Aplicar imunoglobulina específica para varicela zóster (VZIG).
- 46** Recém-nascido (RN) a termo, filho de mãe HIV+, apresentando um bom estado geral e, após receber a primeira dose de zidovudina, ainda na sala de parto, é encaminhado ao alojamento conjunto. A conduta adequada em relação ao RN é:
- (A) Manter aleitamento materno desde que a carga viral da mãe seja indetectável.
 (B) A vacina BCG só dever ser aplicada após a infecção do RN ser descartada.
 (C) Iniciar profilaxia com sulfametoxazol-trimetoprim contra pneumocistose a partir da 6ª semana de vida.
 (D) Suspender a profilaxia com zidovudina após o 14º dia de vida do RN.
 (E) Solicitar de imediato a quantificação do RNA viral, para descartar a possibilidade de infecção no 1º mês de vida.
- 47** Recém-nascido de 4 dias apresenta quadro de palidez cutâneo-mucosa, exantema petequial, icterícia 2+/4 e microcefalia. Ao realizar o exame de ultrassonografia transfontanela foi constatado dilatação ventricular e calcificações intracranianas periventriculares. Identifique a principal hipótese diagnóstica e o tratamento indicado.
- (A) Infecção congênita por citomegalovírus; ganciclovir.
 (B) Toxoplasmose congênita; sulfadiazina e pirimetamina associadas a ácido folínico.
 (C) Infecção por citomegalovírus congênita; aciclovir.
 (D) Infecção congênita por Herpes vírus; sintomáticos.
 (E) Parvovirose congênita; concentrado de plaquetas.
- 48** Escolar de 7 anos apresenta quadro de febre alta, amigdalite pultácea, petéquias em palato, exantema micropapular difuso com intensificação nas dobras flexurais e palidez peribucal, que se iniciou há cinco dias. Aponte a principal hipótese diagnóstica e a conduta indicada.
- (A) Escarlatina; penicilina.
 (B) Mononucleose infecciosa; sintomáticos.
 (C) Doença de Kawasaki; administração de imunoglobulina EV.
 (D) Mononucleose infecciosa; prednisolona oral.
 (E) Escarlatina; sulfametoxazol+trimetoprim oral.

49 Adolescente faz estágio no curso técnico de veterinária, há 3 meses, em uma clínica de animais de pequeno porte. Há 5 semanas, percebeu um ferimento um pouco doloroso abaixo do punho da mão direita, com bordos elevados e um nódulo subcutâneo de 4cm acima da lesão. Três semanas após, o local acima também havia ulcerado e 3 outros nódulos haviam surgido, em uma linha reta acima, no seu antebraço, com as mesmas características.

Não apresentou prurido, febre, apenas dor à compressão.

O diagnóstico mais provável é:

- (A) Impetigo bolhoso veiculado por arranhaduras.
- (B) Leishmaniose tegumentar.
- (C) Tuberculose cutânea veiculada por hamsters.
- (D) Psitacose por calopsitas.
- (E) Esporotricose veiculada por gatos.

50 Pré-escolar de 5 anos é trazida pela mãe à unidade de pronto atendimento por apresentar febre baixa e eritema na face há 3 dias. Há 24 horas surgiu também eritema em face extensora de membros superiores. Mantém bom estado geral. Refere artralgia nas mãos, punhos e joelhos. Ao exame físico: Aparelho cardiovascular sem alterações. Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente sem ruídos adventícios. Exame do abdome sem massas palpáveis ou visceromegalias.

O diagnóstico mais provável é:

- (A) Sarampo.
- (B) Eritema infeccioso.
- (C) Exantema súbito.
- (D) Mononucleose infecciosa.
- (E) Rubéola.

