



Técnico em Enfermagem

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A palpação deve ser sistematizada e simétrica das artérias possibilitando detectar diminuição ou ausência de pulso, viabilizando o diagnóstico de estenose ou oclusão (OLIVEIRA et al., 2024). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao pulso que é prático traçarmos uma linha entre o hálux e o segundo pododáctilo do lado avaliado, na região dorsal do pé podemos palpar, seja com a mão espalmada ou com o dorso do 2º ao 4º dedo da mão direita do examinador.

- (A) Pulso arterial pedioso.
- (B) Pulso arterial tibial posterior.
- (C) Pulso arterial poplíteo.
- (D) Pulso arterial femoral.

Questão 02

A regulação da temperatura corporal depende do balanço entre a produção de calor (a partir de todos os processos metabólicos) e a perda de calor (por trocas com o ambiente) (BRASIL, 2020). Com base nos locais da aferição de temperatura corporal, assinale a alternativa CORRETA, em que a leitura é lenta (cerca de 7 min), há risco de contaminação

por fluidos e não indicado para pacientes que não colaboram ou estão inconscientes.

- (A) Timpânica.
- (B) Axilar.
- (C) Oral.
- (D) Retal.

Questão 03

Com base nos critérios laboratoriais para diagnóstico de *diabetes mellitus*, é CORRETO afirmar que considera-se pré-diabetes quando:

- (A) Glicemia de 1 hora no teste de tolerância à glicose oral (mg/dl): 155-208.
- (B) hemoglobina glicada (%): < 5,7.
- (C) Glicemia de jejum (mg/dl): ≥ 126 .
- (D) Glicemia de 2 horas no teste de tolerância à glicose oral (mg/dl): < 140.

Questão 04

O hemograma é composto por três determinações básicas que incluem as avaliações dos eritrócitos (ou série vermelha), dos leucócitos (ou série branca) e das plaquetas (ou série plaquetária) (Naoum & Naoum, 2006). A análise da série vermelha é constituída pelas seguintes determinações básicas, EXCETO:

- (A) Hematócrito.
- (B) Volume Corpuscular Médio.
- (C) Dosagem da hemoglobina.

- (D) Monócitos.

Questão 05

Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso ou necessidade de descarte, em recipientes de paredes rígidas, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, resistentes ao processo de esterilização, com tampa, devidamente identificados com o símbolo internacional de risco biológico, acrescido da inscrição de "PERFUROCORTANTE" e os riscos adicionais, químico ou radiológico (FIOCRUZ, 2024). Sobre os materiais perfurocortantes, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

() O volume dos recipientes coletores, ou de acondicionamento, deve ser compatível com a geração diária deste tipo de resíduo. Estes recipientes só devem ser preenchidos até os 2/3 de sua capacidade, ou o nível de preenchimento ficar a 5 (cinco) cm de distância da boca do recipiente. Devem estar localizados tão próximo quanto possíveis da área de uso destes materiais.

() É expressamente proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas, quando descartáveis, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manualmente. Os recipientes coletores têm capacidade que varia de 3 a 13 litros, são confeccionados em material resistente (papelão couro), especialmente desenvolvido para utilização em serviços de saúde e, de preferência, possuir desconector de agulhas.

() O armazenamento temporário, o transporte interno e o armazenamento externo destes resíduos podem ser feitos nos mesmos recipientes utilizados para o Grupo A. Os resíduos perfurocortantes devem ser tratados a partir de uma avaliação de risco prévia, dos agentes de risco que posam conter. Os materiais perfurocortantes contaminados com radionuclídeos devem ser submetidos ao mesmo tempo de decaimento do material que o contaminou.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) F, V, F.
- (B) V, F, V.
- (C) F, F, V.
- (D) V, V, V.

Questão 06

As vacinas COVID-19 tiveram grande impacto na redução da morbimortalidade da doença, tendo evitado muitos óbitos e internações no Brasil desde a sua introdução (BRASIL, 2024). Em relação a vacina COVID-19, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

() Em crianças maiores de 2 anos, administrar preferencialmente no músculo vasto lateral da coxa.

() A vacina COVID-19 pode ser administrada na

mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e com outros medicamentos, procedendo-se às administrações com seringas e agulhas diferentes em locais anatômicos distintos.

(___) Em crianças de seis meses a menores de 2 anos de idade, a administração pode ser realizada nas regiões que compreendem o músculo deltoide ou no vasto lateral da coxa.

(___) Crianças imunocomprometidas com idade entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, tem indicação de receber 3 (três) doses da vacina no esquema primário. O intervalo recomendado é de 4 semanas entre a primeira e a segunda doses, e de 8 semanas entre a segunda e a terceira dose.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 07

Desbridamento é a remoção de tecido necrótico não viável. Ela é necessária para livrar a ferida de uma fonte de infecção, permitir a visualização do leito da ferida e proporcionar uma base limpa necessária para a cicatrização. O método de desbridamento depende do que é mais adequado para a condição do paciente e resultados do cuidado (WOCN, 2016). Os métodos de desbridamento incluem mecânico, autolítico, químico e incisivo/cirúrgico, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao desbridamento onde ocorre a remoção de tecido morto por lise do tecido necrótico realizada pelos leucócitos e enzimas naturais do corpo.

- (A) Químico.
- (B) Incisivo/cirúrgico.
- (C) Mecânico.
- (D) Autolítico.

Questão 08

A uretra é o tubo que transporta a urina da bexiga para uma abertura (orifício) do corpo a fim de ser eliminada. A mucosa (epitélio) da uretra é composta de células transicionais à medida que sai da bexiga (ODYA & NORRIS, 2020). A uretra masculina é dividida em três seções, baseadas na estrutura anatômica, com base nessa divisão assinale a alternativa CORRETA relacionada a uretra membranosa.

- (A) Contém o esfíncter interno e passa pela próstata.
- (B) As aberturas dessa região fazem com que o espermatozoide e o fluido prostático entrem na uretra durante o orgasmo.
- (C) Ocupa todo o comprimento do pênis, terminando no meato uretral.

- (D) Contém o esfíncter externo. Ela tem apenas cerca de 2,5 centímetros de comprimento.

Questão 09

Em parturientes de risco habitual, deve-se registrar algumas observações no primeiro período do trabalho de parto, é CORRETO afirmar que uma delas é a frequência cardíaca fetal a cada:

- (A) 5 minutos.
- (B) 60 minutos.
- (C) 30 minutos.
- (D) 90 minutos.

Questão 10

Os fluoretos são anticoagulante que atua em conjunto com o íon cálcio, e a sua utilização destina-se a exames de glicemia por ser um inibidor enzimático, conservando a glicose (MARTY & MARTY, 2014). É CORRETO afirmar que os frascos que contém fluoreto são com tampa de cor:

- (A) Cinza.
- (B) Verde.
- (C) Azul.
- (D) Roxa.

Questão 11

"O procedimento de aplicação de compressas úmidas frias é o mesmo que para as compressas quentes. Aplique compressas frias por _____ a uma temperatura de 15°C para aliviar inflamação e inchaço. Você pode usar compressas limpas ou estéreis." (POTTER et al., 2024)

Assinale a alternativa CORRETA que preenche a lacuna acima.

- (A) 30 minutos.
- (B) 45 minutos.
- (C) 20 minutos.
- (D) 60 minutos.

Questão 12

É CORRETO afirmar que no procedimento de reanimação deve-se iniciar compressões com a frequência de 100 por minuto (ou seja, 5 compressões a cada 3 segundos), comprimindo o tórax na profundidade de, no mínimo, 5 cm para adultos e crianças, e para bebês:

- (A) 2 cm.
- (B) 3 cm.
- (C) 8 cm.
- (D) 4 cm.

Questão 13

Uma técnica utilizada em um laboratório de análises clínicas é a coleta de soro, que consiste em coletar o material biológico em tubo sem anticoagulante, preferencialmente com gel separador e ativador de coágulo, pois este compõe uma barreira no fundo do tubo (MARTY & MARTY, 2014). É CORRETO afirmar que esse material deve ser mantido verticalmente por:

- (A) 10 minutos.
- (B) 20 minutos.
- (C) 15 minutos.
- (D) 30 minutos.

Questão 14

A faringe é uma estrutura tubular em formato de funil que tem aproximadamente 13 cm de comprimento. Começa nos cóanos e se estende até o nível da cartilagem cricóidea, a cartilagem mais inferior da laringe (TORTORA & DERRICKSON, 2023). Em relação à faringe, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

(__) O palato mole, que forma a parte posterior do teto da boca, é uma divisão muscular em formato de arco entre as partes nasal e oral da faringe e é revestido por mucosa.

(__) A parte inferior da faringe, a parte laríngea da faringe (ou laringofaringe), começa no nível do osso hioide. Na sua extremidade superior, abre-se para o esôfago posteriormente e para a laringe anteriormente.

(__) Dois pares de tonsilas, as tonsilas palatinas e linguais, são encontrados na parte oral da faringe.

(__) A porção intermediária da faringe, a parte oral (ou orofaringe), está localizada posteriormente à cavidade oral e se estende a partir do palato mole, inferiormente até o nível da margem inferior da epiglote.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, V, F, V.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

Detox de Dopamina:

Rolar o feed nas redes sociais e verificar constantemente e-mails ou mensagens pode estar sobrecarregando seu cérebro; veja como fazer uma pausa estratégica

Já notou a sensação de prazer ao verificar o celular? A atenção constante ao barulho das notificações e o scroll infinito nas redes sociais podem parecer ações

inofensivas, mas sobrecarregam o sistema de dopamina do cérebro, o que torna mais difícil manter o foco e a motivação. No trabalho, isso se reverte em mais procrastinação e menos atenção a metas e projetos a longo prazo. Se você está com dificuldades para se concentrar, pode estar precisando de uma desintoxicação de dopamina.

O detox ou jejum de dopamina consiste em uma pausa estratégica nas atividades superestimulantes para reiniciar o cérebro e restaurar a capacidade de se concentrar em metas significativas e de longo prazo. Ao minimizar os "picos" de dopamina a curto prazo, que pode vir de redes sociais, jogos ou de acumular muitas tarefas ao mesmo tempo, você pode reconstruir sua capacidade de fazer um trabalho profundo e retomar o controle da sua atenção.

<https://forbes.com.br/carreira/2024/09/detox-de-dopamina-passos-para-aumentar-o-foco-e-vencer-a-procrastinacao/>

Questão 15

"Ao minimizar os "picos" de dopamina a curto prazo, que pode vir de redes sociais, jogos ou de acumular muitas tarefas ao mesmo tempo, você pode reconstruir sua capacidade de fazer um trabalho profundo e retomar o controle da sua atenção."

O período apresenta erros relacionados:

- (A) à ortografia e a concordância nominal.
- (B) à concordância nominal e à verbal.
- (C) à acentuação e à concordância verbal.
- (D) ao emprego da crase e à concordância nominal.

Questão 16

"A atenção constante ao barulho das notificações e o scroll infinito nas redes sociais podem parecer ações inofensivas, mas sobrecarregam o sistema de dopamina do cérebro, o que torna mais difícil manter o foco e a motivação."

Considerando o período acima, julgue as afirmativas:

I. 'barulho' completa o substantivo 'atenção' e 'notificações' completa o substantivo 'barulho', assim, ambos exercem a função sintática de complemento nominal.

II. O verbo 'sobrecarregar' tem como sujeito 'ações inofensivas'.

III. 'o sistema de dopamina do cérebro' é objeto direto do verbo 'sobrecarregar'.

IV. Há um sujeito composto.

Estão corretas:

- (A) Apenas II e IV.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I, III e IV.

Questão 17

"O detox ou jejum de dopamina consiste em uma pausa estratégica nas atividades superestimulantes para reiniciar o cérebro e restaurar a capacidade de se concentrar em metas significativas e de longo prazo."

O vocábulo 'superestimulantes' não é hifenizado, da mesma forma que os das alternativas a seguir, EXCETO em:

- (A) superalimentação.
- (B) superresfriado.
- (C) superbonito.
- (D) superfaturado.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Florianópolis, a capital de Santa Catarina, possui um legado histórico que remonta à época colonial. Inicialmente chamada de Nossa Senhora do Desterro, a cidade passou a se chamar Florianópolis em 1894. Qual evento motivou a mudança de nome?

- (A) A construção da Ponte Hercílio Luz.
- (B) A chegada dos primeiros imigrantes alemães.
- (C) A visita do imperador Dom Pedro II à cidade.
- (D) A homenagem ao presidente Floriano Peixoto, após a Revolução Federalista.

Questão 19

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Dionísio Cerqueira (SC), o processo legislativo municipal compreende a elaboração de diversos dispositivos, EXCETO:

- (A) leis delegadas.
- (B) leis extraordinárias.
- (C) resoluções.
- (D) decretos legislativos.

Questão 20

O Banco Central do Brasil adotou medidas para enfrentar a inflação em 2023. Uma dessas medidas foi:

- (A) Reduzir a taxa Selic para estimular o consumo.
- (B) Congelar os preços dos combustíveis por tempo indeterminado.
- (C) Aumentar a taxa Selic para controlar a inflação.
- (D) Suspender as operações de crédito para empresas.