

Médico (Clínico Geral)**INSTRUÇÕES**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

Você recebeu do fiscal o seguinte material: a) Caderno de Questões da Prova Objetiva com as questões desta; b) Folha de Respostas destinada às respostas das questões da Prova Objetiva.

Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de material transparente, com tinta azul ou preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.

É responsabilidade do candidato certificar-se de que recebeu a prova correspondente (verifique o cabeçalho do Caderno de Questões). Notifique o fiscal qualquer irregularidade.

FOLHEAR O CADERNO DE QUESTÕES ANTES DO INÍCIO DA PROVA IMPLICA NA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. SOMENTE APÓS AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, VERIFIQUE SE ESTE CADERNO DE QUESTÕES ESTÁ COMPLETO E EM ORDEM. NOTIFIQUE O FISCAL QUALQUER IRREGULARIDADE IMEDIATAMENTE.

Não esqueça de assinar seu nome, com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, no espaço próprio da Folha de Respostas.

O candidato deverá assinalar as respostas das questões da Prova Objetiva na Folha de Respostas, preenchendo os alvéolos com caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta. Será de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas (dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada, falta de marcação e campo de marcação não preenchido integralmente).

Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. Ambas somente poderão ser substituídas caso estejam danificadas em suas margens superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

Quando terminar, entregue obrigatoriamente ao fiscal a Folha de Respostas. **NÃO DEIXE DE ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA.**

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

13º salário surgiu de greve geral após vitória do Brasil na Copa de 1962

Em 1962, o Brasil conquistou o bicampeonato na Copa do Mundo. Mas pouca gente conhece a história de uma outra conquista daquele ano: a do 13º salário, benefício garantido em lei sancionada pelo presidente João Goulart em 13 de julho de 1962.

"O 13º salário é um caso de reivindicação surgida no chão da fábrica, legitimada nas relações costumeiras entre patrões e empregados em algumas firmas, transformada em lei às custas de greves, demissões, abaixo assinados, prisões e cuja memória é depois ofuscada pelo brilho da lei que supõe-se, como toda lei, ter sido iniciativa de algum presidente, deputado ou senador", escreve o historiador Murilo Leal Pereira Neto.

Tudo aconteceu sob protestos dos empresários e do mercado financeiro da época, conforme registrou o jornal O Globo que, no dia 26 de abril de 1962, estampou na sua manchete: "Considerado desastroso para o País um 13º mês de salário".

O desastre não veio e hoje milhões são beneficiados com o rendimento adicional, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

A gratificação de Natal é uma tradição originada em países de maioria cristã, onde alguns patrões tinham o costume de presentear seus funcionários com cestas de alimentos na época das festas de fim de ano.

Essa doação, antes voluntária, tornou-se obrigatória na Itália em 1937, durante o regime fascista de Benito Mussolini, quando o acordo coletivo de trabalho nacional passou a prever um mês adicional de salário para os empregados das fábricas.

Em 1946, o benefício seria estendido às demais categorias de trabalhadores italianos, sendo consolidado através de decreto presidencial em 1960.

No Brasil, os primeiros registros de greves e demandas pelo abono de Natal são de 1921, na Companhia Paulista de Aniagação e na indústria Mariângela, ambas empresas do setor têxtil.

Sob inspiração da Carta del Lavoro de 1927 da Itália fascista, o Brasil aprovaria em 1943 sua Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas ela não constava o 13º salário.

Naquele mesmo ano, no entanto, o abono de Natal foi conquistado pelos trabalhadores da fabricante de pneus Pirelli, levando a uma greve geral no ano seguinte em Santo André (SP) pelo pagamento do benefício.

"Na onda de greves que se alastrou de dezembro de 1945 a março de 1946, a luta pelo prêmio de final de ano era a principal reivindicação na sua maioria, envolvendo

categorias como ferroviários da Sorocabana, trabalhadores da Light, tecelões, metalúrgicos, gráficos e químicos em São Paulo", lembra Pereira Neto, em sua tese de doutorado.

Após tantas lutas e greves pelo país ao longo dos anos, a Constituição de 1988 garantiu o 13º salário a todos os trabalhadores urbanos e rurais, direito formalmente estendido aos servidores públicos por meio da Emenda Constitucional 19 naquele mesmo ano.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c2ln4p18r2ro>. adaptado.

Questão 01

Tudo aconteceu 'sob protestos dos empresários e do mercado financeiro da época'.

Sintaticamente, o termo destacado nesta frase trata-se de:

- (A) Predicado verbal.
- (B) Adjunto adverbial.
- (C) Oração subordinada.
- (D) Objeto indireto.
- (E) Complemento nominal.

Questão 02

As funções da linguagem correspondem às maneiras como a linguagem é usada de acordo com a intenção do emissor.

No texto base intitulado '13º salário surgiu de greve geral após vitória do Brasil na Copa de 1962' predomina qual função da linguagem?

- (A) Fática.
- (B) Metalinguística.
- (C) Expressiva.
- (D) Denotativa.
- (E) Conativa.

Questão 03

Na onda de greves que se alastrou de dezembro de 1945 a março de 1946, a luta pelo prêmio de final de ano era a principal reivindicação na 'sua' maioria.

Nesta frase, o pronome destacado substitui o vocábulo:

- (A) dezembro.
- (B) luta.
- (C) onda.
- (D) final.
- (E) reivindicação.

Questão 04

A gratificação de Natal é uma tradição originada em países de maioria cristã, onde alguns patrões tinham o costume de presentear seus funcionários com cestas de alimentos na época das festas de fim de ano.

De acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que:

- (A) há dois vocábulos acentuados por serem oxítonos terminados em 'o'.
- (B) um vocábulo recebe acento diferencial estabelecido pelo novo acordo ortográfico.
- (C) o vocábulo 'cristã' recebe acento por ser paroxítono terminado em 'ã', como 'grã', 'ímã', etc.
- (D) 'países' e 'funcionários' são vocábulos paroxítonos acentuados pela mesma regra.
- (E) 'época' é o único vocábulo presente acentuado por ser proparoxítono.

Questão 05

Em 1962, o Brasil conquistou o bicampeonato na Copa do Mundo. Mas pouca gente conhece a história de uma outra conquista daquele ano: a do 13º salário.

Assinale a opção correta quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) O Brasil conquistou o bicampeonato na Copa do Mundo em 1962, mas pouca gente conhece a história de uma outra conquista daquele ano – a do 13º salário.
- (B) O Brasil, em 1962 conquistou o bicampeonato na Copa do Mundo; mas, pouca gente, conhece a história de uma outra conquista: a do 13º salário daquele ano.
- (C) Em 1962, o Brasil conquistou uma outra conquista daquele ano: a do bicampeonato na Copa do Mundo. Mas, pouca gente conhece a história de o 13º salário.
- (D) Em 1962, o Brasil conquistou – uma outra conquista daquele ano, a do bicampeonato na Copa do Mundo. Mas pouca gente conhece a história de: o 13º salário.
- (E) O Brasil conquistou o bicampeonato na Copa do Mundo, em 1962 mas pouca gente conhece a história, de uma outra conquista, daquele ano – a do 13º salário.

Questão 06

O desastre não 'veio' e hoje milhões são beneficiados com o rendimento adicional, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

O verbo destacado, nesta frase, comporta-se como um verbo:

- (A) Intransitivo.
- (B) Transitivo direto.
- (C) Transitivo indireto.
- (D) Bitransitivo.
- (E) De ligação.

Questão 07

Em 1946, o benefício 'seria' estendido às demais categorias de trabalhadores italianos, sendo consolidado através de decreto presidencial em 1960.

O verbo destacado na frase encontra-se conjugado no:

- (A) Pretérito imperfeito do indicativo.
- (B) Futuro do pretérito do subjuntivo.
- (C) Pretérito imperfeito do subjuntivo.
- (D) Pretérito mais que perfeito do indicativo.
- (E) Futuro do pretérito do indicativo.

Questão 08

A linguagem é um sistema de comunicação que facilita a interação entre as pessoas, a transmissão de conhecimento e a construção de relações sociais, desempenhando um papel essencial na cultura e no desenvolvimento humano.

No texto base intitulado '13º salário surgiu de greve geral após vitória do Brasil na Copa de 1962' tem-se o tipo de linguagem:

- (A) Não verbal.
- (B) Oral.
- (C) Verbal e não verbal.
- (D) Verbal.
- (E) Literária.

Questão 09

[...] envolvendo categorias como 'ferroviários' da Sorocabana, 'trabalhadores' da Light, tecelões, metalúrgicos, 'gráficos' e químicos em São Paulo.

Os vocábulos destacados são formados pelos processos de, respectivamente:

- (A) Parassíntese – parassíntese – parassíntese.
- (B) Parassíntese – parassíntese – regressão.
- (C) Sufixação – parassíntese – sufixação.
- (D) Parassíntese – parassíntese – sufixação.
- (E) Sufixação – sufixação – sufixação.

Questão 10

O benefício do 13º salário foi um acontecimento histórico envolvendo empresários, trabalhadores e o mercado financeiro.

Sobre o processo histórico que levou à formalização do 13º salário, assinale a opção correta.

- (A) A inspiração para o 13º salário no Brasil, que veio de práticas italianas durante o regime fascista, foi logo reimaginada e aceita pelos empresários brasileiros, que viam no benefício uma oportunidade de fortalecer as relações com os empregados.

- (B) O jornal O Globo, em abril de 1962, destacou que o 13º salário representava uma nova forma de vitalizar a economia, prevendo que a sua implementação seria bem recebida por todos os setores da sociedade, sem controvérsias ou resistências.
- (C) O processo que culminou na formalização do 13º salário ocorreu sem maiores movimentações sociais, sendo conduzido de maneira orquestrada e cuidadosa pelos legisladores que buscavam consolidar o bem-estar dos trabalhadores brasileiros, apesar de algumas controvérsias.
- (D) A primeira vitória dos trabalhadores pela conquista de um abono de final de ano ocorreu em 1946, um período onde os trabalhadores embarcaram em um intrincado processo de greves que resultou no estabelecimento imediato do 13º salário em todas as categorias.
- (E) O 13º salário no Brasil foi sancionado por João Goulart em 1962, após um mosaico de lutas que remontam a décadas anteriores, envolvendo greves e reivindicações que finalmente entrelaçaram o benefício à legislação, apesar de forte resistência empresarial.

Raciocínio Lógico ? Matemático

Questão 11

Uma construtora está pavimentando uma avenida que terá 8 km de comprimento e precisa definir a quantidade exata de blocos de concreto para cobrir toda a extensão. Cada bloco de concreto cobre uma faixa de 5 metros de comprimento e tem exatamente 1 metro de largura. Sabendo que a avenida será pavimentada em duas faixas, uma para cada sentido de direção, qual será o número total de blocos de concreto necessários para pavimentar completamente a avenida?

- (A) 3.600 blocos.
 (B) 3.200 blocos.
 (C) 4.000 blocos.
 (D) 2.400 blocos.
 (E) 5.200 blocos.

Questão 12

Em uma plantação de milho, o agricultor João notou que o rendimento por hectare de sua safra era modelado por uma Progressão Geométrica (PG). Ele observou que, a cada ano, a produção de milho por hectare aumentava em uma taxa constante de 100%, em relação ao ano anterior, devido à melhoria nas técnicas de manejo e fertilização. No primeiro ano, João produziu 1.000 kg de milho por hectare. Considerando que essa taxa de crescimento se mantém constante ao longo dos anos, qual será a produção estimada por hectare no 6º ano?

- (A) 32.000 kg.
 (B) 16.000 kg.
 (C) 28.000 kg.

- (D) 24.000 kg.
 (E) 20.000 kg.

Questão 13

Uma agência de turismo está organizando uma série de excursões e deseja calcular a quantidade de assentos necessários em seus veículos. Sabe-se que o número total de passageiros x deve satisfazer um requisito da agência para cobrir os custos e garantir lucro. O número de passageiros está relacionado pela função $f(x) = 5x^2 - 45x$.

Com base nisso, quantos passageiros são necessários para que o custo e a operação sejam viáveis?

- (A) 10 passageiros.
 (B) 4 passageiros.
 (C) 15 passageiros.
 (D) 5 passageiros.
 (E) 9 passageiros.

Questão 14

Uma academia possui 5 professores: João, Marcos, Francisco, Mateus e Cláudio. Foi necessário organizar um cronograma de atendimento em que duas duplas de professores trabalham por dia, seguindo sempre a mesma sequência de rodízio. As duplas se revezam na seguinte ordem:

1. João e Marcos.
2. Francisco e Mateus.
3. Marcos e Cláudio.
4. João e Francisco.
5. Mateus e Cláudio.

Com base nesse cronograma, qual será a dupla de professores que atenderá no 258º dia?

- (A) Marcos e Cláudio.
 (B) João e Francisco.
 (C) Mateus e Cláudio.
 (D) Francisco e Mateus.
 (E) João e Marcos.

Questão 15

Uma loja de produtos agrícolas realizou um financiamento de R\$30.000,00 para expandir seu estoque, com uma taxa de juros simples de 6% ao semestre, para ser quitado em 18 meses. Com os novos produtos em estoque, a loja estima um valor bruto de vendas de R\$55.000,00 ao final desse período.

Para atrair mais clientes, o gerente decidiu conceder um desconto de 15% sobre o valor bruto para os compradores à vista. Considerando o valor final após o desconto e o custo do financiamento, qual será o lucro efetivo da loja ao término desse período?

- (A) R\$13.150,00.

- (B) R\$11.350,00.
- (C) R\$11.200,00.
- (D) R\$12.550,00.
- (E) R\$10.500,00.

Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus Lei municipal 1.118/71; Lei Municipal 870/2005

Questão 16

Paulo, servidor público, ingressou no serviço público municipal antes de 16 de dezembro de 1998. Ele está planejando sua aposentadoria e deseja saber quais são os requisitos para se aposentar com proventos integrais, de acordo com as regras de transição previstas na Lei Nº 870/2005. Quais das seguintes condições Paulo deve atender para se aposentar com base no artigo 50 dessa lei?

- (A) Ter completado cinquenta e cinco anos de idade, cinco anos de efetivo exercício no cargo, e trinta anos de contribuição.
- (B) Ter sessenta anos de idade, se homem, com trinta anos de contribuição.
- (C) Ter quarenta e oito anos de idade, se mulher, com quinze anos de serviço público e cinco anos no cargo atual.
- (D) Ter completado cinquenta anos de idade, se homem, e vinte e cinco anos de contribuição.
- (E) Ter cinquenta e três anos de idade, se homem, cinco anos de efetivo exercício no cargo, e um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo faltante para completar trinta e cinco anos de contribuição.

Questão 17

João foi aprovado em um concurso público e, após dois anos de efetivo exercício, adquiriu estabilidade no cargo público. No entanto, recentemente, foi acusado de irregularidades e está sendo submetido a um processo administrativo. De acordo com a Lei Nº 1118/71, em quais condições João pode perder seu cargo, mesmo sendo um funcionário estável?

- (A) João pode perder o cargo apenas se solicitar sua exoneração voluntária.
- (B) João pode perder o cargo em virtude de uma sentença judicial transitada em julgado ou por meio de processo administrativo, desde que seja garantida ampla defesa.
- (C) João só pode perder o cargo se estiver em estágio probatório, uma vez que a estabilidade o protege contra qualquer forma de demissão.
- (D) João só pode perder o cargo em caso de demissão por justa causa, após recomendação do chefe imediato.

- (E) João pode perder o cargo por qualquer tipo de infração administrativa, sem necessidade de processo judicial ou administrativo.

Questão 18

Em 1º de janeiro, os novos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Manaus reúnem-se para a primeira sessão preparatória da legislatura. De acordo com o Regimento Interno, qual é o procedimento correto para a eleição da Mesa Diretora?

- (A) Os suplentes podem concorrer a qualquer cargo da Mesa Diretora, desde que tenham sido convocados no início da sessão.
- (B) A eleição ocorre antes da posse dos vereadores eleitos, para garantir que a Mesa Diretora esteja constituída.
- (C) A eleição será realizada por voto secreto para garantir imparcialidade no processo.
- (D) O registro da candidatura é feito por cargo, começando pela Presidência, e o vereador não pode concorrer a mais de um cargo.
- (E) A eleição começa com o registro de candidaturas para todos os cargos da Mesa simultaneamente.

Questão 19

Ana, servidora pública municipal, cometeu uma infração no exercício de suas funções, e após análise da gravidade do ato, foi aplicada a pena de suspensão. Sabendo que a suspensão é uma das penas disciplinares previstas na Lei Nº 1118/71, qual das alternativas abaixo descreve corretamente os efeitos dessa penalidade?

- (A) A suspensão de Ana implicará na perda de vencimentos durante o período da suspensão, além de impactar sua antiguidade e promoções.
- (B) Ana poderá converter sua suspensão em multa automaticamente, caso acredite ser mais benéfico.
- (C) A suspensão de Ana não impedirá sua promoção, desde que seja por mérito.
- (D) Ana não perderá nenhum direito, pois a suspensão tem caráter educativo.
- (E) Ana terá suspensa apenas parte de sua remuneração, mas manterá todos os outros direitos funcionais.

Questão 20

Durante uma sessão plenária, o Presidente da Câmara Municipal de Manaus percebe que há um conflito entre dois vereadores que se estendem para a ordem dos trabalhos. Com base no Regimento Interno, qual das alternativas descreve corretamente uma das ações que o Presidente pode tomar em relação ao incidente?

- (A) Afastar-se da condução dos trabalhos para não interferir no andamento da sessão, deixando a responsabilidade com o Secretário.

- (B) Desconsiderar o incidente e permitir que os vereadores continuem o debate para preservar a autonomia dos mesmos.
- (C) Conceder a palavra aos vereadores que não estão envolvidos no incidente, ignorando o conflito.
- (D) Advertir os vereadores e, em caso de insistência, interromper a sessão para uma deliberação sobre a penalidade.
- (E) Retirar imediatamente ambos os vereadores da sessão, sem dar explicações ao Plenário.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

A cólera é uma doença endêmica em algumas regiões e pode se espalhar rapidamente em locais com condições sanitárias inadequadas. O reconhecimento rápido do quadro clínico é crucial para o manejo eficaz e a prevenção de surtos. Sobre o quadro clínico da cólera, marque a alternativa correta.

- (A) As manifestações mais frequentes são diarreia e vômitos.
- (B) Nos quadros graves, o início é lento e progressivo, com febres noturnas, as quais são acompanhadas de intensa sudorese.
- (C) Febre é o principal achado da histórica clínica.
- (D) Os casos graves são marcados pela presença de déficits neurológicos focais, que surgem nos primeiros dias da infecção.
- (E) Vômitos não são frequentes, mas, quando presentes, possuem conteúdo hemorrágico.

Questão 22

O diagnóstico de hipercolesterolemia familiar pode ser definido a partir de um sistema que confere diferentes pontuações para diferentes critérios diagnósticos. Nesse contexto, assinale o item que possui maior pontuação nesse sistema.

- (A) Familiar de primeiro grau com doença aterosclerótica prematura.
- (B) Xantoma tendinoso.
- (C) Arco córneo antes dos 45 anos.
- (D) Paciente com doença arterial coronariana prematura.
- (E) LDL-C entre 155 e 189 mg/dL.

Questão 23

A epilepsia é uma condição que decorre da descarga anormal de neurônios no cérebro. Nesse sentido, indique o item correto quanto ao tratamento medicamentoso desse quadro.

- (A) O fenobarbital é o único medicamento antiepiléptico que não deve ser utilizado em recém-nascidos.

- (B) A fenitoína age pelo estímulo dos canais de sódio dependentes de voltagem e, por possuir raros efeitos adversos, é considerado como tratamento de primeira linha.
- (C) A carbamazepina não é indicada em monoterapia de crises focais.
- (D) O levetiracetam, além de rápido início de ação, possui menos efeitos adversos e menor interação com outros fármacos.
- (E) O clobazam, apesar de possuir um rápido início de ação, possui baixa eficácia e, por isso, não deve ser utilizado.

Questão 24

A amamentação é uma importante fase do desenvolvimento do bebê e motivo de insegurança para muitas mulheres, fator este que revela a importância da adequada orientação fornecida pelo profissional de saúde. Identifique o item abaixo que corresponde a um sinal indicativo de técnica incorreta de amamentação.

- (A) São audíveis os sons da deglutição.
- (B) O queixo do bebê toca a mama.
- (C) As bochechas do bebê estão encovadas a cada sucção.
- (D) Além do mamilo, o bebê abocanha parte da aréola.
- (E) Os lábios do bebê estão curvados para fora.

Questão 25

A vacinação contra febre amarela é a medida mais importante e eficaz para prevenção e controle da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, a primeira dose dessa vacina deve ser tomada a partir de que idade?

- (A) 10 anos.
- (B) 4 anos.
- (C) 9 meses.
- (D) 5 meses.
- (E) 15 meses.

Questão 26

No Brasil, o câncer cervical é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres. O rastreamento desse câncer deve ser realizado em mulheres com faixa etária entre:

- (A) 25 e 60 anos.
- (B) 25 e 69 anos.
- (C) 20 e 64 anos.
- (D) 20 e 60 anos.
- (E) 25 e 64 anos.

Questão 27

A trombólise química é uma das principais formas de tratar o acidente vascular isquêmico. Entretanto, é

fundamental que se conheçam as suas contraindicações absolutas, dentre as quais, pode-se citar:

- (A) NIHSS maior que 22.
- (B) defeito na coagulação, com RNI acima de 1,7.
- (C) história de crise convulsiva.
- (D) uso de antiagregante plaquetário.
- (E) idade maior que 80 anos.

Questão 28

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico ocorre quando há uma interrupção do fluxo sanguíneo em uma área do cérebro, geralmente devido à formação de coágulos. A trombólise química é uma terapia que visa dissolver esses coágulos para restaurar o fluxo sanguíneo o mais rapidamente possível e minimizar os danos neurológicos. No AVC isquêmico, a trombólise química é feita com alteplase, cuja dose máxima é de:

- (A) 90 mg.
- (B) 40 mg.
- (C) 100 mg.
- (D) 4 mg.
- (E) 9 mg.

Questão 29

A diarreia em crianças é uma queixa frequente na atenção primária, sendo fundamental que o médico saiba manejar corretamente tais quadros. Sobre a diarreia no paciente pediátrico e os planos de tratamento A, B e C, assinale o item correto.

- (A) O plano B pode ser realizado no ambiente domiciliar.
- (B) Sede excessiva e recusa alimentar não são considerados sinais de perigo na criança.
- (C) No plano A, após cada evacuação diarreica, recomenda-se que pacientes menores de 1 ano recebam entre 50 a 100mL de líquido.
- (D) No plano A, o paciente deve manter o seu consumo regular de água, ou seja, consumir a quantidade que consome normalmente.
- (E) Na fase rápida do plano C, preconiza-se o uso exclusivo de soro glicosado.

Questão 30

A esquistossomose mansoni é uma infecção parasitária causada pelo *Schistosoma mansoni*, prevalente em regiões tropicais e subtropicais. O tratamento medicamentoso é essencial para interromper o ciclo de transmissão, reduzir a carga parasitária e prevenir complicações graves, como a fibrose hepática. Acerca do tratamento medicamentoso da esquistossomose mansoni, assinale o item correto.

- (A) O tratamento de escolha é o praziquantel, cuja dose é calculada de acordo com o peso do paciente.

- (B) A principal vantagem do tratamento com isoniazida é que este fármaco também pode ser usado por pacientes gestantes.
- (C) O tratamento deve ser realizado com imunoglobulinas, o mais breve possível.
- (D) Dentre os principais efeitos colaterais do tratamento com a isoniazida, está a sonolência.
- (E) Uma das contraindicações ao tratamento da esquistossomose com o medicamento de escolha é a idade inferior a 10 anos.

Questão 31

O climatério é uma fase do ciclo reprodutivo feminino que, muitas vezes, pode exigir manejo farmacológico dos sintomas, com o uso da terapia de reposição hormonal (TRH). Assinale o item abaixo que corresponde a uma contraindicação absoluta à TRH.

- (A) Miomatose uterina.
- (B) Doença hepática grave.
- (C) Endometriose.
- (D) Hipertensão arterial não controlada.
- (E) Diabetes mellitus não controlado.

Questão 32

A importância da regularidade das consultas de pre-natal se evidencia na identificação precoce de complicações que podem comprometer aquela gestação. Dentre tais complicações, está a pré-eclâmpsia. Nesse sentido, assinale o item abaixo que traz a correta definição da pré-eclâmpsia.

- (A) Surgimento de hipertensão arterial sistêmica e proteinúria após a 20ª semana gestacional em mulheres previamente normotensas.
- (B) Surgimento de hipertensão arterial sistêmica, independentemente da idade gestacional.
- (C) Surgimento de convulsões em mulheres acima da 20ª semana gestacional.
- (D) Níveis pressóricos acima de 130x90 mmHg, em mulheres previamente normotensas, associados a crises convulsivas.
- (E) Níveis pressóricos acima de 130x90 mmHg, associados à edema difuso, em mulheres previamente hipertensas.

Questão 33

A avaliação global da pessoa idosa na atenção básica é um processo essencial para identificar as necessidades físicas, psicológicas, sociais e funcionais do idoso. A respeito da avaliação global da pessoa idosa na atenção básica, indique o item correto.

- (A) Dada a alta prevalência da insuficiência venosa, a circulação periférica deve ser sistematicamente verificada, uma vez que a presença de doença arterial periférica é um marcador de aterosclerose com maior risco de lesões coronarianas e cerebrais.

- (B) No atendimento a pessoa idosa, a conduta médica deve ser guiada pelo conceito da "doença única, uma vez que este individualiza o atendimento, a medida em que evita situações como a polifarmácia, quando um indivíduo utiliza um somatório de tratamentos medicamentosos.
- (C) Algumas doenças devem ser sempre investigadas, o que não é o caso da diabetes e de déficits cognitivos.
- (D) As doenças nas pessoas idosas tendem a ter uma apresentação similar quando comparadas a de indivíduos mais jovens, por isso os diagnósticos diferenciais são os mesmos entre essas populações.
- (E) O profissional médico deve se atentar somente aos medicamentos que ele próprio prescreveu, não devendo fazer uma revisão dos medicamentos de uso prévio do paciente.

Questão 34

Analise o exposto abaixo, retirado do Ministério da Saúde:

"Uma das formas de se prevenir do HIV é a PrEP, a Profilaxia Pré-Exposição. Ela consiste na tomada de comprimidos antes da relação sexual, que permitem ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com o HIV. A pessoa em PrEP realiza acompanhamento regular de saúde, com testagem para o HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)".

Indique o item abaixo que corresponde aos dois medicamentos utilizados na PrEP.

- (A) Fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina.
- (B) Fumarato de tenofovir desoproxila + dolutegravir.
- (C) Lamivudina + dolutegravir.
- (D) Fumarato de tenofovir desoproxila + entricitabina.
- (E) Lamivudina + abacavir.

Questão 35

O manejo farmacológico da dissecação de aorta tem como objetivo controlar a pressão arterial e a frequência cardíaca para minimizar o estresse sobre a parede aórtica, prevenindo a progressão da dissecação até que intervenções mais definitivas possam ser realizadas. Conhecer os medicamentos e as estratégias apropriadas para esse manejo é crucial para uma resposta clínica eficaz. Sobre o manejo farmacológico da dissecação de aorta, assinale a alternativa correta.

- (A) A pressão sistólica não deve ser reduzida a valores abaixo de 120 mmHg.
- (B) A medicação inicial de escolha para a redução da pressão arterial é o osmolol.
- (C) Antes de controlar a frequência cardíaca, deve-se utilizar o nitroprussiato para obter o controle da pressão arterial sistólica.
- (D) Para reduzir a frequência cardíaca, preconiza-se, inicialmente, o uso de vasodilatadores intravenosos.

- (E) Está contraindicado o uso de morfina para controle algico, devido a maior associação desse medicamento com o aumento da mortalidade.

Questão 36

De acordo com o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, quando deve ser aplicada a primeira dose da tríplice viral?

- (A) 2 meses de vida.
- (B) 9 meses de vida.
- (C) 5 meses de vida.
- (D) 12 meses de vida.
- (E) 15 meses de vida.

Questão 37

A recomendação de antibioticoterapia para adultos com quadros de meningite secundários à infecção por *Neisseria meningitidis* é com:

- (A) amicacina 500 mg, de 12/12 h, durante 10 dias.
- (B) ceftriaxona 2g, de 12/12 horas, durante 7 dias.
- (C) rifampicina 600 mg, durante 7 dias.
- (D) meropenem endovenoso, até o desaparecimento dos sintomas.
- (E) penicilina intramuscular, durante 4 dias.

Questão 38

O uso de insulina é essencial no manejo de crises hiperglicêmicas, como cetoacidose diabética e estado hiperglicêmico hiperosmolar, que representam emergências médicas em pacientes com diabetes. A administração adequada de insulina nestas situações ajuda a reduzir rapidamente os níveis elevados de glicose no sangue, prevenindo complicações graves e estabilizando o quadro clínico. A compreensão dos protocolos de administração e monitoramento é vital para o manejo eficaz dessas crises. Sobre o uso de insulina nas crises hiperglicêmicas, analise os itens abaixo.

I.O tratamento mais indicado para as crises hiperglicêmicas é com insulina regular em baixas doses.

II.É esperado que a insulinoterapia leve o paciente a um estado de hipercalcemia.

III.A insulinoterapia deve ser a primeira medida a ser realizada no paciente.

IV.O uso contínuo de baixas doses de insulina inibe a cetose e suprime a produção endógena de glicose.

Estão corretos os itens:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 39

A densitometria óssea é um exame muito solicitado para a população idosa. Nesse contexto, pode-se afirmar que o diagnóstico de osteoporose se dá em:

- (A) valores abaixo de -2,5 DP.
- (B) valores acima de 0 DP.
- (C) valores entre -1 e 0 DP.
- (D) valores entre -1,1 a -2,5 DP.
- (E) valores abaixo de -1,5 DP.

Questão 40

A mamografia é uma ferramenta fundamental para o rastreamento do câncer de mama, sendo a sua interpretação uma função do médico. Nesse sentido, qual deve ser a conduta frente a um exame com resultado BI-Rads 3?

- (A) A paciente deve manter controle radiológico por três anos, repetindo o exame a cada seis meses no primeiro ano e anualmente nos dois anos seguintes.
- (B) A terapêutica deve ser específica em unidade de tratamento oncológico.
- (C) A paciente deve manter rotina de rastreamento conforme a faixa etária, uma vez que o exame se mostra inconclusivo.
- (D) A paciente deve manter rotina de rastreamento conforme a faixa etária, uma vez que o exame tem resultado negativo.
- (E) Como se trata de um achado altamente suspeito, é necessário encaminhar a paciente para unidade de referência terciária.

Questão 41

As indicações obstétricas de parto cesáreo são divididas em absolutas e relativas. Trata-se de uma indicação absoluta o (a):

- (A) situação fetal transversa.
- (B) feto não reativo em trabalho de parto.
- (C) apresentação pélvica.
- (D) gravidez gemelar.
- (E) descolamento prematuro de placenta.

Questão 42

Em algumas populações vulneráveis, o risco de adoecimento por tuberculose pode ser comparado ao risco da população geral. Nesse cenário, indique o item que corresponde à população com o maior risco de adoecimento por essa doença.

- (A) Pessoas vivendo com o HIV.
- (B) Indígenas.
- (C) Pessoas que já tiveram tuberculose previamente.
- (D) Pessoas privadas de liberdade.
- (E) Pessoas em situação de rua.

Questão 43

O Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre é um método contraceptivo de longa duração, amplamente utilizado por mulheres que buscam uma alternativa não hormonal para evitar a gravidez. Analise os itens abaixo a respeito do DIU de cobre.

I. Quando retirado, a mulher demora a retornar à fertilidade.

II. Também protege contra infecções sexualmente transmissíveis.

III. Não deve ser aplicado em mulheres adolescentes.

IV. Pode ser colocado em até 48 horas após o parto.

V. Dentre os efeitos colaterais mais comuns estão a cólica e a possibilidade de anemia.

Estão corretos os itens:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) IV e V, apenas.
- (D) III e V, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 44

A doença celíaca é uma condição autoimune desencadeada pela ingestão de glúten, que provoca inflamação no intestino delgado de indivíduos geneticamente predispostos. Analise os itens abaixo a respeito da doença celíaca.

I. É mais frequente em homens.

II. A forma típica se caracteriza por diarreia crônica, associada à distensão abdominal e perda de peso.

III. A crise celíaca pode ser desencadeada por processos infecciosos.

IV. A dermatite herpetiforme também se relaciona com a doença celíaca e é caracterizada por lesões cutâneas do tipo bolhoso e com intenso prurido associado.

Estão corretos os itens:

- (A) III e IV, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) II e IV, apenas.

Questão 45

Analise o trecho abaixo:

"(...) os sintomas ocorrem em situações nas quais a pessoa é observada pelos outros (...) Em contato com os outros, especialmente estranhos, o paciente sofre de sintomas como tremores, sudorese, enrubescimento, dificuldade de concentração ("branco na cabeça"), palpitações, tonteira e sensação de

desmaio. Diferentemente dos ataques de pânico, os sintomas surgem durante as situações sociais temidas e duram até o contato com os outros terminar".

O diagnóstico o qual se refere o exposto é:

- (A) transtorno de ansiedade generalizada.
- (B) transtorno de ansiedade social.
- (C) transtorno obsessivo-compulsivo.
- (D) transtorno de pânico.
- (E) transtorno do espectro autista.

Questão 46

A dermatite atópica é uma condição inflamatória crônica, que pode impactar significativamente a qualidade de vida das crianças e de suas famílias, exigindo um manejo adequado que inclua cuidados com a pele, uso de medicamentos e estratégias para minimizar os fatores desencadeantes. Em relação à dermatite atópica nas crianças, assinale a alternativa correta.

- (A) No lactente, as lesões ocorrem principalmente na região central da face (nariz e boca).
- (B) O principal sintoma dessa doença é o prurido, o qual não melhora com medidas não medicamentosas.
- (C) O uso de hidratantes está restrito à fase aguda da doença.
- (D) Pacientes na fase puberal apresentam lesões mais frequentemente nas pregas flexoras dos braços, pescoço e pernas.
- (E) O uso de corticoide tópico não é recomendado.

Questão 47

A Doença de Crohn é uma condição inflamatória crônica que afeta o trato gastrointestinal, com manifestações que podem ocorrer desde a boca até o ânus, sendo mais comum no íleo e no cólon. A respeito desse quadro, assinale a alternativa correta.

- (A) Pacientes que necessitam de corticoesteroides para permanecer em assintomáticos também são considerados em remissão.
- (B) Ao exame histopatológico, pode ser encontrado acometimento transmural, padrão segmentar e presença de granulomas não caseoso.
- (C) O sintoma mais comum no momento do diagnóstico é o sangramento nas fezes.
- (D) Além das manifestações digestórias, as manifestações extraintestinais são comuns, sendo as mais frequentes as neurológicas e renais.
- (E) Os segmentos do tubo digestivo mais acometidos são jejuno e duodeno.

Questão 48

Um dos diagnósticos respiratórios mais frequentes em crianças é a asma. Sobre o tratamento da asma em crianças, assinale o item correto.

- (A) O choro não reduz a deposição pulmonar, por isso não deve impedir a nebulização.
- (B) O uso de corticoides inalados se associa ao aumento da incidência de fraturas em crianças.
- (C) Para crianças de qualquer idade, preconiza-se o uso de beta-2 agonistas de longa duração em monoterapia.
- (D) A dose de corticoide inalado deve ser a menor dose necessária para o controle clínico e funcional e que não produza efeitos colaterais.
- (E) O uso de corticoide inalado está associado ao aumento de cáries dentárias.

Questão 49

A asma é uma doença respiratória complexa e heterogênea, manifestando-se de formas variadas entre os indivíduos. Sobre os fenótipos da asma, marque a alternativa correta.

- (A) A asma de início tardio responde melhor ao tratamento com corticoesteroides.
- (B) Na asma alérgica, há inflamação predominantemente neutrofílica das vias aéreas.
- (C) A asma alérgica, em geral, começa na fase adulta.
- (D) A asma com obesidade apresenta pouca inflamação eosinofílica da parede das vias aéreas.
- (E) A asma não alérgica tem perfil celular exclusivamente neutrofílico.

Questão 50

Nos pacientes diagnosticados com HIV, a genotipagem pré-tratamento está indicada em alguns casos, a exemplo, tem-se:

- (A) primeiro uso de antirretroviral na vida.
- (B) indivíduos com dependência química.
- (C) pessoas em situação de rua.
- (D) gestantes.
- (E) pessoas com coinfeção sífilis-HIV.

Questão 51

O tratamento medicamentoso para prevenção da progressão da doença renal crônica contempla a terapia padrão ouro com o uso de:

- (A) diuréticos tiazídicos, bloqueadores do receptor de angiotensina e inibidores da enzima conversora de angiotensina.
- (B) espironolactona, bloqueadores do receptor de angiotensina e inibidores da enzima conversora de angiotensina.
- (C) espironolactona, dapagliflozina, bloqueadores do receptor de angiotensina ou inibidores da enzima conversora de angiotensina.
- (D) bloqueadores do canal de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina e diuréticos tiazídicos.

- (E) dapagliflozina e inibidores da enzima conversora de angiotensina.

Questão 52

De acordo com o Ministério da Saúde, o número total de consultas a serem realizadas no pré-natal de gestantes deve ser de, no mínimo:

- (A) 10 consultas.
- (B) 6 consultas.
- (C) 7 consultas.
- (D) 8 consultas.
- (E) 9 consultas.

Questão 53

Uma das causas de corrimento vaginal é a infecção por clamídia. Pode-se afirmar que o tratamento preferencial dessa infecção consiste na:

- (A) associação de ceftriaxona e doxiciclina.
- (B) utilização de azitromicina ou doxiciclina.
- (C) utilização de ceftazidima, em dose única.
- (D) associação de aciclovir e cefazolina.
- (E) aplicação de ceftriaxona intramuscular.

Questão 54

Na abordagem do tabagismo, o Teste de Fagerström pode ser utilizado para avaliar o grau de dependência à nicotina. Esse teste é composto de seis perguntas, com escores que variam de zero a 10. É considerada dependência elevada aquela que possui escore total acima de

- (A) 9.
- (B) 7.
- (C) 8.
- (D) 6.
- (E) 5.

Questão 55

A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele, caracterizada por lesões avermelhadas e descamativas que podem afetar diversas áreas do corpo, causando impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. Com causas multifatoriais, incluindo predisposição genética e fatores ambientais, o manejo da psoríase requer uma abordagem que contemple aspectos clínicos e terapêuticos específicos para o controle dos sintomas e redução das recidivas. Em relação à psoríase marque a alternativa correta.

- (A) Microabscessos de Munro devem ser distinguidos da psoríase, sendo o principal diagnóstico diferencial.
- (B) Caracteriza-se pelo surgimento de placas eritemato-escamosas, com bordas mal delimitadas e escamas avermelhadas.

- (C) Nas fases iniciais, a análise histopatológica é marcada por infiltrado de granulócitos neutrofílicos, que diminuem com a evolução da doença.
- (D) As lesões na forma de placas são assimétricas e se localizam, preferencialmente, nas superfícies genitais.
- (E) A apresentação mais frequente é a psoríase crônica em placas.

Questão 56

As síndromes coronarianas agudas (SCA) compreendem uma série de condições clínicas decorrentes da redução abrupta do fluxo sanguíneo para o coração, incluindo o infarto agudo do miocárdio e a angina instável. Sobre os aspectos gerais das síndromes coronarianas agudas, assinale a alternativa correta.

- (A) Para que um IAMCSST acometa a parede ântero-septal, é necessário que seja identificada alteração no traçado das derivações I e aVL.
- (B) Para pacientes com BAV de 2º grau, deve-se optar pelo uso de betabloqueadores.
- (C) A troponina é um marcador de necrose miocárdica, elevando-se após 24 horas do início dos sintomas.
- (D) O clopidogrel é contraindicado nas síndromes coronarianas sem supra ST.
- (E) Dentre as contraindicações ao uso de nitrato, está a bradicardia e hipotensão.

Questão 57

Para o tratamento do transtorno esquizoafetivo, é fundamental considerar abordagens que combinem intervenções farmacológicas e psicossociais, devido à complexidade do quadro, que inclui sintomas de esquizofrenia e transtornos de humor. Sobre o tratamento do transtorno esquizoafetivo, indique a alternativa correta.

- (A) Dentre os estabilizadores de humor, o carbonato de lítio é o que reúne mais evidências para uso no transtorno esquizoafetivo.
- (B) A clozapina é contraindicada em casos de alto risco de suicídio.
- (C) O decanoato de haloperidol é um antipsicótico de ação curta e, por isso, não deve ser utilizado.
- (D) A clozapina é considerada superior para pacientes não responsivos a outros antipsicóticos.
- (E) O tratamento considerado de primeira linha para este transtorno é o uso de inibidores de recaptção de noradrenalina.

Questão 58

A difteria é uma infecção bacteriana causada pela *Corynebacterium diphtheriae*, que pode afetar gravemente o sistema respiratório e, em casos mais severos, causar complicações cardíacas e neurológicas. Sobre a difteria, marque a alternativa correta.

- (A) A proteção conferida pelo soro antidiftérico é de longa duração, garantindo imunidade por alguns anos.
- (B) A presença de placas pseudomembranosas branco-acinzentadas que se instalam nas amígdalas é a manifestação clínica típica.
- (C) Por ser um quadro auto limitado, não se faz necessária medida terapêutica direcionada.
- (D) O quadro clínico típico da doença é o edema de glote, tendo o choque anafilático como principal diagnóstico diferencial.
- (E) A apresentação clínica mais comum é a difteria vaginal, em que surgem múltiplas ulcerações com corrimento purulento.

Questão 59

A síndrome nefrótica é uma condição clínica caracterizada por uma série de alterações renais que resultam em perda significativa de proteínas na urina, o que pode levar a sintomas como edema e aumento do risco de infecções e trombozes. Considerando os critérios diagnósticos e as implicações clínicas da síndrome nefrótica, pode-se afirmar que essa condição é definida pela presença de:

- (A) proteinúria, hipoalbuminemia e hiperlipidemia.
- (B) proteinúria, edema e hematuria.
- (C) hematuria, hiperlipidemia e hipercoagulabilidade.
- (D) proteinúria, hipoalbuminemia e edema.
- (E) proteinúria, edema e hipercoagulabilidade.

Questão 60

"Considerando que este medicamento é o mais bem validado no tratamento do transtorno afetivo bipolar, além de ser o único que demonstra redução de suicidalidade e mortalidade para todas as causas em pacientes com transtorno de humor, o seu uso é recomendado como primeira escolha entre as opções de estabilizadores de humor".

A qual medicamento se refere este trecho?

- (A) Ácido valproico.
- (B) Lamotrigina.
- (C) Carbamazepina.
- (D) Carbonato de lítio.
- (E) Quetiapina.