

Domingo de manhã

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2024**

ENFERMEIRO (INTENSIVISTA ADULTO)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - **refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V1_31/10/2024 14:35:00

**Eco
Friendly**
A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

Precisamos discutir a eutanásia*Por Dráuzio Varella*

01 O que fazer nas fases mais avançadas da demência, quando a cognição já foi para o espaço
02 e o corpo se tornou um fardo insuportável? Manter uma pessoa inerte, trancada num mundo
03 impenetrável, é o melhor que podemos fazer?

04 A faixa da população que mais cresce no Brasil é a que está com mais de 60 anos. Hoje,
05 quando morre um tio com 70 anos, dizemos que morreu moço. Há pouco tempo, quem atingisse
06 essa idade era considerado muito velho.

07 Num livro do século 19, Machado de Assis se referiu a um homem de 50 anos como "velho
08 gaiteiro". Em 1903, um jornal de Manaus noticiou: "Caminhão desgovernado invade casa e mata
09 uma velhinha de 40 anos".

10 Todos querem viver muito, mas não ___ qualquer preço. Você, leitora, é tão apegada à
11 vida que lutaria para mantê-la ainda que não conseguisse sair da cama, não reconhecesse os
12 filhos e confundisse os netos com ladrões prestes a assaltá-la? E, você, leitor, valeria a pena
13 continuar vivo para passar o resto dos dias sem fazer ideia de quem são aqueles estranhos que
14 trocam as suas fraldas e ... dão comida na boca?

15 Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis escreveu: "A velhice ridícula é,
16 porventura, a mais triste e derradeira surpresa da natureza humana".

17 Em mais de 50 anos de atividade clínica, acompanhei alguns pacientes com quadros
18 demenciais avançados. Quando a doença chega às fases finais, os familiares exauridos pela
19 tarefa de cuidar de alguém que exige cuidados permanentes concluem que a morte seria a
20 solução mais humana.

21 Desejar a morte de uma pessoa querida, entretanto, gera sentimentos contraditórios que
22 fogem ___ racionalidade. Difícil admitir que desejamos a morte da própria mãe, do pai, de um
23 dos irmãos ou do amigo com quem convivemos tantos anos. A reação mais comum é calar. Para
24 quem suporta a carga de cuidados diários, rotina interminável quase sempre realizada por uma
25 mulher, o dilema é: vão pensar que quero ficar livre do trabalho ou, pior, será que não estou
26 mesmo?

27 Nesse momento, se, apesar do sentimento de culpa, um familiar pergunta ao médico ...
28 não encurtar a duração daquele arremedo de vida, ouvirá que as leis brasileiras consideram
29 a eutanásia um crime.

30 Está mais do que na hora de mudarmos essas leis. O Código Penal precisa atender às
31 mudanças ocorridas nas sociedades modernas. Eu não quero de jeito nenhum vegetar num leito,
32 sujeito ___ imprevisibilidade da visita da senhora com a foice, porque ela poderá me encontrar
33 em condições indignas que ficarão gravadas para sempre na memória das pessoas que mais
34 amo.

35 É um tema controverso, mas a sociedade precisa enfrentá-lo. É possível definir regras
36 claras para que a vontade do declarante seja respeitada. Por exemplo: ele não quer continuar
37 quando não reconhecer mais ninguém e perder o controle dos esfíncteres ou quando passar os
38 dias mudo, olhando para o teto ou quando estiver sem memória e precisar de uma sonda gástrica
39 para não morrer de inanição.

(Disponível em: gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/drauzio-varella/noticia/2024/10/esta-mais-do-que-na-hora-de-mudarmos-a-legislacao-sobre-eutanasia-cm2bo8dqf002m014uvw7l2ys1.html – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Pode-se inferir que o autor é a favor da liberação da eutanásia, mas não menciona o que gostaria que fosse feito para ele mesmo.
- II. Um dos motivos da dificuldade de aceitar que se deseja a morte de um familiar é o medo das opiniões acerca de tal pensamento.
- III. O sentimento de culpa por desejar a morte de alguém com quem convivemos é o que impede que a eutanásia seja realizada.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 02 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- Com o aumento da longevidade da população, a percepção sobre a idade das pessoas mudou.
- O autor emprega somente exemplos literários para mostrar a idade das pessoas consideradas velhas no século XX.
- O autor, devido à sua profissão, presenciou casos de pacientes que sofreram de quadros clínicos com comprometimento das funções mentais.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) F – V – F.
- D) V – F – V.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 10, 22 e 32.

- A) à – a – à
- B) à – a – a
- C) a – à – à
- D) a – a – à
- E) a – à – a

QUESTÃO 04 – Considerando a correta colocação pronominal em Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna pontilhada da linha 14.

- A) lhe
- B) te
- C) o
- D) a
- E) os

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo "dilema" (l. 25) sem causar alterações significativas no trecho em que ocorre. Desconsidere eventuais alterações no gênero das palavras.

- A) Convicção.
- B) Acerto.
- C) Asserção.
- D) Imperativo.
- E) Impasse.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que NÃO pertence à mesma classe gramatical do vocábulo sublinhado no trecho a seguir, retirado do texto: “pacientes com quadros demenciais avançados”.

- A) Arraiais.
- B) Substanciais.
- C) Abdominais.
- D) Essenciais.
- E) Superficiais.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego correto dos porquês, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna pontilhada da linha 27.

- A) por quê
- B) porque
- C) porquê
- D) pôr que
- E) por que

QUESTÃO 08 – Considerando o emprego da conjunção “entretanto” (l. 21), analise as assertivas a seguir:

- I. Trata-se de conjunção subordinativa concessiva.
- II. Uma substituição possível para a palavra, por ter o mesmo sentido, seria “todavia”.
- III. A substituição da conjunção por “contudo” causaria a obrigatória supressão das duas vírgulas empregadas no trecho original.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica a correta reescrita do trecho a seguir, retirado do texto, na voz passiva: “ela poderá me encontrar em condições indignas”.

- A) Ela poderá ser encontrada em mim em condições indignas.
- B) Eu poderia encontrá-la em condições indignas.
- C) Ela pode encontrar-me em condições indignas.
- D) Eu poderei ser encontrado por ela em condições indignas.
- E) Ela poderá encontrar-se comigo em condições indignas.

QUESTÃO 10 – Considerando o vocábulo “exauridos” (l. 18), analise as assertivas a seguir:

- I. A palavra é um adjetivo formado a partir de um verbo.
- II. Um sinônimo possível para tal palavra seria “esgotados”.
- III. Trata-se de um adjetivo que não admite flexão de gênero.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**QUESTÃO 11** – Analise a sentença abaixo:

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Direta e Indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS) (**1ª parte**). Estão incluídas nesse conjunto as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde (**2ª parte**). A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 12 – Considerando as diretrizes do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS para o enfrentamento às diversas formas de violência no trabalho em saúde, assinale a alternativa que NÃO faz parte das ações indicadas pelo programa.

- A) Fomentar o uso de comunicação não violenta e práticas humanizadas na relação do trabalho na saúde.
- B) Eliminar qualquer forma de constrangimento, excluindo os quesitos sobre raça/cor e identidade de gênero no cadastro das trabalhadoras de saúde.
- C) Estimular a criação de espaços para denúncias e fluxos de atendimento para vítimas de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.
- D) Promover o debate, a perspectiva e o olhar de gênero e raça no âmbito das relações de trabalho.
- E) Garantir um ambiente institucional seguro, atuando contra machismo, misoginia, sexismo e discriminação étnico-racial, entre outras formas de preconceito.

QUESTÃO 13 – A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT), no âmbito do SUS, tem como objetivo geral promover a saúde integral dessa população, eliminando a discriminação e o preconceito institucional. São objetivos específicos da Política, EXCETO:

- A) Ampliar o acesso da população LGBT aos serviços de saúde do SUS, garantindo às pessoas o respeito e a prestação de serviços de saúde com qualidade e resolução de suas demandas e necessidades.
- B) Qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial.
- C) Regulamentar o processo transexualizador na rede do SUS.
- D) Promover iniciativas voltadas à redução de riscos e oferecer atenção aos problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios femininos e masculinos para travestis e transexuais.
- E) Garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.

QUESTÃO 14 – À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Não estando a pessoa idosa em condições de proceder à opção, esta será feita pelas pessoas e órgãos abaixo citados, EXCETO:

- A) Ministério Público, quando a pessoa idosa for interdita e não houver curador ou familiares conhecidos.
- B) Curador, quando a pessoa idosa for interdita.
- C) Familiares, quando a pessoa idosa não tiver curador ou este não puder ser contatado em tempo hábil.
- D) Médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar.
- E) Próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público.

QUESTÃO 15 – Segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
 - II. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a restrição de participação.
 - III. O desenho universal caracteriza-se pela concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva.
 - IV. As barreiras atitudinais caracterizam-se por qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação.
 - V. A restrição ao trabalho da pessoa com deficiência poderá ser realizada nas etapas iniciais de recrutamento e seleção, quando há exigência de aptidão plena.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Todas as assertivas estão incorretas.
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
E) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 16 – Analise a sentença abaixo:

- São as atitudes, circunstâncias, ações e eventos que assegurem ao trabalhador o crescimento profissional e laboral que possibilite o pleno desenvolvimento humano, a sua satisfação com o trabalho, o reconhecimento, a responsabilização com compromissos pelos direitos de cidadania da população e a prestação de serviços com acolhimento, qualidade e resolubilidade à população usuária do Sistema, tendo repercussão direta no seu engajamento institucional e na sua consciência de cidadania.

A definição acima corresponde ao conceito de:

- A) Qualificação profissional.
- B) Desenvolvimento do trabalhador do SUS.
- C) Educação permanente.
- D) Gestão do trabalho no SUS.
- E) Formação profissional.

QUESTÃO 17 – Com base na Portaria nº 992/2009, assinale a alternativa que melhor define o princípio da equidade como parte das políticas voltadas para a população negra no Brasil.

- A) Conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- B) Acesso garantido aos serviços de saúde para toda a população, em todos os níveis de assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- C) Promoção da igualdade por meio do reconhecimento das desigualdades e da ação estratégica para superá-las, visando uma sociedade livre de preconceitos e onde a diversidade seja um valor.
- D) É caracterizada pela complementaridade, confluência e reforço recíproco de diferentes políticas de saúde, contemplando um conjunto de estratégias que resgatam a visão integral do sujeito.
- E) Conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde.

QUESTÃO 18 – De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD), são consideradas deficiências as condições abaixo citadas, EXCETO:

- A) Transtorno do Espectro Autista (TEA).
- B) Pessoas estomizadas.
- C) Pé torto congênito.
- D) Diabetes Mellito tipo 2.
- E) Trissomia do Cromossomo 21.

QUESTÃO 19 – Assinale a alternativa que está corretamente relacionada ao conceito de interseccionalidade.

- A) Entendida como adoção de práticas de igualdade entre mulheres e homens, considerando a diversidade de raça e etnia, constitui um pilar fundamental da gestão organizacional e do êxito institucional.
- B) Mecanismo que permite o intercâmbio de informação e experiências, valorizando o processo de comunicação e permitindo constante troca de conhecimentos entre os atores envolvidos.
- C) Manifestada por meio da exclusão, restrição ou preferência de algum(a) colaborador(a) com base em seu gênero e/ou orientação sexual.
- D) Categoria analítica usada para entender o imbricamento entre diferentes sistemas discriminatórios como, por exemplo, o racismo, o sexismo e a opressão de classe.
- E) Espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo.

QUESTÃO 20 – A Política Nacional de Humanização (PNH) se estrutura a partir de Princípios, Método, Diretrizes e Dispositivos. Dessa forma, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada estrutura às suas respectivas características.

Coluna 1

1. Princípios.
2. Método.
3. Diretrizes.
4. Dispositivos.

Coluna 2

- () Clínica Ampliada; cogestão; acolhimento; valorização do trabalho e do trabalhador; defesa dos direitos do usuário; fomento das grupalidades, coletivos e redes; construção da memória do SUS que dá certo.
- () Inclusão dos diferentes sujeitos (gestores, trabalhadores e usuários); inclusão de analisadores sociais; inclusão do coletivo seja como movimento social organizado, seja como experiência singular sensível.
- () Transversalidade; indissociabilidade entre atenção e gestão; protagonismo; corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos.
- () Grupo de trabalho de humanização; contrato de gestão; sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde; visita aberta e direito à acompanhante; equipe transdisciplinar de referência e de apoio matricial.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1 – 4.
- B) 4 – 1 – 3 – 2.
- C) 1 – 2 – 3 – 4.
- D) 2 – 3 – 4 – 1.
- E) 4 – 3 – 1 – 2.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Qual é a principal diferença entre a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária?

- A) A vigilância epidemiológica foca em doenças crônicas, enquanto a vigilância sanitária lida com doenças infecciosas.
- B) A vigilância epidemiológica se concentra em produtos e serviços, enquanto a vigilância sanitária lida com populações humanas.
- C) A vigilância epidemiológica monitora eventos relacionados à saúde da população, enquanto a vigilância sanitária regula produtos, serviços e ambientes que possam afetar a saúde.
- D) A vigilância sanitária não atua na fiscalização de alimentos e medicamentos, pois esse é o papel da vigilância epidemiológica.
- E) A vigilância epidemiológica é uma função exclusiva dos hospitais, enquanto a vigilância sanitária é responsabilidade das indústrias farmacêuticas.

QUESTÃO 22 – Na vigilância epidemiológica, considera-se evento sentinela um:

- A) Evento de saúde que ocorre apenas uma vez e não tem impacto na população.
- B) Evento de saúde relacionado a doenças crônicas, sem risco de disseminação.
- C) Evento de saúde inesperado que indica falhas no sistema de saúde ou na vigilância e que requer investigação para prevenir recorrências.
- D) Evento catastrófico, como um desastre natural, que não necessita de monitoramento de saúde.
- E) Surto de doença autolimitada e de curta duração.

QUESTÃO 23 – Ao utilizar a classificação dos diagnósticos de enfermagem da NANDA, a categoria utilizada para identificar diagnósticos relacionados a respostas humanas a condições de saúde é a categoria diagnósticos:

- A) De risco.
- B) Clínicos.
- C) De promoção da saúde.
- D) Ambientais.
- E) Educacionais.

QUESTÃO 24 – A taxa correta de compressões torácicas por minuto para crianças durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é de:

- A) 50 a 70.
- B) 60 a 90.
- C) 80 a 90.
- D) 100 a 120.
- E) 140 a 160.

QUESTÃO 25 – Estilo de liderança que se caracteriza pela tomada de decisão compartilhada e pelo envolvimento da equipe no processo de gestão. O trecho refere-se à liderança:

- A) Autocrática.
- B) Democrática.
- C) Transacional.
- D) Situacional.
- E) *Laissez-faire*.

QUESTÃO 26 – Na administração de oxigenoterapia em pacientes com insuficiência respiratória, qual é a conduta de enfermagem mais adequada?

- A) Iniciar a oxigenoterapia sem prescrição médica.
 - B) Utilizar máscara de Venturi para fornecer 100% de oxigênio.
 - C) Manter o paciente em decúbito dorsal.
 - D) Interromper a oxigenoterapia quando a frequência respiratória for inferior a 12 rpm.
 - E) Monitorar os níveis de saturação de oxigênio e ajustar o fluxo conforme prescrição médica.
-

QUESTÃO 27 – Para um paciente pediátrico com bradicardia significativa durante um evento de SAV, qual é a intervenção inicial mais adequada?

- A) Administrar oxigênio suplementar e monitorar a frequência cardíaca.
- B) Administrar atropina imediatamente.
- C) Iniciar compressões torácicas.
- D) Chamar um especialista em Cardiologia Pediátrica.
- E) Realizar ventilação boca a boca.

QUESTÃO 28 – Um paciente envolvido em um acidente automobilístico apresenta sinais de choque hipovolêmico. Nesse caso, quais sinais devem ser monitorados mais atentamente pela equipe de Enfermagem?

- A) Temperatura corporal e nível de dor.
- B) Frequência respiratória e nível de consciência.
- C) Nível de consciência e frequência cardíaca.
- D) Nível de dor e nível de consciência.
- E) Pressão arterial e frequência cardíaca.

QUESTÃO 29 – Qual é a abordagem correta para a administração de fluidos intravenosos em um paciente com trauma e sinais de choque?

- A) Iniciar a administração de fluidos isotônicos em bolus.
- B) Administrar somente soluções hipertônicas.
- C) Evitar a administração de fluidos até que os resultados dos exames estejam disponíveis.
- D) Limitar a quantidade de fluidos a um mínimo necessário.
- E) Administrar apenas soluções de glicose.

QUESTÃO 30 – Durante a monitorização hemodinâmica, um paciente apresenta uma Pressão Arterial Média (PAM) consistentemente abaixo de 65 mmHg. Nesse contexto, qual é a principal implicação clínica dessa condição em relação à perfusão tecidual?

- A) Aumento da resistência vascular periférica.
- B) Comprometimento da perfusão tecidual e risco de disfunção orgânica.
- C) Estímulo compensatório da frequência cardíaca.
- D) Redução do débito cardíaco devido à hipovolemia.
- E) Melhora na oxigenação tecidual.

QUESTÃO 31 – Na monitorização hemodinâmica, um paciente apresenta um Débito Cardíaco (DC) reduzido e uma Pressão Venosa Central (PVC) normal. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Choque cardiogênico.
- B) Choque hipovolêmico.
- C) Choque distributivo.
- D) Insuficiência respiratória aguda.
- E) Insuficiência renal aguda.

QUESTÃO 32 – Um paciente em hemodiálise contínua apresenta níveis elevados de ácido láctico. Qual dos seguintes fatores pode ser a causa mais provável desse achado?

- A) Hipoperfusão tecidual.
- B) Hiper-hidratação.
- C) Infecção bacteriana controlada.
- D) Hipoalbuminemia.
- E) Aumento do fluxo urinário.

QUESTÃO 33 – Um paciente em choque cardiogênico está recebendo dobutamina intravenosa. Nesse caso, qual dos seguintes parâmetros deve ser monitorado com maior frequência pela equipe de Enfermagem para avaliar a eficácia e a segurança da terapia?

- A) Níveis de glicose no sangue.
- B) Diurese horária.
- C) Níveis de lactato no sangue.
- D) Pressão arterial média e débito cardíaco.
- E) Sinais de toxicidade hepática.

QUESTÃO 34 – Um paciente em ventilação mecânica por uma patologia respiratória está sendo tratado com midazolam para sedação contínua. Nesse contexto, qual dos seguintes efeitos adversos deve ser cuidadosamente monitorado pela equipe de Enfermagem durante a infusão de midazolam?

- A) Depressão respiratória e hipotensão.
- B) Retenção urinária.
- C) Bradicardia grave.
- D) Hiperatividade paradoxal.
- E) Aumento da pressão intracraniana.

QUESTÃO 35 – Um paciente está recebendo heparina intravenosa para tratamento de tromboembolismo venoso (TEV). Sendo assim, qual exame laboratorial deve ser monitorado rotineiramente pela equipe de Enfermagem para ajustar a dose de heparina e prevenir complicações?

- A) Tempo de Protrombina (TP).
- B) Tempo de Tromboplastina Parcial ativada (TTPa).
- C) Níveis de fibrinogênio.
- D) Contagem de plaquetas.
- E) INR (Razão Normalizada Internacional).

QUESTÃO 36 – Durante a administração de nitroprussiato de sódio para controlar a hipertensão grave em um paciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a qual complicação a equipe de Enfermagem deve estar atenta e como monitorá-la?

- A) Hipopotassemia: monitorar eletrólitos séricos.
- B) Acidose metabólica: monitorar o pH arterial.
- C) Toxicidade por cianeto: monitorar lactato e bicarbonato sérico.
- D) Bradicardia: monitorar ECG.
- E) Nefrotoxicidade: monitorar função renal.

QUESTÃO 37 – Um paciente em pós-operatório de grande cirurgia abdominal desenvolve hiponatremia grave (Na^+ 118 mEq/L). Qual das seguintes abordagens deve ser evitada na assistência de Enfermagem?

- A) Administração lenta de solução salina hipertônica 3%.
- B) Monitorização frequente do nível de sódio sérico.
- C) Restrição de líquidos orais e intravenosos.
- D) Aumento rápido do nível de sódio para corrigir o desequilíbrio.
- E) Monitorização neurológica contínua para sinais de encefalopatia.

QUESTÃO 38 – Um paciente com sepse grave apresenta gasometria com pH 7,15, PaCO_2 35 mmHg e HCO_3^- 10 mEq/L. Qual é o resultado de gasometria e qual é a prioridade de intervenção da Enfermagem, respectivamente?

- A) Acidose respiratória – iniciar ventilação mecânica.
- B) Acidose metabólica compensada – administrar bicarbonato de sódio.
- C) Acidose metabólica descompensada – corrigir a causa subjacente e monitorar perfusão tecidual.
- D) Alcalose mista – avaliar as funções renal e respiratória.
- E) Acidose mista – corrigir os distúrbios respiratórios e metabólicos simultaneamente.

QUESTÃO 39 – É importante para o enfermeiro ter conhecimento sobre o manejo da hipertensão intracraniana em terapia intensiva. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Deve-se elevar a cabeceira do leito entre 30° e 45° para facilitar a drenagem venosa.
- B) Deve-se administrar manitol para reduzir o edema cerebral.
- C) Deve-se realizar hiperventilação terapêutica prolongada para reduzir a pressão intracraniana.
- D) Deve-se realizar monitoramento contínuo da pressão intracraniana em pacientes com TCE grave.
- E) Deve-se controlar rigorosamente a glicemia para evitar hiperglicemia, que pode agravar o edema cerebral.

QUESTÃO 40 – A hipertensão intracraniana (HIC) é uma condição caracterizada pelo aumento da pressão dentro do crânio. São causas de HIC:

- I. Aumento do volume cerebral: pode ocorrer devido a edema cerebral, hemorragias, tumores ou infecções, como meningite.
- II. Aumento do volume do líquido cefalorraquidiano (LCR): pode ser causado por obstruções no fluxo do LCR ou produção excessiva.
- III. Aumento do volume de sangue: pode resultar de vasodilatação ou aumento do fluxo sanguíneo cerebral.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 41 – Um paciente sofreu uma lesão medular cervical e é diagnosticado com choque neurogênico. Qual dos seguintes achados fisiológicos é mais característico desse tipo de choque?

- A) Taquicardia compensatória.
- B) Hipertensão sistêmica.
- C) Bradicardia e hipotensão.
- D) Vasoconstrição periférica.
- E) Aumento do débito urinário.

QUESTÃO 42 – O Balão Intra-Aórtico (BIA) é um dispositivo médico utilizado para auxiliar na função cardíaca. Sobre esse dispositivo, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Deve ser utilizado exclusivamente em pacientes com choque cardiogênico.
- () Sua insuflação ocorre durante a diástole, o que ajuda a aumentar a pressão de perfusão coronariana.
- () Pode ser utilizado em pacientes com aneurisma aórtico, desde que monitorados atentamente.
- () É capaz de melhorar a função ventricular esquerda, reduzindo a pós-carga.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – F.
- B) F – F – V – V.
- C) F – V – F – V.
- D) V – F – F – V.
- E) F – V – V – F.

QUESTÃO 43 – Um paciente com choque neurogênico decorrente de lesão medular completa desenvolve hipoventilação. Qual dos seguintes mecanismos explica essa alteração respiratória?

- A) Colapso alveolar secundário à hipotensão sistêmica.
- B) Perda do tônus diafragmático devido à falha do nervo frênico.
- C) Vasoconstrição pulmonar, levando à redução do fluxo sanguíneo.
- D) Acúmulo de fluido alveolar secundário à insuficiência cardíaca.
- E) Obstrução brônquica por secreções espessas.

QUESTÃO 44 – A cetoacidose diabética (CAD) é uma complicação grave e potencialmente fatal do diabetes, principalmente do tipo 1, embora também possa ocorrer em pacientes com diabetes tipo 2 sob certas condições. A CAD se desenvolve quando o corpo começa a “quebrar” a gordura, em vez de glicose, como fonte de energia, resultando na produção de cetonas. São sinais de complicações da CAD, EXCETO:

- A) Edema cerebral por acúmulo de líquido no cérebro.
- B) Hiperglicemia por níveis elevados de glicose no sangue.
- C) Falência renal devido à desidratação e acidose.
- D) Arritmias cardíacas causadas por alterações nos eletrólitos.
- E) Coma e morte, em casos graves.

QUESTÃO 45 – A hipomagnesemia é uma condição caracterizada pela diminuição dos níveis de magnésio no sangue. Qual é a causa mais frequente da hipomagnesemia em pacientes na UTI?

- A) Insuficiência cardíaca.
- B) Hipotireoidismo.
- C) Desidratação.
- D) Uso prolongado de diuréticos.
- E) Síndrome nefrótica.

QUESTÃO 46 – Um paciente na UTI está com intoxicação por pesticidas organofosforados. Qual medicamento deve ser administrado como antídoto?

- A) Atropina.
- B) Naloxona.
- C) Flumazenil.
- D) Pralidoxima.
- E) Carvão ativado.

QUESTÃO 47 – Um paciente idoso com histórico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é admitido na UTI com insuficiência respiratória aguda e acidose respiratória severa. Após a intubação e início da ventilação mecânica, o paciente desenvolve hipoxemia grave e hipotensão. Qual é a causa mais provável dessa deterioração?

- A) Tensão excessiva no circuito ventilatório.
- B) Acúmulo de dióxido de carbono no sistema respiratório.
- C) Sobrecarga hídrica aguda.
- D) Embolia pulmonar maciça.
- E) Barotrauma com pneumotórax hipertensivo.

QUESTÃO 48 – Assinale a alternativa que corresponde ao sinal clínico mais indicativo de intoxicação por ácido acetilsalicílico.

- A) Náuseas e vômitos.
- B) Hipotermia.
- C) Convulsões.
- D) Acidose metabólica com respiração de Kussmaul.
- E) Edema pulmonar.

QUESTÃO 49 – A dissecção aórtica é uma condição médica grave que ocorre quando há uma ruptura na camada interna da aorta, a maior artéria do corpo. Essa ruptura permite que o sangue flua entre as camadas da parede da aorta, criando um canal que pode se expandir e provocar complicações potencialmente fatais. São sintomas mais característicos dessa condição, EXCETO:

- A) Dor intensa, que pode irradiar para o pescoço, a mandíbula ou o abdome.
- B) Sintomas de choque, sudorese, palidez e tontura.
- C) Pulso desigual em casos de dissecção, que afetam as artérias que irrigam os membros superiores.
- D) Dificuldade para respirar devido à compressão das vias aéreas ou comprometimento da função cardíaca.
- E) Hipertensão arterial, pois pode enfraquecer a parede da aorta.

QUESTÃO 50 – Um paciente com insuficiência renal crônica está na UTI recebendo digoxina para tratamento de insuficiência cardíaca. Qual complicação é mais provável em pacientes com insuficiência renal que estão sendo tratados com digoxina?

- A) Hiperglicemia.
- B) Hipocalemia.
- C) Hipernatremia.
- D) Hipertermia.
- E) Intoxicação digitálica.