

Domingo de manhã

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2024**

MÉDICO (CIRURGIA VASCULAR)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - **refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_31/10/2024 14:34:37



POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**QUESTÃO 01** – Analise a sentença abaixo:

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Direta e Indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS) (**1ª parte**). Estão incluídas nesse conjunto as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde (**2ª parte**). A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 02 – Considerando as diretrizes do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS para o enfrentamento às diversas formas de violência no trabalho em saúde, assinale a alternativa que NÃO faz parte das ações indicadas pelo programa.

- A) Fomentar o uso de comunicação não violenta e práticas humanizadas na relação do trabalho na saúde.
- B) Eliminar qualquer forma de constrangimento, excluindo os quesitos sobre raça/cor e identidade de gênero no cadastro das trabalhadoras de saúde.
- C) Estimular a criação de espaços para denúncias e fluxos de atendimento para vítimas de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.
- D) Promover o debate, a perspectiva e o olhar de gênero e raça no âmbito das relações de trabalho.
- E) Garantir um ambiente institucional seguro, atuando contra machismo, misoginia, sexismo e discriminação étnico-racial, entre outras formas de preconceito.

QUESTÃO 03 – A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT), no âmbito do SUS, tem como objetivo geral promover a saúde integral dessa população, eliminando a discriminação e o preconceito institucional. São objetivos específicos da Política, EXCETO:

- A) Ampliar o acesso da população LGBT aos serviços de saúde do SUS, garantindo às pessoas o respeito e a prestação de serviços de saúde com qualidade e resolução de suas demandas e necessidades.
- B) Qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial.
- C) Regulamentar o processo transsexualizador na rede do SUS.
- D) Promover iniciativas voltadas à redução de riscos e oferecer atenção aos problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios femininos e masculinos para travestis e transexuais.
- E) Garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.

QUESTÃO 04 – À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Não estando a pessoa idosa em condições de proceder à opção, esta será feita pelas pessoas e órgãos abaixo citados, EXCETO:

- A) Ministério Público, quando a pessoa idosa for interditada e não houver curador ou familiares conhecidos.
- B) Curador, quando a pessoa idosa for interditada.
- C) Familiares, quando a pessoa idosa não tiver curador ou este não puder ser contatado em tempo hábil.
- D) Médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar.
- E) Próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público.

QUESTÃO 05 – Segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
 - II. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a restrição de participação.
 - III. O desenho universal caracteriza-se pela concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva.
 - IV. As barreiras atitudinais caracterizam-se por qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação.
 - V. A restrição ao trabalho da pessoa com deficiência poderá ser realizada nas etapas iniciais de recrutamento e seleção, quando há exigência de aptidão plena.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Todas as assertivas estão incorretas.
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
E) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – A respeito da promoção da saúde, de seu conceito ampliado de saúde e de seu referencial teórico como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, analise as assertivas abaixo:

- I. A mudança comportamental e de hábitos de vida voltados para a saúde representam um grande desafio para a promoção da saúde, sendo relevantes a coordenação e a integração do cuidado e a corresponsabilização da pessoa. Nesse sentido, no âmbito individual, para a realização da entrevista motivacional, o engajamento, o foco, a evocação e o planejamento são processos fundamentais.
- II. No Brasil, a Política Nacional de Promoção da Saúde adota como princípios, entre outros, a equidade, a intersetorialidade, a intrasetorialidade, a territorialidade e a sustentabilidade.
- III. O conceito de promoção da saúde vem mudando ao longo da história. A Carta de Ottawa (1986) definiu esse conceito como o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma participação maior no controle desse processo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Na abordagem de pacientes adultos com anemia, sobre a classificação das anemias segundo o Volume Corpuscular Médio (VCM) e o *Red Cell Distribution Width* (RDW), analise as assertivas abaixo:

- I. A anemia da drepanocitose apresenta VCM <80 fL e RDW normal.
- II. A talassemia maior apresenta VCM >80 fL e RDW diminuído.
- III. A anemia do hipotireoidismo apresenta VCM >100 fL e RDW normal.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Quanto aos exames diagnósticos, a respeito do Eletrocardiograma (ECG), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Entre os achados no ECG, a fibrilação atrial apresenta ausência de ondas P e intervalo RR irregular.
- B) Um intervalo QT corrigido prolongado é visto em anormalidades eletrolíticas, entre elas a hipocalcemia.
- C) Quando um paciente jovem apresenta pré-síncope ou síncope, embora rara, a hipótese de síndrome do QT corrigido longo congênita deve ser considerada.
- D) Constitui causa de intervalo QT corrigido longo a intoxicação digitálica.
- E) A hipotermia em geral é caracterizada no ECG por uma frequência lenta, um QT longo e artefatos de tremor muscular, além da onda de Osborn arredondada no ponto J.

QUESTÃO 09 – Analise as seguintes assertivas a respeito de doenças do sistema arterial:

- I. A aterosclerose sistêmica é causa frequente da doença arterial obstrutiva periférica. O sintoma de claudicação intermitente e o Índice de pressão sistólica Tornozelo-Braquial (ITB) de 0,90 ou menor viabilizam o diagnóstico de oclusão arterial crônica.
- II. A doença de Raynaud, ou fenômeno de Raynaud primário, afeta sobretudo mulheres jovens, e a arterite de Takayasu ocorre mais frequentemente em mulheres idosas.
- III. Os aneurismas da aorta abdominal ocorrem mais frequentemente entre a sexta e a sétima décadas de vida e a ocorrência é similar entre homens e mulheres.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Sobre o campo da Epidemiologia, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Estudos de coorte permitem estimar o risco relativo, dividindo-se a incidência da doença em pessoas expostas pela incidência da doença em não expostas ao fator de estudo.
- () As Razões de Verossimilhança (RV) são uma forma de expressar o desempenho de um teste diagnóstico, com a desvantagem de que as RV são usadas apenas para resultados dicotômicos: teste anormal ou normal.
- () As etapas do uso de Razões de Verossimilhança (RV) incluem: 1) converter probabilidade pré-teste (prevalência) em chances pré-teste através da fórmula $\text{Chances pré-teste} = \text{Prevalência} / (1 + \text{Prevalência})$; 2) multiplicar as chances pré-testes pela RV de um teste para obter as chances pós-teste; 3) converter as chances pós-teste em probabilidade pós-teste através da fórmula $\text{Probabilidade pós-teste} = \text{Chances pós-teste} / (1 + \text{Chances pós-teste})$.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 11 – A respeito de qualidade assistencial e segurança do paciente, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Como um modelo de melhoria da qualidade usado pelos sistemas de assistência ao paciente, o modelo Lean utiliza o método PDCA (planejar, executar, checar e agir) e objetiva melhorar a eficiência da heurística.
- B) A prevenção de danos ao paciente e as práticas seguras que diminuam o risco de eventos relacionados à exposição à assistência médica incluem a necessidade de dispor de médicos engajados em práticas seguras para os pacientes, como também os sistemas de assistência devem idealmente ser construídos com base em uma cultura de segurança.
- C) Entre os erros diagnósticos (diagnóstico falho, tardio ou incorreto), estão os erros cognitivos que envolvem vieses e heurística falha durante a tomada de decisão médica.
- D) O erro de medicação pode resultar de falhas na prescrição feita pelo médico, tais como a prescrição inefetiva ou exagerada, ou de erros de prescrição, tais como erro de paciente-alvo para receber o tratamento, ou de fármaco, de dose, de via e horário de administração.
- E) Para evitar erros diagnósticos, deve-se conhecer a heurística de disponibilidade, portanto, deve-se evitar estabelecer o diagnóstico com base naquilo que estiver mais facilmente disponível na memória do médico, em vez daquilo que for mais provável para o diagnóstico.

QUESTÃO 12 – A respeito de ética e bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A capacidade de tomada de decisões está presente quando o paciente demonstra condições de compreender informações relevantes, entender a situação e suas possíveis consequências, manipular racionalmente as informações e fazer uma escolha fundamentada.
- B) De acordo com o Código de Ética Médica em vigência, é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte.
- C) O Código de Ética Médica em vigência apresenta normas deontológicas relativas ao que é vedado ao médico.
- D) De acordo com o Código de Ética Médica vigente, é vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente criança ou adolescente, desde que este tenha capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.
- E) Entre as normas deontológicas constantes do Código de Ética Médica em vigência, consta aquela que estatui: A Medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que visem aos melhores resultados.

QUESTÃO 13 – Em relação à vasculogênese do sistema vascular, assinale a alternativa que indica corretamente a origem do plexo vascular primário.

- A) Mesoderma por vasculogênese.
- B) Angioblastos.
- C) Células musculares lisas da parede vascular.
- D) Tubos endocárdicos.
- E) Células periendoteliais.

QUESTÃO 14 – Em relação à doença arterial periférica, ao utilizar a classificação de Rutherford, um paciente classificado como grau II (categoria 4) apresenta:

- A) Claudicação moderada.
- B) Lesão isquêmica com necrose menor.
- C) Dor isquêmica em repouso.
- D) Claudicação intensa com gangrena focal.
- E) Úlcera ou necrose.

QUESTÃO 15 – Na classificação CEAP, o termo insuficiência venosa crônica restringe-se a qual grau de doença venosa?

- A) CEAP 3 até CEAP 6.
- B) CEAP 0 até CEAP 6.
- C) CEAP 3 até CEAP 4b.
- D) CEAP 0 até CEAP 5.
- E) CEAP 2 até CEAP 6.

QUESTÃO 16 – Uma paciente do sexo feminino, 33 anos, sem antecedentes, com IMC 27, vem à consulta com queixa de dor tipo peso, cansaço nas pernas e referindo ter varizes. No exame físico vascular com a paciente em posição ortostática, identifica-se que ela tem varizes CEAP C2. Nesse caso, é correto afirmar que a paciente apresenta veias:

- A) Intradérmicas azuladas com diâmetro entre 1 a 3 mm.
- B) Visíveis e discretamente dilatadas, porém sem tortuosidade e/ou alongamento.
- C) Intradérmicas dilatadas com diâmetro igual ou superior a 2,5 mm.
- D) Subcutâneas dilatadas com diâmetro igual ou superior a 3 mm.
- E) Subcutâneas dilatadas com diâmetro menor do que 3 mm.

QUESTÃO 17 – Durante a realização de ultrassonografia para diagnóstico de TVP, qual é o critério mais confiável e simples para verificação de trombose venosa profunda em fase aguda?

- A) Compressibilidade venosa no modo B.
- B) Presença de fluxo espontâneo, de baixa velocidade e fásico à respiração no modo B.
- C) Presença de fluxo pulsátil e trifásico no interior do sistema venoso ao modo espectral.
- D) Presença de espessamento da parede venosa e trombo flutuante no modo color.
- E) Ausência de fluxo venoso no modo B.

QUESTÃO 18 – Durante a realização de uma flebografia descendente com paciente realizando manobra de Valsalva a fim de avaliar a insuficiência valvular das veias femorais e junção safeno-femoral, identificou-se: incompetência valvular leve – refluxo de contraste até o nível do joelho. Sendo assim, o grau de refluxo encontrado na flebografia é:

- A) 0.
- B) 1.
- C) 2.
- D) 3.
- E) 4.

QUESTÃO 19 – O sinal de Stemmer é utilizado na propedêutica de qual doença vascular?

- A) Insuficiência arterial aguda.
- B) Insuficiência arterial crônica.
- C) Síndrome do desfiladeiro cervical.
- D) Malformação arteriovenosa de etiologia traumática.
- E) Linfedema.

QUESTÃO 20 – Sobre as indicações de realização de linfocintilografia, assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Diagnóstico diferencial dos edemas e sua classificação.
- () Avaliação de lesão linfática pós-trauma.
- () Identificação de linfonodo sentinela.
- () Indicação de utilização de aparelhos de compressão, massagem e tratamento cirúrgico.
- () Avaliação prognóstica e terapêutica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – F – V.
- B) F – F – F – V – V.
- C) F – V – V – F – F.
- D) V – V – V – V – V.
- E) F – V – F – F – F.

QUESTÃO 21 – Na avaliação qualitativa da linfocintilografia, são parâmetros que devem ser considerados, EXCETO:

- A) Aspecto do trajeto.
- B) Captação inguinal.
- C) Quantidade de vasos linfáticos.
- D) Linfonodo poplíteo.
- E) Índice de transporte.

QUESTÃO 22 – Na farmacodinâmica da heparina (HNF), o complexo heparina-antitrombina (H-AT) é capaz de inibir várias enzimas do sistema de coagulação. Quais são os fatores que mais sofrem inibição?

- A) Fator IXa e Fator XIa.
- B) Fator IXa e Fator XIIa.
- C) Trombina e Fator Xa.
- D) Trombina e Fator IXa.
- E) Fator Xa e Fator XIIa.

QUESTÃO 23 – Entre os medicamentos que interagem com a varfarina, qual medicação abaixo inibe a ação desse fármaco?

- A) Propranolol.
- B) Paracetamol.
- C) Carbamazepina.
- D) Tamoxifeno.
- E) Metronidazol.

QUESTÃO 24 – Em relação aos anticoagulantes orais diretos (DOACS), qual medicamento tem efeito inibidor oral direto da trombina?

- A) Lixiana.
- B) Etxilato de dabigatrana.
- C) Rivaroxabana.
- D) Apixabana.
- E) Edoxabana.

QUESTÃO 25 – A paraplegia, ou paraparesia, é um evento raro que pode ocorrer como consequência de cirurgia de aneurisma de aorta aberta ou endovascular. Como possíveis causas, destacam-se lesão ou ligadura da artéria de Adamkiewicz, clampeamento suprarrenal prolongado, microembolizações, entre outras. São ações para tentar minimizar essa complicação as descritas abaixo, EXCETO:

- A) Evitar a hipotensão.
- B) Preservar as artérias de circulação colateral.
- C) Evitar oclusão prolongada da aorta.
- D) Manejar a aorta o menos possível.
- E) Empregar concentrado de hemácias precocemente.

QUESTÃO 26 – Em relação à correção endovascular dos aneurismas de aorta, analise as assertivas abaixo:

- I. Endopróteses com bifurcação modular: fornecidas com um segmento troncular, bifurcado, implantado no colo proximal, que tem ramos curtos para as artérias ilíacas.
- II. Endopróteses cônicas: dispositivos cônicos implantados desde a aorta infrarrenal até as artérias ilíacas comuns.
- III. Endoleak Tipo IV: quando ocorre passagem de sangue através da malha do tecido da prótese por excesso de endotensão.
- IV. Endopróteses com bifurcação pré-construída: fornecidas com a bifurcação já completa, incluindo os ramos para as artérias ilíacas externas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 27 – De acordo com a classificação dos Endoleaks, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Tipo I: quando ocorre na implantação proximal da prótese (no colo aórtico do aneurisma) ou distal (na íliaca comum), por aderência incompleta do tecido da prótese à parede do vaso.
- B) Tipo II: esse tipo não resulta de falha na implantação da prótese, mas de enchimento do saco aneurismático por fluxo retrógrado, através de artérias lombares ou da mesentérica inferior.
- C) Tipo III: quando ocorre em uma junção entre dois segmentos de prótese, por aderência incompleta entre eles.
- D) Tipo IV: quando ocorre passagem de sangue através do colo distal da endoprótese.
- E) Tipo V: também denominado endotensão, não é propriamente um vazamento, mas a persistência do crescimento do aneurisma na ausência de qualquer vazamento detectável.

QUESTÃO 28 – Entre os sintomas do aneurisma de subclávia, destacam-se os abaixo citados, EXCETO:

- A) Dor no pescoço, tórax e ombro decorrente de expansão aguda ou ruptura.
- B) Rouquidão devido à compressão do VIII par de nervo craniano à direita.
- C) Ataques isquêmicos transitórios cerebrais devido a tromboembolismo retrógrado na vertebral e carótida direita.
- D) Hemoptise por erosão no ápice do pulmão.
- E) Sintomas isquêmicos agudos e crônicos na extremidade superior contralateral decorrentes de tromboembolismo.

QUESTÃO 29 – Entre os aneurismas periféricos verdadeiros das extremidades inferiores, o mais comum, de acordo com a literatura, é o aneurisma de artéria:

- A) Femoral profunda.
- B) Femoral comum.
- C) Poplítea.
- D) Tibial anterior.
- E) Fibular.

QUESTÃO 30 – Entre os aneurismas viscerais, o de maior frequência, de acordo com a literatura, é o aneurisma de:

- A) Tronco celíaco.
- B) Artéria gastroduodenal.
- C) Artéria esplênica.
- D) Artéria hepática.
- E) Artéria renal.

QUESTÃO 31 – No exame de ultrassonografia com Doppler de artérias carótidas e vertebrais, a presença de fluxo retrógrado aos modos Doppler e espectral em uma das artérias vertebrais é fortemente sugestiva de:

- A) Estenose carotídea >50%.
- B) Estenose entre o forame do processo transversal vertebral de C1 e o forame magno.
- C) Oclusão no segmento intracraniano até a artéria basilar.
- D) Aneurisma entre o óstio e o forame do processo transversal vertebral de C6.
- E) Síndrome de roubo da artéria subclávia.

QUESTÃO 32 – O corpúsculo carotídeo, localizado no bulbo carotídeo, é o único barorreceptor anatomicamente reconhecido no corpo humano. Sua manipulação de forma inadvertida durante a cirurgia endovascular de carótidas pode desencadear o reflexo denominado:

- A) Hering.
- B) Pacini.
- C) Meissner.
- D) Malpighi.
- E) Salvatore.

QUESTÃO 33 – Em relação à circulação mesentérica, a artéria marginal de Drummond e o arco de Riouan conectam:

- A) A artéria cólica esquerda (ramo da AMI) com a artéria cólica média (ramo da AMS).
- B) As artérias hipogástricas com as ilíacas internas.
- C) As artérias gastroduodenal e pancreaticoduodenal com o tronco celíaco e hepática comum.
- D) A artéria mesentérica inferior com o tronco celíaco.
- E) A artéria hepática comum com as hemorroidárias.

QUESTÃO 34 – A trombose venosa profunda primária do membro superior geralmente ocorre de forma espontânea e costuma acometer indivíduos mais jovens após estresse físico intenso que envolva hiperabdução dos membros superiores. Essa trombose de esforço é também chamada de síndrome:

- A) De Trousseau.
- B) De Klippel-Trenaunay.
- C) De Paget von Schroetter.
- D) Do atleta.
- E) Da academia.

QUESTÃO 35 – Os critérios utilizados na ultrassonografia com Doppler das artérias renais para o diagnóstico de hipertensão renovascular em uma estenose <60% são: Pico de Velocidade Sistólica (PVS) _____ do que 180 cm/s, índice aortorrenal (IAR) _____ do que 3,5 e índice renorrenal (IRR) _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) menor – maior – maior do que 2,5
- B) menor – menor – menor do que 2,7
- C) maior – maior – maior do que 2,5
- D) menor – maior – menor do que 2,7
- E) maior – menor – menor do que 2,5

QUESTÃO 36 – Em relação aos linfedemas, assinale a alternativa correta.

- A) Linfedemas congênitos surgem após o quinto ano de vida, podendo estar associados a outras síndromes e malformações, ocorrer isoladamente (linfedema congênito simples) ou apresentar transmissão hereditária e familiar (doença de Milroy).
- B) Linfedemas primários precoces constituem o grupo mais numeroso entre os linfedemas primários.
- C) Linfedemas primários tardios acometem pacientes antes dos 35 anos de vida.
- D) Linfedemas congênitos são os que se manifestam entre 2 e 35 anos. Apesar de quadro clínico variável, é mais comum no sexo feminino e tem início na adolescência, sendo rara sua associação a disfunções de outros órgãos ou sistemas.
- E) Linfedemas primários tardios acometem pacientes após os 35 anos, são mais frequentes no sexo masculino e, em geral, ocorrem após erisipelas ou linfangites de repetição.

QUESTÃO 37 – O sinal de Nicoladoni-Israel-Branham é encontrado nas fístulas arteriovenosas traumáticas de alto fluxo. Quando se realiza a compressão no local da fístula, ocorre:

- A) Isquemia aguda do membro.
- B) Taquicardia reflexa com compressão da fístula devido ao aumento da pré-carga.
- C) Síncope com compressão da fístula devido ao aumento da pré-carga.
- D) Insuficiência cardíaca aguda.
- E) Bradicardia reflexa com compressão da fístula devido ao aumento da pós-carga.

QUESTÃO 38 – São condições locais que impedem a revascularização clássica e, portanto, têm indicação de realizar uma derivação axilofemoral e axilobifemoral as abaixo citadas, EXCETO:

- A) Prótese aortoilíaca infectada com a necessidade de sua remoção parcial ou total.
- B) Fístula aortoduodenal resultante de pseudoaneurisma na anastomose aórtica.
- C) Irradiação pélvica ou abdominal prévia com alteração da anatomia devido à fibrose ou dificuldade de acesso aos vasos.
- D) Tumor abdominal.
- E) Aneurisma micótico da aorta abdominal sem condições de reconstrução direta.

QUESTÃO 39 – Assinale a alternativa que apresenta um achado arteriográfico altamente sugestivo de tromboangeíte obliterante (TAO).

- A) Ausência de circulação arterial.
- B) Presença abundante de rede de colaterais tipicamente descritas como em "saca-rolhas" ou em "raízes de árvore".
- C) Oclusões arteriais proximais.
- D) Presença de calcificações ou placas ateroscleróticas difusamente espalhadas principalmente em artérias infrapatelares.
- E) Presença de microaneurismas em artérias distais.

QUESTÃO 40 – A Manobra de Wright é uma manobra propedêutica utilizada na pesquisa de:

- A) Trombose venosa profunda.
- B) Fístula arteriovenosa traumática.
- C) Síndrome do túnel do carpo.
- D) Síndromes compressivas neurovasculares do desfiladeiro cervicotoracoaxilar.
- E) Trombose de esforço.