



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS – IPSEMG
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
EDITAL Nº 1/2024**

CADERNO DE PROVA – TARDE

**PRÉ-REQUISITO
CLÍNICA MÉDICA**

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

1. Este caderno de prova contém **50 (cinquenta)** questões objetivas, numeradas de **1 a 50**, a respeito do conteúdo de:
 - **Clínica Médica.**
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro)** opções de resposta. Apenas **1 (uma)** resposta responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para esta prova é de **2 (duas)** horas.
5. Reserve tempo suficiente para marcar a sua folha de respostas.
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno **não** serão considerados na avaliação.
7. O candidato somente poderá se retirar do local de realização da prova após o decurso de **1 (uma)** hora do horário de início da prova, mas somente poderá levar consigo o caderno de questões no decurso dos últimos **30 (trinta)** minutos anteriores ao horário determinado para o encerramento da prova.
8. Não será permitida a anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio.
9. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue a folha de respostas.
10. Boa prova!

CLÍNICA MÉDICA**Questão 1**

Paciente de 63 anos com histórico de diabetes mellitus tipo 2 é admitido com quadro de dor precordial associada a sudorese e náuseas. ECG revela infradesnível de ST em derivações anteriores. Qual é a conduta inicial mais indicada?

- (A) Administração de nitroglicerina sublingual.
- (B) Realização de cateterismo cardíaco imediato.
- (C) Anticoagulação e terapia antiplaquetária.
- (D) Início de corticoides intravenosos.

Questão 2

Homem de 57 anos, hipertenso, apresenta cefaleia súbita e intensa acompanhada de náuseas. Ao exame físico, encontra-se com pressão arterial de 180/110 mmHg e rigidez de nuca. O exame mais adequado para o diagnóstico inicial é:

- (A) Ressonância magnética do crânio.
- (B) Tomografia computadorizada de crânio sem contraste.
- (C) Punção lombar.
- (D) Ultrassonografia doppler de vasos intracranianos.

Questão 3

Paciente de 70 anos com insuficiência cardíaca congestiva e histórico de fibrilação atrial é internado devido à descompensação. Qual das medicações abaixo está indicada para controle de frequência cardíaca nesta condição?

- (A) Bloqueador dos canais de cálcio.
- (B) Betabloqueador.
- (C) Amiodarona oral.
- (D) Digoxina intravenosa.

Questão 4

Mulher de 52 anos apresenta dor epigástrica intensa irradiada para o dorso, associada a náuseas e vômitos. O exame físico revela dor à palpação do abdome superior. O exame diagnóstico inicial mais adequado é:

- (A) Endoscopia digestiva alta.
- (B) Ultrassonografia abdominal.
- (C) Tomografia computadorizada de abdome com contraste.
- (D) Raio-X de abdome em pé.

Questão 5

Homem de 68 anos com história de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é internado com dispneia progressiva e cianose. A gasometria arterial revela pH de 7,25, PaCO₂ de 60 mmHg e PaO₂ de 55 mmHg. Qual é o tratamento inicial recomendado?

- (A) Oxigenoterapia de alto fluxo.
- (B) Ventilação não invasiva com pressão positiva.
- (C) Ventilação mecânica invasiva.
- (D) Administração de diuréticos.

Questão 6

Mulher de 42 anos com histórico de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é atendida com quadro de febre, artralgia e piora da função renal. Exames laboratoriais revelam creatinina elevada e sedimento urinário com proteinúria e hematúria. O exame indicado para avaliar a extensão do acometimento renal é:

- (A) Ultrassonografia renal.
- (B) Biópsia renal.
- (C) Tomografia computadorizada de abdome.
- (D) Urografia excretora.

Questão 7

Paciente de 56 anos apresenta perda de peso, tosse produtiva e sudorese noturna há dois meses. O exame de imagem revela infiltrado pulmonar em lobo superior direito. O próximo passo diagnóstico é:

- (A) Tomografia computadorizada de tórax.
- (B) Prova tuberculínica (PPD).
- (C) Baciloscopia de escarro.
- (D) Teste sorológico para HIV.

Questão 8

Homem de 45 anos é admitido com história de etilismo crônico e icterícia. Apresenta distensão abdominal e edema de membros inferiores. O exame físico revela circulação colateral abdominal e hepatoesplenomegalia. O exame mais indicado para confirmar a etiologia e gravidade da doença hepática é:

- (A) Ressonância magnética de abdome.
- (B) Biópsia hepática.
- (C) Elastografia hepática.
- (D) Ultrassonografia com doppler de abdome.

Questão 9

Mulher de 30 anos, previamente saudável, apresenta quadro súbito de dor torácica pleurítica e dispneia. No exame físico, observa-se taquipneia e diminuição de murmúrio vesicular em hemitórax direito. O diagnóstico mais provável e o exame de imagem inicial são:

- (A) Pneumonia; radiografia de tórax.
- (B) Pneumotórax; tomografia computadorizada de tórax.
- (C) Pneumotórax; radiografia de tórax.
- (D) Derrame pleural; ultrassonografia de tórax.

Questão 10

Homem de 60 anos, com história de hipertensão e diabetes, é admitido com quadro de tontura e fraqueza muscular progressiva. Exames laboratoriais revelam hipocalcemia importante. A condição mais provável que justifica o quadro é:

- (A) Hipoparatiroidismo.
- (B) Síndrome de Cushing.
- (C) Feocromocitoma.
- (D) Doença de Addison.

Questão 11

Paciente de 72 anos com histórico de hipertensão e insuficiência renal crônica é admitido com quadro de dispneia, edema periférico e estertores bibasais. A gasometria arterial revela pH 7,32, PaCO₂ 50 mmHg e PaO₂ 60 mmHg. O exame mais indicado para avaliar a causa e a gravidade da insuficiência cardíaca é:

- (A) Radiografia de tórax.
- (B) Ecocardiograma transtorácico.
- (C) Angiotomografia de tórax.
- (D) Cateterismo cardíaco.

Questão 12

Homem de 50 anos com história de alcoolismo é atendido com quadro de dor abdominal intensa e febre. A tomografia computadorizada revela áreas hipodensas no pâncreas e presença de gás na cavidade peritoneal. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Pancreatite aguda necrosante.
- (B) Perfuração intestinal.
- (C) Pseudocisto pancreático.
- (D) Cálculo de via biliar principal.

Questão 13

Mulher de 38 anos apresenta queixa de poliúria, polidipsia e perda de peso. Exames laboratoriais revelam glicemia de jejum de 250 mg/dL e HbA1c de 9%. Qual é a orientação inicial mais indicada?

- (A) Início de metformina e acompanhamento ambulatorial.
- (B) Insulinoterapia e controle rigoroso de glicemia.
- (C) Dieta hipoglicídica e observação.
- (D) Aumento da ingestão hídrica e restrição de sódio.

Questão 14

Paciente de 60 anos com DPOC apresenta episódios de exacerbação com tosse e secreção purulenta. O exame laboratorial confirma aumento de leucócitos e PCR elevado. O antibiótico de escolha para este paciente é:

- (A) Amoxicilina.
- (B) Ceftriaxona.
- (C) Ciprofloxacina.
- (D) Azitromicina.

Questão 15

Homem de 45 anos é atendido com quadro de fraqueza muscular progressiva e ptose palpebral bilateral. Exame de eletroneuromiografia sugere bloqueio de transmissão neuromuscular. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Síndrome de Guillain-Barré.
- (B) Miastenia gravis.
- (C) Esclerose lateral amiotrófica.
- (D) Polineuropatia desmielinizante.

Questão 16

Paciente de 40 anos com histórico de hipertensão apresenta dor torácica aguda e intensa, que irradia para o dorso, associada a sudorese. O exame físico revela pressão arterial de 180/100 mmHg e ausência de pulsos periféricos em membro inferior esquerdo. O exame diagnóstico inicial mais indicado é:

- (A) Radiografia de tórax.
- (B) Tomografia computadorizada de tórax.
- (C) Eletrocardiograma.
- (D) Ecocardiograma transtorácico.

Questão 17

Mulher de 55 anos apresenta polidipsia, poliúria e hipernatremia. A osmolaridade urinária está baixa e não se eleva após administração de vasopressina. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Síndrome de secreção inapropriada de ADH (SIADH).
- (B) Diabetes insípido nefrogênico.
- (C) Diabetes insípido central.
- (D) Hipoparatiroidismo.

Questão 18

Homem de 28 anos é admitido com quadro de febre, dor abdominal e diarreia sanguinolenta. Exame endoscópico revela inflamação contínua do cólon. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Doença de Crohn.
- (B) Colite pseudomembranosa.
- (C) Colite ulcerativa.
- (D) Síndrome do intestino irritável.

Questão 19

Paciente de 70 anos com histórico de fibrilação atrial não tratada apresenta dor intensa e súbita em membro inferior direito, com palidez e ausência de pulsos. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Trombose venosa profunda.
- (B) Embolia arterial aguda.
- (C) Doença arterial periférica.
- (D) Síndrome compartimental.

Questão 20

Homem de 60 anos com história de tabagismo apresenta tosse crônica, dispneia e perda ponderal. A tomografia computadorizada de tórax revela massa pulmonar central. O próximo passo diagnóstico mais indicado é:

- (A) Broncoscopia com biópsia.
- (B) Toracocentese.
- (C) PET scan.
- (D) Punção aspirativa por agulha fina.

Questão 21

Paciente de 65 anos, diabético e obeso, apresenta dor abdominal no quadrante inferior esquerdo e febre. O exame de imagem mostra diverticulite aguda. Qual é a conduta inicial mais indicada?

- (A) Observação e dieta líquida.
- (B) Antibióticos orais e repouso.
- (C) Cirurgia de urgência.
- (D) Antibióticos intravenosos e internação.

Questão 22

Mulher de 48 anos apresenta edema, proteinúria e níveis baixos de albumina plasmática. A suspeita clínica é de síndrome nefrótica. Qual é o exame mais indicado para confirmar o diagnóstico e avaliar o tipo de glomerulopatia?

- (A) Exame de urina tipo 1.
- (B) Hemograma completo.
- (C) Biópsia renal.
- (D) Ultrassonografia abdominal.

Questão 23

Homem de 40 anos, previamente hígido, é admitido com quadro de febre e dispneia. A radiografia de tórax revela infiltrado intersticial difuso. O diagnóstico mais provável, considerando ausência de comorbidades e hábitos de risco, é:

- (A) Pneumocistose.
- (B) Tuberculose miliar.
- (C) Pneumonia por Mycoplasma.
- (D) Embolia pulmonar.

Questão 24

Paciente de 70 anos com história de insuficiência cardíaca congestiva apresenta hiponatremia e aumento do peso corporal. Qual é a causa mais provável desta hiponatremia?

- (A) Síndrome de secreção inapropriada de ADH.
- (B) Hipovolemia.
- (C) Retenção hídrica secundária à insuficiência cardíaca.
- (D) Hipotireoidismo.

Questão 25

Mulher de 35 anos com nódulo indolor na mama direita, que permanece inalterado há seis meses. A mamografia revela lesão espiculada. O exame mais indicado para diagnóstico definitivo é:

- (A) Biópsia por agulha grossa (core biopsy).
- (B) Ultrassonografia mamária.
- (C) Ressonância magnética de mama.
- (D) Punção aspirativa com agulha fina.

Questão 26

Homem de 55 anos, com etilismo crônico, é atendido com hematêmese e melena. A primeira medida terapêutica recomendada é:

- (A) Infusão de soluções cristaloides.
- (B) Administração de inibidor de bomba de prótons.
- (C) Vasoconstritores esplâncnicos.
- (D) Endoscopia digestiva alta.

Questão 27

Mulher de 60 anos com queixas de fadiga e palidez. Exames mostram hemoglobina de 8 g/dL e VCM de 70 fL. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Anemia ferropriva.
- (B) Anemia megaloblástica.
- (C) Anemia aplástica.
- (D) Talassemia minor.

Questão 28

Paciente de 50 anos, tabagista, com história de DPOC, é admitido com dispneia intensa e sibilância. Qual dos medicamentos abaixo é mais indicado para alívio imediato dos sintomas?

- (A) Salbutamol inalatório.
- (B) Prednisona oral.
- (C) Brometo de ipratrópio oral.
- (D) Oxigenoterapia contínua.

Questão 29

Homem de 40 anos apresenta dor abdominal intensa e súbita no quadrante inferior direito. No exame físico, há descompressão brusca dolorosa. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Apendicite aguda.
- (B) Colecistite aguda.
- (C) Pancreatite aguda.
- (D) Diverticulite.

Questão 30

Mulher de 72 anos com fratura de fêmur proximal. Ao realizar exames pré-operatórios, detecta-se hipercalcemia. A principal hipótese diagnóstica para a hipercalcemia é:

- (A) Hiperparatireoidismo primário.
- (B) Hipovitaminose D.
- (C) Doença de Paget.
- (D) Insuficiência renal.

Questão 31

Homem de 63 anos apresenta edema de membros inferiores e dispneia aos esforços. Exames revelam BNP elevado e fração de ejeção reduzida. Qual é a classe de medicamentos indicada para reduzir a mortalidade neste caso?

- (A) Bloqueadores de canal de cálcio.
- (B) Diuréticos tiazídicos.
- (C) Inibidores da ECA.
- (D) Digoxina.

Questão 32

Mulher de 45 anos, tabagista, apresenta quadro de hemoptise e dor torácica. A tomografia de tórax mostra lesão pulmonar cavitária. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Câncer de pulmão.
- (B) Tuberculose pulmonar.
- (C) Aspergilose.
- (D) Pneumonia necrosante.

Questão 33

Paciente de 60 anos com história de insuficiência renal crônica apresenta queixa de dor óssea e fraqueza muscular. Exames mostram hipocalcemia e hiperfosfatemia. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Osteoporose.
- (B) Osteomalácia.
- (C) Hiperparatireoidismo secundário.
- (D) Doença de Paget.

Questão 34

Mulher de 35 anos apresenta poliartrite simétrica nas mãos e rigidez matinal. Exames mostram fator reumatoide positivo. O tratamento inicial mais indicado é:

- (A) Prednisona oral.
- (B) Metotrexato.
- (C) Hidroxicloroquina.
- (D) AINEs.

Questão 35

Paciente de 58 anos, obeso e sedentário, apresenta dor no peito e falta de ar ao esforço físico. Qual exame é o mais indicado para confirmar o diagnóstico de angina estável?

- (A) Cateterismo cardíaco.
- (B) Cintilografia de perfusão miocárdica.
- (C) Eletrocardiograma em repouso.
- (D) Ecocardiograma de estresse.

Questão 36

Homem de 70 anos com história de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) apresenta aumento súbito de dispneia e sibilos. O próximo passo terapêutico mais adequado é:

- (A) Prednisona oral.
- (B) Oxigenoterapia contínua.
- (C) Diuréticos.
- (D) Ventilação mecânica invasiva.

Questão 37

Mulher de 40 anos com queixa de fadiga crônica e dor difusa apresenta hipersensibilidade à palpação em pontos específicos. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Artrite reumatoide.
- (B) Fibromialgia.
- (C) Osteoartrite.
- (D) Polimialgia reumática.

Questão 38

Homem de 65 anos, com antecedente de tabagismo, apresenta quadro de disfagia progressiva. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Acalasia.
- (B) Câncer de esôfago.
- (C) Estenose esofágica benigna.
- (D) Esofagite eosinofílica.

Questão 39

Paciente de 55 anos apresenta quadro de dor e edema na panturrilha após longa viagem de avião. O exame mais indicado para investigação é:

- (A) Ultrassonografia com doppler venoso.
- (B) Flebografia.
- (C) Tomografia computadorizada.
- (D) Radiografia simples.

Questão 40

Mulher de 62 anos com diagnóstico de doença renal crônica apresenta anemia com índice de hemoglobina em 9 g/dL. A causa mais provável da anemia é:

- (A) Deficiência de ferro.
- (B) Deficiência de vitamina B12.
- (C) Anemia de doença crônica.
- (D) Anemia hemolítica.

Questão 41

Paciente de 50 anos com diagnóstico de hipertensão resistente ao tratamento apresenta episódios de cefaleia intensa e sudorese. O exame mais indicado para investigação da causa é:

- (A) Tomografia de crânio.
- (B) Dosagem de catecolaminas urinárias.
- (C) Ecocardiograma.
- (D) Ressonância magnética de crânio.

Questão 42

Homem de 64 anos com diagnóstico de gota apresenta episódio de dor intensa e edema em primeiro pododáctilo. A medicação mais indicada para tratar esta crise é:

- (A) Colchicina.
- (B) Hidroclorotiazida.
- (C) Probenecida.
- (D) Alopurinol.

Questão 43

Paciente de 47 anos com insuficiência renal crônica é admitido com hipercalemia severa. Qual é a primeira medida terapêutica recomendada?

- (A) Furosemida IV.
- (B) Diálise imediata.
- (C) Insulina e glicose IV.
- (D) Restrição de potássio na dieta.

Questão 44

Mulher de 39 anos com histórico de síndrome do intestino irritável apresenta diarreia aquosa crônica sem perda de peso significativa. Qual é o tratamento inicial mais adequado?

- (A) Loperamida.
- (B) Metronidazol.
- (C) Prednisona.
- (D) Ciprofloxacina.

Questão 45

Homem de 70 anos apresenta quadro de hemorragia digestiva alta. Qual medicação intravenosa é recomendada como parte do manejo inicial?

- (A) Omeprazol.
- (B) Insulina.
- (C) Antibiótico profilático.
- (D) Heparina.

Questão 46

Mulher de 55 anos é diagnosticada com hipotireoidismo. O tratamento inicial mais indicado é:

- (A) Levotiroxina.
- (B) Propiltiouracil.
- (C) Metimazol.
- (D) Iodo radioativo.

Questão 47

Homem de 52 anos, tabagista, apresenta tosse crônica e dispneia. A espirometria confirma VEF1 reduzido com padrão obstrutivo. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Asma.
- (B) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
- (C) Bronquiolite.
- (D) Tuberculose.

Questão 48

Paciente de 70 anos com histórico de fibrilação atrial apresenta embolia pulmonar. Qual dos medicamentos abaixo é indicado para anticoagulação de longo prazo?

- (A) Heparina de baixo peso molecular.
- (B) Apixabana.
- (C) Varfarina.
- (D) Clopidogrel.

Questão 49

Homem de 60 anos apresenta alteração visual súbita e cefaleia. A fundoscopia revela papiledema. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Hipertensão intracraniana.
- (B) Glaucoma.
- (C) Retinopatia diabética.
- (D) Degeneração macular.

Questão 50

Mulher de 65 anos com dor em articulações das mãos, rigidez matinal e fator reumatoide positivo. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Osteoartrite.
- (B) Gota.
- (C) Artrite reumatoide.
- (D) Lúpus eritematoso sistêmico.

Realização
Instituto
ACCESS