

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – COMO MUDAR O RUMO

Desde que a humanidade deixou de se preocupar apenas em sobreviver às doenças para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra, outro incômodo passou a ter prioridade. Voltando seu olhar ao redor, como se só então pudessem fazê-lo sem medo de contágio, os homens descobriram a pobreza e a terrível desigualdade social. Os que acumularam riqueza só pensavam em amealhar cada vez mais. Os que estavam no pé da pirâmide dificilmente conseguiam subir, a não ser com a ajuda de mãos caridosas.

Diferentemente daqueles que enxergam na ajuda filantrópica a única saída para este dilema milenar, há muitos que acreditam na força e na potência dos seres humanos, desde que lhes seja dada uma chance de se fazer ouvir por quem tem poder e capital.

1. Em função do que é lido no texto, o título "Como mudar o rumo" deve referir-se:
 - (A) à mudança das preocupações da humanidade;
 - (B) à substituição das doenças pelas preocupações sociais;
 - (C) ao comportamento diferente dos que amealharam grandes riquezas;
 - (D) aos que acreditam em algo mais do que a ajuda filantrópica para sanar problemas sociais;
 - (E) ao encaminhamento dos necessitados para a ajuda filantrópica.
2. "Desde que a humanidade deixou de se preocupar apenas em sobreviver às doenças para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra, outro incômodo passou a ter prioridade"; a nova forma dessa frase que altera o seu sentido original é:
 - (A) Outro incômodo passou a ter prioridade, desde que a humanidade deixou de se preocupar apenas em sobreviver às doenças para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra;
 - (B) Desde que a humanidade deixou de se preocupar apenas em sobreviver às doenças, outro incômodo passou a ter prioridade, para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra;
 - (C) Desde que a humanidade deixou de se preocupar, para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra, apenas em sobreviver às doenças, outro incômodo passou a ter prioridade;
 - (D) Outro incômodo passou a ter prioridade, desde que a humanidade deixou de se preocupar, para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra, apenas em sobreviver às doenças;
 - (E) Desde que a humanidade, para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra, deixou de se preocupar apenas em sobreviver às doenças, outro incômodo passou a ter prioridade.
3. "para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra"; o significado de "sobrevida" no texto é:
 - (A) prolongamento da vida além de limite dado;
 - (B) tudo o que ocorre em seguida à vida terrena;
 - (C) a continuidade da vida após o desaparecimento de outros;
 - (D) a sobrevivência com qualidade de vida;
 - (E) a continuidade da vida na Terra com poucas espécies que escaparam da extinção.
4. A expressão "ter prioridade" equivale semanticamente a "ser prioritário"; a alternativa abaixo que mostra uma equivalência EQUIVOCADA é:
 - (A) ter pressa = ser apressado;
 - (B) ter problemas = ser problemático;
 - (C) ter dificuldades = ser deficiente;
 - (D) ter preocupações = ser preocupado;
 - (E) ter desinteresse = ser desinteressado.
5. Ao dizer que "outro incômodo passou a ter prioridade", pode-se deduzir que:
 - (A) a situação anterior não era incômoda;
 - (B) passam a existir dois incômodos prioritários;
 - (C) o problema anterior foi solucionado;
 - (D) o incômodo anterior foi momentaneamente esquecido;
 - (E) outro incômodo fez com que o anterior ficasse em segundo plano.
6. "Voltando seu olhar ao redor, os homens descobriram a pobreza..."; a alternativa que mostra uma forma desenvolvida do gerúndio "voltando" que é adequada ao contexto é:
 - (A) antes de voltarem;
 - (B) quando voltaram;
 - (C) se voltassem;
 - (D) apesar de voltarem;
 - (E) embora voltassem.
7. "os homens descobriram a pobreza e a terrível desigualdade social"; a alternativa que mostra uma forma INADEQUADA dessa frase por alterar o seu sentido original é:
 - (A) A pobreza foi descoberta pelos homens, juntamente com a terrível desigualdade social;
 - (B) A pobreza e a terrível desigualdade social foram descobertas pelos homens;
 - (C) A pobreza e a terrível desigualdade social, os homens as descobriram;
 - (D) Os homens descobriram, além da pobreza, a terrível desigualdade social;
 - (E) Pela terrível desigualdade social, os homens descobriram a pobreza.
8. "Os que acumularam riqueza só pensavam em amealhar cada vez mais"; a alternativa que mostra a reescritura dessa mesma frase em que a mudança de posição da palavra só NÃO altera o sentido original é:
 - (A) Só os que acumularam riqueza pensavam em amealhar cada vez mais;
 - (B) Os que só acumularam riqueza, pensavam em amealhar cada vez mais;
 - (C) Os que acumularam só riqueza pensavam em amealhar cada vez mais;
 - (D) Os que acumularam riqueza pensavam só em amealhar cada vez mais;
 - (E) Os que acumularam riqueza pensavam em amealhar só cada vez mais.

9. "Os que estavam ao pé da pirâmide dificilmente conseguiam subir"; os que estão "ao pé da pirâmide" são:
- (A) os desejosos de progredir socialmente;
 - (B) os de classe social mais alta;
 - (C) os que ajudam os demais a subir socialmente;
 - (D) os mais pobres;
 - (E) os que acreditam na força e na potência dos seres humanos.
10. "desde que lhes seja dada uma chance de se fazer ouvir"; o conectivo "desde que" expressa uma:
- (A) condição;
 - (B) situação temporal;
 - (C) comparação;
 - (D) causa;
 - (E) concessão.

ENFERMAGEM

11. Em relação à sistematização da assistência de enfermagem, é correto afirmar que:
- O eixo central deve se dirigir para as condições de desenvolvimento profissional;
 - É importante, mas não fundamental para a administração da assistência;
 - As teorias da enfermagem são amplamente usadas em nosso meio;
 - É centrada no paciente e orientada para a assistência;
 - É exclusividade da assistência hospitalar.
12. A etapa do processo de enfermagem que é definida como "a identificação de problemas de saúde reais ou potenciais que podem ser controlados por intervenções independentes de enfermagem" é:
- Diagnóstico de enfermagem;
 - Planejamento de enfermagem;
 - Prescrição de enfermagem;
 - Registro de enfermagem;
 - Intervenção de enfermagem.
13. Os registros detalhados e seqüenciais de como uma atividade de enfermagem deve ser realizada, estruturados de modo uniforme para toda a unidade de saúde, e baseados em princípios científicos são denominados:
- Normas;
 - Rotinas;
 - Manuais;
 - Regulamentos;
 - Procedimentos.
14. Em relação à dinâmica dos líquidos em geral que deve ser considerada na administração de infusões por via IV, assinale a afirmativa correta:
- Aumentar a altura de um frasco de infusão em relação ao ponto de acesso causa desaceleração do fluxo;
 - Líquidos viscosos devem ser administrados utilizando-se cânulas e equipos de calibre menor quando se deseja um fluxo lento;
 - A extensão do equipo regula a velocidade do fluxo de modo diretamente proporcional;
 - A velocidade do fluxo é inversamente proporcional ao diâmetro da luz do equipo;
 - Quanto maior a coluna de líquido, menos veloz o fluxo da infusão.
15. Assinale a assertiva que constitui contra-indicação para acesso venoso por cateter central inserido periféricamente:
- Pacientes que devem receber quimioterápicos por via parenteral por períodos moderados a longo;
 - Pessoas que deverão receber infusões de volume elevado de líquidos;
 - Pacientes com veias cefálica, média e basilica complacentes;
 - Pessoas com obesidade e usuários de drogas injetáveis;
 - Pacientes portadores de edema generalizado.
16. Na administração de oxigenoterapia, o uso do cateter nasal é indicado quando se deseja:
- Manter o paciente imobilizado no leito;
 - Garantir a inalação de oxigênio umidificado;
 - Manter concentrações de oxigênio de 70 a 80%;
 - Manter concentração de oxigênio em torno 40%;
 - Permitir a inalação de fluxo com relação constante de ar ambiente misturado com fluxo de O₂;
17. São cuidados de enfermagem a pacientes submetidos à ventilação artificial mecânica:
- Estimular a realização de exercícios ativos para amplitude do movimento respiratório;
 - Medir o volume corrente fornecido e analisar a concentração de O₂ a cada 6 horas;
 - Avaliar a necessidade de aspiração do tubo orotraqueal a cada 4 ou 6 horas;
 - Verificar o ventilador, alternando a administração de gás seco e umidificado;
 - Fazer mudança de decúbito do paciente a cada 1 ou 2 horas.
18. A Portaria 2.616 do Ministério da Saúde, que traz as diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares (IH) no Brasil, em seu Anexo III, trata especificamente do tópico lavagem das mãos, sendo CORRETO afirmar que:
- Quando o cuidado direto é restrito a um paciente, a lavagem das mãos é realizada apenas ao iniciar e terminar os cuidados;
 - Trata-se de procedimento realizado de modo alternativo ao uso de luvas descartáveis no contato com mucosas de pacientes;
 - A utilização de anti-sépticos neste procedimento é somente necessária antes do contato direto com feridas ou dispositivos invasivos;
 - Considera-se lavagem das mãos a fricção vigorosa das mãos com anti-sépticos e sabões, seguindo-se do enxágüe com água abundante;
 - A lavagem das mãos, depois do uso de luvas descartáveis, é o procedimento isolado mais importante para prevenir a ocorrência de IH.
19. Dentre os indicadores epidemiológicos mais importantes a serem obtidos e analisados periodicamente para o Controle das Infecções Hospitalares em um hospital está a Taxa de Infecção Hospitalar (TIH), calculada da seguinte forma:
- $\frac{\text{Número de episódios de IH, período } y}{\text{Total de saídas ou entradas período } y} \times 100$;
 - $\frac{\text{Número de doentes com IH, período } Y}{\text{Total de saídas ou entradas, período } Y} \times 100$;
 - $\frac{\text{Número de episódios de IH, período } Y}{\text{Total de óbitos por IH, período } Y} \times 100$;
 - $\frac{\text{Número de mortes por IH, período } y}{\text{Total de óbitos na população, período } y} \times 100$;
 - $\frac{\text{Número de recaídas por IH, período } y}{\text{Total de saídas ou entradas, período } y} \times 100$.

20. Segundo a Norma Regulamentadora 32, que dispõe sobre as condições de biossegurança do trabalhador em estabelecimentos de saúde, o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) deve contemplar os seguintes pontos:

- (A) A execução do monitoramento de riscos físicos à saúde, que cabe exclusivamente ao médico do trabalho;
- (B) A identificação dos riscos biológicos mais prováveis, considerando a localização geográfica e características do serviço de saúde;
- (C) O monitoramento do uso opcional de EPIs por trabalhadores expostos a emissões de radiações ionizantes;
- (D) A composição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho;
- (E) Uma reavaliação a cada 5 anos sobre os riscos ambientais existentes no serviço.

21. De acordo com a Lei do Exercício Profissional, cabe apenas ao enfermeiro executar as atividades abaixo listadas, EXCETO:

- (A) Prestar cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas;
- (B) Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis;
- (C) Fazer consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem;
- (D) Realizar consulta de enfermagem;
- (E) Chefiar serviço de enfermagem.

22. A Resolução COFEN 240/2000 regulamente o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, segundo o qual são garantidos direitos, mas também definidas responsabilidades e proibições para o exercício profissional. Em relação a estes itens, analise as situações hipotéticas abaixo:

- I- Uma enfermeira é assediada moralmente por um paciente internado em seu setor, e recusa-se a prestar atenção direta a esta pessoa, passando os cuidados do quarto para outro profissional até que a direção do hospital providencie a transferência do mesmo;
- II- Ao receber um paciente inconsciente no setor de emergência, o enfermeiro é comunicado pelo médico atendente que o paciente necessita ser encaminhado urgentemente para uma cirurgia mutiladora. O enfermeiro responsável libera o paciente para o centro cirúrgico, e solicita o retardo do início da cirurgia, com garantia da manutenção artificial da vida, aguardando até um familiar chegar e assinar o termo de consentimento;
- III- Uma enfermeira recusa atender à solicitação da chefia de assumir a consulta e prescrição de medicamentos para as crianças portadoras de infecções respiratórias, como forma de diminuir a demanda num Posto de Saúde temporariamente sem pediatra.

A resposta correta é:

- (A) Constitui proibição a ação descrita na situação I;
- (B) Constitui proibição a ação descrita na situação II;
- (C) Não constitui proibição a ação descrita na situação II;
- (D) Constituem proibições as ações descritas nas situações I e II;
- (E) Não constituem proibições as ações descritas nas situações II e III.

23. Na ausculta pulmonar do paciente normal ocorrem variações nos sons respiratórios, de acordo com o ponto da ausculta, sendo os sons mais baixos e suaves (vesiculares) característicos da seguinte localização:

- (A) Proximidades dos grandes brônquios;
- (B) Parede anterior, brônquio-fonte;
- (C) Áreas alveolares periféricas;
- (D) Entre as escápulas;
- (E) Sobre a traquéia.

24. Durante a anamnese, o enfermeiro deverá suspeitar da existência de causa secundária de hipertensão arterial quando se deparar com os seguintes dados:

- (A) Homem de 58 anos, com aparecimento súbito de hipertensão, sem história familiar de hipertensão arterial;
- (B) Homem de 48 anos, com história de crises hipertensivas progressivamente graves, com dislipidemia e sem história familiar;
- (C) Mulher de 40 anos, sedentária, com crises moderadas de hipertensão há anos, e com história familiar de infarto do miocárdio;
- (D) Homem de 35 anos, com um episódio de crise hipertensiva moderada, tabagista e com história familiar de acidente vascular;
- (E) Mulher de 52 anos, com hipertensão moderada, obesa e com queixa de falta de ar.

25. Alterações benignas da pele podem surgir com o envelhecimento, sendo usual encontrar, durante o exame físico de idosos:

- (A) Máculas hipoestésicas;
- (B) Pápulas puntiformes;
- (C) Telangectasias;
- (D) Exantemas;
- (E) Petéquias.

26. A avaliação física do abdome inclui a inspeção, a ausculta, a palpação e a percussão. A posição adequada do paciente no leito é:

- (A) Decúbito lateral, pernas fletidas;
- (B) Decúbito dorsal, posição de litotomia;
- (C) Decúbito dorsal, quadris em ligeira flexão;
- (D) Decúbito dorsal, joelhos em ligeira flexão;
- (E) Decúbito dorsal, membros inferiores em extensão.

27. Em emergência cardiológica, a desfibrilação é o tratamento de escolha em duas condições: fibrilação ventricular e:
- (A) Infarto do miocárdio;
 - (B) Taquicardia sinusal;
 - (C) Bloqueio atrioventricular, sem pulso;
 - (D) Complexo ventricular prematuro;
 - (E) Taquicardia ventricular, sem pulso.
28. A hipocalcemia é um distúrbio hidroeletrolítico que pode ter causas relacionadas a patologias diversas, sendo também predisposto pelo uso de alguns medicamentos, entre os quais:
- (A) Penicilinas;
 - (B) Betabloqueadores;
 - (C) Corticosteróides;
 - (D) Derivados cumarínicos;
 - (E) Anticoncepcionais injetáveis.
29. A retirada de um cateter endovenoso, embora seja um procedimento de enfermagem rotineiro, está associada a duas condições de perigo, a saber:
- (A) Paralisia e flebite;
 - (B) Flebite e sangramento;
 - (C) Isquemia e hipercoagulação;
 - (D) Sangramento e embolia por cateter;
 - (E) Hipercoagulação e embolia por cateter.
30. A condição respiratória de urgência que se caracteriza pelo aumento da pressão positiva no espaço pleural, levando a colapso parcial ou total do pulmão denomina-se:
- (A) Embolia pulmonar;
 - (B) Edema pulmonar;
 - (C) Pneumotórax;
 - (D) Atelectasia;
 - (E) Empiema.

ENFERMAGEM EM DOENÇAS INFECCIOSAS


31. – O perfil de saúde da população brasileira vem sofrendo uma transição importante, e os fatores envolvidos incluem, entre outros, as mudanças na estrutura social e demográfica e o impacto das tecnologias de saúde disponíveis. A enfermagem, ao acompanhar esta transição, também sofre mudanças no que se refere ao escopo, métodos e abrangência de suas ações, intervindo também sobre determinantes e condicionantes de situações de saúde, orientando-se pelo paradigma da:

- A) redução de danos;
- B) promoção da saúde;
- C) limitação de danos;
- D) prevenção de saúde;
- E) prevenção de seqüelas.

32. Definida como uma profissão cuja atuação se baseia em passos metodológicos claros e princípios científicos, a enfermagem tem sua identidade vinculada ao desenvolvimento do processo de enfermagem. A análise dos dados coletados é um passo a ser destacado, sendo algumas vezes explicitada como etapa separada, e em outras como fazendo parte da etapa de:

- A) diagnóstico;
- B) planejamento;
- C) avaliação;
- D) implementação;
- E) evolução.

33. Segundo Wanda de Aguiar Horta, a metodologia para a elaboração do diagnóstico de enfermagem pode ser expressa no seguinte esquema gráfico:



Assinale a alternativa que traz os itens do esquema numerados 1,2,e 3:

- A) 1-Diagnóstico; 2- Intervenção; 3- Supervisão;
- B) 1-Sintomas; 2-Necessidades; 3-Dependência;
- C) 1-Histórico; 2-Assistência; 3-Evolução;
- D) 1-Informações; 2-Ação; 3-Planejamento;
- E) 1-Queixas; 2-Sistematização; 3-Desenvolvimento.

34. No registro do plano de cuidados e da evolução de enfermagem no prontuário, a enfermagem observa alguns princípios, sendo correto afirmar que:

- A) a evolução é uma avaliação global do plano de cuidados implementado;
- B) a prescrição de enfermagem tem como base as prioridades da prescrição medicamentosa;
- C) no registro da evolução, os dados objetivos são priorizados e depois são registrados os dados subjetivos;
- D) o plano de cuidados é um roteiro semanal que coordena a ação da equipe de enfermagem nos cuidados necessários.
- E) a redação da prescrição de enfermagem se orienta por princípios de detalhamento, utilizando os verbos em tempos futuros, e primeira pessoa do singular.

35. Entre os critérios definidos pela Associação Brasileira de Enfermagem para uma norma de enfermagem cumprir sua função de guia temos que:

- A) a norma deve ser firme e clara, a fim de evitar iniciativas e mudanças;
- B) os critérios de avaliação devem se basear em medidas exclusivamente quantitativas;
- C) sua adequada formatação busca evitar a que esteja sujeita a contínua revisão e avaliação;
- D) é elaborada de forma a desvincular-se das funções, que são consideradas como elementos independentes entre si;
- E) traduz objetivos e descreve as condições que são consideradas necessárias para atingir um ideal.

36. As rotinas de enfermagem são classificadas em três tipos principais, a saber:

- A) vertical; horizontal; transversal;
- B) organograma; pontual; descritiva;
- C) de coluna; textual; fluxograma;
- D) de alternância; básica; complexa;
- E) de ação; planejamento; de avaliação.

37. O procedimento de enfermagem consiste de uma descrição detalhada dos passos a serem realizados em determinada atividade. Compõe o conjunto de ferramentas institucionais que orientam as ações de enfermagem, e sua natureza básica é:

- A) técnica;
- B) política;
- C) filosófica;
- D) gerencial;
- E) administrativa.

38. O planejamento da assistência de enfermagem é influenciado pelas teorias da administração, e nas instituições hospitalares ainda há forte influência das Teorias Científica e Clássica, cujos principais teóricos foram, respectivamente, Taylor e Fayol. Duas características organizativas e administrativas importantes destas influências, observadas nas estruturas hospitalares, são:
- o planejamento estratégico e a integração setorial;
 - a desorganização funcional e a humanização das relações;
 - a integração entre tarefas e a compartimentalização organizacional;
 - a divisão do trabalho e a subordinação hierárquica organizacional;
 - o desenvolvimento funcional organizativo e a divisão horizontal do trabalho.
39. Os conceitos de educação continuada, educação em serviço, e, mais recentemente, de educação permanente orientam as práticas educativas voltadas para o desenvolvimento profissional, pessoal e institucional, e se inserem na modalidade de educação do adulto. Entre os pressupostos a serem considerados nas propostas de educação continuada em enfermagem temos:
- o indivíduo adulto já possui seus princípios e caráter formados, demandando um ensino objetivo, não voltado para a expressão de necessidades;
 - o enfermeiro responsável constrói o planejamento da proposta educativa, e a participação dos educandos se dá a partir do início da execução desta;
 - a aprendizagem terá maior significado quando as experiências profissionais e de vida integrarem a proposta educativa;
 - a avaliação deve verificar o aprendizado e apoiar a classificação, pelo enfermeiro-líder, da equipe quanto à capacidade e destreza na execução das ações ensinadas.
- apenas a afirmativa I está correta;
 - apenas as afirmativas II e III estão corretas;
 - apenas a afirmativa III está correta;
 - apenas as afirmativas I e IV estão corretas;
 - apenas a afirmativa IV está correta.
40. Na administração de terapia endovenosa, a osmolaridade das soluções deve ser levada em conta, sendo CORRETO afirmar que:
- Os líquidos classificados como isotônicos expandem o espaço intravascular, e devem ser administrados com cuidado em pacientes com hipertensão arterial;
 - A infusão de líquidos hipertônicos tem como uma de suas funções o fornecimento de água livre para a excreção de resíduos corporais;
 - Soluções salinas em concentrações osmolares superiores à do líquido extracelular puxam água deste para o intracelular, e fazem com que as células inchem;
 - A solução de Ringer é usada para corrigir a desidratação, a depleção de sódio e repor perdas gastrointestinais;
 - Uma das funções da administração de soluções hipotônicas é repor o líquido extracelular.
41. Alterações fisiológicas do envelhecimento determinam diferenças na absorção, metabolismo e excreção de medicamentos. Dentre as alterações descritas abaixo, assinale a que está INCORRETA em relação a estas alterações:
- maior acidez gástrica;
 - menor motilidade gastrointestinal;
 - aumento da gordura total no organismo;
 - menor quantidade de água no organismo;
 - diminuição da função tubular e do fluxo sanguíneo renal.
42. A condição de emergência respiratória que requer, como tratamento imediato, a colocação do paciente em posição ereta com pernas pendentes visando a redução do retorno venoso ao coração é:
- pneumonia aguda;
 - enfisema pulmonar agudo;
 - edema pulmonar agudo;
 - traqueobronquite aguda;
 - empiema pulmonar agudo.
43. A insuficiência hepática fulminante é uma condição clínica súbita e extremamente grave, que ocorre em pessoa previamente saudável. A causa mais comum desta condição é:
- uso abusivo de drogas psicoativas;
 - cálculos biliares numerosos;
 - uso abusivo de álcool;
 - diabetes mellitus;
 - hepatite viral.
44. Complete a sentença abaixo:
- Em relação às picadas e inoculação de venenos de insetos como abelhas, vespas e besouros, picadas em qualquer área corporal podem desencadear a anafilaxia, mas as picadas em são especialmente graves.
- A alternativa correta é:
- membros inferiores;
 - membros superiores;
 - cabeça e pescoço;
 - tronco e pernas;
 - dorso e braços.
45. A manobra considerada segura para abertura da via aérea em paciente de emergência que ainda não foi avaliado quanto à possibilidade de lesão na coluna é:
- uma das mãos é colocada na frente, sendo aplicada pressão firme para trás com a região palmar, inclinando a cabeça para trás, enquanto a outra mão é colocada sob a parte óssea da mandíbula, levantando-a;
 - o paciente é colocado em decúbito ventral e imediatamente depois em decúbito lateral direito, tendo-se o cuidado de manter o corpo alinhado, virando-o em bloco;
 - o profissional de saúde abraça o paciente por trás, colocando ambas as mãos fechadas sobre a região sub-diafragmática, aplicando pressão rápida para cima;
 - colocam-se as mãos, uma em cada lado da mandíbula, segurando os ângulos desta, levantando-o, deslocando a mandíbula para a frente;
 - estimula-se o paciente a tossir vigorosamente, apoiando-o em posição semi-sentada.

46. Na evolução da AIDS, a fase em que a doença se encontra auto-limitada, e geralmente não é diagnosticada porque os sintomas são confundidos com outras doenças virais é denominada:
- A) doença latente;
 - B) infecção aguda;
 - C) doença sintomática;
 - D) período de incubação;
 - E) infecção assintomática.
47. A evolução dos casos de dengue é variável, dependendo da forma como se apresenta a doença, que pode ser:
- A) aguda, crônica, hemorrágica;
 - B) dengue clássica e síndrome de choque da dengue;
 - C) dengue epidêmica, dengue endêmica e dengue hemorrágica;
 - D) infecção aparente, dengue clássica, febre hemorrágica da dengue;
 - E) infecção inaparente, dengue clássica, febre hemorrágica da dengue e síndrome de choque da dengue.
48. Em relação ao tratamento da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) com antimônio, é correto afirmar que:
- A) em crianças, não é realizado o tratamento com antimônio até os 12 anos de idade;
 - B) quando há associação da LTA com a esquistossomose, deve-se tratar a LTA primeiro;
 - C) gestantes, após o sexto mês poderão receber doses baixas de antimônio, dependendo da gravidade do caso;
 - D) o tratamento de pacientes com mais de 50 anos e cardiopatas é totalmente contra-indicado;
 - E) pacientes portadores de nefropatia ou hepatopatias deverão fazer acompanhamento.
49. Para efeitos do cumprimento da legislação da ANVISA sobre controle de infecções hospitalares, são considerados pacientes críticos os abaixo relacionados, EXCETO os:
- A) portadores de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida;
 - B) em uso de soro heterólogo por qualquer causa;
 - C) submetidos a transplante de órgãos;
 - D) de berçário de alto risco;
 - E) queimados.
50. Na prevenção e controle das infecções hospitalares, alguns indicadores devem ser obtidos e analisados periodicamente. O indicador que é calculado tomando como numerador o número de episódios de infecção hospitalar no período considerado e como denominador o total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no mesmo período denomina-se:
- A) taxa de Infecção Hospitalar;
 - B) taxa de Pacientes com Infecção Hospitalar;
 - C) distribuição Percentual das Infecções Hospitalares;
 - D) proporção de Infecções Hospitalares entre as saídas do hospital;
 - E) distribuição Proporcional dos Pacientes com Infecção Hospitalar.