HCFAMEMA

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

001. PROVA OBJETIVA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas e 30 minutos do tempo de duração da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

Confidencial até o momento da aplicação.

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira a seguir para responder às questões **01** e **02**:

(Bill Waterson. *O melhor de Calvin*. Disponível em: www.estadao.com.br, 16.03.2025)

01. A partir da leitura da tira, é correto afirmar que o garoto Calvin

(A) mostra arrependimento por ter feito algo que lhe causou um castigo injusto.

(B) diz que não aprendeu a lição para que prolonguem a punição recebida.

(C) não entende como o deixaram sem TV, se ela continua sobre o móvel.

(D) revela indignação e tenta provar que seu castigo não terá o efeito esperado.

(E) se recusa a ligar a TV para demonstrar teimosia e irritar quem o castigou.

02. Na frase “Eles não conseguem me **dobrar**!” (2º quadro), o garoto Calvin emprega a palavra destacada em sentido

(A) figurado, para dar ao tigre uma noção de sua submissão.

(B) figurado, para dizer que não vai ceder de seu propósito.

(C) próprio, para se referir à sua paciência acima do normal.

(D) próprio, para indicar que só ele comanda seus músculos.

(E) próprio, para mostrar que a sua serenidade é a que prevalece.

Leia o texto a seguir para responder às questões **03** e **04**:

Comunicavam-se nascimentos em pequenos anúncios no jornal. Crianças andavam de bicicleta no meio da rua, não havia condomínios fechados. Sabíamos os números de telefone de cor – de avós, primos, amigos. Pagávamos as contas com dinheiro vivo, a não ser valores maiores, quando usávamos cheque. Se não quiséssemos que o cheque fosse descontado no caixa do banco, fazíamos dois riscos no canto da folha e quem o recebia era obrigado a depositá-lo, o que nos dava tempo até a compensação.

Telefonávamos para conversar e combinar encontros. Enviavam-se cartas pelo correio, que chegavam ao destino semanas depois. E usava-se o telegrama para notícias urgentes. “Pai hospital volte logo.” Suprimiam-se preposições, pronomes: se pagava por palavra.

Viajar de avião era um evento. Serviam farta comida e bebida durante os voos. Fumava-se dentro da cabine. Aos 13, meninos e meninas já tinham dado sua primeira tragada. Saída de colégio era um fumódromo. Festivais de música e torneios esportivos eram patrocinados por fabricantes de cigarros.

Parece mentira, mas há documentos, testemunhos, sobreviventes: era assim mesmo. Quem viveu isso lembra com saudade, mas sem perder o juízo: voltar no tempo, nem pensar. Evoluímos. Se antes varríamos para baixo do tapete os preconceitos e a alienação, hoje temos informação instantânea e escutamos a voz de todos, graças à revolução digital. Seria maravilhoso se fizéssemos bom uso dessa conexão progressista, mas o ser humano é craque em estragar tudo. Por ganância e irresponsabilidade de alguns, ficará cada vez mais difícil perceber o que parece mentira e o que parece verdade. Já que a desinformação produz ainda mais poder e dinheiro, seremos transformados em consumidores de falsidades e habitaremos um planeta sem alma, totalmente manipulado. Crise mundial de confiança. E a solidão se expandirá.

Não sou de fazer drama, mas dá vontade de enviar um telegrama para aqueles poucos cujo telefone ainda sei de cor: “Faça as malas embarque imediato montanhas.”

(Martha Medeiros. *Telegrama para você*. Disponível em: https://oglobo.globo.com, 26.01.2025. Adaptado)

03. É correto afirmar que, na descrição que a autora faz da vida de antigamente, se observa

(A) praticidade, dada a facilidade de se comunicar sem preposições e pronomes, o que torna a mensagem que se quer transmitir mais clara.

(B) posicionamento crítico, já que há certa ironia em se enaltecer o patrocínio de um evento esportivo por uma marca de cigarro.

(C) saudosismo, mas com o reconhecimento de que houve avanços que impedem o desejo de que certas atitudes do passado retornem.

(D) transparência, pois os sentimentos, mesmo os ruins, estavam expostos e eram discutidos abertamente pela sociedade.

(E) conexão das pessoas, que, mesmo conscientes dos males do cigarro, se reuniam para fumar e socializar.

04. Assinale a alternativa em que o trecho destacado estabelece relação de sentido de causa no contexto em que foi empregado.

(A) “Pagávamos as contas com dinheiro vivo, a não ser valores maiores, **quando usávamos cheque**.” (1º parágrafo)

(B) “Parece mentira, mas há documentos, testemunhos, sobreviventes: **era assim mesmo**.” (4º parágrafo)

(C) “Quem viveu isso lembra com saudade, **mas sem perder o juízo**…” (4º parágrafo)

(D) “**Por ganância e irresponsabilidade de alguns**, ficará cada vez mais difícil perceber o que parece mentira e o que parece verdade.” (4º parágrafo)

(E) “… dá vontade de enviar um telegrama para aqueles poucos **cujo telefone ainda sei de cor**...” (5º parágrafo)

05. A norma-padrão de concordância nominal e verbal, assim como a de emprego do acento indicativo de crase, está respeitada em:

(A) É importante praticar boas ações sem olhar à quem, tornando-se um craque em cidadania.

(B) O cheque é desconhecido à alguns, mas há quem não saia de casa sem levá-los.

(C) Eram fartos em voos o serviço de bordo, mas às empresas os encolheram para economizar.

(D) Apesar de considerar as amizades importante, hoje é difícil dar atenção à todas elas.

(E) Tinha-se mais liberdade antes, mas a sociedade perdeu-a devido à violência nas cidades.

06. Um frasco de *spray* medicamentoso contém, no total, 7,2 gramas de substância ativa, diluídas homogeneamente em um volume de líquido que rende, no total, 120 jatos (doses). A quantidade de substância ativa presente em cada um desses jatos corresponde, então, a

(A) 0,6 mg.

(B) 1,6 mg.

(C) 6 mg.

(D) 16 mg.

(E) 60 mg.

07. Em radiologia, mGy (miligray) é uma unidade de medida da dose de radiação absorvida pelo tecido. É uma subunidade do Gray (Gy), a unidade SI de dose absorvida de radiação ionizante.

Suponha que, para certo exame de tomografia, a norma regulamentar determine que 50 mGy é o nível de dose média permitido para o exame em questão. Se em certo laboratório, a dose constatada foi de 56,25 mGy, é correto afirmar que esse valor ultrapassou o valor determinado pela norma em

(A) 6,25%

(B) 10%

(C) 12,5%

(D) 17,5%

(E) 25%

08. Uma caixa para transporte de medicamentos possui a forma de um cubo, e sua superfície total mede 3.456 cm².

O volume dessa caixa corresponde, então, a

(A) 12.500 cm³.

(B) 13.824 cm³.

(C) 19.102 cm³.

(D) 33.177 cm³.

(E) 41.278 cm³.

R A S C U N H O

09. Um estudo feito a partir de 2.000 mortes por certa doença em grupos de risco separou essas mortes em subgrupos de risco, de acordo com o gráfico a seguir:



Seja M_1 a média aritmética simples entre os números de mortes nos subgrupos A e B, e seja M_2 a média aritmética simples entre os números de mortes nos subgrupos C e D. A diferença $M_2 - M_1$ é igual a

(A) 260.

(B) 220.

(C) 160.

(D) 120.

(E) 100.

10. Uma compra com 50 frascos de álcool em gel e 120 máscaras de proteção facial custou R$ 1.003,00. Sob os mesmos preços unitários desses itens, outra compra, de 8 frascos de álcool em gel e 40 máscaras de proteção facial, custou R$ 252,00. Com base nessas informações, é correto concluir que, nessas compras, cada frasco de álcool em gel foi vendido a

(A) R$ 4,40.

(B) R$ 6,50.

(C) R$ 8,00.

(D) R$ 9,50.

(E) R$ 12,40.

R A S C U N H O

Informática

11. Um técnico estava editando um texto em um editor de textos do MS-Windows 10, em sua configuração padrão, e por diversas vezes utilizou o atalho por teclado Ctrl + C, usando o recurso de histórico da área de transferência. Em certo momento, decidiu acessar o histórico da área de transferência para colar algo no texto e, para isso, ele utilizou o atalho por teclado _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) Tecla Windows + C

(B) Ctrl + V

(C) Tecla Windows + V

(D) Ctrl + H

(E) Tecla Windows + H

12. O parágrafo a seguir, contendo 6 palavras, estava sendo editado por meio do MS-Word 2016, em sua configuração padrão.

Hospital das **Clínicas** – *Medicina* de Marília

O usuário então selecionou todo o parágrafo e pressionou os ícones das formatações Sublinhado e Itálico, nessa ordem. O número de palavras que apresenta formatação Sublinhado e o número de palavras que apresenta formatação Itálico são, respectivamente,

(A) 6 e 0.

(B) 6 e 2.

(C) 6 e 6.

(D) 3 e 6.

(E) 3 e 0.

13. A planilha a seguir foi elaborada por meio do MS-Excel 2016, em sua configuração padrão.

	A	B	C
1	2	1	1
2	4	5	2
3	3	4	3
4	2	2	2
5	2	3	1
6			4

Foram digitados números nas primeiras 5 linhas, e na célula C6 há uma fórmula.

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula adicionada na célula C6 que retorna o valor exibido, conforme a imagem.

(A) =MAIOR(A1:A5;4)

(B) =MENOR(C1:C5;5)

(C) =MAIOR(A1:C5;4)

(D) =MENOR(B2:B4;2)

(E) =MÉDIA(A2:C4)

14. Por meio do MS-PowerPoint 2016, em sua configuração padrão, um usuário criou uma apresentação contendo 7 slides (numerados de 1 a 7), sem nenhum efeito de transição nem animação configurados. Apenas o slide 2 estava marcado como oculto. A partir desse momento, o usuário editou o texto do slide 4, marcou-o como oculto e iniciou o modo de apresentação de slides pressionando Shift + F5. Assim que a apresentação foi iniciada, pressionou duas vezes a seta para a esquerda e duas vezes a seta para a direita, nessa ordem.

Assinale a alternativa que apresenta o slide em exibição após as ações descritas.

(A) 7

(B) 5

(C) 3

(D) 6

(E) 4

15. Um usuário abriu um e-mail recebido por meio do Gmail, em sua configuração padrão, e na parte superior da tela havia o ícone exibido a seguir.

A ação do ícone exibido é

(A) Denunciar SPAM.

(B) Arquivar.

(C) Marcar como importante.

(D) Marcar como lida.

(E) Marcar como não lida.

Política de Saúde

16. O Decreto nº 7.508/2011 define o conceito de portas de entradas às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde. Segundo o decreto referido, portas de entrada são

(A) serviços de atenção à saúde internos ou externos ao SUS.

(B) somente os serviços de atendimento de urgência no SUS.

(C) serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

(D) serviços de alta complexidade do SUS.

(E) serviços que oferecem atendimento por ordem de agendamento.

17. Um usuário do SUS, de 37 anos de idade, trabalhador de limpeza de um condomínio residencial próximo a uma unidade básica de saúde (UBS), é levado ao serviço de saúde com queixa de lombalgia intensa há alguns dias, desde que teve que fazer uma limpeza pesada do salão de festa após um casamento. Sobre esse caso, é correto afirmar que o paciente

(A) deve ser atendido, medicado e encaminhado a especialista, se necessário.

(B) pode ser atendido somente após o atendimento de todos os pacientes agendados.

(C) deve ser necessariamente encaminhado a um serviço de urgência.

(D) deve ser encaminhado imediatamente a um ortopedista.

(E) deve agendar atendimento, pois não se trata de quadro de urgência.

18. Uma trabalhadora doméstica, de 30 anos de idade, procura uma UBS com queixa de dor em ombros e punhos há 5 meses. É diarista há 8 anos, trabalha de segunda a sábado e às vezes no domingo. É examinada pelo médico, que diagnostica quadro de lesões por esforços repetitivos, com bursite de ombros e tendinite de punhos, provocadas por sobrecarga do sistema musculoesquelético, pois faz faxina pesada, lava e passa roupas pelo menos 6 vezes por semana. Assinale a alternativa correta sobre o caso.

(A) Trata-se de um caso relacionado ao trabalho e qualquer conduta só pode ser tomada depois de a trabalhadora ser avaliada por ortopedista.

(B) O caso dessa doença relacionada ao trabalho é de notificação compulsória no SUS.

(C) O caso é de notificação compulsória no SUS somente se a trabalhadora for registrada em carteira de trabalho.

(D) O caso deve ser encaminhado ao Ministério do Trabalho, pois o SUS não atende trabalhadores com doenças relacionadas ao trabalho.

(E) A trabalhadora deve ser proibida pelo médico de trabalhar 6 dias por semana.

19. Assinale a alternativa que apresenta duas vacinas que uma criança de 3 anos deve ter recebido, segundo o Calendário Nacional de Vacinação.

(A) Vacina HPV papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4 - recombinante) e vacina BCG (dose única).

(B) Primeiro e segundo reforços da vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (DTP).

(C) Vacina BCG (dose única) e vacina hepatite B (recombinante HB).

(D) Reforço da vacina febre amarela (atenuada) e vacina HPV papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4 - recombinante).

(E) Duas doses da vacina pneumocócica 23-valente (Pneumo 23).

20. Assinale a alternativa que apresenta dois procedimentos que podem ser realizados na atenção básica.

(A) Lavagem gástrica e biópsia de tumor em mama.

(B) Remoção de melanoma e remoção de corpo estranho nasal.

(C) Remoção de corpo estranho ocular e endoscopia.

(D) Radioterapia e exérese de lipoma.

(E) Drenagem de abcesso e lavagem auricular.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Na sala de vacinas, o técnico de enfermagem (TE) constatou que, de acordo com o cronograma vacinal, uma criança menor de 2 anos deveria receber diversas vacinas por via intramuscular.

Frente a essa situação, havendo a necessidade de aplicar mais de uma vacina em um mesmo grupo muscular, de acordo com recomendação do Ministério da Saúde, o TE deve respeitar a distância de _____ cm entre uma vacina e outra, com o propósito de _____.

Assinale a alternativa que completa, de forma correta e respectivamente, a afirmação.

(A) 2,5 ... permitir diferenciar eventuais eventos adversos locais

(B) 2,0 ... evitar a diminuição do efeito da vacina

(C) 1,5 ... permitir diferenciar eventuais eventos adversos locais

(D) 1,0 ... evitar a diminuição do efeito da vacina

(E) 0,5 ... evitar a diminuição do efeito da vacina

22. Em uma maternidade, a mãe e o recém-nascido estão de alta. Considerando que o bebê, eutrófico, estava com 3 dias de idade, atendendo ao protocolo da instituição, o técnico de enfermagem (TE) foi solicitado para realizar a coleta de material para a realização do teste de triagem neonatal biológica (“teste do pezinho”).

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, ao realizar esse procedimento, o TE deve, entre outras ações,

(A) usar luvas estéreis ao realizar a coleta de sangue do bebê.

(B) realizar compressa fria, por cinco minutos, no local da punção, antes de proceder à coleta de material.

(C) selecionar uma das laterais da região plantar do calcanhar da criança para realizar a punção.

(D) realizar a punção do local escolhido com lanceta apropriada para a coleta de sangue periférico ou agulha hipodérmica com calibre 30 x 8.

(E) observar que a punção só poderá ser realizada após a assepsia do local selecionado com solução degermante.

23. Ao orientar as mulheres a respeito do preparo necessário para a realização do exame citopatológico para a prevenção do câncer de colo uterino, o técnico de enfermagem deve enfatizar que

(A) é necessário observar abstinência sexual por 7 dias, antes da data aprazada para a coleta de material para o exame, caso não seja utilizado o preservativo.

(B) deverá ser realizada a aplicação de lubrificante vaginal 2 horas antes do horário agendado para a realização do exame.

(C) a realização de ultrassonografia por via vaginal (transvaginal) deve ser evitada nas 48 horas anteriores à coleta de material para realização do exame.

(D) a aplicação de medicamentos por via vaginal pode ser realizada normalmente, até 6 horas antes da realização do exame.

(E) a realização desse exame está contraindicada no primeiro trimestre de gestação.

24. J.C., 30 anos, com 9 semanas de gestação, compareceu à unidade básica de saúde para coleta de sangue para exames. Durante o atendimento pelo técnico de enfermagem (TE), a gestante queixou-se de sialorreia.

Frente a essa situação, com base nas recomendações do Ministério da Saúde para a redução desse tipo de desconforto, o TE deve orientar J.C., entre outras ações, a

(A) ingerir, diariamente, 1 comprimido de clorpromazina pela manhã, 30 minutos antes de se levantar.

(B) evitar deglutir a saliva, utilizando lenços de papel ou tecido macio para absorver seu excesso.

(C) consumir até três refeições diárias, ricas em proteínas e pobres em hidratos de carbono, dando preferência a alimentos sólidos, sem molhos e bem temperados.

(D) ingerir líquidos em abundância para evitar a desidratação, principalmente em dias de calor.

(E) encaminhar a gestante ao pré-natal de alto risco para avaliação e conduta.

25. A obtenção de valores fidedignos da pressão arterial (PA) de uma gestante está relacionada à técnica correta para sua aferição. Ao realizar esse procedimento, o técnico de enfermagem deve observar as recomendações do Ministério da Saúde para a aferição da PA de gestantes que, entre outras ações, determinam que a gestante esteja _____, o manguito seja posicionado no braço _____, mantendo-se este _____. Deve-se considerar o valor da pressão diastólica pelo _____ ruído de Korotkoff, correspondente ao _____ do som da bulha.

Assinale a alternativa que completa, de forma correta e respectivamente, a afirmação.

(A) em decúbito lateral esquerdo ... esquerdo ... na altura do coração ... 1º (primeiro) ... aparecimento

(B) em decúbito lateral direito ... direito ... apoiado na lateral do corpo ... 4º (quarto) ... desaparecimento

(C) sentada ... direito ... elevado na altura do coração ... 5º (quinto) ... desaparecimento

(D) em decúbito lateral esquerdo ... direito ... apoiado na lateral do corpo ... 4º (quarto) ... enfraquecimento

(E) sentada ... esquerdo ... elevado, pouco acima da altura do coração ... 1º (primeiro) ... aparecimento

Para responder às questões de números **26** e **27**, considere o relato hipotético apresentado a seguir:

G.J., 20 anos, eutrófico, portador de diabete melito tipo 1, foi admitido na unidade de clínica médica, com diagnóstico de infecção urinária. Ao se preparar para realizar a medicação de G.J., o técnico de enfermagem (TE) constatou que a prescrição médica determinava, entre outros medicamentos, a administração de insulina Lispro (Humalog), por via subcutânea, utilizando-se o dispositivo caneta para a aplicação.

26. Frente a situação apresentada, com o objetivo de monitorar o paciente, em conformidade com orientação da Sociedade Brasileira de Diabete (SBD), o TE deve considerar que o início (I) e o pico (P) da ação da insulina prescrita são, respectivamente:

(A) I = 30 a 60 minutos; P = 2 a 3 horas.

(B) I = 5 a 15 minutos; P = 30 minutos a 2 horas.

(C) I = 2 a 4 horas; P = 4 a 10 horas.

(D) I = 5 a 15 minutos; P = 2 a 3 horas.

(E) I = 30 a 60 minutos; P = 4 a 10 horas.

27. Uma vez que a caneta para a aplicação da insulina disponível está montada com agulha de 4 mm de comprimento, ao administrar o medicamento, o TE deve

(A) considerar que é obrigatória a realização da prega cutânea, quando a insulina for aplicada no abdome.

(B) introduzir a agulha em ângulo de 45 graus quando a insulina for aplicada na face posterior do braço.

(C) manter o botão injetor da caneta pressionado até a retirada total da agulha do tecido subcutâneo.

(D) considerar que é desnecessária a realização de assepsia da pele antes da aplicação.

(E) realizar massagem vigorosa no local após a aplicação, para facilitar a absorção da insulina.

28. Ao longo do processo de envelhecimento, é correto observar alterações em diferentes sistemas, entre elas, a dificuldade em discriminar sons, evidenciada, entre outras ações, pela solicitação do idoso para que sejam repetidas as palavras, responder de forma inadequada a uma pergunta ou a colocação da orelha adiante para ouvir.

Frente a essa situação, ao prestar cuidados de enfermagem, o profissional deve

(A) ficar de frente para a pessoa idosa ao fornecer informações ou realizar orientações.

(B) utilizar um tom de voz agudo, pois a pessoa idosa com presbiacusia irá compreender melhor o que está sendo dito.

(C) evitar usar sinais não verbais enquanto conversa com a pessoa idosa, o que poderá confundi-la, dificultando a compreensão da mensagem.

(D) falar próximo à orelha, sem falar alto, posicionando-se por trás da pessoa idosa.

(E) colocar uma ou ambas as mãos em concha ao redor da boca para direcionar melhor o som da fala às orelhas do paciente.

29. Pacientes obesos, portadores de insuficiência cardíaca e/ou varicosidades apresentam risco aumentado para o desenvolvimento de tromboembolismo venoso (TEV). Ao prestar assistência de enfermagem para pacientes com essas condições, o técnico de enfermagem deve estar atento à detecção precoce de sinais e sintomas dessa complicação que, quando ocorre em veias profundas, inclui: _____, entre outros itens. Uma vez que uma das mais sérias complicações do tromboembolismo venoso é _____, em pacientes com história anterior de TEV, por serem considerados de maior risco, devem ser instituídas medidas para a prevenção de um novo episódio que incluem, entre outras ações, _____.

Assinale a alternativa que completa, de forma correta e respectivamente, a afirmação.

(A) queixa de dor intensa e aguda, dormência, extremidade fria e cianose do membro afetado e claudicação ... a embolia pulmonar ... o estímulo à deambulação

(B) elevação da temperatura da superfície da perna, edema em toda extensão do membro afetado, calor e rubor ... a úlcera venosa ... repouso absoluto no leito

(C) queixa de dormência e formigamento, dor tipo queimação na medida em que a cor da pele varia entre branca, azulada e vermelha ... a gangrena do membro afetado ... manter o membro afetado apoiado em nível mais alto do que o coração

(D) ingurgitamento do tornozelo, edema, elevação da temperatura da superfície da perna, especialmente da panturrilha ou do tornozelo do membro afetado ... a embolia pulmonar ... o encorajamento à deambulação

(E) queixa de dormência e formigamento, dor tipo queimação e extremidade cianótica ... a úlcera venosa ... repouso e manter o membro afetado mais baixo do que o coração

30. Em uma unidade de clínica médica, é comum a internação de pacientes, sob os cuidados da equipe de hematologia, para receber transfusão de hemocomponentes como parte do tratamento.

Frente a essa situação, ao administrar medicamentos prescritos para esses pacientes, o técnico de enfermagem deve considerar que o líquido de utilização intravenosa que pode ser administrado em conjunto com a transfusão de hemocomponente é

(A) solução de Ringer lactato.

(B) solução salina isotônica 0,9%.

(C) solução de Parkland.

(D) soro glicosado 5%.

(E) manitol a 20%.

31. Paciente adulto, encontra-se internado na unidade de clínica cirúrgica com diagnóstico de neoplasia intestinal. Submetido à cirurgia abdominal há 4 dias, está sendo alimentado via sonda nasoenteral (pós-pilórica), de forma intermitente, por gavage. Ao consultar a prescrição de enfermagem para esse paciente, o técnico de enfermagem constatou que, entre outros cuidados, deveria "administrar a dieta prescrita em temperatura ambiente".

Esse cuidado tem como objetivo prevenir

(A) pneumonia por aspiração.

(B) desidratação.

(C) constipação intestinal.

(D) esvaziamento gástrico lento.

(E) cólicas gástricas e desconforto.

32. Em uma unidade de pronto atendimento (UPA), ao avaliar um paciente, o médico, suspeitando se tratar de um caso de infarto agudo do miocárdio (IAM), solicitou ao técnico de enfermagem (TE) a realização de eletrocardiograma com 12 derivações.

Ao realizar esse procedimento, para obter a derivação V1, o TE deve posicionar o eletrodo no

(A) quarto espaço intercostal, à direita, próximo do osso esterno.

(B) quarto espaço intercostal, à esquerda, próximo do osso esterno.

(C) quinto espaço intercostal, linha média axilar esquerda.

(D) membro superior direito.

(E) membro inferior esquerdo.

33. Adulto, vítima de incêndio há 30 minutos, apresentando queimaduras de primeiro e segundo graus no tronco e membros superiores, foi admitida na sala de emergência.

Frente a essa situação, de acordo com recomendação do Ministério da Saúde, entre outros cuidados, a vítima deve ser posicionada

(A) em Trendelenburg.

(B) em Trendelenburg invertida.

(C) sentada, com os membros inferiores elevados.

(D) em decúbito dorsal horizontal.

(E) com a cabeceira elevada a 30º.

34. Considere as recomendações do Ministério da Saúde a respeito das vacinas oferecidas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), e assinale a alternativa correta.

(A) A vacina BCG deve ser administrada o mais precocemente possível, ainda na maternidade, para recém-nascidos com peso igual ou maior a 1800 g.

(B) Meninas e meninos, na faixa etária de 9 a 14 anos de idade, devem receber 2 doses da vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante) – HPV4, com intervalo de 30 dias entre elas.

(C) Até 15 minutos após a administração da vacina rotavírus humano, caso a criança cuspa a vacina, regurgite, ou vomite, uma nova dose da vacina deve ser administrada imediatamente.

(D) Quando necessária a aplicação da vacina febre amarela atenuada (VFA) em nutrizes com bebês de até 6 meses de idade, o aleitamento materno deve ser suspenso por dez dias após sua administração.

(E) A aplicação da vacina meningocócica ACWY (conjugada), indicada para a prevenção da doença sistêmica causada pela *Neisseria meningitidis* do soro grupo ACWY, é recomendada para crianças aos 3 e 5 meses.

35. Em uma instituição hospitalar, um técnico de enfermagem (TE), 32 anos, sexo masculino, foi encaminhado ao ambulatório de saúde ocupacional para avaliação e orientação, pois, a partir da próxima escala, passaria a realizar suas atividades na unidade de cuidados intensivos neonatal (UCIN).

Frente a essa situação, uma vez que o TE apresentava o esquema vacinal completo para as vacinas dupla adulto, hepatite B, tríplice viral, gripe e covid-19, de acordo com recomendação do Ministério da Saúde, antes de ser transferido para o setor, esse trabalhador deverá ser informado que, para atuar na UCIN,

(A) seu esquema vacinal está completo e, quando aplicável, os prazos para reforço das vacinas deverão ser cumpridos rigorosamente.

(B) necessita tomar as vacinas: Vacina meningocócica C (Conjugada) – MenC e pneumocócica 23-valente (polissacarídica) – VPP23, em dose única.

(C) necessita tomar uma dose de reforço das vacinas BCG e sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada) – SCRV.

(D) necessita tomar a vacina adsorvida difteria, tétano e pertússis (acelular) tipo adulto – dTpa (uma dose, com reforço a cada 10 anos) e varicela, caso não tenha história de varicela ou apresente história duvidosa.

(E) necessita tomar uma dose de reforço das vacinas BCG e sarampo, caxumba, rubéola (atenuada) – SCR, caso a última dose da vacina SCR tenha sido administrada há mais de 5 anos.

36. A adequada coleta de escarro é muito importante para a realização da baciloscopia, da cultura para micobactéria com identificação de espécie e, recentemente, do teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB), pois esses testes dependem da quantidade e da qualidade da amostra de escarro para que seus resultados sejam confiáveis.

Assim sendo, ao realizar o procedimento de coleta de escarro, o técnico de enfermagem deve considerar que

(A) em unidades básicas de saúde (UBS), as coletas devem ser realizadas em ambiente privado, preferencialmente no banheiro.

(B) o paciente deve ser orientado a realizar bochecho e gargarejo com solução antisséptica bucal 15 minutos antes da coleta da amostra.

(C) devem ser coletados de 1 a 4 mL de escarro para que a realização e desempenho do exame de baciloscopia não fique prejudicado.

(D) caso o paciente esteja internado e apresente dificuldade para tossir, a amostra pode ser obtida por meio da aspiração da faringe.

(E) o aspecto ideal da amostra, obtida após esforço de tosse, é mucopurulento.

37. Em relação às doenças de notificação compulsória, é correto afirmar que

(A) no âmbito da equipe de saúde, o preenchimento das fichas de notificação é atribuição exclusiva do médico que realizou o diagnóstico ou do enfermeiro responsável pelo doente.

(B) nos casos de suspeita de sarampo, o preenchimento da ficha de notificação compulsória e seu registro no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan só deve ser realizado após confirmação laboratorial ou clínica da doença.

(C) os casos de violência sexual, independentemente da idade da vítima, devem ser notificados à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em até 24 horas.

(D) os casos suspeitos ou confirmados de hanseníase devem ser notificados às secretarias municipal e estadual de saúde em até 24 horas, devido a sua alta transmissibilidade.

(E) os serviços privados de saúde estão dispensados de realizar o preenchimento das fichas de notificação de doenças, agravos e eventos de saúde pública, pois essa atividade é de responsabilidade dos serviços de saúde públicos.

38. Define-se como _____ o processo físico ou químico que destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies. Entre os diversos agentes químicos que possuem esse tipo de ação, encontra-se _____ indicado(a) para a desinfecção de _____, sendo recomendado(a) _____ para obtenção do resultado esperado.

Assinale a alternativa que completa, de forma correta e respectivamente, a afirmação.

(A) desinfecção de nível intermediário ... o álcool etílico na concentração de 70% ... materiais não críticos, semicríticos e superfícies ... a fricção por 30 segundos

(B) desinfecção de alto nível ... a solução de glutaraldeído 2% ... produtos para a saúde confeccionados em borracha e plástico ... a ativação prévia do produto

(C) desinfecção de nível intermediário ... a solução de quaternário de amônia ... materiais não críticos e superfícies ... seu uso sem diluição

(D) desinfecção de alto nível ... a solução de hipoclorito de sódio ... produtos de inaloterapia e oxigenoterapia ... a exposição do produto por 30 minutos à solução na concentração de 200 ppm

(E) desinfecção de nível intermediário ... o ácido peracético ... produtos de inaloterapia e materiais de assistência ventilatória ... a exposição do produto por 15 minutos à solução na concentração de 500 ppm

39. Em uma quinta-feira, familiares de O.V., 40 anos, sexo feminino, agente administrativo, procuraram a instituição onde ela trabalhava informando que esta havia sido atropelada, há 1 dia, ao descer do ônibus quando retornava, de forma habitual e diretamente, do trabalho para casa. Relataram que, devido à gravidade dos ferimentos, evoluíra para óbito há 12 horas.

Uma vez que o contrato de trabalho de O.V. era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que diz respeito a emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), é correto afirmar que

(A) por se tratar de acidente ocorrido fora da empresa, a instituição está dispensada de emitir a CAT.

(B) a instituição deve emitir a CAT em até 24 horas, a contar da data em que a instituição tomou conhecimento do acidente.

(C) a instituição deve emitir a CAT em até 7 dias, a contar da data em que a instituição tomou conhecimento do acidente.

(D) a instituição deve emitir a CAT em até 72 horas, a contar da data em que ocorreu o acidente.

(E) a instituição deve emitir a CAT em até 48 horas, a contar da data em que ocorreu o acidente.

40. Considere o estabelecido pela Norma Reguladora nº 32 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde (NR 32), e assinale a alternativa correta.

(A) Quando os profissionais de saúde fazem uso de lentes de contato, o manuseio dessas lentes só pode ser realizado nos postos de enfermagem.

(B) A higienização das vestimentas utilizadas nos serviços de tratamento intensivo, unidades de internação pediátrica, berçários e unidades de pronto-atendimento, entre outras, são de responsabilidade do empregador.

(C) Em situação de emergência, os cilindros de oxigênio devem ser transportados, com capacete, na posição horizontal.

(D) Com o objetivo de reduzir os riscos de acidentes com materiais perfurocortantes, os serviços de saúde devem constituir uma comissão gestora multidisciplinar composta por um representante de cada um dos seguintes setores ou grupos: SESMT, CIPA, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, COREN e CRM.

(E) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após serem submetidos, obrigatoriamente, à avaliação médica e emissão de documento de liberação para o trabalho.

41. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 5, a organização deve promover treinamento para o representante nomeado da NR-5 e para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse compreendendo, obrigatoriamente, entre outros temas,

(A) combate a incêndios.

(B) prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no trabalho.

(C) qualidade de vida.

(D) suporte básico de vida.

(E) suporte avançado de vida.

42. Após trabalhar em uma instituição hospitalar por 10 anos, um técnico do setor de manutenção solicitou sua demissão. Uma vez que esse tipo de estabelecimento é classificado como grau de risco 3, o trabalhador estará dispensado de realizar o exame demissional se o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de

(A) 180 dias.

(B) 155 dias.

(C) 135 dias.

(D) 120 dias.

(E) 90 dias.

43. A Norma Regulamentadora 9 (NR-9), Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, estabelece o nível de ação como o valor acima do qual devem ser implementadas ações de controle sistemático, de modo a reduzir a chance de que as exposições ocupacionais a agentes químicos ultrapassem os limites de exposição.

Considerando-se que, para a substância X, o limite de tolerância é de 780 ppm, o valor acima do qual devem ser implementadas ações de controle é

(A) 390 ppm.

(B) 312 ppm.

(C) 234 ppm.

(D) 156 ppm.

(E) 78 ppm.

44. No que diz respeito à exposição a agentes biológicos, a insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Segundo a NR 15 – Atividades e operações insalubres, faz jus a insalubridade de grau máximo, entre outras condições, o trabalho ou operações, em contato permanente com

(A) pacientes ou com material infecto-contagiante, em hospitais e serviços de emergência.

(B) pacientes ou com material infecto-contagiante em laboratórios de análise clínica e histopatologia.

(C) pacientes em ambulatórios e postos de vacinação.

(D) pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.

(E) materiais utilizados em pacientes, não previamente esterilizados.

45. Quando ocorre a exposição a dois ou mais agentes químicos no ambiente de trabalho, podem ocorrer diferentes tipos de interações entre estes nas fases de toxicocinética e toxicodinâmica.

Assim sendo, associe as duas colunas, relacionando os tipos de interação entre os agentes químicos e seu conceito.

1. Efeito aditivo.
2. Antagonismo.
3. Potenciação.
4. Sinergismo.

( ) O efeito produzido por dois ou mais agentes tóxicos é maior do que a soma dos efeitos produzidos individualmente por cada agente.

( ) Ocorre quando o efeito de um agente tóxico é aumentado por agir simultaneamente com outro agente.

( ) O efeito produzido por dois ou mais agentes tóxicos é minimizado; um agente reduz o efeito do outro.

( ) A magnitude do efeito produzido por dois ou mais agentes tóxicos é quantitativamente igual à soma dos efeitos produzidos individualmente por cada agente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dessa associação.

(A) 1, 2, 3, 4.

(B) 4, 3, 2, 1,

(C) 1, 4, 2, 3.

(D) 3, 4, 2, 1.

(E) 2, 1, 3, 4.

46. Ao prestar os cuidados de enfermagem aos pacientes, o técnico de enfermagem deve estar atento ao tempo de uso dos equipos utilizados para infusão contínua de soluções. Com o propósito de prevenir infecções de corrente sanguínea, o parecer elaborado pela Câmara Técnica do Conselho Regional de São Paulo – COREN-SP recomenda que a troca de equipos de infusão contínua não ocorra em intervalos inferiores a

(A) 96 horas.

(B) 120 horas.

(C) 144 horas.

(D) 156 horas.

(E) 168 horas.

47. Os resíduos de serviços de saúde (RSS) resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos, atenuados ou inativados, incluindo frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutilizado ou com restos do produto e seringas, quando desconectadas, são classificados como grupo

(A) E, e devem ser descartados no local de sua geração, imediatamente após o uso, em caixa coletora de material perfurocortante.

(B) B, e devem ser acondicionados em saco plástico branco leitoso identificado pelo símbolo de risco biológico, acrescido da expressão RESÍDUO INFECTANTE.

(C) A1, e devem ser tratados por meio de processo físico ou outro processo validado para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana antes da disposição final adequada.

(D) A4, e devem ser descartados no local de sua geração, imediatamente após o uso, em caixa coletora de material rígido resistente à umidade, identificada com a expressão RESÍDUO INFECTANTE.

(E) A2, e devem ser descartados no local de sua geração, imediatamente após o uso, em caixa coletora de material perfurocortante.

48. A legislação, ao estabelecer a obrigatoriedade de as empresas com 100 (cem) ou mais empregados preencherem uma parcela de seus cargos com portadores de deficiência (cota), tem proporcionado o acesso ao trabalho de pessoas, que, sem essa tutela, dificilmente teriam essa oportunidade. Essa cota depende do número geral de empregados que a empresa tem no seu quadro, sendo que para empresas com 100 a 200 funcionários, a proporção estabelecida legalmente é de, no mínimo:

(A) 2%

(B) 3%

(C) 4%

(D) 5%

(E) 10%

49. No que diz respeito a licença da funcionária ou servidora gestante, o Decreto nº 29.180, de 11 de novembro de 1988, que institui o Regulamento de Perícias Médicas – R.P.M. e dá outras providências, estabelece que

(A) será concedida a licença antes do parto, a partir da 30ª semana de gestação, salvo prescrição médica em contrário, mediante perícia médica realizada em local autorizado para esse fim.

(B) será concedida a licença após o parto mediante a apresentação da certidão de nascimento da criança.

(C) uma vez publicada a decisão sobre o pedido da licença, caso a criança venha a falecer durante o período concedido, a servidora deverá retornar ao trabalho 15 dias após o fato, estando dispensada da realização de perícia médica.

(D) a funcionária ou servidora que desejar usufruir da licença antes do parto deverá solicitar ao médico obstetra, que acompanha seu pré-natal, o preenchimento da Guia para Perícia Médica (G.P.M.), que será apresentada no momento da perícia médica para a conceção da licença.

(E) quando a funcionária ou servidora gestante adoecer em localidade diversa de sua sede, a G.P M. deverá ser por ela preenchida e enviada por email, e a perícia médica para a concessão da licença será realizada por meio de teleconsulta.

50. Após investigação, constatou-se que o profissional de enfermagem cometeu infração ética ao revelar em suas redes sociais; fato que teve conhecimento em razão de sua atividade profissional, sem o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal.

Frente a essa situação, de acordo com o estabelecido pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o profissional de enfermagem está sujeito à penalidade de

(A) advertência verbal, que consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

(B) cassação, que consiste na perda definitiva do direito ao exercício da Enfermagem, que será divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

(C) censura, que consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada em seu prontuário, na presença de duas testemunhas.

(D) multa, que consiste na obrigatoriedade de pagamento de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.

(E) suspensão, que consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 90 (noventa) dias, e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.

Confidencial até o momento da aplicação.