



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboa.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2025

PROVA OBJETIVA

Cargo: Enfermeiro

Data da aplicação: 18/05/2025

Duração: 3h30min

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome Legível do Candidato	RG ou CPF

Terra Boa, _____, _____ de 2025

Assinatura do candidato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

1. Ao iniciar seu trabalho em um hospital em Cianorte, um técnico de enfermagem é orientado sobre a importância da biossegurança. Qual o principal objetivo dessas medidas no ambiente de saúde?

- A) Reduzir os custos hospitalares com materiais descartáveis.
- B) Aumentar a velocidade dos procedimentos de enfermagem.
- C) Prevenir e minimizar riscos à saúde dos trabalhadores, pacientes e meio ambiente.
- D) Facilitar o descarte de resíduos comuns.

2. Um paciente é admitido na unidade de isolamento respiratório com diagnóstico confirmado de tuberculose pulmonar bacilífera. Para prestar os cuidados necessários com segurança, qual Equipamento de Proteção Individual (EPI) é INDISPENSÁVEL para o técnico de enfermagem ao entrar no quarto?

- A) Apenas luvas de procedimento.
- B) Máscara cirúrgica comum.
- C) Máscara de proteção respiratória (N95 ou PFF2).
- D) Apenas óculos de proteção.

3. Em uma reunião de equipe para discutir as altas taxas de infecção do sítio cirúrgico na clínica onde você trabalha, qual das seguintes ações realizadas pela equipe de enfermagem é destacada como fundamental na prevenção dessas Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)?

- A) Utilizar o mesmo termômetro em vários pacientes sem desinfecção intermediária.
- B) Manter as portas dos quartos dos pacientes sempre abertas para ventilação.
- C) Realizar a higienização das mãos corretamente e nos momentos indicados.
- D) Reutilizar agulhas descartáveis após esterilização.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

4. Um paciente no pós-operatório imediato de uma cirurgia abdominal queixa-se de dor intensa (escala 10/10). O médico prescreve um analgésico potente para alívio rápido. Qual via de administração escolhida pelo médico garantirá a absorção mais rápida e o efeito sistêmico imediato?

- A) Oral (VO).
- B) Subcutânea (SC).
- C) Intramuscular (IM).
- D) Intravenosa (IV ou EV).

5. Ao preparar a bandeja de medicamentos para os pacientes da enfermaria no início do turno, o técnico de enfermagem confere cada item da prescrição. Para garantir a segurança, ele deve seguir rigorosamente a regra dos "Certos". Qual das alternativas NÃO representa um desses "Certos" essenciais na administração?

- A) Paciente certo.
- B) Medicamento certo.
- C) Médico Certo..
- D) Horário certo.

6. Durante a infusão de um contraste iodado para um exame de tomografia computadorizada, o paciente começa a apresentar prurido intenso, edema de glote e dificuldade respiratória significativa. Diante dessa suspeita de reação anafilática, qual a primeira ação do técnico de enfermagem que acompanha o paciente?

- A) Administrar um analgésico.
- B) Aumentar a velocidade de infusão da medicação.
- C) Interromper imediatamente a infusão e comunicar o enfermeiro/médico responsável pelo exame.
- D) Oferecer água ao paciente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

7. A prescrição médica para um paciente pediátrico internado é de 500 mg de Cefazolina EV. Na farmácia do hospital, o frasco disponível contém 1g e a etiqueta indica diluição em 10 mL de água destilada. Qual volume (em mL) o técnico de enfermagem deverá aspirar do frasco diluído para administrar a dose correta?

- A) 2 mL
- B) 5 mL
- C) 10 mL
- D) 1 mL

8. Ao realizar a verificação de rotina dos sinais vitais de Dona Maria, uma paciente hipertensa de 70 anos, qual procedimento o técnico de enfermagem deve seguir para aferir corretamente a Pressão Arterial (PA) no braço esquerdo, utilizando esfigmomanômetro aneróide e estetoscópio?

- A) Desinflar o manguito lentamente (2-3 mmHg por segundo) e auscultar os sons de Korotkoff sobre a artéria braquial na fossa cubital
- B) Posicionar o estetoscópio sobre a artéria radial, no punho.
- C) Utilizar um manguito pequeno (pediátrico), pois o braço dela é fino.
- D) Posicionar o braço da paciente bem abaixo do nível do coração.

9. Durante a triagem na Unidade Básica de Saúde, você avalia um senhor de 65 anos, sem queixas no momento, aguardando consulta de rotina. Ele está sentado e calmo. Ao verificar o pulso radial, qual faixa de frequência cardíaca (batimentos por minuto) seria considerada normal para ele neste estado?

- A) 40-60 bpm
- B) 60-100 bpm
- C) 100-120 bpm
- D) 120-140 bpm



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

10. Um paciente internado com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) exacerbada apresenta dispneia intensa ao ficar deitado totalmente na horizontal. Qual posição o técnico de enfermagem deve auxiliar o paciente a adotar para facilitar a respiração?

- A)** Trendelenburg (pés elevados).
- B)** Decúbito ventral (barriga para baixo).
- C)** Fowler ou semi-Fowler (cabeceira elevada).
- D)** Decúbito lateral esquerdo.

11. Antes de administrar a dieta enteral prescrita a um paciente com sonda nasogástrica (SNG) de longa permanência, qual cuidado é ESSENCIAL que o técnico de enfermagem realize para garantir a segurança e prevenir a administração da dieta nos pulmões?

- A)** Lavar a sonda apenas com soro fisiológico após a dieta.
- B)** Manter a sonda pinçada por 1 hora antes da dieta.
- C)** Verificar o posicionamento correto da sonda (ausculta epigástrica da injeção de ar, verificação do pH do aspirado gástrico, ou confirmação da marca externa da sonda).
- D)** Administrar a dieta o mais rápido possível para evitar refluxo.

12. Seu João, 80 anos, sofreu um AVC e está acamado, com mobilidade muito reduzida no leito. Qual é a principal medida de enfermagem que deve ser implementada no plano de cuidados para PREVENIR o desenvolvimento de lesões por pressão (escaras) na região sacral e calcâneos?

- A)** Manter o paciente sempre em decúbito dorsal para facilitar a alimentação.
- B)** Aplicar creme hidratante na pele apenas se já houver vermelhidão.
- C)** Realizar mudanças de decúbito (posição na cama) a cada 2 horas, utilizando coxins para aliviar pontos de pressão.
- D)** Utilizar fralda geriátrica continuamente, mesmo que o paciente não tenha incontinência.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboa.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

13. No Centro de Material e Esterilização (CME) do hospital, pinças e tesouras que foram utilizadas em uma cirurgia precisam ser reprocessadas para uso futuro. Qual processo garante a destruição de TODAS as formas de vida microbiana, incluindo os resistentes esporos bacterianos, tornando o material seguro para uso em procedimentos invasivos?

- A) Limpeza com água e sabão.
- B) Desinfecção com álcool 70%.
- C) Desinfecção de alto nível com glutaraldeído.
- D) Esterilização por autoclave (vapor sob pressão) ou óxido de etileno.

14. Após administrar uma injeção de insulina com seringa e agulha descartável em um paciente na unidade de saúde, como o técnico de enfermagem deve proceder para o descarte seguro deste material perfurocortante, conforme as normas da ANVISA (RDC 222/2018)?

- A) Descartar no lixo comum do consultório.
- B) Descartar no saco de lixo branco leitoso (infectante).
- C) Descartar o conjunto seringa-agulha (sem reencapar) diretamente em um coletor de paredes rígidas, resistente a perfurações, identificado com símbolo de risco biológico (caixa tipo Descarpac®).
- D) Reencapar a agulha cuidadosamente antes de descartar no lixo infectante.

15. Durante a realização de um curativo em uma ferida extensa, o técnico de enfermagem procura utilizar biombo ou manter a porta do quarto fechada para proteger o paciente da exposição desnecessária. Essa atitude demonstra respeito a qual dever ético fundamental?

- A) Dever de aprimorar conhecimentos técnicos.
- B) Dever de colaborar com a equipe multiprofissional.
- C) Dever de respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano.
- D) Dever de registrar as informações no prontuário.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

16. Um técnico de enfermagem que trabalha no posto de saúde do bairro é abordado por uma vizinha que pergunta insistentemente sobre o diagnóstico de outro morador que foi atendido recentemente. De acordo com o Código de Ética, como o técnico deve agir?

- A)** Fornecer informações superficiais para não ser indelicado.
- B)** Explicar educadamente que não pode fornecer informações devido ao sigilo profissional.
- C)** Confirmar o diagnóstico se a vizinha já demonstrar saber do que se trata.
- D)** Pedir autorização ao paciente por telefone para poder contar à vizinha.

17. Em um plantão noturno, o único médico da pequena unidade de pronto atendimento precisou se ausentar para acompanhar uma transferência urgente. Chega um paciente com sinais claros de dificuldade respiratória grave. Qual conduta do técnico de enfermagem seria considerada uma INFRAÇÃO ÉTICA GRAVE?

- A)** Iniciar a administração de oxigênio conforme protocolo e chamar o enfermeiro (se houver).
- B)** Verificar os sinais vitais e posicionar o paciente confortavelmente.
- C)** Tentar contatar o médico ou outro serviço de apoio imediatamente.
- D)** Negar-se a prestar os primeiros cuidados de enfermagem alegando ausência médica.

18. Durante a integração de novos técnicos de enfermagem em um hospital, o enfermeiro educador explica as atribuições de cada categoria profissional. De acordo com a Lei nº 7.498/86 (Lei do Exercício Profissional da Enfermagem), qual das seguintes atividades é uma atribuição característica do Técnico de Enfermagem?

- A)** Realizar consulta de enfermagem e estabelecer o diagnóstico de enfermagem.
- B)** Gerenciar a unidade de internação e seus recursos humanos de enfermagem.
- C)** Executar ações assistenciais de enfermagem de média complexidade, sob supervisão e orientação do Enfermeiro.
- D)** Prescrever medicamentos que não exigem receita médica.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

19. Um técnico de enfermagem recém-formado tem dúvidas se pode ou não realizar a punção de um acesso venoso periférico para administração de soroterapia prescrita. De acordo com as normativas do Sistema COFEN/CORENs e a legislação vigente, essa é uma competência do Técnico de Enfermagem?

- A)** Não, pois é um procedimento invasivo privativo do Enfermeiro.
- B)** Sim, desde que ele se sinta seguro, mesmo sem supervisão.
- C)** Sim, é uma atribuição comum do técnico, realizada sob supervisão ou orientação do Enfermeiro, conforme protocolos institucionais.
- D)** Apenas se o paciente for adulto e o acesso for de pequeno calibre.

20. Um paciente idoso, internado para tratamento de uma infecção, está lúcido e orientado, mas se recusa a tomar um dos antibióticos prescritos, alegando que o mesmo lhe causou forte náusea anteriormente. O técnico de enfermagem informa o paciente sobre a importância do medicamento, mas o paciente mantém a recusa. Qual princípio da Política Nacional de Humanização (PNH) e direito do paciente está sendo exercido e deve ser respeitado pela equipe?

- A)** Princípio da Indissociabilidade entre Atenção e Gestão.
- B)** Princípio da Transversalidade.
- C)** Direito à informação e Princípio da Autonomia.
- D)** Direito a acompanhante e visita diária.

21. Ao preparar uma injeção de anticoagulante, o técnico de enfermagem nota que a dose na seringa é dez vezes maior que a prescrita. Ele descarta a seringa e prepara a dose correta antes de administrar ao paciente. Felizmente, o paciente não sofreu nenhum dano. Como essa ocorrência deve ser classificada segundo a terminologia de segurança do paciente?

- A)** Evento adverso grave.
- B)** Incidente sem dano (ou "near miss").
- C)** Evento sentinela.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

D) Violação de procedimento.

22. Antes de administrar a primeira dose de um antibiótico a um paciente recém-admitido na enfermaria, qual procedimento é ESSENCIAL e faz parte de um protocolo internacional de segurança para evitar erros de medicação?

A) Perguntar ao colega do lado qual o leito do paciente.

B) Verificar a etiqueta de prescrição apenas pelo número do leito.

C) Conferir a identificação do paciente usando pelo menos dois identificadores (ex: nome completo e data de nascimento na pulseira e perguntando ao paciente) e comparar com a prescrição.

D) Administrar rapidamente para cumprir o horário.

23. Você está caminhando pela Praça Arthur Thomas em Cianorte e vê uma pessoa cair subitamente. Ao se aproximar, verifica que o local é seguro e constata que a vítima está inconsciente e não respira normalmente (apenas gasping). Qual a sua PRIMEIRA ação imediata, seguindo as diretrizes de Suporte Básico de Vida (BLS)?

A) Iniciar imediatamente 30 compressões torácicas.

B) Procurar alguém que tenha um desfibrilador por perto.

C) Tentar sentir o pulso carotídeo por 15 segundos.

D) Gritar por ajuda e acionar o serviço médico de emergência (SAMU 192 ou SIATE 193) ou instruir alguém a fazê-lo imediatamente.

24. Durante o atendimento a uma vítima adulta em parada cardiorrespiratória, a equipe está revezando nas compressões torácicas. Para garantir uma Reanimação Cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade, qual a frequência e profundidade que o técnico de enfermagem deve buscar atingir durante as compressões?

A) Cerca de 80 compressões por minuto; profundidade superficial de 3 cm.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

B) Entre 100 e 120 compressões por minuto; profundidade de 5 a 6 cm.

C) Mais de 130 compressões por minuto; profundidade de 4 a 5 cm.

D) Frequência variável conforme o cansaço; profundidade máxima possível.

25. Uma criança derramou água fervente sobre o braço na cozinha de casa. A pele está intensamente vermelha, dolorosa e com formação de algumas bolhas grandes e íntegras. Qual a conduta inicial de primeiros socorros mais adequada que o técnico de enfermagem orientaria por telefone ou realizaria no local?

A) Aplicar pasta de dente ou clara de ovo para aliviar a dor.

B) Estourar as bolhas imediatamente com uma agulha esterilizada.

C) Resfriar a área queimada com água corrente em temperatura ambiente por vários minutos (10-20 min) e depois cobrir com um pano limpo e seco.

D) Envolver o braço firmemente com gelo picado.

26. Um paciente diabético tipo 1 chega à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) trazido pela família, apresentando-se pálido, com sudorese fria intensa, tremores nas mãos e discurso confuso. Ele está consciente, mas desorientado. A glicemia capilar confirma 45 mg/dL. Qual a conduta IMEDIATA mais adequada para o técnico de enfermagem, sob orientação?

A) Administrar a dose usual de insulina NPH do paciente.

B) Oferecer um copo de água com adoçante.

C) Oferecer rapidamente 15-20g de carboidrato de simples absorção por via oral (ex: meio copo de suco de laranja integral, 1 colher de sopa de açúcar ou mel).

D) Preparar acesso venoso para administrar soro glicosado 50% em bolus (se orientado pelo médico).

27. A equipe do SIATE atende uma vítima de queda de altura (aproximadamente 3 metros), que se encontra caída ao solo, consciente, mas queixando-se de forte dor nas costas e incapacidade de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

mover as pernas. Qual a principal conduta da equipe em relação à coluna vertebral da vítima durante todo o atendimento e transporte?

- A) Solicitar que a vítima tente ficar de pé para avaliar a força muscular.
- B) Transportar a vítima na posição que ela achar mais confortável.
- C) Realizar a imobilização completa da coluna em posição neutra (colar cervical, imobilizadores laterais de cabeça, prancha rígida) antes de qualquer movimentação.
- D) Aplicar tração manual na coluna lombar para aliviar a dor.

28. Ocorre um acidente com um ônibus de estudantes na rodovia PR-323, próximo a Cianorte, resultando em cerca de 30 vítimas com ferimentos de gravidade variada. As primeiras equipes de resgate chegam ao local. Qual o objetivo principal da aplicação de um método de triagem, como o START (Simple Triage And Rapid Treatment), nesse cenário?

- A) Identificar nominalmente todas as vítimas para controle administrativo.
- B) Fornecer tratamento definitivo para cada vítima na ordem de chegada.
- C) Classificar rapidamente as vítimas por prioridade de atendimento (gravidade e chance de sobrevivência), otimizando o socorro com os recursos disponíveis.
- D) Liberar rapidamente as vítimas com ferimentos leves para que procurem ajuda por conta própria.

29. Você está na sala de espera da UBS quando um paciente começa a ter uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada (se debatendo, com salivação excessiva). Qual a conduta prioritária do técnico de enfermagem neste momento?

- A) Tentar conter os movimentos da pessoa segurando braços e pernas firmemente.
- B) Colocar um objeto rígido (caneta, colher) entre os dentes da pessoa para evitar que morda a língua.
- C) Proteger a cabeça da pessoa para evitar traumas, afastar objetos perigosos ao redor e lateralizar a cabeça se possível para facilitar a saída de secreções.
- D) Jogar água fria no rosto da pessoa para tentar cessar a crise.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

30. Após uma crise convulsiva que durou cerca de 2 minutos, o paciente gradualmente recupera a consciência, mas apresenta-se sonolento e confuso (período pós-ictal). Qual o cuidado de enfermagem importante neste momento?

- A)** Estimular o paciente a levantar e caminhar imediatamente para acelerar a recuperação.
- B)** Oferecer alimentos sólidos e líquidos assim que ele acordar.
- C)** Deixar o paciente sozinho em um quarto escuro para descansar.
- D)** Manter o paciente em observação, em posição confortável (preferencialmente decúbito lateral), verificar sinais vitais e garantir que as vias aéreas permaneçam pérvias até a recuperação completa.