

# PROCTOLOGIA

CANDIDATO: \_\_\_\_\_

**Comando da Aeronáutica**



**EXAME DE ADMISSÃO**

**CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO  
ANO 2026**

Versão

**A**



**PÁGINA EM BRANCO**

**As questões de 1 a 7 referem-se ao Texto I.**

**Texto I**

**Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras**

*Em uma empresa de Sorocaba (SP), vendas de mudas para hortas caseiras saltou de 5% para 20% em um período de quatro anos.*

As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas. Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.

O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população. Em uma empresa, situada em Sorocaba (SP), as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos. Entre eles, alface, rúcula, brócolis, couve-flor e pepino, garantindo uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.

"Tenho vários clientes que atendo em busca de uma vida mais saudável. É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comenta Marcelo Higashi, dono do espaço.

Fonte: G1. **Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras.** Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/nosso-campo/noticia/2025/02/09/algumas-dicas-ajudam-a-melhorar-a-producao-de-hortas-caseiras.ghtml>. (Texto adaptado). Acesso em: 09 fev. 2025.

**01)** Leia o trecho retirado do Texto I.

"Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo."

Sobre o uso da vírgula no trecho acima, marque a opção que segue a mesma regra.

- a) Às vezes sobe aos ramos da árvore, outras, remexe o uru de palha matizada.
- b) Pelas 11h do dia, que foi de sol ardente, alcançamos a margem do Rio Paraná.
- c) Eis que, aos poucos, lá para as bandas cio oriente, clareia um cantinho do céu.
- d) O sal do Mar Morto, o lago mais salgado do mundo, está diminuindo rapidamente.

**02)** O Texto I discute o crescente interesse pelas hortas caseiras, destacando aspectos relacionados ao estilo de vida das pessoas e à evolução do mercado. Com base nessa análise, assinale a opção correta.

- a) A prática de cultivar hortas caseiras é criticada no texto, sendo vista como uma atividade desnecessária diante das alternativas mais eficientes oferecidas pela indústria alimentícia.
- b) O texto destaca a relevância das hortas caseiras apenas do ponto de vista nutricional, sem considerar as vantagens psicológicas e terapêuticas que essa prática pode oferecer aos indivíduos.
- c) O mercado de hortas caseiras está estagnado, com vendas constantes de mudas, o que sugere que as pessoas estão satisfeitas com o consumo de produtos industrializados e não necessitam mais de alternativas naturais.
- d) O aumento das vendas de mudas de hortas caseiras é retratado como um fenômeno recente que reflete a busca por práticas de consumo mais conscientes, ligadas a um estilo de vida saudável e livre de produtos químicos.

**03)** No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, fazem toda a diferença na hora do consumo.", caso houvesse a inclusão da palavra "bem" antes de cultivados, haveria necessidade de uso do hífen entre "bem" e "cultivados"? Marque a opção que apresenta a resposta correta para esse questionamento com base nas regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) Sim, pois "bem" antes de palavras que têm vida autônoma sempre exige hífen.
- b) Sim, pois todos os advérbios terminados em "m" exigem hífen quando antes de participípios.
- c) Não, pois o hífen só ocorre em palavras compostas por justaposição sem elementos de ligação.
- d) Não, pois "bem" seguido de participípio só leva hífen em casos específicos como "bem-vindo" e "bem-humorado".

**04)** Marque a opção em que a reescrita de trechos do Texto I apresenta inadequações, de acordo com as normas gramaticais, quanto ao uso da concordância verbal.

- a) Os mercados já perceberam essa mudança no estilo de vida da população.
- b) As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.
- c) A maioria dos clientes relata que espera o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comentam os donos do espaço.
- d) Em algumas empresas, situadas em Sorocaba (SP), a venda de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

- 05) O Texto I apresenta informações sobre o crescimento das hortas caseiras e suas vantagens. Com base no Texto I, analise as afirmativas a seguir.
- I. O texto menciona duas vezes a mesma informação sobre o crescimento das vendas de mudas para hortas caseiras em uma empresa de Sorocaba, o que pode indicar um problema de redundância textual.
  - II. A fala de Marcelo Higashi reforça a ideia de que a prática da horticultura caseira vai além da alimentação, funcionando também como uma atividade terapêutica e de lazer.
  - III. O texto sugere que o cultivo de hortas caseiras tem impulsionado a economia local, mas não apresenta dados concretos sobre o impacto financeiro para a empresa mencionada.
  - IV. Apesar de destacar os benefícios das hortas caseiras, o texto não menciona desafios ou dificuldades que podem estar envolvidas no cultivo dessas hortas.
- Estão corretas **apenas** as afirmativas
- a) I e II.
  - b) II e III.
  - c) I, II e IV.
  - d) II, III e IV.
- 06) Analise as afirmativas a seguir e informe verdadeiro (V) ou falso (F), considerando as regras de concordância nominal da Língua Portuguesa, e em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- ( ) No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.", a expressão "toda a diferença" está corretamente flexionada, pois o adjetivo "toda" concorda com "diferença", que está no singular e é feminino.
- ( ) No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "distintos" concorda com "vegetais", que é o núcleo do sujeito e está no plural.
- ( ) No trecho "Uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.", o adjetivo "maior" está corretamente flexionado no singular, pois concorda com "valor", que também está no singular.
- ( ) No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação agradável e necessárias para quem busca qualidade de vida.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "necessárias" concorda com todos os substantivos enumerados anteriormente.
- ( ) No trecho "As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.", a palavra "presente" deveria estar no plural ("presentes") para concordar com "hortas caseiras".
- a) (F); (F); (F); (V); (V).
  - b) (F); (F); (V); (V); (F).
  - c) (V); (V); (F); (F); (V).
  - d) (V); (V); (V); (F); (F).
- 07) Analise as assertivas abaixo, considerando a classificação e o papel das orações coordenadas na construção da argumentação e progressão textual.
- I. No trecho "O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população, e as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20%", há uma oração coordenada sindética aditiva, cuja função é enfatizar a relação de consequência entre a percepção da mudança pelo mercado e o crescimento das vendas.
  - II. No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada", observa-se a ausência de conectivo explícito entre as orações, caracterizando um caso de coordenação assindética, que contribui para o efeito de enumeração e reforço das diferentes razões que motivam os clientes a manterem hortas caseiras.
  - III. No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo, mas exigem cuidados específicos", há uma oração coordenada sindética adversativa, cuja presença do conectivo adversativo indica uma oposição absoluta entre os enunciados, anulando a relação positiva da primeira oração.
  - IV. No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos, por isso muitas pessoas adotam essa prática", a oração introduzida pela locução "por isso" pode ser classificada como coordenada sindética conclusiva, pois estabelece uma relação lógica de consequência entre a possibilidade de cultivo e a adesão das pessoas a essa prática.

Estão corretas **apenas** as assertivas

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.

- 08) Analise o trecho abaixo, observando o emprego dos mecanismos de coesão e coerência textual, e marque a opção correta sobre o uso dos elementos de referência.

"As hortas caseiras têm se tornado uma tendência crescente, não apenas por sua capacidade de promover uma alimentação saudável, mas também devido à sua contribuição para o bem-estar psicológico dos indivíduos. Elas têm se revelado como uma alternativa prática, ao permitir que os consumidores cultivem seus próprios alimentos, escolhendo com precisão o que desejam plantar. Isso tem gerado uma verdadeira transformação nos hábitos alimentares da população, ao ponto de alguns até afirmarem que o cultivo de hortas caseiras substitui atividades terapêuticas, proporcionando relaxamento e prazer. Além disso, elas têm se expandido para além das grandes cidades, com o aumento da demanda por produtos naturais e locais."

- a) O uso do pronome "isso" no início da terceira frase é correto, pois retoma a ideia de "tendência crescente", o que confere clareza e coesão ao texto.
- b) O termo "elas" na última frase refere-se a "atividades terapêuticas", criando uma confusão de coesão, já que o termo deveria remeter a "hortas caseiras" de acordo com o contexto.
- c) O pronome "elas" na segunda frase se refere de maneira clara e coesa ao substantivo "hortas caseiras", mantendo a coerência sem ambiguidade, já que é o único referente mencionado anteriormente.
- d) O uso de "isso" na terceira frase estabelece uma referência à "alimentação saudável", o que contribui para coesão do texto.

**As questões de 9 a 13 referem-se ao Texto II.**

## Texto II

### **Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer**

*Coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos da UFRJ lembra que, sem estímulos, a condição dos pacientes se deteriora mais rapidamente.*

O Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos (LabCONS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem a coordenação da psicóloga clínica Marcia Cristina Nascimento Dourado, professora adjunta do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e especializada nos cuidados a idosos. Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, medir a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade.

"Há 25 anos, atendia pessoas com Alzheimer em psicoterapia e comecei a me perguntar se conseguiam perceber o que estava acontecendo com elas em decorrência da doença. Meu trabalho nasceu desses questionamentos e as pesquisas mostram que há aspectos da cognição que ficam mais preservados. A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de dizer que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada. As limitações vão aumentando gradativamente, mas o cuidador tende a subestimar a capacidade de um portador de Alzheimer", afirma a professora.

Dourado faz uma ressalva importante: o cuidador normalmente está sobrecarregado, o que faz com que procure resolver tudo de uma forma rápida e prática. Entretanto, sem estímulos, a condição se deteriora mais rapidamente, por isso essa não é a alternativa ideal na fase inicial da enfermidade: "Sabemos que acaba sendo trabalhoso. Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, porque dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima. Da mesma forma, na hora de sair, seria bem mais estimulante apresentar pelo menos duas opções de roupas para que a escolha seja dele", ensina.

A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, mas também para aprender a lidar com seus próprios sentimentos: "Há uma tendência de culpabilizar o cuidador, como se ele nunca fizesse o bastante. Se a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva. É preciso considerar o contexto da relação".

A professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado. Portanto, embora seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença: "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, mas os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local. O diagnóstico acaba virando sinônimo de desqualificação".

Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado. O projeto envolveu uma avaliação transversal de 102 com sintomas leves e 59 casos considerados moderados e seus principais cuidadores.

De maneira geral, portadores de Alzheimer moderado são mais dependentes nas atividades diárias, o que faz com que os cuidadores avaliem seu desempenho de forma mais negativa em relação a outras habilidades. O estudo recebeu investimentos da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e os resultados foram publicados na revista científica *Journal of Alzheimer Disease and Associated Disorders*.

Fonte: G1. **Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer**. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2025/02/09/cuidadores-tendem-a-subestimar-a-capacidade-das-pessoas-com-alzheimer.ghtml>. Acesso em: 09 fev. 2025.

- 09) Considerando os conectivos destacados, associe as colunas relacionando as orações com suas respectivas classificações.

### Orações

- (1) "Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, **porque** dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima."
- (2) "A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, **mas também** para aprender a lidar com seus próprios sentimentos."
- (3) "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, **mas** os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local."
- (4) "**Se** a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva."
- (5) "**Embora** seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença."

### Classificações

- ( ) Oração Subordinada Substantiva Adverbial Condicional.
- ( ) Oração Subordinada Substantiva Adverbial Causal.
- ( ) Oração Subordinada Substantiva Adverbial Concessiva.
- ( ) Oração Subordinada Substantiva Adverbial Aditiva.
- ( ) Oração Subordinada Substantiva Adverbial Adversativa.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (5), (2).  
b) (4); (1); (5); (2), (3).  
c) (3); (5); (1); (4), (2).  
d) (2); (4); (3); (1), (5).
- 10) Analise o trecho abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta o sujeito da oração.
- "Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado."
- a) Pacientes e cuidadores.  
b) Uma diferença significativa.  
c) Funcionamento socioemocional.  
d) Universidade Federal de Santa Catarina.

- 11) O Texto II discute a relação entre cuidadores e pessoas com Alzheimer, destacando aspectos como a subestimação das capacidades dos pacientes, a sobrecarga emocional dos cuidadores e a importância da estimulação na preservação das funções cognitivas e socioemocionais. Com base no Texto II, marque a opção correta.
- a) O texto sugere que os cuidadores subestimam a capacidade dos portadores de Alzheimer porque desconhecem completamente a doença e suas implicações.
- b) O estudo do LabCONS demonstra que, apesar da perda de memória, os pacientes ainda são capazes de perceber mudanças na forma como são tratados socialmente.
- c) O papel do cuidador é tratado de forma crítica no texto, apontando que a sobrecarga emocional e a falta de paciência contribuem para o agravamento da doença.
- d) A pesquisa mencionada no texto aponta que há um consenso entre cuidadores e pacientes sobre a avaliação do funcionamento socioemocional de portadores de Alzheimer moderado.

12) Analise as assertivas a seguir.

- I. “A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de **dizer** que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada.”
- II. “Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, **medir** a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade”.

Os verbos destacados podem ser classificados, respectivamente, como

- a) infinitivo pessoal e infinitivo pessoal.
- b) infinitivo impessoal e infinitivo pessoal.
- c) infinitivo pessoal e infinitivo impessoal.
- d) infinitivo impessoal e infinitivo impessoal.

13) Analise as assertivas a seguir.

- I. “Se a pessoa for lavar **um** prato, talvez não fique limpo.”
- II. “Se **a** filha teve uma mãe agressiva ou negligente.”
- III. “**A** professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado.”

Os artigos destacados apresentam, respectivamente, a função de:

- a) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo.
- b) Especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico.
- c) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; especificar e particularizar o substantivo; determinar um referente já conhecido ou específico.
- d) Determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago.

14) Analise as orações abaixo quanto à concordância no plural.

- I. Quando as pessoas vêem quaisquer pessoas desconhecidas, procuram questioná-las.
- II. Os barulhos vêm das casas do lado.
- III. Estas tecnologias nada têm a ver com as realidades das pacatas cidades.
- IV. Agora os pesquisadores reveem os resultados obtidos nas pesquisas.

O plural está correto **apenas** nas assertivas

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) II, III e IV.

15) Em relação à classificação do sujeito, assinale a opção em que o sujeito é indeterminado.

- a) Hoje fez muito sol na praia.
- b) Escreveu bastante sobre o assunto.
- c) Havia muitas pessoas na reunião hoje.
- d) Ainda não inventaram um carro voador.

16) Leia a frase:

Em apenas um toque, esse celular **realiza** um bilhão de funções. Mas o projeto ainda é embrionário, por isso **lê** com dificuldade os comandos. Os especialistas em tecnologia **discordavam** radicalmente das capacidades operacionais em todos os sentidos. Portanto, a empresa **oferecerá** mais cursos a novos pesquisadores.

Associe as colunas, relacionando as palavras destacadas acima com a respectiva predicação verbal.

Palavras	Predicação verbal
(1) realiza	( ) Verbo transitivo indireto.
(2) discordavam	( ) Verbo transitivo direto.
(3) oferecerá	( ) Verbo intransitivo.
(4) lê	( ) Verbo transitivo direto e indireto.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (4); (3).
- b) (1); (2); (3); (4).
- c) (4); (3); (2); (1).
- d) (2); (4); (1); (3).

17) Sobre os pronomes pessoais de tratamento, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- ( ) "É uma honra estar na presença de Vossa Santidade, cuja sabedoria e liderança inspiram a todos." (Papa)
  - ( ) "Pedimos humildemente a Vossa Eminência que ilumine nossos caminhos com sua infinita sabedoria." (Príncipes)
  - ( ) "Humildemente, dirigimo-nos a Vossa Reverendíssima, buscando sua orientação e bênçãos." (Sacerdotes e Bispos)
  - ( ) "É com grande respeito que me dirijo a Vossa Alteza, reconhecendo sua dedicação e sabedoria." (Reis e Rainhas)
- a) (F); (V); (F); (F).
  - b) (V); (F); (V); (F).
  - c) (V); (F); (F); (V).
  - d) (F); (V); (V); (V).

18) Preencha as lacunas e, em seguida, marque a opção correta.

Padecerá \_\_\_\_\_ coerção, \_\_\_\_\_ felicidade nunca há de terminar durante todo o tempo em que tu tiveres coragem para concluir \_\_\_\_\_ frustrações do cotidiano. Assim, situou-se disposto \_\_\_\_\_ deslocar-me e tenho de evitar empecilhos \_\_\_\_\_ que acreditam na humanidade.

- a) a / à / às / a / as
- b) a / a / às / à / às
- c) à / a / as / a / às
- d) à / à / as / à / as

- 19) Quanto à diferença de sentido das orações I e II, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- I. Os pilotos, que passam por rigorosos treinamentos de segurança, são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- II. Os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- ( ) O período entre vírgulas na oração I é classificado como uma Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Restritiva.
- ( ) A oração “que passam por rigorosos treinamentos de segurança”, sem a vírgula, funciona como Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Explicativa.
- ( ) Na oração I, o uso da vírgula passa a ideia de que todos os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- ( ) Na oração II, a ausência de vírgulas limita o conceito de que apenas os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância, isto é, não são todos que estão preparados.
- a) (F); (F); (V); (V).  
b) (F); (V); (V); (F).  
c) (V); (F); (F); (V).  
d) (V); (V); (F); (F).

20) Analise as frases abaixo.

- I. A pandemia do H1N1 deixou rastros que estão sendo estudados pelos cientistas.  
II. Aquele atleta lutava a favor da medalha olímpica.  
III. Em 2022, a escola pública foi reformada pelo mutirão.  
IV. A tecnologia é uma dádiva que dominou o mundo contemporâneo.

A apresentação do verbo na voz passiva ocorre **apenas** em

- a) I e II.  
b) I e III.  
c) II e IV.  
d) III e IV.

21) O texto abaixo apresenta problemas de concordância verbal e nominal. Leia os fragmentos e marque a opção em que o texto está escrito corretamente.

"A conferência sobre inteligência artificial acontecerá dia 20/08/2024, às 9 horas. Será analisado os impactos da automação no mercado de trabalho e também será discutido as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria."

- a) A conferência sobre inteligência artificial será realizada dia 20/08/2024, às 9 horas. Na ocasião, analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-á as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- b) No dia 20/08/2024, às 9 horas, será realizada uma conferência sobre inteligência artificial, na qual analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-ão as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- c) A conferência sobre inteligência artificial acontecerá no dia 20/08/2024, às 9 horas. Durante a ocasião, um estudo sobre os impactos da automação no mercado de trabalho será feito e as diretrizes para o uso ético da tecnologia será debatida. Informe-se na secretaria.
- d) No dia 20/08/2024, às 9 horas, acontecerá a conferência sobre inteligência artificial, na qual serão analisados os impactos da automação no mercado de trabalho e também serão discutidas as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.

- 22) Associe as colunas relacionando as funções sintáticas aos respectivos termos destacados em cada expressão. Considere que, mais de um termo pode se associar à mesma função sintática.

**Função Sintática**

- (1) Complemento Nominal  
(2) Adjunto Adnominal

**Termos**

- ( ) Prato **de sobremesa**.  
( ) Assistência **às aulas**.  
( ) Útil **ao bem comum**.  
( ) Uma pista **de corrida**.  
( ) Insaciável **de vingança**.  
( ) Uma mesa **de vidro**.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (1); (2); (1); (2).  
b) (2); (2); (2); (1); (2); (1).  
c) (1); (1); (2); (1); (1); (2).  
d) (1); (2); (1); (2); (2); (1).
- 23) A frase a seguir apresenta um conflito semântico decorrente da interação entre elementos gramaticais específicos, gerando um efeito de ambiguidade interpretativa.

"Eu já não sei mais o que pensar sobre todas as escolhas que fiz, pois agora me sinto cada vez mais perdido, como se as minhas decisões não tivessem sido em vão."

Considerando a estrutura sintática e os efeitos de sentido da frase, assinale a opção que contém o principal fator de incoerência textual, capaz de inverter ou comprometer a intenção comunicativa do enunciador.

- a) Advérbios de negação (não).  
b) Conjunção coordenativa (pois).  
c) Locução verbal (tivessem sido).  
d) Subordinada adverbial (como se).
- 24) Considerando os aspectos morfológicos e fonológicos envolvidos, associe as colunas relacionando as palavras aos respectivos processos de formação.

**Palavra**

- (1) realizar  
(2) supersônico  
(3) amaciar  
(4) ataque

**Processo de formação**

- ( ) Sufixação  
( ) Prefixação  
( ) Parassintética  
( ) Regressiva


A sequência correta dessa associação é:

- a) (3); (4); (1); (2).  
b) (1); (2); (3); (4).  
c) (2); (1); (4); (3).  
d) (4); (3); (1); (2).
- 25) Sobre a colocação pronominal, assinale a opção correta, conforme a justificativa da norma padrão da Língua Portuguesa.
- a) Na oração "Ficarei sem o almoço, pois não sinto-me disposto", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise é exigida pelo advérbio de negação "não".  
b) Na oração "Que nossa fé proteja-nos dos perigos da vida", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve ficar obrigatoriamente depois do verbo em expressões optativas.  
c) Na oração "Para carta ser entregue é necessário que escreva-a", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise em caso de objeto direto é exigida, portanto deve vir depois do verbo "escreva".  
d) Na oração "Preparem-se para a festa de inauguração, caros funcionários", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve obrigatoriamente vir depois do verbo no imperativo afirmativo, desse modo, a ênclise se justifica.

- 26) Marque a opção correta quanto à grafia das palavras em destaque e a respectiva justificativa com base na norma gramatical da Língua Portuguesa.
- A palavra **fórceps** está correta, pois é uma proparoxítona terminada em (ps).
  - A palavra **misântropo** está correta, pois é uma proparoxítona e sua sílaba tônica é (sân).
  - A palavra **assembleia** está correta, pois é uma paroxítona e enquadra-se na regra de ditongo aberto.
  - A palavra **bengáli** está correta, pois é uma paroxítona e enquadra-se na regra que todas terminadas em (i) tem acento.
- 27) Preencha as lacunas abaixo com a forma correta do particípio dos verbos indicados entre parênteses, seguindo a norma culta da Língua Portuguesa.
- Após muitos estudos, constatou-se que aquele concreto já estivesse se \_\_\_\_\_ no muro. (enxugar)  
Durante séculos, pensava-se que aquele concreto já tivesse se \_\_\_\_\_ no muro. (enxugar)  
O zelador não entendeu por que o síndico não havia \_\_\_\_\_ sua obra. (entregar)  
O zelador não entendeu por que sua obra não foi \_\_\_\_\_ pelo síndico. (entregar)
- A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:
- enxugado / enxuto / entregue / entregue
  - enxuto / enxugado / entregado / entregue
  - enxugado / enxuto / entregue / entregado
  - enxugado / enxuto / entregado / entregado
- 28) Analise o papel semântico da preposição "com" nas frases abaixo e assinale a opção correta.
- Com** uma única caneta, os estudantes realizam o vestibular.  
Ela realiza o trabalho **com** o auxílio de estudantes experientes.  
Os estudantes, **com** dedicação, se preparam para o exame final.  
Os estudantes brasileiros lutam **com** as dificuldades do dia a dia.
- Modo - instrumento - causa - tempo.
  - Oposição - companhia - modo - causa.
  - Instrumento - modo - causa - oposição.
  - Instrumento - companhia - modo – oposição.
- 29) Analise os períodos compostos abaixo.
- É dúvida **que ele não compareceu à reunião**.  
A dúvida é **que ele não compareceu à reunião**.
- As orações subordinadas destacadas nos períodos acima exercem funções sintáticas diferentes. Marque a opção correta que apresenta, respectivamente, essas funções:
- Sujeito - predicativo.
  - Predicativo - sujeito.
  - Objeto direto - sujeito.
  - Predicativo - objeto direto.
- 30) Sobre o uso dos pronomes relativos, marque a opção **incorreta**.
- O pronome relativo **em que** sempre tem antecedente e equivale a **onde**. Exemplo "A casa **onde** moro foi de meu avô".
  - O pronome relativo **quem** só se aplica a pessoas, tem antecedente, vem sempre precedido de preposição e equivale a **o qual**. Exemplo "O médico de **quem** falo é meu conterrâneo".
  - Os pronomes **quanto(s)** e **quanta(s)** não são relativos quando precedidos de um dos pronomes indefinidos **tudo, tanto(s), tanta(s), todos, todas**. Exemplo "Tenho tudo **quanto** quero".
  - Os pronomes relativos **do qual** e **da qual** precedem sempre um substantivo sem artigo e podem ser substituídos por **cujo** e **cuja**. Exemplo "Qual será o animal **cujo** nome a autora não quis revelar?".

- 31)** Um paciente do sexo masculino foi submetido a uma ressecção anterior do reto devido a uma neoplasia no reto médio (T3N1M0) após tratamento neoadjuvante. No acompanhamento pós-operatório, o paciente apresentou dificuldades de ejaculação e disfunção erétil. Em relação às disfunções sexuais que podem surgir após cirurgias pélvicas, assinale a opção correta.
- Durante a ligadura da artéria mesentérica inferior pode ocorrer lesão do sistema nervoso simpático, resultando em complicações como ejaculação retrógrada e atonia vesical.
  - As lesões na inervação parassimpática, presente nas raízes lombares e no plexo hipogástrico superior, podem resultar em disfunção erétil significativa.
  - A ressecção anterior do reto não é associada a complicações como ejaculação retrógrada, e disfunção erétil, sendo essas queixas relacionadas a fatores psicológicos.
  - Não é possível que ocorra disfunção nervosa que cause dificuldade ejaculatória em cirurgias de ressecção anterior do reto, sendo a causa mais provável a radioterapia.
- 32)** Em relação à vascularização do cólon e reto, é correto afirmar que:
- A artéria retal inferior é um ramo da artéria mesentérica inferior, sendo responsável pela irrigação arterial do reto inferior e canal anal.
  - A artéria cólica direita é reconhecida por grande variação anatômica, podendo estar ausente em torno de 20% dos pacientes.
  - Os pontos de maior vascularização, devido à rede de circulação colateral, são o ponto de Griffiths no ângulo esplênico e de Sudeck na junção retossigmoide.
  - A artéria retal média está presente no ligamento lateral na maioria dos pacientes juntamente a demais estruturas neurovasculares clinicamente relevantes.
- 33)** Paciente, sexo feminino, 72 anos, comparece ao consultório com queixa de perda fecal e dificuldade de controle de flatos. Informa que o quadro tem aproximadamente 1 ano e é pior em períodos de diarreia. Durante a investigação, foi optado pela realização de um exame de manometria anorretal com os seguintes achados: hipotonia de repouso, reflexo retoanal presente, ausência de outros achados. Em relação à manometria anorretal, é correto afirmar que:
- O reflexo inibitório retoanal é caracterizado por uma redução dos valores da pressão de repouso basal, após a distensão do reto pelo balão, que retorna, após um determinado tempo, a valores semelhantes aos iniciais.
  - O reto apresenta pressão de repouso em torno de 10 vezes maior do que a do canal anal, sendo que a diminuição da pressão retal durante o ato evacuatório é um fator importante para o mecanismo de evacuação.
  - A contração paradoxal do puborretal pode ser avaliada na manometria quando observamos, durante o esforço evacuatório, um aumento da pressão do reto associada à diminuição dos valores de pressão do canal anal.
  - A hipotonia de repouso é associada à urgeincontinência fecal, sendo comumente observado uma menor pressão basal de repouso em homens quando comparado a mulheres e em idosos quando comparado a pacientes jovens.
- 34)** A Síndrome da Ressecção Anterior Baixa (*Low Anterior Resection Syndrome – LARS*) é um conjunto de sintomas intestinais que podem ocorrer como complicação após a ressecção anterior baixa do reto. Sobre essa condição, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- A Síndrome de LARS é caracterizada por sintomas como incontinência fecal, urgência evacuatória ou evacuações fragmentadas.
  - São considerados fatores de risco para LARS a realização de radioterapia neoadjuvante, a altura da anastomose e a realização de ostomia de desvio (ileostomia em alça).
  - O escore de LARS é uma ferramenta validada utilizada para avaliar a gravidade dos sintomas em pacientes que realizaram ressecção anterior baixa.
  - O tratamento da Síndrome de LARS é exclusivamente cirúrgico, sendo a reconstrução esfinteriana a única opção terapêutica eficaz.
- (V); (V); (F); (V).
  - (F); (V); (V); (F).
  - (V); (F); (V); (F).
  - (V); (V); (V); (F).

35) Analise as imagens abaixo.



Fonte: Banca Examinadora, 2026.

As imagens acima representam a classificação das fístulas perianais de acordo com sua relação com os esfíncteres anais. Com base na classificação tradicional, assinale a opção que corretamente correlaciona os tipos de fístulas com suas respectivas descrições.

- a) Tipo I - Fístula transesfintérica; Tipo II - Fístula supraesfintérica; Tipo III - Fístula interesfintérica; Tipo IV - Fístula extraesfintérica.
- b) Tipo I - Fístula interesfintérica; Tipo II - Fístula transesfintérica; Tipo III - Fístula supraesfintérica; Tipo IV - Fístula extraesfintérica.
- c) Tipo I - Fístula supraesfintérica; Tipo II - Fístula interesfintérica; Tipo III - Fístula transesfintérica; Tipo IV - Fístula extraesfintérica.
- d) Tipo I - Fístula interesfintérica; Tipo II - Fístula transesfintérica; Tipo III - Fístula extraesfintérica; Tipo IV - Fístula supraesfintérica.

36) Preencha as lacunas abaixo.

Durante a realização de uma ileostomia terminal, o cirurgião deve realizar a maturação do estoma \_\_\_\_\_ fechamento da parede abdominal, posicionando o mesmo \_\_\_\_\_ do músculo reto abdominal, evitando tensão excessiva para reduzir o risco de complicações. O diâmetro da incisão pela parede abdominal deve ser o suficiente para a passagem de \_\_\_\_\_ do cirurgião, prevenindo isquemia e retração. Após a fixação do estoma, a ileostomia deve ficar \_\_\_\_\_ nível da pele para melhor adaptação dos dispositivos coletores.

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:

- a) após o / através / três dedos / no mesmo
- b) antes do / ao lado / dois dedos / acima do
- c) após o / através / dois dedos / acima do
- d) antes do / ao lado / três dedos / no mesmo

37) Um paciente de 50 anos, imunossuprimido, apresenta dor anal crônica associada a sangramento discreto. Ao exame físico, identifica-se uma fissura anal lateral, de bordas endurecidas e fundo irregular. Diante desse quadro, a conduta mais adequada é:

- a) Prescrever medidas conservadoras, como banhos de assento, dieta rica em fibras e analgésicos, monitorando a evolução clínica.
- b) Indicar esfínterectomia lateral interna, considerando que a cronicidade do quadro sugere hipertonia do esfíncter anal.
- c) Iniciar tratamento com bloqueadores de canal de cálcio tópicos para promover o relaxamento do esfíncter anal e facilitar a cicatrização.
- d) Realizar biópsia da lesão para afastar etiologias neoplásicas ou infecciosas e solicitar sorologias para investigação adicional.

- 38) Um paciente com síndrome de Lynch apresentou diagnóstico de câncer de cólon direito durante realização de colonoscopia de rastreio. Após os exames necessários, o estadiamento clínico do tumor foi classificado como T3N0M0. Durante a avaliação clínica, é discutida a possibilidade de realizar uma colectomia. Considerando os fatores de risco associados à síndrome de Lynch e os benefícios da abordagem cirúrgica, assinale a opção mais adequada para este paciente.
- a) Colectomia segmentar, preservando a maior parte do cólon, já que a síndrome de Lynch está associada à evolução oncológica mais favorável.
  - b) Proctocolectomia total com anastomose coloanal, pois com a remoção cirúrgica do cólon e reto ocorre a cura da síndrome de Lynch.
  - c) Tratamento endoscópico por dissecação de submucosa, devido à ausência de acometimento linfonodal no estadiamento clínico.
  - d) Colectomia abdominal total ou subtotal, devido ao risco elevado de desenvolvimento de câncer em múltiplos segmentos do cólon e reto.
- 39) Em relação à fístula perianal de origem criptoglandular, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- ( ) A maioria das fístulas perianais apresenta resolução espontânea sem necessidade de intervenção cirúrgica.
  - ( ) O tratamento cirúrgico da fístula perianal sempre requer a realização de colostomia para adequada cicatrização.
  - ( ) A classificação de Parks é utilizada para categorizar as fístulas perianais com base na relação do trajeto fistuloso com o esfíncter anal.
  - ( ) O objetivo do tratamento da fístula perianal é erradicar a fístula, mantendo a continência anal.
- a) (F); (V); (V); (F).
  - b) (F); (F); (V); (V).
  - c) (V); (V); (F); (V).
  - d) (F); (F); (F); (V).
- 40) Um paciente de 28 anos, previamente hígido, apresenta uma proctite intensa com úlceras dolorosas de bordas irregulares, acompanhada de linfadenopatia inguinal unilateral dolorosa com abscesso e febre. Nega presença de vesículas ou outras lesões prévias. Ao exame, observa-se saída de secreção anal purulenta associada à queixa de tenesmo. Considerando o quadro clínico descrito, qual é o agente etiológico mais provável?
- a) *Treponema pallidum*.
  - b) *Klebsiella granulomatis*.
  - c) *Chlamydia trachomatis* (L1, L2, L3).
  - d) *Herpes simplex vírus* (HSV-2).
- 41) Sobre a doença hemorroidária, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- ( ) Hemorroidas internas são classificadas em quatro graus, sendo que as de grau III exigem redução manual e as de grau IV são irreduzíveis.
  - ( ) A escleroterapia é uma opção de tratamento para hemorroidas internas de graus I a III, sendo realizada com a injeção de agentes esclerosantes na submucosa.
  - ( ) As técnicas de hemorroidectomia aberta (Milligan-Morgan) e fechada (Ferguson) apresentam taxas semelhantes de recidiva hemorroidária e complicações infecciosas.
  - ( ) O tratamento inicial das hemorroidas sintomáticas inclui modificações dietéticas, aumento da ingestão de fibras e melhora da higiene anal.
- a) (V); (F); (V); (V).
  - b) (V); (V); (V); (V).
  - c) (F); (V); (F); (F).
  - d) (V); (V); (F); (V).

- 42) Em um paciente hemodinamicamente estável com trauma de cólon há 2 horas, apresentando acometimento de 60% do órgão por arma de fogo, a conduta cirúrgica mais adequada no atendimento de urgência é:
- Realizar ressecção do segmento afetado com anastomose primária, uma vez que o paciente está hemodinamicamente estável.
  - Optar pela laparotomia exploradora com lavagem local e dreno, sem intervenção no cólon, monitorando a evolução clínica do paciente.
  - Realizar uma colostomia temporária, considerando o tempo de recuperação e potencial contaminação do campo operatório.
  - Executar uma ressecção subtotal do cólon, pois a quantidade de tecido comprometido justifica uma abordagem mais radical.
- 43) Preencha as lacunas abaixo.
- As síndromes genéticas associadas ao câncer colorretal incluem a síndrome de \_\_\_\_\_, que é caracterizada por uma predisposição a câncer colorretal, de endométrio, ovário, estômago e outros, devido a defeitos na reparação do DNA. Por outro lado, a síndrome de \_\_\_\_\_ é marcada pelo desenvolvimento de pólipos hamartomatosos e manchas pigmentares na mucosa oral e pele, além de aumento do risco de câncer colorretal. Enquanto a síndrome de \_\_\_\_\_ é caracterizada por osteomas da mandíbula ou do crânio, dentes supranumerários e lesões císticas epidermoides, além de polipose.
- A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:
- Turcot / Muir-Torre / Gardner
  - Lynch / Muir-Torre / Turcot
  - Muir-Torre / Peutz-Jeghers / Turcot
  - Lynch / Peutz-Jeghers / Gardner
- 44) Em relação ao tratamento cirúrgico do câncer de reto, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- ( ) A ressecção transanal é a abordagem de escolha para tumores de reto médio e alto, independentemente do estadiamento.
- ( ) A excisão total do mesorreto é um dos princípios fundamentais da cirurgia oncológica do câncer de reto.
- ( ) A radioterapia neoadjuvante pode reduzir a taxa de recorrência local em pacientes com câncer de reto localmente avançado.
- ( ) A amputação abdominoperineal é indicada para todos os tumores de reto distal, independentemente se há ou não acometimento do esfíncter.
- (F); (F); (V); (V).
  - (F); (V); (V); (F).
  - (V); (F); (V); (F).
  - (V); (V); (F); (F).
- 45) Um paciente foi submetido à ressecção de um adenocarcinoma colorretal e, na análise histopatológica, foram identificados depósitos tumorais no tecido pericólico não peritonealizado, sem evidência de linfonodos regionais acometidos. Considerando a classificação TNM do *American Joint Committee on Cancer (AJCC)* para câncer colorretal, qual a categoria adequada para a classificação desse achado?
- N1a.
  - N1b.
  - N1c.
  - N2a.
- 46) Durante uma colonoscopia de rastreamento, foi identificada uma lesão incidental no apêndice cecal. A propedêutica e o tratamento revelaram um tumor mucinoso de baixo grau (LAMN) limitado ao apêndice, sem evidências de invasão linfonodal ou do mesoapêndice, sem perfuração ou metástases à distância. Considerando a classificação e o manejo das neoplasias apendiculares, qual é a conduta cirúrgica mais apropriada para esse caso?
- Apendicectomia isolada.
  - Ressecção segmentar do ceco.
  - Colectomia direita com linfadenectomia.
  - Quimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia.

- 47) Um paciente de 62 anos, diagnosticado com adenocarcinoma de cólon ascendente estágio III, foi encaminhado para tratamento cirúrgico. Considerando os princípios cirúrgicos oncológicos, marque a opção correta conforme as diretrizes atuais.
- A linfadenectomia é considerada adequada quando pelo menos 10 linfonodos são removidos para estadiamento preciso.
  - Pelo menos 5 cm de margem cirúrgica deve ser obtida tanto proximal quanto distalmente, bem como ser realizada a ligadura do vaso em sua origem.
  - O princípio de "no touch" (evitar manipulação tumoral antes da ligadura vascular) é essencial para reduzir a disseminação de células tumorais e melhorar a sobrevida.
  - A ressecção em bloco de órgãos adjacentes em tumores localmente avançados só deve ser realizada se houver confirmação intraoperatória de invasão microscópica.
- 48) Paciente sexo masculino, 62 anos, apresentou hematoquezia, tenesmo e perda ponderal. Em exames propedêuticos, foi identificado um adenocarcinoma de reto baixo T3N1M0. Foi encaminhado à neoadjuvância e, após avaliação de resposta, foi identificada uma resposta clínica completa e optado por tratamento não operatório. Analise as afirmativas abaixo sobre o protocolo "watch and wait" no câncer de reto.
- A biópsia endoscópica negativa não é um critério obrigatório para a inclusão de pacientes no protocolo "watch and wait", pois não é um método confiável para avaliar a resposta tumoral à quimiorradioterapia.
  - Pacientes que apresentam resposta clínica parcial (pCR) também podem ser incluídos no protocolo "watch and wait", pois há evidências de regressão tumoral tardia sem necessidade de cirurgia, não sendo necessário o acompanhamento desses pacientes.
  - O acompanhamento no protocolo "watch and wait" inclui exame clínico e colonoscopia, geralmente a cada três meses, e ressonância magnética pélvica a cada 6 meses nos dois primeiros anos.
  - A detecção de recorrência local durante o acompanhamento pode indicar cirurgia de resgate, sendo 90% dos casos de crescimento local passíveis de ressecção R0, com taxas de sucesso semelhantes às de pacientes operados inicialmente.
  - Pacientes no protocolo "watch and wait" podem ser acompanhados exclusivamente com exames de imagem, sem necessidade de avaliação clínica frequente ou exames adicionais.
- Estão corretas **apenas** as afirmativas
- I e III.
  - I, III e IV.
  - II, III e V.
  - IV e V.
- 49) Em relação às manifestações extraintestinais (MEIs) na Doença Inflamatória Intestinal (DII), é correto afirmar que:
- A artrite periférica é a MEI mais comum em pacientes com DII, ocorrendo em até 40% dos casos e sempre acompanha a atividade inflamatória intestinal.
  - A manifestação de uveíte está sempre associada à atividade intestinal, com uma prevalência de 2 a 6% em pacientes com DII.
  - A colangite esclerosante primária (CEP) tem uma associação incerta com a atividade intestinal e, quando presente, associa-se a um risco aumentado de malignidade.
  - A espondilite anquilosante, uma das EIMs mais comuns, ocorre exclusivamente em pacientes com alta atividade intestinal, afetando de 5 a 20% dos pacientes com DII.
- 50) Em relação às características de alto risco que indicam a necessidade de terapias medicamentosas mais agressivas na Doença de Crohn, é correto afirmar que:
- Pacientes com doença leve limitada ao íleo terminal devem ser tratados de forma agressiva, devendo ser indicado o biológico, para evitar a progressão da doença.
  - Pacientes com doença penetrante ou doença perianal são considerados de baixo risco, portanto, não há necessidade de terapias agressivas.
  - Fatores como sexo masculino, início jovem da doença, tabagismo ativo e fenótipo de doença penetrante são indicativos de necessidade de tratamento mais agressivo.
  - Pacientes com doença multifocal devem ser tratados apenas com terapias leves, como dieta e antibióticos, sem necessidade de terapias medicamentosas mais agressivas.

- 51) Analise as afirmativas abaixo sobre o tratamento da retocolite ulcerativa moderada a grave.
- I. Os imunomoduladores, como tiopurinas e metotrexato, são recomendados para indução de remissão em casos de colite ulcerativa moderada a grave.
  - II. O vedolizumabe é um agente biológico eficaz para indução de remissão em colite ulcerativa, com um perfil de segurança teoricamente melhor devido à sua seletividade intestinal.
  - III. O uso de ustekinumabe para indução de remissão em colite ulcerativa apresenta uma taxa significativamente maior de remissão clínica em comparação ao placebo, de acordo com os estudos mais recentes.
  - IV. Em pacientes nunca tratados com biológicos ou tiopurinas, a combinação de agentes biológicos, como infliximabe, com imunomoduladores, como a azatioprina, tem mostrado melhores taxas de remissão em comparação ao uso de agentes biológicos isolados.
  - V. Recomenda-se na prática clínica o uso de tofacitinibe como terapia de primeira linha para a indução de remissão em pacientes nunca tratados com biológicos.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
- b) II, III e IV.
- c) III, IV e V.
- d) II, IV e V.

- 52) Paciente do sexo masculino, 68 anos, apresentou cinco episódios de sangramento vermelho-vivo em moderada quantidade à evacuação nas últimas 24 horas. Admitido com: FC 108 bpm, PA 80x50 mmHg, hipocorado, afebril. Foi optado por estabilização clínica, internação e investigação propedêutica.

Em relação ao manejo da hemorragia digestiva, é correto afirmar que:

- a) A endoscopia digestiva alta deve ser realizada nos pacientes com instabilidade hemodinâmica e hematoquezia, sendo a única modalidade capaz de identificar a fonte do sangramento e realizar intervenções terapêuticas.
- b) A angiografia mesentérica é a modalidade radiográfica mais eficaz para a localização do sangramento, porém a taxa de sangramento deve ser maior que 0,5 ml/minuto e contínua, sendo eficaz apenas em pacientes hemodinamicamente estáveis.
- c) A angiotomografia (angioTC) é eficaz para localizar sangramentos do trato gastrointestinal inferior, com uma boa sensibilidade, sendo indicada especialmente para pacientes estáveis.
- d) A cintilografia com sangue marcado com tecnécio-99m (99mTc) é a técnica de localização padrão-ouro, com a maior sensibilidade entre os exames propedêuticos e possui a capacidade de realizar tratamento terapêutico imediato.

- 53) O exame de colonoscopia está associado a um risco de bacteremia em 2 a 4%, mas o uso rotineiro de antibioticoprofilaxia em pacientes submetidos ao exame endoscópico do trato digestivo baixo não é recomendado.

Segundo a diretriz da Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal (*American Society for Gastrointestinal Endoscopy- ASGE*) publicada em 2015, a única situação abaixo em que a administração de antibióticos profiláticos antes da colonoscopia está indicada é:

- a) Portadores de válvula cardíaca protética.
- b) Portadores de prótese de quadril bilateral.
- c) Portadores de *stent* metálico coronariano.
- d) Portadores de enxerto vascular aorto bi-iliáco.

- 54) Para paciente com queixas proctológicas, a anamnese e o exame físico completos são essenciais para a elaboração de uma hipótese diagnóstica pertinente. Atualmente, o especialista tem um grande arsenal de exames, alguns deles realizados no mesmo momento da consulta, para completar a investigação.

No que se refere à propedêutica complementar ao exame físico coloproctológico, é **incorreto** afirmar que

- a) a retoscopia rígida é realizada sem sedação, geralmente, após aplicação de enemas e é um excelente instrumento para precisar a localização de uma lesão retal em relação à margem anal.
- b) a retossigmoidoscopia flexível permite a investigação do sangramento de origem retal, a resposta a radioquimioterapia em protocolo *watch and wait* e avaliação de anastomoses colorretais distais.
- c) a colonoscopia é essencial para o rastreamento do câncer colorretal, para acompanhamento dos pacientes pós tratamento oncológico intestinal e para manejo dos pacientes com sintomas intestinais.
- d) o ultrassom endoanal permite a avaliação da musculatura anal através da refração dos tecidos, sendo que o esfíncter anal externo aparece como uma imagem hipoecoica porque possui baixo conteúdo líquido.

- 55) A taxa de detecção de adenomas e a correta remoção dos pólipos são parâmetros de qualidade do exame de colonoscopia, segundo o *guideline* da Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal (*European Society of Gastrointestinal Endoscopy- ESGE*) publicado em 2017.

Considerando as recomendações da ESGE de 2017, qual a técnica de polipectomia endoscópica correta baseada no tamanho do pólipos?

- a) Pólipos pediculados de 10 a 19mm devem ser retirados com alça de polipectomia com corrente elétrica, após injeção de solução de adrenalina na base do pedículo.
  - b) Pólipos sésseis com 4mm devem, preferencialmente, ser removidos com pinça de biópsia pela facilidade técnica.
  - c) Pólipos sésseis com 5mm devem, preferencialmente, ser ressecados com alça de polipectomia a frio para completa remoção.
  - d) Pólipos sésseis com 7mm devem ser removidos com pinça de biópsia diatérmica (*hot biopsy*) para evitar sangramento tardio.
- 56) Paciente de 40 anos, sem comorbidades, com hábito intestinal regular, sem colonoscopia prévia, inicia quadro de dor em fossa ilíaca esquerda de intensidade progressiva. Procura o Pronto-Socorro de um hospital próximo a sua casa, no terceiro dia após início dos sintomas, por piora da dor e temperatura corporal de 38°C. Realizou tomografia de abdome e pelve que demonstrou tratar-se de uma diverticulite complicada com abscesso pélvico, mas sem pneumoperitônio. Teve boa evolução com antibioticoterapia venosa exclusiva. Após a alta hospitalar, qual conduta deve ser seguida?
- a) Deve-se orientar dieta sem sementes ou grãos pelo alto risco de um novo quadro de diverticulite complicada.
  - b) Deve-se solicitar uma colonoscopia, preferencialmente após 6 semanas, para excluir neoplasia.
  - c) Deve-se prescrever um antibiótico tópico, como a Rifaximina pelo alto risco de um novo quadro de diverticulite complicada.
  - d) Deve-se, obrigatoriamente, agendar o tratamento cirúrgico pelo alto risco de um novo quadro de diverticulite complicada.
- 57) Segundo as recomendações da Sociedade Americana de Cirurgiões Colorretais (*American Society of Colorectal Surgery- ASCRS*) de 2020 para tratamento da diverticulite do lado esquerdo, é correto afirmar que
- a) nos quadros de diverticulite Hinchey II, abscessos com 2cm frequentemente necessitam de drenagem percutânea para alcançar o sucesso terapêutico.
  - b) a omissão da antibioticoterapia em pacientes imunossuprimidos, desde que hemodinamicamente estáveis e com diverticulite não complicada está bem respaldada pelos estudos AVOD e DIABOLO.
  - c) nos quadros de diverticulite Hinchey III e IV, quando a sigmoidectomia faz-se mandatória, deve-se sempre realizar a ressecção no plano oncológico pelo risco de êmbolos sépticos no mesocólon.
  - d) nos quadros de diverticulite Hinchey IV, os pacientes imunocompetentes e estáveis hemodinamicamente podem ser adequadamente tratados com sigmoidectomia com ileostomia protetora.

- 58) Analise as afirmativas abaixo com relação ao prolapso de reto.

- I. A abordagem multidisciplinar do prolapso de reto, com avaliação dos três compartimentos pélvicos é recomendada porque é frequente a associação com sintomas e defeitos dos compartimentos anterior e médio.
- II. O prolapso de reto é diagnosticado com o exame proctológico minucioso, mas a defecorressonância magnética é um importante instrumento para determinar a extensão do acometimento nos órgãos internos, sendo mais sensível que a defecografia por fluoroscopia.
- III. A escolha da abordagem do prolapso de reto por via perineal ou por via abdominal depende de vários fatores, mas, na presença de encarceramento, faz-se necessária a abordagem perineal.
- IV. A técnica de Delorme consiste na secção da mucosa excedente, plicatura da camada muscular, seguida de sutura da mucosa retal junto ao canal anal e está reservada a clientes com alto risco para abordagem abdominal e prolapso de segmento curto.
- V. A retopexia ventral com tela, via laparoscópica ou robótica, consiste na dissecção e mobilização do reto em toda sua circunferência e sua fixação no promontório através de uma tela.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e III.
- b) II, III e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II e V.

- 59)** Apesar de ser uma das doenças digestivas mais comumente diagnosticadas no mundo todo, a Síndrome do Intestino Irritável (SII) continua sendo um dilema para muitos coloproctologistas. Assinale a opção correta sobre o diagnóstico da SII.
- a) O diagnóstico da SII, atualmente, consiste na avaliação dos critérios de Roma IV e fundamentalmente inclui alteração do hábito intestinal e distensão abdominal.
  - b) Sinais de alarme que sugerem outro diagnóstico e merecem investigação diagnóstica adicional incluem: uso recente de antibióticos, perda de peso documentada, sintomas noturnos e fezes com sangue.
  - c) O diagnóstico diferencial da SII não depende de biomarcadores porque os critérios de Roma IV, baseados em sintomas, conseguem claramente diferenciar a patologia de qualquer outra doença orgânica.
  - d) Para fins de classificação da SII, a identificação da forma das fezes através da escala de Bristol não substitui a realização do tempo de trânsito colônico.
- 60)** Qualquer segmento móvel do cólon pode torcer sobre o seu eixo axial e o segmento volvular, resultando em uma obstrução em alça fechada.
- O volvo de cólon ocorre mais comumente no \_\_\_\_\_ (cerca de 60%) e no \_\_\_\_\_ (aproximadamente 40%).
- A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:
- a) ceco / cólon transverso
  - b) cólon transverso / cólon sigmoide
  - c) cólon sigmoide / cólon transverso
  - d) cólon sigmoide / ceco

RASCUNHO

RASCUNHO

RASCUNHO

RASCUNHO



## EXAME DE ADMISSÃO

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:
  - ▶ a numeração das questões e a paginação estão corretas;
  - ▶ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; e
  - ▶ a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos ou equipamentos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente e/ou com tinta apagável; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook*, *tablet*; *pen drive*; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ou quaisquer instrumentos que recebam, transmitam ou armazenem informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.
6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas**.
11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.
12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.