

Domingo de manhã

## CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 02/2025

### ODONTÓLOGO (SAÚDE PÚBLICA) 37 – GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (RS)

#### Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:
  - contém 50 (cinquenta) questões;
  - **refere-se ao número e ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



BONSUCESSO

V1\_26/05/2025 13:02:38



CONCEIÇÃO



A Fundatec utiliza papel com certificação florestal e tinta biodegradável.

Controle de  
QUALIDADE  
Fundatec

Concursos  
**fundatec**

ISO 9001



**LÍNGUA PORTUGUESA****A arte de ver o outro**

*Por Gilmar Marcílio*

01 Estamos perdendo consideravelmente a capacidade de estabelecer relações de acolhimento  
02 e amor. Acho triste, pois precisamos desses dois sentimentos para abraçar com a alma aquele  
03 que está próximo de nós. Porém, há algo ainda a ser feito para sustentar esses pilares  
04 emocionais. Chegamos até aqui pela persistência em colaborar. E nessa palavra está embutido  
05 um longo trajeto de renúncia ao egoístico ato de se colocar em primeiro lugar. Talvez você se  
06 pergunte: como será verdade se as pessoas estão cada vez mais pensando só em si mesmas?  
07 Acredito ser um sintoma temporário: creio que vamos nos exaurir de tanta individualidade. A  
08 história é pendular. Ora aqui, ora acolá. Só após, o equilíbrio, também provisório.

09 Ninguém é autossuficiente o bastante para pre...indir de uma rede de apoio. Qualquer  
10 existência está intrinsecamente ligada \_\_\_ demais. A ruptura desses elos pode significar o nosso  
11 fim como espécie. No entanto, vejo sinais alentadores. Há muitos movimentos de solidariedade,  
12 largos gestos promovendo a salvação quando somos atingidos por uma tragédia ambiental, por  
13 exemplo. É comovente acompanhar tanta gente mobilizando-se em busca de uma solução ao se  
14 depararem com comunidades que passaram por grandes perdas. Dá-se a isso o nome de  
15 empatia.

16 Penso na magnífica arte da conversação. Vêm-me \_\_\_ mente os diálogos socráticos, nos  
17 quais cada interlocutor apresenta seus pontos de vista e é acolhido pelo grupo \_\_\_ despeito de  
18 eventuais divergências. Investigar diversas visões de mundo é multiplicar as experiências, pois  
19 nos deslocamos para um local (imaginário) diferente do nosso. O narcísico não gosta dessa  
20 prática e exatamente por isso deve-se insistir nesse propósito. Como é possível fazê-lo com  
21 eficiência? Depois das triviais perguntas "olá, tudo bem, como está?", nos despirmos um pouco  
22 da autorreferência. É o início de ricos encontros que geralmente desaguam em divagações  
23 filosóficas, transcendendo a banalidade do dia a dia. A inteligência é altamente sedutora,  
24 compete com os atrativos físicos. E há o fato de, com a passagem do tempo e o aprofundamento  
25 dos contatos, sempre termos o que acrescentar no diálogo com o amigo, o colega, o vizinho. Ver  
26 com paixão quem está ao lado é estabelecer uma ligação próxima ao princípio religioso de  
27 unicidade.

28 Conta-se que certas tribos indígenas, conhecidas por suas admiráveis criações artísticas,  
29 nunca assinam as peças produzidas. Para eles, a glória particular não tem valor algum. Visando  
30 escapar de tal armadilha da vaidade assinam as obras uns dos outros. Há neste pacto uma  
31 indizível beleza.

32 Veja para além dos olhos, com o corpo todo. Só assim será capaz de fazer a leitura correta  
33 de cada ser.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/pioneiro/colunistas/gilmar-marcilio/noticia/2025/05/a-arte-de-ver-o-outro-cmazumqi900dq013bffhx3xa1.html> – texto adaptado especialmente para esta prova).

**QUESTÃO 01** – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Para o autor, a tendência é que as pessoas fiquem cada vez mais egoístas, o que aponta para um futuro cada vez mais individualista.
- II. Segundo o autor, um dos pilares que sustenta a nossa existência é o fato de termos nossas vidas interconectadas com as de outros indivíduos.
- III. Considerando a totalidade do texto, é possível inferir que uma forma de melhor perceber o outro é investir em interações genuinamente interessadas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 02** – Analise a charge a seguir e as asserções a respeito da sua relação com o texto-base desta prova:



Fonte: Sul 21 (2015).

Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

- I. Tanto o texto-base quanto a charge abordam o tema do individualismo.

**ALÉM DISSO**

- II. Os dois textos apontam apenas cenários negativos a partir do individualismo, indicando uma sociedade sem recuperação.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento correto da I.  
 B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento correto da I.  
 C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  
 D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  
 E) As asserções I e II são proposições falsas.

**QUESTÃO 03** – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 10, 16 e 17.

- A) às - à - a  
 B) às - a - à  
 C) às - à - à  
 D) as - a - à  
 E) as - à - a

**QUESTÃO 04** – Considerando o emprego das figuras de linguagem, em qual dos trechos a seguir, retirados do texto-base, NÃO há a ocorrência de linguagem figurada?

- A) "[...] abraçar com a alma aquele que está próximo de nós".  
 B) "Depois das triviais perguntas 'olá, tudo bem, como está?'".  
 C) "[...] nos despirmos um pouco da autorreferência".  
 D) "[...] ricos encontros que geralmente desaguam em divagações filosóficas".  
 E) "Visando escapar de tal armadilha da vaidade".

**QUESTÃO 05** – Assinale a alternativa que apresenta palavra que NÃO poderia substituir corretamente o vocábulo “triviais” (l. 21) por causar alterações significativas ao sentido do trecho em que ele ocorre. Desconsidere eventuais alterações necessárias na estrutura da frase.

- A) Tolas.
- B) Corriqueiras.
- C) Banais.
- D) Simples.
- E) Comuns.

**QUESTÃO 06** – Considerando os trechos a seguir, retirados do texto-base, assinale a alternativa na qual a palavra “se” tenha sido empregada como conjunção.

- A) “[...] renúncia ao egoístico ato de se colocar em primeiro lugar”.
- B) “Talvez você se pergunte [...]”.
- C) “[...] por isso deve-se insistir nesse propósito”.
- D) “[...] como será verdade se as pessoas estão cada vez mais pensando só em si”.
- E) “Conta-se que certas tribos indígenas [...]”.

**QUESTÃO 07** – Assinale a alternativa que indica quantas outras alterações seriam obrigatoriamente necessárias caso a palavra “diálogos” fosse substituída por sua forma singular no trecho a seguir, retirado do texto-base:

“Vêm-me \_\_\_ mente os diálogos socráticos, nos quais cada interlocutor apresenta seus pontos de vista”.

- A) 3.
- B) 4.
- C) 5.
- D) 6.
- E) 7.

**QUESTÃO 08** – Considerando a expressão “pre....indir de” (l. 09) na situação em que ocorre no texto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Um sinônimo possível para tal expressão seria “dispensar”.
- B) A lacuna pontilhada deveria ser preenchida por “c”.
- C) A expressão é formada por um verbo da terceira conjugação.
- D) Em relação à sua transitividade, tal verbo é transitivo indireto.
- E) A forma verbal que compõe a expressão encontra-se no infinitivo.

**QUESTÃO 09** – Na linha 11, tem-se o emprego da locução conjuntiva “No entanto”, que carrega a ideia de \_\_\_\_\_ e poderia ser substituída por “\_\_\_\_\_”, \_\_\_\_\_ necessárias alterações no período a fim de que se mantenha a mesma relação de sentido e a correção gramatical.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) condição – conquanto – sendo
- B) condição – conquanto – não sendo
- C) oposição – conquanto – sendo
- D) oposição – todavia – não sendo
- E) oposição – todavia – sendo

**QUESTÃO 10** – Considerando os trechos a seguir, retirados do texto-base, assinale a alternativa na qual a palavra “que” NÃO tenha sido empregada como pronome relativo.

- A) “[...] aquele que está próximo de nós”.
- B) “[...] com comunidades que passaram por grandes perdas”.
- C) “[...] ricos encontros que geralmente desaguam em divagações [...]”.
- D) “[...] sempre termos o que acrescentar no diálogo [...]”.
- E) “Conta-se que certas tribos indígenas [...]”.

**POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**

**QUESTÃO 11** – Considerando as previsões da Constituição Federal de 1988 em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- A) O subsistema da saúde está inserido no sistema social do seguro, em conjunto com os subsistemas da previdência social e assistência social.
- B) Compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- C) A participação na produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos é de competência do SUS, com exceção da produção dos hemoderivados.
- D) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde é de competência do Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Saúde.
- E) É de competência das Universidades todo desenvolvimento científico e tecnológico da área da saúde, não havendo necessidade de incremento pelo SUS.

**QUESTÃO 12** – Considerando as previsões em relação ao SUS com base na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- B) A Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito privativamente público.
- C) Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS).
- D) O SUS poderá, em livre iniciativa e a qualquer momento, recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, em detrimento da própria oferta de serviços, formalizadas mediante termo de compromisso entre as instituições.
- E) Na prestação de serviços de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento, com exceção dos serviços prestados pela iniciativa privada, que possuem seu próprio regramento.

**QUESTÃO 13** – Mesas de negociação, contratos internos de gestão, Câmara Técnica de Humanização (CTH), Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), gerência de porta aberta, entre outros, são arranjos de trabalho que exemplificam dispositivos de qual diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH)?

- A) Clínica ampliada.
- B) Acolhimento.
- C) Cogestão.
- D) Valorização do trabalho e do trabalhador.
- E) Defesa dos direitos do usuário.

**QUESTÃO 14** – Não basta garantir o direito ao acompanhante, é preciso que existam espaços capazes de acolhê-los, assim como não é possível assegurar e promover a inclusão da pessoa com deficiência sem a configuração de espaços e de práticas de modo universalizante. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sensibilidade às necessidades é o primeiro passo para favorecer a inclusão dos diferentes sujeitos.
- B) Um objeto acessível é aquele que pode ser alcançado para uso. Uma vez alcançado, supõe-se que seu uso, seguro e autônomo, não seja mais uma questão de acessibilidade, e sim de usabilidade.
- C) A confortabilidade não se limita à supressão dos fatores indesejáveis e de inacessibilidade, mas envolve algo a mais, um conjunto de valores onde trabalhadores e usuários identifiquem seu mundo e suas referências nos espaços de cuidado e atenção à saúde.
- D) Utilizar o conceito arquitetônico de Desenho Compartimental ao projetar os espaços da saúde, favorece a integração e potencializa o espaço para o uso democrático dos diferentes usuários.
- E) A discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários, acompanhantes e trabalhadores de cada serviço, possibilita a criação de espaços saudáveis e acolhedores e melhora o processo de trabalho e a produção de saúde.

**QUESTÃO 15** – A qualidade da atenção à saúde exige a formação de pessoal específico, com domínio de tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva. É imprescindível e obrigatório o comprometimento das instituições de ensino em todos os níveis, com o SUS e com o modelo assistencial definido nas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990. Esse comprometimento se dá por meio de diversas ações, como as seguintes, EXCETO:

- A) Formulação de diretrizes curriculares que contemplem as prioridades expressas pelo perfil epidemiológico e demográfico das regiões do País.
- B) Incentivo à formação dos trabalhadores do SUS, em todos os níveis, em especial nas áreas prioritárias para o funcionamento do Sistema, incluindo gestores, por meio das escolas de governo vinculadas às Secretarias Municipais e de Estado de Saúde, escolas técnicas federais e universidades da localidade ou de sua região.
- C) Implementação de política de capacitação de docentes orientada para o SUS.
- D) Abertura de campos de estágio para a formação dos trabalhadores do SUS, tendo o trabalho como referência e eixo central do processo ensino-aprendizagem, vinculados aos princípios e aos objetivos do SUS.
- E) Incentivo aos programas de residência médica e em área profissional, adequados às necessidades da instituição de ensino e/ou estabelecimento de saúde proponente e deliberadas pelos respectivos Conselhos de Classe.

**QUESTÃO 16** – O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.763/2003) completa 22 anos em 2025, consolidando-se como um marco fundamental na proteção dos direitos da pessoa idosa no Brasil. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

- A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- B) Em caso da identificação de doenças infectocontagiosas em pessoa idosa na instituição de longa permanência, a instituição deverá comunicar ao Conselho da Pessoa Idosa para as devidas providências.
- C) Entre as obrigações das instituições de longa permanência estão: preservar vínculos familiares, oferecer acomodações apropriadas para pessoa idosa e para o recebimento de visitas, promover atividades de lazer. Contudo, as instituições não são obrigadas a propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças.
- D) Quando for necessário o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos, o agente promoverá o contato necessário com a família ou responsável para providenciar o deslocamento da pessoa até o órgão público demandante, com atendimento agendado prioritário.
- E) A pessoa idosa enferma que necessitar de atendimento domiciliar para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária poderá realizar o atendimento em instituição privada não vinculada ao SUS e, posteriormente, encaminhar o laudo para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) através de procurador legalmente constituído.

**QUESTÃO 17** – Para implementar o objetivo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) de promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS, é necessário refletir sobre conceitos que dão base aos entendimentos sobre o assunto. Dessa forma, assinale alternativa que descreve corretamente o conceito de "racismo", de acordo com a cartilha "Educando para as Relações Étnico-Raciais" (2024).

- A) Comportamento social originado do preconceito, que diferencia e classifica negativamente uma pessoa em função de alguma característica aparentemente diferente ou "específica".
- B) Conceito ou opinião formados antes de ter os conhecimentos necessários sobre determinado assunto. Acontece quando um julgamento antecipado inviabiliza o respeito às diferenças.
- C) Forma sistêmica de discriminação baseada em raça/cor e etnia, que tem como resultado a desigualdade e a restrição de direitos nas esferas (pública e privada) da vida de pessoas não brancas, sendo construído e reproduzido a partir de relações de poder e dominação.
- D) Falas e expressões que por vezes passam despercebidos, pois parece que eles "sempre estiveram ali". Isso porque se baseiam em toda uma bagagem de aprendizados coletivos e vivências pessoais, em estereótipos raciais naturalizados com o tempo e que se materializam.
- E) Compreensão de que é necessário oferecer condições adequadas para que todas as pessoas tenham, realmente, acesso às mesmas oportunidades. Isso significa dar mais para quem precisa mais, de forma proporcional e adequada às suas circunstâncias.

**QUESTÃO 18** – Considerando a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, instituída pela Portaria nº 2.836/2011, assinale a alternativa correta.

- A) A discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero, embora relacionadas, não incidem na determinação social da saúde.
- B) Devido à inexistência de dados, ainda não é possível identificar se há ou não desigualdade de acesso aos serviços de saúde pelas lésbicas e mulheres bissexuais.
- C) Uma das diretrizes na elaboração de planos, projetos e ações na saúde envolve a inclusão da temática da orientação sexual e identidade de gênero nos processos de educação permanente desenvolvidos para trabalhadores da saúde pelo SUS, não incluindo os integrantes dos Conselhos de Saúde e as lideranças sociais, que são abarcados pelo controle social.
- D) A discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incidem no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social reservado às populações de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
- E) Há uma incoerência e desalinhamento entre a interseccionalidade e a produção da desigualdade no atendimento das demandas e necessidades em saúde da população LGBT, principalmente por conta da inclusão das especificidades de raça, cor, etnia, territoriais e outras congêneres na mesma população.

**QUESTÃO 19** – Uma das diretrizes do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS é o acolhimento às trabalhadoras da saúde no processo de maternagem. São ações previstas nessa diretriz:

- I. Sensibilizar as gestoras e os gestores para manutenção da carga horária e ampliação de metas de trabalho no primeiro mês após o retorno da licença-maternidade, visando à readaptação da mulher no trabalho na saúde.
- II. Flexibilizar horários de trabalho garantindo dois descansos especiais, de meia hora cada um, durante a jornada de trabalho até o 6º mês de vida do bebê, além dos intervalos normais para repouso e alimentação, mesmo tratamento estendido para casos de adoção (art. 396 da CLT).
- III. Fomentar estratégias de acolhimento e respeito às particularidades das mulheres que retornam do processo de licença maternidade e necessitam de reorganização do seu processo de trabalho.
- IV. Flexibilizar horários de trabalho para mulheres lactantes trabalhadoras que retornam da licença-maternidade e desejam continuar amamentando seus filhos, para que possam sair para amamentar, visto ser vedado amamentar dentro da instituição de trabalho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 20** – Em relação às ações estratégicas da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD) e Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) no âmbito do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Atendimento especializado em reabilitação e dispensação de tecnologia assistiva, aumentando as possibilidades de autonomia, independência e inclusão social da pessoa com deficiência.
- B) Instituição de linhas de cuidado, informadas por evidências científicas, voltadas às pessoas com deficiência, entre elas, mas não restrita, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pé torto congênito, trissomia do cromossomo 21, pessoas estomizadas e outras condições de saúde, considerando a lógica de atenção interprofissional, multiprofissional e interdisciplinar.
- C) Definição de fluxos para o acesso à tecnologia assistiva de acordo com critérios de equidade e funcionalidade, incluindo medicamentos, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.
- D) Ampliação e fortalecimento das ações voltadas ao diagnóstico precoce de agravos, incluindo-se as triagens neonatais, de modo a possibilitar intervenções precoces e início do tratamento, habilitação e/ou reabilitação em tempo oportuno.
- E) Articulação e integração dos diferentes pontos de atenção, considerando a centralidade da Atenção Especializada como coordenadora do cuidado e ordenadora das Redes de Atenção à Saúde.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 21** – Em relação à publicidade profissional na Odontologia, conforme as normas éticas vigentes, é permitido ao cirurgião-dentista:

- A) Garantir resultados de tratamentos em redes sociais.
- B) Divulgar fotos de “antes e depois”, desde que não haja identificação do paciente.
- C) Fazer referência à excelência de sua formação e atuação em áreas específicas.
- D) Apresentar o número de registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) em materiais de divulgação.
- E) Mencionar premiações recebidas como forma de valorização de sua atuação profissional.

**QUESTÃO 22** – Em relação ao processo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família (ESF), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A adscrição de clientela permite identificar a população sob responsabilidade da equipe, favorecendo o vínculo, a continuidade do cuidado e a responsabilização sanitária.
- ( ) A organização do processo de trabalho deve priorizar o atendimento da demanda espontânea, mesmo que em detrimento das ações programadas e da vigilância em saúde.
- ( ) A responsabilização sanitária implica compromisso longitudinal da equipe com os agravos e condições de saúde da população sob sua responsabilidade.
- ( ) O planejamento das ações da equipe deve ocorrer exclusivamente em nível municipal, sendo responsabilidade da gestão central definir metas e rotinas do processo de trabalho das unidades.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – F.
- B) V – V – F – F.
- C) F – F – V – V.
- D) F – V – F – F.
- E) V – F – V – V.

**QUESTÃO 23** – Antônio, 59 anos, vive em situação de vulnerabilidade social e é acompanhado pela equipe da ESF. Possui diabetes descompensado, é edêntulo total e relata dificuldade de alimentação por ausência de prótese. A Equipe de Saúde Bucal (ESB) realiza avaliação e deseja inseri-lo no fluxo de reabilitação, conforme diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB). Sobre esse caso, analise as assertivas abaixo:

- I. A inclusão do paciente em fluxo de prótese dentária pode ser feita pela própria ESB, com moldagem inicial e solicitação ao Laboratório Regional de Prótese Dentária, conforme protocolos locais.
- II. Pacientes em situação de vulnerabilidade têm prioridade absoluta no processo de confecção de prótese, independentemente da avaliação clínica.
- III. A ESB deve atuar em parceria com outros profissionais da unidade para garantir a abordagem integral, incluindo controle glicêmico e orientação nutricional.
- IV. A confecção de prótese total pelo SUS depende de encaminhamento exclusivo ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pois não é atribuição da Atenção Primária/Básica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 24** – Durante a anamnese, um paciente adulto relata uso contínuo de losartana e omeprazol, além de episódios recorrentes de dor epigástrica. Está agendada uma exodontia do dente 38 incluso. Com base na farmacologia dos Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINEs) e nas boas práticas clínicas em Odontologia, assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação relativa ao uso de AINEs nesse cenário.

- A) Paciente com hipotireoidismo sob controle medicamentoso, sem queixas gastrointestinais ou cardiovasculares.
- B) Paciente em uso regular de losartana e inibidor da bomba de prótons, com histórico de desconforto epigástrico.
- C) Indivíduo ansioso, com uso esporádico de ansiolítico benzodiazepínico, sem disfunções orgânicas conhecidas.
- D) Jovem de 17 anos, sem comorbidades registradas, com boa condição geral de saúde.
- E) Indivíduo com histórico odontológico de cirurgia parendodôntica realizada no último ano, sem intercorrências pós-operatórias.

**QUESTÃO 25** – Em pacientes com gengivite ulcerativa necrosante aguda, uma das principais indicações farmacológicas é:

- A) Prednisona associada à clorexidina.
- B) Dipirona 500 mg e ibuprofeno 600 mg, em doses alternadas, a cada 6 horas.
- C) Metronidazol 400 mg, 3 vezes ao dia, 7 dias, associado a debridamento mecânico.
- D) Nistatina suspensão oral, por 14 dias.
- E) Cefalexina associada a fluconazol.

**QUESTÃO 26** – Sobre o papel do cirurgião-dentista na equipe hospitalar e os aspectos éticos e clínicos da sua atuação em ambiente de alta complexidade, analise as assertivas abaixo:

- I. O cirurgião-dentista deve adequar sua conduta às limitações clínicas do paciente crítico, priorizando a biossegurança e a estabilidade sistêmica.
- II. A documentação em prontuário de todas as ações odontológicas no ambiente hospitalar é obrigatória, inclusive é passível de descredenciamento na dependência do Regimento Interno.
- III. A intervenção odontológica em pacientes neutropênicos deve ser imediata, preferencialmente com raspagem e profilaxia.
- IV. A atuação do dentista em ambiente hospitalar inclui não apenas o tratamento de lesões, mas também ações preventivas e de educação em saúde.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 27** – Sobre os vasoconstritores utilizados em anestésicos locais, é correto afirmar que:

- A) A epinefrina aumenta o sangramento no campo operatório por efeito vasodilatador.
- B) A felipressina é contraindicada em pacientes hipertensos, por seu efeito adrenérgico.
- C) A presença de vasoconstritor aumenta a duração da anestesia e reduz toxicidade sistêmica.
- D) A noradrenalina é mais segura que a epinefrina, por ter ação exclusivamente periférica.
- E) A associação de anestésico sem vasoconstritor é preferível em todos os portadores de cardiopatias.

**QUESTÃO 28** – No contexto da atuação odontológica em ambientes hospitalares, o controle rigoroso de infecções cruzadas é fundamental para a segurança do paciente e da equipe de saúde. Considerando os protocolos de biossegurança e as medidas de precaução padrão preconizadas para prevenção de infecções nosocomiais, assinale a alternativa correta.

- A) A limpeza dos instrumentais críticos pode ser realizada manualmente, desde que eles sejam imersos em desinfetante de alto nível antes da esterilização.
- B) O atendimento de pacientes com histórico de infecções transmissíveis deve ser programado sempre para o final do expediente para evitar risco de contaminação da unidade odontológica.
- C) O uso de antisséptico bucal pré-procedimento é indicado apenas em pacientes com sinais clínicos de inflamação gengival ativa ou sangramento.
- D) A esterilização de sondas e espelhos é obrigatória apenas quando usados em procedimentos cirúrgicos ou em ambiente hospitalar de risco elevado.
- E) A utilização de campos, barreiras plásticas em superfícies de contato e Equipamento de Proteção Individual (EPI) são medidas universais aplicáveis a todos os atendimentos, independentemente do diagnóstico do paciente.

**QUESTÃO 29** – Durante a exodontia do dente 26 (primeiro molar superior esquerdo), um paciente adulto, hígido, sem histórico de doenças sistêmicas ou uso de anticoagulantes, apresenta sangramento abundante e persistente no alvéolo, mesmo após irrigação e compressão inicial com gaze estéril. Não há sinais de hemorragia sistêmica ou comprometimento geral, e a extração foi tecnicamente correta. Considerando a situação descrita e com base em evidências científicas, qual é a conduta clínica local mais adequada para esse caso?

- A) Suspender o atendimento, solicitar exames laboratoriais de coagulação e encaminhar o paciente para avaliação médica de urgência.
- B) Prescrever antibiótico profilático e analgésico opioide para prevenir infecção e controlar a dor associada ao sangramento.
- C) Aplicar compressão com gaze embebida em hemostático local, associar sutura alveolar se necessário e observar resposta clínica imediata.
- D) Realizar nova anestesia local com maior concentração de vasoconstritor e aplicar gelo diretamente no alvéolo.
- E) Considerar o sangramento como normal em molares superiores e apenas orientar o paciente a manter pressão com gaze por algumas horas em casa.

**QUESTÃO 30** – Sobre o tratamento cirúrgico do cisto radicular residual, assinale a alternativa correta.

- A) A exérese cirúrgica deve sempre incluir a remoção de tecidos duros adjacentes e margem óssea de 1 cm.
- B) Cistos residuais assintomáticos e estáveis devem ser acompanhados clinicamente e não requerem biópsia.
- C) Os cistos radiculares residuais apresentam alto risco de transformação maligna, justificando quimioterapia preventiva.
- D) Em casos de cisto residual em mandíbula posterior, a marsupialização é preferida devido ao risco de fratura.
- E) A abordagem padrão é a enucleação cirúrgica, com envio obrigatório da peça para exame histopatológico.

**QUESTÃO 31** – Sobre Úlceras Aftosas Recorrentes (UAR), assinale a alternativa correta.

- A) São lesões ulceradas, dolorosas, recobertas por pseudomembrana esbranquiçada, com halo eritematoso, e ocorrem exclusivamente em mucosa queratinizada.
- B) A forma herpetiforme ocorre tipicamente em adultos jovens, com múltiplas lesões pequenas, muitas vezes confundidas com infecção herpética.
- C) A forma major é a mais comum, autolimitada e geralmente não deixa cicatriz após a resolução.
- D) O tratamento é exclusivamente com antivirais sistêmicos, independentemente da forma clínica.
- E) São manifestações típicas da mucosite urêmica em pacientes com insuficiência renal crônica.

**QUESTÃO 32** – De acordo com Peterson *et al.* (2016) sobre subluxação e trauma dentário em dentes permanentes, analise as assertivas abaixo:

- I. A subluxação é uma lesão de ligamento periodontal sem perda da posição do dente, e raramente requer tratamento além do controle da dor e acompanhamento pulpar.
- II. Radiograficamente, a subluxação pode ser confirmada por um aumento visível no espaço do ligamento periodontal em um ou mais lados da raiz.
- III. A resposta pulpar a uma subluxação pode variar, sendo comum o desenvolvimento de necrose pulpar em adultos, motivo pelo qual o teste de sensibilidade deve ser repetido periodicamente.
- IV. O uso de antibióticos sistêmicos é indicado rotineiramente em todos os casos de subluxação para prevenir infecções endodônticas ou periodontais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I, II e IV.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 33** – Um paciente de 78 anos sofreu uma queda com impacto na região da mandíbula e apresenta dor à movimentação mandibular, limitação de abertura bucal e desvio da linha média para a direita. A tomografia revela fratura unilateral da cabeça do côndilo mandibular direito, sem desvio significativo e sem acometimento de estruturas intracranianas. O paciente é hígido, mas apresenta limitação funcional leve. Com base nos princípios descritos por Peterson *et al.* (2016) no manejo de fraturas condilares em adultos e considerando o perfil clínico do paciente, assinale a alternativa correta.

- A) O tratamento cirúrgico com redução aberta e fixação interna é indicado para prevenir fibrose da articulação temporomandibular e garantir alinhamento ósseo.
- B) O tratamento conservador com fisioterapia precoce, dieta pastosa e monitoramento funcional é apropriado, dada a ausência de deslocamento e a idade avançada.
- C) O Bloqueio Maxilomandibular (BMM) é obrigatório em todas as fraturas condilares, inclusive em idosos, para garantir imobilidade e consolidação óssea.
- D) Em pacientes acima de 70 anos, a exodontia dos dentes posteriores deve preceder qualquer abordagem da fratura condilar para evitar sobrecarga oclusal.
- E) A cirurgia de acesso pré-auricular com osteossíntese é contraindicada apenas nos casos de fratura bilateral da cabeça condilar, mas indicada nas fraturas unilaterais.

**QUESTÃO 34** – João, 59 anos, portador de Doença Renal Crônica (DRC) em estágio 4, com aproximadamente 30% da função renal (TFG estimada em 20 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>), é acompanhado por nefrologista e faz uso de eritropoetina, carbonato de cálcio e furosemida. Compareceu ao pronto atendimento odontológico com dor intensa em região posterior superior esquerda, febre baixa e edema local. Ao exame, detecta-se abscesso agudo em região do dente 28, com trismo moderado. Relata que a última dosagem de creatinina foi de 6,2 mg/dL (0,7-1,3 mg/dL) e ureia de 158 mg/dL (10-50 mg/dL), com anemia normocítica com Hb = 9,4 g/dL (13,5-17,5 g/dL) e função plaquetária alterada (tempo de sangramento prolongado, plaquetas = 138.000/mm<sup>3</sup> (150-400.000/mm<sup>3</sup>). Com base nesse cenário e nos princípios da atenção odontológica em pacientes com DRC avançada, assinale a alternativa correta.

- A) A incisão e drenagem devem ser realizadas imediatamente, com anestesia local convencional, e antibioticoterapia iniciada apenas se houver piora sistêmica.
- B) A amoxicilina com ácido clavulânico é uma opção segura para o controle infeccioso inicial, sem necessidade de ajuste de dose, pois é eliminada por via hepática.
- C) O uso de AINEs, como o ibuprofeno, é indicado para controle algico, desde que associado à proteção gástrica.
- D) A prescrição de analgésicos deve considerar o metabolismo e excreção renal; dipirona é preferível à morfina ou a AINEs nesse paciente.
- E) Dado o risco de infecção em foco odontogênico, é indicada a extração imediata do dente 28, mesmo sem antibiótico profilático e tempo de sangramento alterado.

**QUESTÃO 35** – Em relação aos cuidados odontológicos em pacientes imunocomprometidos internados em ambiente hospitalar, como Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ou enfermarias de transplante, analise as assertivas abaixo:

- I. O uso de clorexidina a 0,12% como antisséptico bucal é recomendado como medida preventiva auxiliar em pacientes imunossuprimidos, com evidência de redução do risco de pneumonia nosocomial.
- II. Procedimentos odontológicos eletivos, como raspagens e profilaxias, devem ser evitados em fases ativas de quimioterapia ou mielossupressão intensa, mesmo com anestesia local.
- III. O uso rigoroso de EPIs protege tanto a equipe quanto o paciente imunocomprometido, reduzindo o risco de infecção cruzada.
- IV. A rastreabilidade dos ciclos de esterilização de instrumentais odontológicos é prática recomendada em odontologia hospitalar, sobretudo em setores com pacientes de alto risco imunológico.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I, II e IV.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 36** – Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, analise as assertivas abaixo:

- I. A equidade, diferentemente da igualdade, pressupõe tratamento uniforme aos desiguais para garantir justiça distributiva.
- II. A descentralização do SUS implica que os Municípios têm autonomia plena na definição de políticas locais, podendo suplantam as normas federais caso estas não contemplem os Conselhos Municipal e Estadual de Saúde.
- III. A integralidade pode ser compreendida tanto como a articulação dos serviços quanto como a ampliação da clínica e da escuta do usuário.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 37** – No processo de trabalho da Equipe de Saúde da Família, o Projeto Terapêutico Singular (PTS)

- A) deve ser construído coletivamente e considerar aspectos clínicos e psicossociais.
- B) deve ser elaborado apenas para pacientes em internação hospitalar prolongada.
- C) substitui o prontuário eletrônico e a ficha clínica do paciente.
- D) é responsabilidade exclusiva do médico da equipe, com apoio técnico se solicitado por ele.
- E) aplica-se apenas em casos de saúde mental com dependência química.

**QUESTÃO 38** – Quanto às atribuições dos técnicos e auxiliares de saúde bucal no serviço público, assinale a alternativa correta.

- A) O técnico em saúde bucal pode realizar raspagem subgengival com supervisão direta.
- B) O auxiliar em saúde bucal pode prescrever flúor tópico de uso domiciliar.
- C) Apenas o cirurgião-dentista pode aplicar técnicas de escovação supervisionada em grupos escolares.
- D) O técnico em saúde bucal pode realizar atividades educativas em saúde sob supervisão.
- E) O auxiliar em saúde bucal pode realizar restaurações atraumáticas em comunidades isoladas.

**QUESTÃO 39** – Em relação aos indicadores epidemiológicos utilizados em saúde bucal, assinale a alternativa correta.

- A) O índice CPOD considera dentes restaurados como indicativo negativo de saúde bucal.
- B) O índice de sangramento gengival mede a presença de cálculo supragengival.
- C) O índice CPOD é utilizado apenas em adultos acima de 35 anos.
- D) O índice CPOD é uma medida cumulativa de experiência de cárie ao longo da vida.
- E) O índice de dentes perdidos considera apenas perdas traumáticas.

**QUESTÃO 40** – Entre as ações de promoção da saúde bucal reconhecidas como práticas exitosas na Atenção Primária em Saúde (APS), qual alternativa apresenta corretamente uma estratégia intersetorial e comprovadamente eficaz na redução das desigualdades em saúde bucal no Brasil?

- A) Realização de campanhas anuais de escovação supervisionada apenas em escolas privadas.
- B) Ampliação de acesso ao atendimento odontológico especializado em centros de referência hospitalar.
- C) Distribuição de kits de higiene bucal com orientação educativa ou acompanhamento específico do cirurgião-dentista.
- D) Ampliação do número de consultas por demanda espontânea nos centros de especialidades odontológicas.
- E) Implantação de equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família com ações educativas contínuas em creches e escolas públicas.

**QUESTÃO 41** – A fluoretação da água de abastecimento público é uma das principais estratégias de saúde pública na prevenção da cárie dentária. Sobre os parâmetros técnicos dessa medida no Brasil, assinale a alternativa correta.

- A) A concentração ideal de flúor na água é fixa em 0,7 ppm para todo o território nacional.
- B) A fluoretação da água é obrigatória apenas em cidades com mais de 500 mil habitantes.
- C) A concentração ótima de flúor na água varia de acordo com o clima da região, sendo maior em regiões frias e menor em quentes.
- D) A água fluoretada oferece maior risco de fluorose dentária severa do que os dentifrícios fluoretados.
- E) A fluoretação das águas no Brasil é regulamentada exclusivamente por normas da Organização Mundial da Saúde.

**QUESTÃO 42** – Os determinantes sociais se referem a um conjunto de acontecimentos, fatos, situações e comportamentos sociais, ambientais, políticos, culturais, entre outros, que afetam positiva ou negativamente a saúde dos indivíduos e das coletividades. Sobre os determinantes sociais relacionados à saúde bucal, assinale a alternativa correta.

- A) Há evidências de que a escolaridade materna e o acesso precoce à informação em saúde bucal estão relacionados a menores índices de cárie em crianças.
- B) A presença de cárie dentária está fortemente associada à genética, sendo pouco influenciada por fatores ambientais ou sociais.
- C) O uso de serviços odontológicos é determinado principalmente pela vontade individual do paciente, independentemente do seu contexto socioeconômico.
- D) O ambiente urbano, por possuir maior densidade populacional, tende a apresentar melhores condições de saúde bucal do que o meio rural, de forma geral, independentemente de outros fatores.
- E) A cultura não interfere significativamente na percepção de saúde bucal, pois os problemas dentários são universalmente reconhecidos como prioridade em todas as comunidades.

**QUESTÃO 43** – Em um território coberto por uma Equipe de Saúde da Família, os profissionais identificaram alta prevalência de edentulismo funcional em adultos jovens, associado à baixa adesão aos serviços odontológicos. Considerando os princípios da APS e o papel do cirurgião-dentista no SUS, qual das condutas a seguir está mais alinhada à abordagem integral e multiprofissional do cuidado?

- A) Elaborar grupos educativos em saúde bucal específicos para adultos jovens com perda dentária, com conteúdo técnico adaptado, sem articulação com as demais atividades da unidade.
- B) Participar ativamente do planejamento e execução de ações intersetoriais, incorporando a saúde bucal em estratégias educativas da equipe de saúde e redes locais, como escolas e associações comunitárias.
- C) Desenvolver ações de educação em saúde bucal e triagem clínica dentro da unidade, priorizando pacientes que já frequentam regularmente o consultório odontológico.
- D) Oferecer acolhimento odontológico diário com vagas limitadas para demanda espontânea, considerando a alta procura como critério de impacto social da saúde bucal.
- E) Reorganizar a agenda para concentrar os atendimentos odontológicos em grupos de risco, como gestantes e idosos, reduzindo a abrangência das ações para aumentar sua efetividade.

**QUESTÃO 44** – Em relação aos anestésicos locais utilizados na Odontologia, assinale a alternativa correta.

- A) A lidocaína possui início de ação mais lento que a bupivacaína.
- B) A prilocaína é contraindicada em gestantes devido ao alto poder vasodilatador.
- C) A articaína possui alta difusão óssea, sendo indicada em bloqueios e infiltrações.
- D) A mepivacaína apresenta vasodilatação intensa, exigindo sempre vasoconstritor.
- E) A ropivacaína é o anestésico de escolha para procedimentos de curta duração.

**QUESTÃO 45** – As doenças bucais são condições que afetam os dentes, gengivas, língua e todo o sistema estomatognático. Sobre as infecções bucais e seus efeitos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A gengivite ulcerativa necrosante está associada apenas a infecções bacterianas, sem relação com fatores sistêmicos.
- B) A cárie avançada pode causar abscessos que, em casos graves, resultam em celulite facial ou angina de Ludwig.
- C) Pacientes em tratamento com bisfosfonatos apresentam maior risco de osteonecrose dos maxilares após procedimentos bucais cruentos.
- D) O herpes simples intraoral está frequentemente associado à imunossupressão e afeta primariamente a mucosa ceratinizada.
- E) A candidíase atrófica crônica é comum em usuários de próteses totais ou parciais superiores.

**QUESTÃO 46** – Entre as doenças diagnosticadas pelo cirurgião-dentista, o câncer bucal é um dos agravos que necessita da confirmação do diagnóstico para estabelecer o plano de tratamento e definir os caminhos que o usuário deve percorrer até a resolução do caso. Sobre os exames complementares no diagnóstico do câncer bucal, assinale a alternativa correta.

- A) O exame histopatológico é dispensável para o encaminhamento ao tratamento em um centro de referência oncológica.
- B) A tomografia computadorizada e/ou a ressonância magnética podem ser utilizadas para avaliar a tipagem celular dos tumores.
- C) O exame clínico é suficiente para determinar o estadiamento da lesão nos casos que já se observe comprometimento de linfonodos regionais e metástases a distância.
- D) A ressonância magnética é útil para avaliar comprometimento de tecidos ósseos.
- E) Exames de imagem auxiliam na determinação do estadiamento do câncer.

**QUESTÃO 47** – Mulher, 46 anos, em tratamento quimioterápico adjuvante para câncer de mama (ciclo iniciado há 10 dias), procura atendimento odontológico com queixa de sangramento gengival espontâneo, dor à mastigação e halitose. Ao exame clínico, observam-se gengiva intensamente eritematosa e ulcerada, presença de pseudomembranas esbranquiçadas e mobilidade dentária leve em múltiplos elementos. A paciente relata febre baixa e fadiga nas últimas 48 horas. Exame laboratorial recente evidencia neutropenia (neutrófilos  $<1.000/\text{mm}^3$ ). Qual é a conduta inicial mais adequada nesse caso?

- A) Realizar raspagem subgengival imediatamente, com anestesia local e prescrição de antibiótico profilático.
- B) Iniciar antibioticoterapia sistêmica, prescrever bochechos antissépticos e encaminhar para atendimento hospitalar.
- C) Aplicar laserterapia e iniciar antibióticos tópicos para evitar resistência bacteriana.
- D) Adiar o tratamento periodontal até o final do ciclo quimioterápico e prescrever anti-inflamatório não esteroide.
- E) Prescrever antifúngico oral e realizar profilaxia mecânica com ultrassom.

**QUESTÃO 48** – Segundo Miloro (2016), sobre acidentes e complicações durante exodontias, assinale a alternativa correta.

- A) Fraturas de tuberosidade maxilar podem ocorrer durante a remoção de caninos superiores, em razão do volume radicular e da resistência da bossa canina.
- B) Em exodontias de terceiros molares inferiores, as luxações da Articulação Temporomandibular (ATM) são raras e ocorrem somente quando há anquilose da ATM ou lesão periapical.
- C) Lesões ao nervo alveolar inferior são extremamente incomuns nas exodontias de terceiros molares inferiores.
- D) Hemorragias podem ser controladas com hemostasia local e sutura compressiva.
- E) A prevenção de acidentes em cirurgias bucomaxilofaciais incluem a realização de radiografias periapicais e oclusais antes do procedimento, as quais são as únicas disponíveis na Rede de Atenção à Saúde.

**QUESTÃO 49** – Mulher, 58 anos, diabética tipo 2 e hipertensa, apresenta um abscesso periapical agudo no dente 47. Está em uso de metformina e amlodipina. Qual das condutas a seguir é INCORRETA?

- A) Prescrever amoxicilina para o controle da infecção, ajustando a dose de acordo com a função renal.
- B) A profilaxia antibiótica deve ser obrigatória devido à condição sistêmica da paciente e ao risco cardiovascular.
- C) Realizar a drenagem do abscesso, preferencialmente via canal, e fazer a prescrição medicamentosa.
- D) Evitar o uso de AINEs, como nimesulida e ibuprofeno, pois podem exacerbar a hipertensão.
- E) Recomendar o uso de fluoreto tópico para prevenir lesões de cárie em função da hipossalivação secundária aos medicamentos e das alterações das glândulas salivares.

**QUESTÃO 50** – A candidíase pseudomembranosa é caracterizada pelo aparecimento de placas brancas, multifocais ou difusas, ligeiramente elevadas, localizadas na mucosa jugal, língua, palato e região retromolar. Essas placas, ou pseudomembranas, aparentam-se ao leite coalhado e são formadas por uma mistura de hifas do fungo, fibrina, leucócitos, bactérias, epitélio descamado e queratina. Em relação ao seu tratamento, qual antifúngico é indicado em casos leves e moderados de candidíase bucal pseudomembranosa em adultos imunocomprometidos, segundo o Ministério da Saúde (2024)?

- A) Metronidazol VO, 500 mg, de 8 em 8 horas, por 10 dias.
- B) Nistatina 100.000 UI/mL, em bochechos, 3 vezes ao dia, por 7 dias.
- C) Clotrimazol tópico 10 mg (Canesten®), 3 vezes ao dia, por 5 dias.
- D) Lidocaína tópica associada à dipirona, de 4 em 4 horas, por 14 dias.
- E) Fluconazol VO 100-150 mg/dia, por 7 a 14 dias.