

Domingo de manhã

CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 02/2025

MÉDICO (CIRURGIA GERAL)
76 – HOSPITAL FEDERAL BONSUCESSO (RJ)
47 – GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (RS)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - **refere-se ao número e ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



BONSUCESSO

V1_26/05/2025 12:51:23



CONCEIÇÃO



A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Concursos
fundatec

ISO 9001

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – Considerando as previsões da Constituição Federal de 1988 em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- A) O subsistema da saúde está inserido no sistema social do seguro, em conjunto com os subsistemas da previdência social e assistência social.
- B) Compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- C) A participação na produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos é de competência do SUS, com exceção da produção dos hemoderivados.
- D) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde é de competência do Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Saúde.
- E) É de competência das Universidades todo desenvolvimento científico e tecnológico da área da saúde, não havendo necessidade de incremento pelo SUS.

QUESTÃO 02 – Considerando as previsões em relação ao SUS com base na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- B) A Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito privativamente público.
- C) Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS).
- D) O SUS poderá, em livre iniciativa e a qualquer momento, recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, em detrimento da própria oferta de serviços, formalizadas mediante termo de compromisso entre as instituições.
- E) Na prestação de serviços de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento, com exceção dos serviços prestados pela iniciativa privada, que possuem seu próprio regramento.

QUESTÃO 03 – Mesas de negociação, contratos internos de gestão, Câmara Técnica de Humanização (CTH), Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), gerência de porta aberta, entre outros, são arranjos de trabalho que exemplificam dispositivos de qual diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH)?

- A) Clínica ampliada.
- B) Acolhimento.
- C) Cogestão.
- D) Valorização do trabalho e do trabalhador.
- E) Defesa dos direitos do usuário.

QUESTÃO 04 – Não basta garantir o direito ao acompanhante, é preciso que existam espaços capazes de acolhê-los, assim como não é possível assegurar e promover a inclusão da pessoa com deficiência sem a configuração de espaços e de práticas de modo universalizante. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sensibilidade às necessidades é o primeiro passo para favorecer a inclusão dos diferentes sujeitos.
- B) Um objeto acessível é aquele que pode ser alcançado para uso. Uma vez alcançado, supõe-se que seu uso, seguro e autônomo, não seja mais uma questão de acessibilidade, e sim de usabilidade.
- C) A confortabilidade não se limita à supressão dos fatores indesejáveis e de inacessibilidade, mas envolve algo a mais, um conjunto de valores onde trabalhadores e usuários identifiquem seu mundo e suas referências nos espaços de cuidado e atenção à saúde.
- D) Utilizar o conceito arquitetônico de Desenho Compartimental ao projetar os espaços da saúde, favorece a integração e potencializa o espaço para o uso democrático dos diferentes usuários.
- E) A discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários, acompanhantes e trabalhadores de cada serviço, possibilita a criação de espaços saudáveis e acolhedores e melhora o processo de trabalho e a produção de saúde.

QUESTÃO 05 – A qualidade da atenção à saúde exige a formação de pessoal específico, com domínio de tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva. É imprescindível e obrigatório o comprometimento das instituições de ensino em todos os níveis, com o SUS e com o modelo assistencial definido nas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990. Esse comprometimento se dá por meio de diversas ações, como as seguintes, EXCETO:

- A) Formulação de diretrizes curriculares que contemplem as prioridades expressas pelo perfil epidemiológico e demográfico das regiões do País.
- B) Incentivo à formação dos trabalhadores do SUS, em todos os níveis, em especial nas áreas prioritárias para o funcionamento do Sistema, incluindo gestores, por meio das escolas de governo vinculadas às Secretarias Municipais e de Estado de Saúde, escolas técnicas federais e universidades da localidade ou de sua região.
- C) Implementação de política de capacitação de docentes orientada para o SUS.
- D) Abertura de campos de estágio para a formação dos trabalhadores do SUS, tendo o trabalho como referência e eixo central do processo ensino-aprendizagem, vinculados aos princípios e aos objetivos do SUS.
- E) Incentivo aos programas de residência médica e em área profissional, adequados às necessidades da instituição de ensino e/ou estabelecimento de saúde proponente e deliberadas pelos respectivos Conselhos de Classe.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – A respeito da prevenção de doenças através de imunizações, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Imunização é o processo de indução de imunidade por meio da administração de antígenos (por exemplo, as vacinas) ou anticorpos.
- B) Vacina inativada é aquela composta por bactérias ou vírus mortos que, após replicação em meios de cultura, são inativados por procedimentos químicos ou físicos.
- C) Vacina combinada é uma vacina na qual o polissacarídeo é conjugado a uma proteína carreadora, com capacidade de estimular a resposta imune timo-dependente.
- D) A vacina BCG é uma vacina atenuada composta por bactérias vivas, especialmente o bacilo de Calmette-Guérin que protege contra as formas graves de tuberculose, como a miliar e a meningite tuberculosa.
- E) A vacina oral contra poliomielite é atenuada, composta por vírus vivos, e a vacina injetável contra poliomielite é inativada, composta por vírus mortos.

QUESTÃO 07 – Sobre os acidentes com escorpiões, que podem levar a pessoa acidentada a um quadro clínico emergencial, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os escorpiões são de grande importância na saúde pública, especialmente em decorrência de fatores associados à urbanização desordenada, com acúmulo de resíduos, lixo, proliferação de pragas urbanas, e ao transporte de cargas.
- B) A cauda dos escorpiões é formada por dois segmentos e no fim dela situa-se o ferrão, também conhecido como telso. São crescentes no Brasil os acidentes com escorpiões do gênero *Tityus* (*T. serrulatus* – escorpião preto).
- C) Grupos vulneráveis são representados por sujeitos trabalhadores na construção civil, ou em madeiras, distribuidoras de hortifrutigranjeiros, e crianças e pessoas que permanecem em casa ou em quintais por maiores períodos.
- D) Os escorpiões podem sobreviver vários meses sem alimento e sem água.
- E) O soro antiescorpiônico intravenoso é indicado para quadro grave com manifestação sistêmica intensa, como inúmeros episódios de vômitos, priapismo, convulsões, insuficiência cardíaca e agitação alternada com sonolência.

QUESTÃO 08 – A respeito de Epidemiologia em Saúde e/ou de indicadores de saúde que podem ser utilizados na avaliação de serviços de saúde ou da situação de saúde na população, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A avaliação dos serviços de saúde é usualmente baseada na coleta de dados sobre estrutura, processo e resultado, conforme o modelo criado por Donabedian, na década de 1960.
- B) Entre os indicadores utilizados na análise de impacto organizacional dos serviços de saúde, citam-se como exemplos: recursos financeiros, custos e despesas; e estoque (material de consumo, medicamentos, vacinas e equipamentos médicos).
- C) Cita-se como exemplo de indicadores hospitalares de processo: índice de intervalo de substituição representado pela porcentagem de desocupação multiplicada pela média de permanência em dias, divididas pela porcentagem de ocupação.
- D) Citam-se como exemplo de indicadores utilizados na avaliação de resultados: morbidade ambulatorial com distribuição dos atendimentos ambulatoriais por causa, idade, sexo, custos; vigilância à saúde/vigilância epidemiológica e sanitária: incidência e prevalência de doenças de notificação compulsória.
- E) A Organização Mundial da Saúde estabelece alguns indicadores que permitem conhecer aspectos da situação de saúde da população e das práticas em saúde, entre eles: indicadores sociais e econômicos; indicadores da cobertura da Atenção Primária.

QUESTÃO 09 – As imunodeficiências primárias constituem um grupo de doenças heterogêneas que afetam primariamente a função do sistema imunológico. Mais recentemente, esse grupo de doenças tem sido denominado como Erros Inatos da Imunidade (EII). A principal manifestação dos EII são:

- A) Alergias.
- B) Linfomas.
- C) Leucemias.
- D) Infecções.
- E) Anemias.

QUESTÃO 10 – A respeito dos distúrbios do sódio, assinale a alternativa correta.

- A) A principal consequência da hipernatremia aguda por infusão de solução salina é o edema de membros inferiores.
- B) O tratamento da hiponatremia deve considerar a hipocalemia, pois a reposição de potássio desloca o sódio do compartimento extracelular para o intracelular.
- C) O principal local acometido pela desmielinização osmótica é o cerebelo.
- D) O sódio sérico, em caso de hiponatremia aguda, deve ser rapidamente elevado, mais do que 5 mEq/L/h, totalizando ao menos 20 mEq em 24h.
- E) Em casos crônicos, a hiponatremia leve está associada a distúrbios cognitivos, distúrbios de marcha, risco de queda e fraturas.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que apresenta um princípio fundamental corretamente descrito de acordo com o Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 2.217/2018.

- A) O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.
- B) É direito do médico requerer desagravo ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- C) É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- D) É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta.
- E) O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.

QUESTÃO 12 – A respeito do exame de urina de rotina, analise os resultados da análise física ou macroscópica da urina e suas possíveis alterações de cor, conforme a presença e a concentração de pigmentos, agentes químicos, produtos do metabolismo ou distúrbios endógenos, e assinale a alternativa que indica correspondência INCORRETA entre a cor apresentada e o respectivo fator.

- A) Cinza – furazolidona.
- B) Laranja – fenazopiridinas.
- C) Incolor – diabetes insípido.
- D) Azul – ácido homogentísico.
- E) Preta – melanina.

QUESTÃO 13 – A respeito da Ética Médica e da Bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Código de Ética Médica, no capítulo destinado ao Ensino e Pesquisa Médica, estabelece que é vedado ao médico deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa.
- B) No campo da Bioética, o consentimento informado é uma condição indispensável da relação médico-paciente e da pesquisa com seres humanos e se trata de uma decisão voluntária, realizada por uma pessoa autônoma e capaz, tomada após um processo informativo e deliberativo, visando à aceitação de um tratamento específico ou experimentação, sabendo da natureza deste, das suas consequências e dos seus riscos.
- C) No campo da Bioética, o consentimento informado obtido de forma correta legítima e fundamenta o ato médico ou de pesquisa como justo e eticamente correto.
- D) No campo da Bioética, o respeito decorrente da dignidade e a autonomia são propriedades que caracterizam o consentimento informado.
- E) No campo da Bioética, é evidente que o médico e os demais profissionais da saúde devem exercer o princípio da benevolência de modo absoluto, pois isso não aniquila a manifestação da vontade, dos desejos e dos sentimentos do paciente.

QUESTÃO 14 – A respeito de epidemiologia em saúde e da abordagem de exames diagnósticos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Na prática diagnóstica, podem ser utilizadas quatro estratégias, segundo Sackett *et al.* (1991): o reconhecimento padrão, a técnica da arborização ou do fluxograma, a técnica da exaustão e a técnica hipotético-dedutiva.
- B) As técnicas de raciocínio clínico, segundo Kassirer (1989), incluem o raciocínio probabilístico ou bayesiano, o raciocínio causal e o raciocínio determinístico ou categórico.
- C) O nomograma proposto por Fagan fornece diretamente, a partir da probabilidade pré-teste (incidência) da doença na população estudada, a probabilidade pós-teste, de acordo com as razões de verossimilhança.
- D) Entre outras ferramentas, a epidemiologia clínica utiliza para o processo diagnóstico a sensibilidade, a especificidade, a curva ROC (*Receiver-operating Characteristic*), os valores preditivos de um teste, a prevalência e as razões de probabilidades.
- E) A curva ROC compara sensibilidade e especificidade, além da taxa de falsos-positivos e de verdadeiros-positivos em múltiplos pontos de corte, e os testes de bom poder discriminatório se concentram no campo superior esquerdo dessa curva.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta INCORRETAMENTE a associação do achado clínico com sua respectiva doença.

- A) Edema pré-tibial com cacifo macio – mixedema.
- B) Hirsutismo – hipertireoidismo.
- C) Língua fissurada – acromegalia.
- D) Sinal de Schamroth – Doença de Crohn.
- E) Asteríxis – encefalopatia urêmica.

QUESTÃO 16 – Durante a reposição volêmica de um paciente crítico, opta-se por administrar grandes volumes de soro fisiológico 0,9%. Após a infusão, observa-se acidose metabólica hiperclorêmica. Qual mecanismo fisiopatológico explica, de forma mais provável, a alteração descrita?

- A) Diluição do bicarbonato plasmático.
- B) Aumento da produção de ácido lático.
- C) Perda renal de bicarbonato.
- D) Hiperventilação compensatória.
- E) Retenção de dióxido de carbono.

QUESTÃO 17 – Em relação ao suporte nutricional no paciente cirúrgico crítico de acordo com as recomendações do livro "Condutas no Paciente Grave", de Elias Knobel (2019), assinale a alternativa correta.

- A) A nutrição parenteral total deve ser iniciada precocemente em todos os pacientes cirúrgicos, independentemente da função gastrointestinal.
- B) A via oral ou enteral deve ser evitada nas primeiras 72 horas após grandes cirurgias abdominais.
- C) A nutrição hipocalórica com restrição proteica é preferível no pós-operatório imediato de pacientes críticos.
- D) A suplementação com aminoácidos específicos (como glutamina) é contraindicada em pacientes cirúrgicos graves.
- E) A nutrição enteral precoce está associada à redução de complicações infecciosas e deve ser considerada sempre que o trato gastrointestinal estiver funcional.

QUESTÃO 18 – Ainda de acordo com Knobel (2019), sobre os cuidados com o paciente cirúrgico grave nas fases pré, peri e pós-operatória, assinale a alternativa correta.

- A) A avaliação pré-operatória é desnecessária em cirurgias de emergência, pois o tempo é prioritário.
- B) Durante o período perioperatório, o controle rigoroso da temperatura corporal não é necessário em pacientes com boa reserva fisiológica.
- C) A monitorização hemodinâmica invasiva no perioperatório está indicada em pacientes jovens e saudáveis em cirurgia de baixo risco.
- D) No pós-operatório imediato, a dor deve ser monitorada e controlada de forma agressiva, pois sua presença está associada a complicações clínicas.
- E) Pacientes com risco cardiovascular elevado devem receber betabloqueadores, de forma universal, antes de qualquer cirurgia.

QUESTÃO 19 – Um paciente internado na UTI apresenta hiponatremia hipovolêmica, com natremia de 125 mEq/L, pressão arterial baixa e sinais de desidratação. Considerando as recomendações de Knobel (2006) e de Azevedo *et al.* (2020), qual é a conduta mais adequada para a correção desse distúrbio?

- A) Infusão cuidadosa de solução salina isotônica (NaCl 0,9%).
- B) Administração de solução salina hipertônica (NaCl 3%) em bólus rápido.
- C) Restrição hídrica rigorosa para evitar sobrecarga hídrica.
- D) Uso de diuréticos tiazídicos para aumentar a excreção de água livre.
- E) Administração de solução glicosada a 5% para diluir o sódio plasmático.

QUESTÃO 20 – Um paciente de 65 anos é admitido na UTI com diagnóstico de choque séptico. Após 48 horas de tratamento, ele desenvolve insuficiência renal aguda, disfunção hepática e necessidade de ventilação mecânica devido à hipoxemia refratária. Qual é a principal abordagem terapêutica para prevenir a progressão da falência de múltiplos órgãos nesse contexto?

- A) Administração de altas doses de corticosteroides para suprimir a resposta inflamatória.
- B) Início imediato de nutrição parenteral total para evitar catabolismo.
- C) Uso de antibióticos de amplo espectro, sem necessidade de revisão baseada em culturas.
- D) Otimização da perfusão tecidual, com suporte hemodinâmico e controle da fonte infecciosa.
- E) Restrição hídrica rigorosa para prevenir edema pulmonar.

QUESTÃO 21 – Durante um procedimento cirúrgico eletivo, o cirurgião identifica uma lesão inesperada em outro órgão, não relacionada à cirurgia inicialmente proposta e que não representa risco iminente à vida do paciente. O procedimento para corrigir essa lesão não foi previamente discutido nem autorizado. De acordo com o Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018), como o cirurgião deve proceder?

- A) Corrigir a lesão imediatamente, pois o benefício ao paciente justifica a intervenção.
- B) Corrigir a lesão apenas se houver concordância verbal do anestesista e da equipe.
- C) Registrar a lesão em prontuário e realizar o procedimento em outro momento, com o consentimento do paciente.
- D) Corrigir a lesão e informar o paciente após a cirurgia.
- E) Solicitar por telefone o consentimento de familiares e proceder à correção.

QUESTÃO 22 – Após uma cirurgia abdominal eletiva, o paciente apresenta sinais de infecção na ferida cirúrgica, como hiperemia, calor local e secreção purulenta. De acordo com o "Sabiston: Tratado de Cirurgia" (2020), qual é a conduta mais apropriada para o manejo inicial dessa complicação?

- A) Realizar sutura imediata da ferida para evitar maior contaminação.
- B) Iniciar antibioticoterapia sistêmica, sem necessidade de manejo local da ferida.
- C) Abrir a ferida para drenagem e limpeza, associando cuidados locais adequados.
- D) Aplicar curativos oclusivos para acelerar a cicatrização.
- E) Suspender qualquer tipo de limpeza, para permitir cicatrização espontânea.

QUESTÃO 23 – Sobre os princípios fundamentais da técnica operatória de acordo com o "Sabiston: Tratado de Cirurgia" (2020), qual das seguintes condutas é a mais adequada para minimizar o risco de infecção e promover boa cicatrização da ferida operatória?

- A) Manuseio vigoroso dos tecidos, para garantir exposição adequada e rapidez cirúrgica.
- B) Escolha preferencial de fios absorvíveis em todas as camadas, inclusive na pele.
- C) Coagulação extensa com eletrocautério em áreas amplas, para reduzir o sangramento.
- D) Uso de antibióticos profiláticos, que dispensa a necessidade de técnica asséptica rigorosa.
- E) Preservação do suprimento vascular e hemostasia meticulosa, que auxiliam na cicatrização.

QUESTÃO 24 – Durante uma laparotomia exploradora por suspeita de trauma abdominal, o cirurgião realiza a manobra de Kocher. Qual é o principal objetivo dessa manobra?

- A) Mobilizar o cólon esquerdo para exposição da aorta abdominal.
- B) Expor o pâncreas distal e o baço para hemostasia em sangramentos do retroperitônio.
- C) Mobilizar o duodeno e a cabeça do pâncreas para acesso à veia cava inferior.
- D) Reduzir hérnias diafragmáticas traumáticas por via abdominal.
- E) Avaliar a integridade do intestino delgado próximo à válvula ileocecal.

QUESTÃO 25 – Durante uma colecistectomia videolaparoscópica, a identificação da tríade de Calot é fundamental para evitar lesão de estruturas vitais. Qual das alternativas a seguir apresenta corretamente os limites anatômicos do triângulo de Calot (modificado)?

- A) Ducto cístico, artéria hepática comum e margem inferior do fígado.
- B) Ducto hepático comum, ducto cístico e artéria cística.
- C) Ducto hepático comum, ducto cístico e margem inferior do fígado.
- D) Ducto hepático comum, ducto colédoco e artéria hepática própria.
- E) Ducto colédoco, artéria cística e veia porta.

QUESTÃO 26 – Um paciente submetido à colectomia direita evolui, no quinto dia do pós-operatório, com febre, taquicardia e dor abdominal difusa. Ao exame, apresenta sinais de irritação peritoneal. Qual é a complicação cirúrgica mais provável nesse contexto e qual deve ser a conduta inicial, respectivamente?

- A) Hematoma de parede abdominal – observação ambulatorial.
- B) Atelectasia pulmonar – fisioterapia respiratória intensiva.
- C) Deiscência da anastomose intestinal – investigação com imagem.
- D) Trombose venosa profunda – iniciar anticoagulação plena imediatamente.
- E) Íleo paralítico prolongado – aumento da hidratação e mobilização precoce.

QUESTÃO 27 – Um paciente submetido a uma hernioplastia inguinal apresenta febre de 38,5 °C no segundo dia de pós-operatório. Está hemodinamicamente estável, com ausculta pulmonar reduzida na base direita e leve taquipneia. Qual é a causa mais provável da febre nesse período e qual é a conduta inicial mais adequada, respectivamente?

- A) Infecção da ferida operatória – iniciar antibiótico empírico.
- B) Atelectasia pulmonar – incentivar deambulação e fisioterapia respiratória.
- C) Infecção urinária – iniciar antibioticoterapia após urocultura.
- D) Trombose venosa profunda – iniciar anticoagulação plena.
- E) Pneumonia – solicitar TC de tórax e iniciar antibiótico de amplo espectro.

QUESTÃO 28 – Durante a preparação de um paciente para uma cirurgia abdominal eletiva, a equipe realiza a antissepsia da pele com clorexidina alcoólica. De acordo com o “Sabiston: Tratado de Cirurgia” (2020) sobre antissepsia e assepsia no campo operatório, assinale a alternativa correta.

- A) A antissepsia é desnecessária em cirurgias limpas, desde que seja feita tricotomia.
- B) O uso de soluções alcoólicas deve ser evitado em qualquer tipo de cirurgia por risco de queimadura.
- C) A assepsia diz respeito exclusivamente ao uso de antibióticos profiláticos pré-operatórios.
- D) A clorexidina alcoólica é superior à povidona iodada na redução de infecções do sítio cirúrgico.
- E) Luvas estéreis são dispensáveis se for feita antissepsia adequada da pele.

QUESTÃO 29 – Homem, 55 anos, admitido em unidade de atendimento por apresentar vômitos com sangue. Em investigação, é evidenciado melena ao toque retal. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que:

- A) A causa etiológica mais frequente do quadro apresentado são varizes de esôfago.
- B) Síndrome de Mallory-Weiss pode ser a causa em pacientes com vômitos recorrentes.
- C) Gastropatia da hipertensão portal é a causa mais frequente em pacientes hepatopatas.
- D) Deve-se pensar em úlcera péptica somente nos casos de uso de anti-inflamatório.
- E) Os inibidores da bomba de prótons não têm impacto na cicatrização da úlcera péptica.

QUESTÃO 30 – Paciente de 45 anos busca atendimento em consultório por apresentar aumento de volume abdominal há alguns meses. Refere que tem ficado mais "inchado". Ao exame físico, apresenta abdome flácido, com semicírculo de Skoda próximo à cicatriz umbilical. Sobre o caso apresentado, é correto afirmar que:

- A) A principal hipótese diagnóstica é insuficiência cardíaca congestiva com derrame pleural secundário.
- B) O aumento do volume abdominal está relacionado a complicações da obesidade.
- C) O achado do exame físico indica a presença de tumor abdominal, sendo indicada a cirurgia.
- D) A hipertensão portal é a principal causa em adultos, sendo necessário investigar hepatopatia.
- E) Quadro secundário à constipação funcional, sendo necessário indicar medidas laxativas.

QUESTÃO 31 – Sobre a Resolução CFM nº 2.429/2025, que atualiza os critérios para indicação e realização da cirurgia bariátrica e metabólica no Brasil, assinale a alternativa correta.

- A) Manteve a idade mínima de 18 anos para a realização da cirurgia em todas as situações.
- B) Alterou a indicação para incluir pacientes com IMC entre 25 e 30 com duas comorbidades associadas.
- C) Reduziu o IMC mínimo para indicação cirúrgica em pacientes com comorbidades associadas.
- D) Restringiu a realização da cirurgia, sendo indicada somente para pacientes com IMC acima de 35.
- E) Passou a permitir a realização da cirurgia em pacientes com IMC inferior a 25, independentemente da presença de comorbidades.

QUESTÃO 32 – Em relação à cirurgia videolaparoscópica, assinale a alternativa correta.

- A) A técnica de Hasson se refere à forma que se retira a vesícula pelo trocarte umbilical.
- B) O enfisema subcutâneo pode ser uma complicação causada pelo mau posicionamento da agulha de Veress.
- C) O procedimento é contraindicado para gestantes por apresentar mais riscos que a cirurgia laparotômica.
- D) Os gases utilizados para a insuflação da cavidade abdominal podem ser o óxido nítrico e o oxigênio.
- E) A pressão intra-abdominal é usualmente maior que 20 mmHg.

QUESTÃO 33 – Mulher, 63 anos, apresenta quadro de alteração do hábito intestinal com constipação há 2 meses, associada a emagrecimento de 15 kg no período. Condição foi investigada com colonoscopia, que evidenciou tumor de cólon sigmoide com obliteração parcial da luz, sem outros achados de lesões. Indicada intervenção cirúrgica. Sobre o caso apresentado, é correto afirmar que:

- A) Em tumores localizados no cólon sigmoide, a colectomia total com ileostomia terminal é a técnica padrão, independentemente da extensão da lesão.
- B) O esvaziamento linfático é desnecessário em tumores colônicos se não houver metástases visíveis durante a cirurgia.
- C) Em tumores do cólon sigmoide com obliteração parcial, o procedimento de Hartmann deve ser realizado de rotina em todos os pacientes.
- D) A cirurgia laparoscópica é contraindicada para tumores colônicos, especialmente em localização no cólon esquerdo.
- E) A colectomia segmentar oncológica exige margens adequadas e linfadenectomia regional, respeitando os princípios cirúrgicos.

QUESTÃO 34 – Sobre a resposta endocrinometabólica ao trauma, assinale a alternativa correta.

- A) Na fase inicial, ocorre aumento do débito cardíaco e hipermetabolismo.
- B) A liberação de cortisol, catecolaminas e glucagon estimula a gliconeogênese e a resistência periférica à insulina.
- C) O metabolismo basal diminui progressivamente durante a fase tardia.
- D) A resistência insulínica é minimizada na resposta ao trauma para favorecer a captação de glicose pelos tecidos.
- E) A principal fonte energética mobilizada na fase aguda do trauma são os ácidos graxos armazenados nos músculos.

QUESTÃO 35 – Homem, 20 anos, vítima de colisão de motocicleta em poste, em alta velocidade. No atendimento inicial, apresenta vias aéreas pervias, está consciente, confuso, com esforço respiratório e FR 34 irpm. Na inspeção torácica, presença de assimetria ventilatória, escoriações e abrasão no tórax direito. Ausculta pulmonar abolida à direita, com hipertimpanismo à percussão. Apresenta FC 140 bpm e PA 80x40 mmHg. Qual é a conduta imediata a ser adotada?

- A) Realizar toracocentese à direita.
- B) Proceder à intubação orotraqueal.
- C) Solicitar radiografia de tórax.
- D) Solicitar tomografia de tórax com contraste.
- E) Buscar a fonte do choque hipovolêmico.

QUESTÃO 36 – Mulher, 69 anos, hipertensa, vítima de queda da própria altura após tropeçar, tendo batido a cabeça em uma mesa, com ferimento corto-contuso de 3 cm em região temporal à direita. Admitida consciente, escala de Glasgow 15, pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem sinais localizatórios. Considerando o caso apresentado, além de realizar a sutura do ferimento, deve-se:

- A) Dispensar a paciente sem necessidade de investigação adicional.
- B) Internar a paciente para observação clínica e neurológica.
- C) Realizar tomografia computadorizada de crânio sem contraste.
- D) Realizar radiografia de crânio em três posições.
- E) Dispensar o uso de antitetânica caso tenha se vacinado na adolescência.

QUESTÃO 37 – De acordo com as diretrizes da *World Society of Emergency Surgery* (WSES), qual dos achados apresentados a seguir contraindica o tratamento não operatório de lesões abdominais sólidas?

- A) Presença de estabilidade hemodinâmica.
- B) Ausência de sinais de irritação peritoneal.
- C) Presença de lesões de vísceras ocas.
- D) Presença em unidade de terapia intensiva.
- E) Disponibilidade de cirurgia imediata.

QUESTÃO 38 – Um paciente de 65 anos dá entrada no pronto-socorro com quadro de dor abdominal difusa, distensão abdominal progressiva, náuseas e vômitos. Ao exame físico, observa-se timpanismo à percussão e ruídos hidroaéreos aumentados. A radiografia de abdome mostra níveis hidroaéreos em alças intestinais dilatadas. Com base nesse quadro clínico, qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Pancreatite aguda.
- B) Apendicite aguda.
- C) Abdome agudo perfurativo.
- D) Abdome agudo obstrutivo.
- E) Colecistite aguda.

QUESTÃO 39 – Entre as técnicas cirúrgicas para reparo de hérnias incisionais, qual apresenta a menor taxa de complicações e recidivas segundo a *International Endohernia Society* (IEHS)?

- A) *Onlay*.
- B) *Inlay*.
- C) *Underlay*.
- D) *Sublay*.
- E) *Interlay*.

QUESTÃO 40 – Mulher, 54 anos, com quadro de dor em cólica abdominal no andar superior do abdome, principalmente em hipocôndrio direito há 3 dias, com piora no dia da consulta, associada a náuseas, vômitos, sem febre. A ultrassonografia de abdome revelou os seguintes resultados:

- Fígado: tamanho e ecotextura preservados. Sem dilatação de vias biliares intra ou extra-hepáticas.
- Vesícula biliar: distendida, com espessamento parietal (>3 mm), conteúdo ecogênico móvel (cálculo de 1,2 cm) e presença de líquido perivesicular (halo hipoecoico sugestivo de edema). Sinal de Murphy ultrassonográfico positivo.
- Colédoco: diâmetro normal.
- Pâncreas e baço: sem alterações.

Com base no caso descrito, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o diagnóstico provável e a conduta indicada.

- A) Pancreatite aguda – internação, hidratação e analgesia.
- B) Hepatite aguda – analgesia e hidratação.
- C) Coledocolitíase – analgesia e ressonância magnética de abdome.
- D) Apendicite aguda – internação e apendicectomia.
- E) Colecistite aguda – internação e colecistectomia.