

INSTRUÇÕES

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 (QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada uma, sempre na sequência A, B, C e D, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno.
6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala e não pode ser aberto sob pena de eliminação.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de **3 (três) horas** a partir do início da prova.
11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 30 (trinta) minutos após o início de sua realização, não podendo levar o caderno de provas, sob pena de eliminação. Após o tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos de prova, o candidato poderá retirar-se do local de realização da Prova Objetiva levando consigo o caderno de prova, que contém espaço para anotação do gabarito.
13. **Os três últimos** candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos.
14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

PORTUGUÊS

Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 1 a 5:

[...]

Deslocando essas considerações para o campo dos estudos da linguagem, compreendemos o discurso de ódio como violência simbólica. Entendemos essa noção tal como propõe Slavoj Žižek (2014) ao refletir sobre as diferentes dimensões da violência e suas causas. Para o autor, a violência nossa de cada dia pode ser subjetiva ou objetiva. A primeira dimensão da violência é a forma mais visível, claramente identificável, é aquela que salta aos olhos porque “é percebida como uma perturbação do estado de coisas ‘normal’ e pacífico” (2014, p. 17-8). Já a violência em sua dimensão objetiva “é precisamente aquela inerente a esse estado ‘normal’ de coisas. [...] é uma violência invisível, uma vez que é precisamente ela que sustenta a normalidade do nível zero contra a qual percebemos algo como subjetivamente violento” (2014, p. 18). A violência objetiva se realiza como violência simbólica ou como violência sistêmica. Essas são as formas de violências sob a perspectiva de Žižek.

Em sua forma sistêmica, a violência objetiva “consiste nas consequências muitas vezes catastróficas do funcionamento regular de nossos sistemas econômico e político” (2014, p. 17). Quase invisível, esta violência está impregnada na estrutura social capitalista baseada nas relações de desigualdade-subordinação. É ela que ajuda a manter o *status quo* do sistema de relações sociais.

De outro lado, a violência simbólica é aquela “encarnada na linguagem”: “essa violência não está em ação apenas nos casos evidentes – e largamente estudados – de provocação e de relações de dominação social que nossas formas de discurso habituais reproduzem: há uma forma ainda mais fundamental de violência que pertence à linguagem enquanto tal, à imposição de um certo universo de sentido” (ŽIŽEK, 2014, p. 17).

O discurso de ódio expõe esta imposição de um certo universo de sentido. É por isso que desperta a atenção: porque faz emergir a violência por trás do estado normal de coisas e a intolerância com aqueles que desvirtuam/subvertem esse universo de sentidos. Esse tipo de discurso mostra que esse estado normal de funcionamento de nossa sociedade é baseado na relação superior/inferior e insiste que essa ordem deve ser respeitada. Quando essa normalidade não é observada emerge a intolerância, a discriminação, a hostilização materializada em discursos de ódio.

A violência simbólica opera no âmbito ideológico: encarna-se na linguagem para impor a reprodução das relações de dominação/subordinação. O discurso de ódio, ao sustentar-se na dicotomia superior/inferior, trabalha impondo e/ou lembrando o lugar de cada um na estrutura social; baseia-se na naturalização dessa relação dicotômica e dessa determinação de lugares. Atua perpetuando relações sócio-históricas de desigualdade-subordinação a partir da face mais intolerante que a dominação ideológica pode assumir.

Fragmento de texto de Mariana Jantsch de Souza, disponível em: <https://www.scielo.br/j/tla/a/BqJsGQQbc6csP838MJrRDFx/>

01. Considerando o fragmento de texto apresentado e recorrendo a conhecimentos enciclopédicos, assinale a alternativa CORRETA em relação ao texto integral.

A.	Trata-se de um fragmento de uma reportagem, cujo tema central é o discurso de ódio contra grupos vulnerabilizados, que tem por objetivo definir tal conceito e apresentar aspectos que o caracterizam.
B.	Trata-se de texto acadêmico, publicado em revista científica, que tem por objetivo discutir diferentes perspectivas teóricas sobre o conceito de ‘violência’.
C.	Trata-se de um texto acadêmico, cujo objetivo central é apresentar a contribuição da obra de Žižek (2014) na teorização do conceito de ‘discurso de ódio’.
D.	Trata-se de um texto científico em que a autora defende, a partir de perspectiva(s) teórica(s), que o discurso de ódio se configura como prática discursiva que exprime violência simbólica.

02. Considerando o conteúdo do texto, assinale a alternativa INCORRETA.	
A.	Na perspectiva de Žižek (2014), a violência simbólica relaciona-se ao conceito de violência objetiva e se dá via linguagem, podendo se constituir como uma violência mais aceitável no que tange à proteção da dignidade humana, já que se estabelece no estado normal das coisas.
B.	Considerando o conceito de ‘violência’ abordada nesse fragmento do texto, pode-se entender como expressão da violência simbólica as ações discursivas relacionadas ao uso de estereótipos que recaem sobre grupos sociais vulneráveis, por exemplo, o negro, o indígena e a mulher.
C.	O âmbito ideológico está relacionado ao uso da linguagem e à manutenção do <i>status quo</i> do sistema de relações sociais, contribuindo para que grupos marginalizados continuem a ocupar posição de subordinação em relação a indivíduos e grupos sociais socialmente prestigiados.
D.	A intolerância, a discriminação e a hostilização são formas de expressão do discurso de ódio, que emerge quando um universo de sentidos é modificado via linguagem, ameaçando o estado normal de funcionamento de nossa sociedade.

03. Assinale a alternativa que apresenta uma relação semântica ADEQUADA, de acordo com o conteúdo do texto.	
A.	Enquanto a violência objetiva é mais visível e fácil de identificar, a violência simbólica é mais invisível, por ser inerente a um estado normal de coisas.
B.	Enquanto a violência subjetiva é mais visível e fácil de identificar, a violência objetiva é mais invisível, por ser inerente a um estado normal de coisas.
C.	Enquanto a violência objetiva é mais visível e fácil de identificar, a violência subjetiva é mais invisível, por ser inerente a um estado normal de coisas.
D.	Enquanto a violência sistêmica é mais visível e fácil de identificar, a violência objetiva é mais invisível, por ser inerente a um estado normal de coisas.

04. Considerando os elementos do texto, assinale a alternativa INCORRETA.	
A.	No primeiro parágrafo, a oração fica sintaticamente mais completa com a inclusão de um pronome, conforme proposto a seguir: “Entendemos essa noção tal como a propõe Slavoj Žižek (2014)”.
B.	No quarto parágrafo, a expressão “de um certo universo de sentido” tem a função sintática de complemento nominal, pois complementa o sentido de um substantivo (“imposição”).
C.	A expressão “Quase invisível”, no 2º parágrafo, introduz uma finalidade em relação ao que se diz no restante do período.
D.	O pronome do caso reto usado no último período do segundo parágrafo é um elemento de coesão que se refere a ‘violência sistêmica’.

05. Em relação à pontuação, assinale a alternativa INCORRETA.	
A.	No terceiro parágrafo, os dois pontos introduzem uma citação direta, recurso recorrente em textos acadêmicos.
B.	No último período do quarto parágrafo, está faltando uma vírgula para isolar a oração adverbial, qual seja: “Quando essa normalidade não é observada”.
C.	Os travessões empregados no terceiro parágrafo isolam uma informação relativa a ‘casos evidentes’ e poderiam ser excluídos sem prejuízo sintático ao período.
D.	Nesse texto, as barras [/] são usadas para colocar em paralelo expressões sinônimas, menos no caso das conjunções “e/ou” (5º parágrafo), que introduzem relações lógicas distintas.

MATEMÁTICA

06. A nutricionista montou um cardápio em que alguns dias é possível que a Joana coma os seus alimentos preferidos juntos. Sabendo que ela pode comer carne vermelha a cada 3 dias, batata frita a cada 4 dias e macarrão a cada 6 dias, e que no dia 2 de março foi possível combinar os três (carne vermelha, bata frita e macarrão), a próxima vez que ela vai poder comer os 3 alimentos juntos será no dia:

A.	19/03.
B.	10/03.
C.	14/03.
D.	24/03.

07. Maria, Anita e Amélia recebem mesada de seus pais. Maria é a mais velha e recebe o dobro de Anita, que é a filha do meio. Por sua vez, Anita recebe o dobro de Amélia, que é a caçula. Sabendo que o total da mesada das três irmãs é de R\$ 350,00, quanto Maria, Anita e Amélia recebem, respectivamente?

A.	R\$ 200,00, R\$ 100,00 e R\$ 50,00.
B.	R\$ 180,00, R\$ 150,00 e R\$ 20,00.
C.	R\$ 50,00, R\$ 220,00 e R\$ 80,00.
D.	R\$ 50,00, R\$ 120,00 e R\$ 80,00.

08. Um ônibus demora $7\frac{1}{2}$ horas para fazer uma viagem de Cascavel-PR até Presidente Prudente -SP. Já um automóvel demora $5\frac{1}{4}$ horas. Geralmente, viajo de ônibus, mas, se eu for de carro, economizo quanto tempo na estrada?

A.	3 horas e 10 minutos.
B.	1 hora e 30 minutos.
C.	2 horas e 15 minutos.
D.	1 hora e 15 minutos.

09. O azulejista contratado para colocar o rodapé da sala comercial em que trabalho dispõe de retalhos de piso de vários tamanhos. As medidas variam entre 160 cm, 180 cm e 100 cm. Sabendo disso e com o objetivo de não desperdiçar material, cortar o piso em pedaços iguais e ainda do maior tamanho possível, posso esperar um rodapé de que tamanho?

A.	14cm.
B.	18cm.
C.	10cm.
D.	20cm.

10. No quintal de D. Maria, há galinhas e patas. Segundo ela, a soma do dobro do número de galinhas que botam com o triplo de patas que botam é igual a 47, e a diferença entre o número de galinhas e de patas que botam é 1. Sabendo disso, é CORRETO afirmar que o número de galinhas e patas botando é, respectivamente:

A.	10 galinhas e 9 patas.
B.	5 galinhas e 14 patas.
C.	8 galinhas e 11 patas.
D.	18 galinhas e 1 pata.

CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO

11. Segundo o parágrafo 2º do art. 16 da Lei 2.666/2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de São Miguel do Iguaçu: A posse ocorrerá no prazo de até dias contados da data do edital de convocação, podendo ser prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE o número de dias.

A.	15 (quinze).
B.	30 (trinta).
C.	45 (quarenta e cinco).
D.	60 (sessenta).

12. Segundo o art. 23 da Lei 2.666/2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de São Miguel do Iguaçu: Reversão é:

A.	O retorno à atividade do servidor que ficou 60 dias afastado para tratamento de saúde.
B.	O retorno à atividade do servidor que ficou 180 dias afastado para tratamento de saúde.
C.	O retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
D.	O retorno à atividade do servidor que ficou afastado para concorrer às eleições.

13. Em relação ao ramo da indústria de alimentos, as atividades que mais se destacam são:

A.	Frigoríficos de peixe, bovinos e suínos, e turismo.
B.	Fábricas de tijolos, artefatos de cimento e frigoríficos de peixe.
C.	Fábricas de embutidos, frigoríficos de peixe, e metalúrgicas e funilarias.
D.	Fábricas de embutidos, frigoríficos de peixe, bovinos e suínos.

14. Na bandeira do município de São Miguel do Iguaçu, quais cores estão presentes?

A.	Amarelo, Branco, Verde e Azul.
B.	Amarelo, Verde, Azul e Vermelho.
C.	Amarelo, Branco, Verde, Azul e Vermelho.
D.	Amarelo, Verde, Azul, Preto e Vermelho.

15. A Bacia Hidrográfica de São Miguel do Iguaçu é composta pela Bacia do:

A.	Iguaçu.
B.	Paraná.
C.	Prata.
D.	Lago.

16. Segundo o art. 20 da Lei 3039/2018 que “dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa da administração direta do município de São Miguel do Iguaçu, e dá outras providências”. O planejamento das atividades do Governo Municipal será feito por meio da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:	
A.	Programa de Metas.
B.	Lei de Diretrizes Orçamentárias.
C.	Plano Plurianual.
D.	Todas as alternativas anteriores.

17. A Lei nº 2.700/2015, altera dispositivos na lei nº 2.666/2015 (estatuto dos servidores municipais). Dando nova redação ao art. 107 que passa a vigorar com a seguinte redação:	
A.	A família do servidor, que vier a falecer, ainda que ele esteja em disponibilidade, será concedido um auxílio funeral correspondente a um mês de remuneração que o mesmo vinha recebendo
B.	A família do servidor efetivo ativo, que vier a falecer, ainda que ele esteja em disponibilidade, será concedido um auxílio funeral correspondente a dois meses de remuneração que o mesmo vinha recebendo
C.	A família do servidor efetivo ativo, que vier a falecer, ainda que ele esteja em disponibilidade, será concedido um auxílio funeral correspondente a um mês de remuneração que o mesmo vinha recebendo
D.	A família do servidor, que vier a falecer, ainda que ele esteja em disponibilidade, será concedido um auxílio funeral correspondente a dois meses de remuneração que o mesmo vinha recebendo

18. Segundo o site oficial da prefeitura de São Miguel do Iguaçu https://www.saomiguel.pr.gov.br/historia/ existe uma versão Lendária e uma versão Oficial acerca do nome da cidade. Qual das alternativas abaixo corresponde a versão Oficial?	
A.	A denominação São Miguel do Iguaçu origina-se do fato do colonizador espanhol Miguel Alvarez Nuñez Cabeza de Vaca, que por ser muito religioso e ser o primeiro a descobrir as cataratas do rio Iguaçu, ganhou essa homenagem.
B.	A denominação São Miguel do Iguaçu origina-se do fato de ser o santo o padroeiro do município e ser a área originariamente denominada “Fazenda São Miguel”. À este nome, para diferenciá-lo de outras localidades e facilitar sua localização, foi acrescido o nome de um acidente geográfico próximo, o Rio Iguaçu e também por ter o mesmo grande parte de sua área limitando com uma das maiores áreas de preservação ambiental, o Parque Nacional do Iguaçu.
C.	A denominação São Miguel do Iguaçu origina-se do fato de ser a área originariamente denominada “Gleba São Miguel”. E facilitar sua localização, foi acrescido do termo que identifica o Parque Nacional do Iguaçu.
D.	Nenhuma das alternativas anteriores.

19. Segundo o art. 6 da Lei 3039/2018 que “dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa da administração direta do município de São Miguel do Iguaçu, e dá outras providências”. Estabelece que:	
A.	A cultura organizacional da Administração Pública Municipal será fundamentada em uma nova atitude perante o cidadão e no princípio de que o serviço público poderá servir, ser útil desde que haja interesse da administração em ser um facilitador da sociedade, proporcionando as condições para o pleno exercício das liberdades individuais e coletivas.
B.	A cultura organizacional da Administração Pública Municipal deverá estar fundamentada em uma nova atitude perante o cidadão e no princípio de que o serviço público existe para servir, ser útil e ser um facilitador da sociedade, proporcionando as condições para o pleno exercício das liberdades individuais e coletivas, mesmo que para atingir esses propósitos ela não precise se preocupar com o Princípio da Responsabilidade do Poder Executivo e da sua Administração perante os cidadãos
C.	A cultura organizacional da Administração Pública Municipal deverá estar fundamentada em uma nova atitude perante o cidadão e no princípio de que o serviço público existe para servir, ser útil e ser um facilitador da sociedade, proporcionando as condições para o pleno exercício das liberdades individuais e coletivas, assegurando o Princípio da Responsabilidade do Poder Executivo e da sua Administração perante os cidadãos
D.	Nenhuma das alternativas anteriores.

20. Segundo o art. 29 da Lei 3039/2018 que “dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa da administração direta do município de São Miguel do Iguaçu, e dá outras providências”. Estabelece que:	
A.	Os ocupantes de cargos comissionados e função gratificada estão sujeitos ao cumprimento de jornada de trabalho de 40 horas semanais, podendo, ainda, serem convocados sempre que houver interesse ou necessidade da Administração, sem direito ao recebimento de qualquer vantagem salarial adicional.
B.	Os ocupantes de cargos comissionados e função gratificada estão sujeitos ao cumprimento de jornada de trabalho de 30 horas semanais, podendo, ainda, serem convocados sempre que houver interesse ou necessidade da Administração, sem direito ao recebimento de qualquer vantagem salarial adicional.
C.	Os ocupantes de cargos comissionados e função gratificada estão sujeitos ao cumprimento de jornada de trabalho de 30 horas semanais, podendo, ainda, serem convocados sempre que houver interesse ou necessidade da Administração, com direito a receber vantagem salarial adicional.
D.	Nenhuma das alternativas anteriores.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO

21. A psoríase é uma doença inflamatória crônica e recorrente, de base imunogenética e de ocorrência universal. Pode ser desencadeada ou exacerbada por gatilhos ambientais em indivíduos susceptíveis. Sobre o seu tratamento, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	O calcipotriol pomada, análogo sintético da vitamina D, tem atividade antipsoriásica, com início de ação entre 1 e 2 semanas, sendo tão eficaz quanto os corticoides, sem os efeitos adversos destes.
B.	O metotrexato é absorvido por via oral e, na dose de até 25 mg, equivale à administração pelas vias subcutânea e intramuscular.
C.	A acitretina é indicada na psoríase em placas moderada a grave ou refratária a tratamentos tópicos, formas pustulosas, eritrodérmica, ungueal, palmoplantar, pediátrica e quando há artrite psoriásica associada.
D.	Adalimumabe é um anticorpo monoclonal totalmente humano que se liga ao fator de necrose tumoral- α , inibindo sua interação com os seus receptores. No Brasil, além da psoríase, também é aprovado para artrite reumatoide e psoriásica, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, hidradenite supurativa e uveíte não infecciosa.

22. A dermatite seborreica (DS) é uma doença inflamatória comum. Embora sua patogênese não seja inteiramente conhecida, há envolvimento da produção sebácea e do fungo comensal do gênero <i>Malassezia</i> . Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA:	
A.	Há duas formas clínicas: a do lactente, com início após os 3 primeiros meses de vida; e a forma do adulto, com pico de incidência entre a 4ª e 6ª décadas de vida.
B.	A DS infantil geralmente responde satisfatoriamente a medidas de cuidado geral da pele, tais como limpeza e aplicação de emolientes.
C.	É uma condição crônica e recorrente que pode durar décadas. Tende a piorar com o estresse e durante os meses de inverno, e a melhorar durante os meses de verão.
D.	A DS pode fazer parte de um quadro mais grave, a doença de Leiner ou eritrodermia esfoliativa do infante (deficiência de C5, levando a diarreia, vômitos, anemia, febre e DS).

23. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a Pitíriase Rósea de Gilbert:	
A.	Representa uma afecção de pele frequente e autolimitada. O tempo de evolução é de 4 a 10 semanas, com regressão total.
B.	O quadro clínico é restrito à pele, não havendo sintomas sistêmicos associados.
C.	O couro cabeludo é respeitado e a face e regiões palmo-plantares geralmente são poupadas.
D.	O tratamento medicamentoso não é necessário, porém, quando houver prurido ou eczematização, corticoides tópicos e anti-histamínicos estão indicados.

24. Sobre os retalhos e enxertos utilizados na cirurgia dermatológica, assinale a alternativa INCORRETA:	
A.	O enxerto de pele total caracteriza-se pela presença da epiderme e a total espessura da derme. Já o enxerto parcial caracteriza-se pela preservação da derme na área doadora, possibilitando, assim, a sua reepitelização.
B.	Os tipos de retração dos enxertos estão relacionados com a quantidade de fibras elásticas presentes. A contração primária ocorre imediatamente à sua obtenção e a secundária é observada durante o processo de integração/cicatrização ao leito receptor. Enxertos de pele parcial mostram melhor resultado estético e menor contração secundária.
C.	O retalho de avanço é caracterizado por um movimento em linha reta, podendo ser unilateral, bilateral, tangencial duplo ou tangencial único. Já o retalho de rotação tem um movimento que leva à formação de defeito secundário em semicírculo.
D.	O retalho de transposição tem movimento de rotação, geralmente pulando a área de pele sã. Já o retalho de interpolação pula uma área de pele sã, formando uma ponte entre o defeito primário e a origem do pedículo.

25. É importante fazer escolhas sensatas na prática médica para evitar a exposição do paciente a condutas inadequadas. Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	O tratamento da tinea do couro cabeludo deve ser feito inicialmente com antifúngicos tópicos, tendo em vista os efeitos colaterais associados aos tratamentos orais. Antifúngicos sistêmicos devem ser reservados para casos refratários.
B.	Corticoides tópicos são uma boa opção para o tratamento de rosácea, especialmente em períodos de exacerbação.
C.	O filtro solar não deve ser contraindicado em pacientes com hipovitaminose D.
D.	Antibióticos tópicos auxiliam na cicatrização de úlceras crônicas, além de prevenir a formação de biofilme.

26. A Hanseníase é considerada um problema de saúde pública, especialmente em países menos desenvolvidos ou com superpopulação. Se não tratada na forma inicial, pode evoluir, tornar-se transmissível e atingir pessoas de qualquer idade. Essa progressão ocorre, em geral, de forma lenta e progressiva, podendo levar a incapacidades físicas. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA:	
A.	É transmitida pelas vias respiratórias por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível com um doente que não está sendo tratado. Estima-se que a maioria da população possua imunidade contra o <i>Mycobacterium leprae</i> .
B.	O tratamento é ambulatorial, utilizando os esquemas terapêuticos conhecidos como poliquimioterapia (PQT). Os medicamentos usados como primeira linha são a rifampicina, a dapsona e a clofazimina.
C.	Em relação aos efeitos colaterais do tratamento, a rifampicina associa-se a reações alérgicas, metemoglobinemia, agranulocitose e hemólise.
D.	De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para fins operacionais de tratamento, os pacientes são classificados em paucibacilares (PB – presença de até 5 lesões de pele com baciloscopia de raspado intradérmico negativo, quando disponível) ou multibacilares (MB – presença de 6 ou mais lesões de pele OU baciloscopia de raspado intradérmico positiva).

27. Sobre a urticária, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	É classificada de acordo com o tempo decorrido desde o início das manifestações clínicas. É considerada aguda quando os sinais e sintomas persistem por menos do que 4 semanas, ou crônica, nos casos em que se manifesta diariamente ou quase diariamente por mais do que 4 semanas.
B.	A urticária crônica pode ocorrer espontaneamente ou ser induzida por estímulos específicos, como frio, calor, pressão, aumento da temperatura corporal etc. Recomenda-se investigação inicial limitada. Os exames básicos incluem hemograma e prova de atividade inflamatória (VHS ou PCR).
C.	A primeira linha de tratamento na urticária crônica espontânea são os anti-histamínicos de primeira geração, associados a anti-histamínicos de segunda geração.
D.	Os corticosteroides sistêmicos em doses baixas são recomendados por longo prazo em casos de urticária crônica refratária.

28. A escabiose é uma dermatose parasitária causada pelo ácaro <i>Sarcoptes scabiei var. hominis</i> , sendo considerada um problema de saúde pública, independentemente do status socioeconômico. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA:	
A.	É transmitida por contato inter-humano direto e, excepcionalmente, por fômites.
B.	A sarna crostosa representa uma forma grave e altamente contagiosa da doença. É caracterizada pela hiperinfestação de ácaros, acometendo principalmente imunodeprimidos.
C.	O tratamento pode ser realizado com permetrina loção 5% (crianças > 2 meses, adultos, gestantes e nutrízes), enxofre precipitado 5-10% em vaselina (crianças, gestantes e nutrízes) e com ivermectina oral (adultos e crianças > 5 anos).
D.	Contatos intradomiciliares e/ou muito próximos devem ser tratados apenas se apresentarem sinais e/ou sintomas de infecção.

29. Dermatoses parasitárias são afecções cutâneas causadas por insetos, vermes, protozoários ou celenterados que tenham vida parasitária ou não. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA:	
A.	Na pediculose do púbis (fitiríase), a manifestação clínica principal é o prurido. O diagnóstico é feito por meio do encontro do parasita na pele, geralmente com a parte da cabeça introduzida no folículo piloso, ou lêndeas presas próximas à base dos pelos.
B.	O eritema migrans é a principal manifestação clínica inicial da doença de Lyme – 3 a 30 dias após a picada do carrapato, aparece no local de inoculação uma pápula ou pequena placa eritematosa que aumenta de tamanho, forma placa com bordas descontínuas e centro claro, cianótico e/ou descamativo, que se expande centrifugamente. É comum a progressão rápida das lesões, em dias ou semanas.
C.	A cimidiase é causada por percevejos, insetos hematófagos de hábitos noturnos, que colonizam fendas ou orifícios de móveis. As picadas ocorrem mais comumente em face, pescoço, braços e mãos. Provocam lesões urticadas, pruriginosas, muitas vezes em disposição linear, restrita ao local da picada.
D.	A manifestação mais comum e precoce da oncocercose no tegumento é o prurido crônico, constante, podendo simular escabiose. Áreas com escoriações, liquenificação e hiperpigmentação são frequentes – quadro conhecido como <i>lizard skin</i> (pele de lagarto).

30. Sobre a acne, assinale a alternativa INCORRETA:	
A.	Os retinoides são considerados a primeira linha de tratamento para a acne comedoniana: normalizam a queratinização infundibular, inibem comedogênese, possuem ação anti-inflamatória e aumentam a penetração de outros medicamentos.
B.	A maioria dos pacientes com acne comedoniana responde ao tratamento tópico associado a cuidados com a pele. Já a isotretinoína é indicada em casos de acne nódulo-cística grave e na acne pápulo-pustulosa refratária aos tratamentos convencionais ou com tendência a formação de cicatrizes.
C.	O leite e alimentos com alto índice glicêmico podem contribuir para o agravamento da acne.
D.	Na acne da mulher adulta, a maioria das pacientes apresenta sinais de hiperandrogenismo associado, sendo indicado investigação adicional de rotina – testosterona total e livre, S-DHEA, LH, FSH e ultrassom transvaginal.

31. Em relação às dermatoviroses, assinale a alternativa INCORRETA:	
A.	Nas infecções primárias e recorrentes não complicadas de herpes simples, o tratamento mais efetivo são os antivirais por via oral. Quando utilizados precocemente, reduzem o tempo de sintomas e o potencial de transmissão. A terapia supressiva crônica está indicada para pacientes com 6 ou mais episódios por ano.
B.	A transmissão do molusco contagioso ocorre pelo contato direto com a pele da pessoa contaminada, por fomitês ou por autoinoculação. Portanto, o tratamento é mandatório, incluindo diversas opções, como medicamentos tópicos, crioterapia e curetagem.
C.	A herpangina é uma enterovirose frequente que acomete habitualmente crianças. Manifesta-se com pródromos de febre, cefaleia, mal-estar e dor em região cervical, seguidos pelo aparecimento de lesões orais dolorosas.
D.	As verrugas vulgares são lesões causadas pelo HPV. Não existe um fármaco antiviral específico para o HPV, mas, em lesões sintomáticas, inestéticas, em pacientes imunodeprimidos ou com risco de malignização, o tratamento é indicado. O ácido salicílico e a crioterapia encontram-se entre as principais opções terapêuticas.

32. Sobre as infecções sexualmente transmissíveis (IST), assinale a afirmativa CORRETA:	
A.	A sífilis primária (cancro duro – protossifiloma) surge no ponto de inoculação do treponema, após um período de incubação médio de 3 semanas. A lesão inicia-se como uma pápula inflamatória que rapidamente evolui para exulceração dolorosa de fundo limpo e rosado.
B.	A sífilis secundária surge 2 a 6 meses após o início da infecção, geralmente em 6 a 8 semanas após o aparecimento do cancro, que poderá ainda estar presente quando da eclosão do secundarismo sífilítico. As lesões dessa fase são extraordinariamente polimorfas e representam a reação dos tecidos à presença do <i>Treponema pallidum</i> .
C.	O linfogranuloma venéreo é uma doença de caráter inflamatório e invasivo do trato urogenital, causado pela bactéria <i>Haemophilus ducreyi</i> .
D.	O cancro mole é uma IST de evolução aguda, caracterizada por lesão ulcerada dolorosa superficial, de bordas irregulares e mal definidas, causado pela bactéria <i>Klebsiella granulomatis</i> .

33. A prevalência e a incidência de úlceras crônicas têm aumentado com o envelhecimento da população e das comorbidades associadas. Muitas doenças se manifestam como úlceras crônicas, com destaque para as dos membros inferiores, que ocorrem abaixo do joelho e não cicatrizam dentro de 6 semanas, causando impacto social e econômico significativo. Sobre o tema, marque a alternativa CORRETA:	
A.	As úlceras venosas ocorrem no estágio mais avançado da doença venosa crônica. Localiza-se geralmente na porção distal dos membros inferiores, particularmente na região do maléolo lateral.
B.	As úlceras arteriais se desenvolvem conseqüentemente a um suprimento sanguíneo arterial inadequado. Costumam ser dolorosas, mesmo quando em pequeno diâmetro, com melhora da dor ao elevar o membro.
C.	As causas mais prevalentes de úlceras neuropáticas são as neuropatias diabéticas, hansênica e alcoólica. A úlcera é precedida por calosidade não dolorosa, que pode evoluir para pontos arroxeados e/ou enegrecidos indicativos de sofrimento tecidual e necrose.
D.	A úlcera hipertensiva de Martorell caracteriza-se por uma úlcera fagedênica e necrótica. Apresenta crescimento rápido e costuma ser indolor.

34. A pele demonstra o que acontece no organismo em muitas doenças porque reflete na superfície cutânea alguns processos internos. Nesse sentido, ela, como órgão, extrapola as suas funções de proteção e barreira, pois dá pistas para o reconhecimento de algumas enfermidades sistêmicas. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA:	
A.	O fenômeno de Raynaud é definido pela presença de alteração da cor dos dedos que corresponde ao vasoespasm (palidez e cianose), seguido ou não de vasodilatação (eritema), em razão de exposição súbita a baixas temperaturas. Pode ser primário ou secundário à doença de base – por exemplo, a uma colagenose.
B.	Necrobiose lipoídica, Scleredema <i>adultorum</i> de Buschke, granuloma anular e acantose nigricans são dermatoses que se relacionam ao diabetes mellitus.
C.	Pele seca, pele fria e manchada, carotenemia, mixedema, macroglossia, perda do terço lateral das sobrelhas e cabelo áspero e quebradiço são manifestações cutâneas do hipertireoidismo.
D.	Relatos de casos e séries clínicas de diversas regiões do mundo foram publicados, descrevendo diversas manifestações cutâneas associadas à Covid-19, dentre elas: exantema, manifestações vasculares, erupção acropopular e erupção urticariforme.

35. As infecções de pele têm extrema importância na prática clínica, não só por sua grande prevalência, como também pelo grande potencial mórbido que carregam. Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	A fasciíte necrosante é um processo infeccioso incomum, agudo, de rápida progressão e que cursa com necrose da fáscia muscular superficial e mesmo profunda, do tecido celular subcutâneo, da derme e epiderme. Pode evoluir para sepse, choque e óbito em até 40% dos casos. Na maioria das situações, inicia-se por inoculação do patógeno em pele íntegra.
B.	A prevalência de infecções por <i>Staphylococcus aureus</i> resiste a meticilina (MRSA) vem aumentando significativamente no ambiente hospitalar, mas ainda são raras na comunidade.
C.	A celulite é uma infecção bacteriana da derme com acometimento linfático. Já a extensão desse processo inflamatório ao tecido subcutâneo é denominada erisipela.
D.	Antraz corresponde à coalescência de dois ou mais furúnculos no mesmo lócus, com múltiplos tratos sinusais de drenagem, e tende a se estender mais profundamente na hipoderme. Sintomas sistêmicos geralmente estão presentes e pode ocorrer linfadenopatia regional.

36. Sobre as dermatoses bolhosas, assinale a alternativa INCORRETA:	
A.	O pênfigo foliáceo caracteriza-se por erosões cutâneas escamosas e crostosas, geralmente em uma base eritematosa, com destruição seborreica. Não há envolvimento mucoso clinicamente aparente, mesmo com doença disseminada. O exame histopatológico revela acantólise intraepidérmica subcórnea.
B.	O pênfigo vulgar manifesta-se com bolhas flácidas de paredes finas em qualquer parte da superfície da pele (especialmente em couro cabeludo, face, axilas e virilhas), geralmente associado com lesões em mucosas. O histopatológico mostra acantólise intraepidérmica suprabasal.
C.	O linfoma não-Hodgkin e a leucemia linfocítica crônica são as neoplasias mais associadas ao pênfigo paraneoplásico.
D.	A dermatite herpetiforme é uma dermatose crônica associada à enteropatia sensível ao glúten. A maioria dos pacientes acometidos apresenta quadro clínico evidente de doença celíaca, como diarreia, desconforto abdominal e perda de peso.

37. A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por diferentes espécies de parasitos protozoários do gênero <i>Leishmania</i> . Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Restringe-se ao acometimento cutâneo, não afetando o tecido mucoso.
B.	A lesão cutânea primária da forma localizada da LTA consiste geralmente em pápula, única ou múltipla, usualmente em áreas do corpo cobertas, que evolui de forma insidiosa, até formar uma lesão ulcerosa.
C.	A patogenia da LTA está fortemente influenciada pela característica imunogenética do indivíduo, a qual se encontra associada à capacidade de resposta imunológica, assim como pela virulência da espécie de <i>Leishmania</i> infectante.
D.	O tratamento de escolha para as formas iniciais é a anfotericina B. Já o antimoniato de N-metilglucamina é reservado para casos refratários.

38. As manifestações cutaneomucosas podem ser os primeiros sinais da infecção pelo HIV em pacientes assintomáticos, mas também podem indicar grau de infecção avançada com o aparecimento de infecções sistêmicas ou neoplasias, definidoras da síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA/AIDS). Sobre o tema, marque a opção INCORRETA:	
A.	A sífilis pode atuar como facilitadora ou agravadora da ação e da transmissão do HIV. Existe a possibilidade de ocorrência de lesões nodulares, ulcerativas e queratodermia, caracterizando o quadro de sífilis maligna precoce.
B.	A onicomicose branca proximal com rápida extensão da unha proximal a distal pode ser sugestiva de infecção pelo HIV ou outras condições imunossupressoras.
C.	O citomegalovírus pode ser causador de úlceras anogenitais, predominantemente em pacientes com níveis reduzidos de CD4+.
D.	A síndrome retroviral aguda caracteriza-se por uma erupção maculopapular disseminada, com febre, mal-estar, cefaleia, irritação na garganta, ulcerações orais e genitais, aumento dos gânglios, artralgia, mialgia, dor abdominal e diarreia. O quadro costuma durar cerca de 2 semanas e a confirmação é feita pela pesquisa de anticorpos anti-HIV, que costumam já estar positivos nessa fase da doença.

39. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o melanoma:	
A.	A maioria dos melanomas cutâneos desenvolve-se na pele normal (cerca de 75-80%), enquanto em torno de 20-25% origina-se de lesões melanocíticas pré-existentes.
B.	No melanoma <i>in situ</i> , recomenda-se ampliação de margens de 1 a 2 cm.
C.	A gravidez não aumenta o risco nem piora o prognóstico do melanoma.
D.	A espessura vertical do tumor (profundidade de Breslow) é o fator prognóstico local mais importante no melanoma cutâneo primário.

40. Os carcinomas queratinocíticos – carcinoma basocelular (CBC) e espinocelular (CEC) – são as principais causas de neoplasias no mundo. Apesar da alta taxa de cura, são responsáveis por um grande número de mortes. Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Os subtipos histológicos superficial, nodular e micronodular do CBC são considerados de baixo risco para recorrência.
B.	De acordo com as recomendações do <i>National Comprehensive Cancer Network (NCCN)</i> , a cirurgia convencional é o tratamento de primeira linha para os carcinomas de baixo risco, com margens de 4mm para os CBCs e de 4-6mm para os CECs.
C.	O imiquimode representa uma boa opção para o tratamento de CBCs superficiais pequenos e localizados em face.
D.	A cirurgia micrográfica de Mohs é uma boa opção para tumores não complicados, menores do que 1cm e localizados em tronco ou extremidades.

Ficha de respostas para conferência (CONCURSO SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – 26/06/2022)
 Acesse o Gabarito Provisório a partir de 27/06/2022

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					