



MÉDICO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A qualidade da relação médico-paciente é um pilar da prática clínica, influenciando diretamente a adesão ao tratamento, a satisfação e os desfechos em saúde. Modelos contemporâneos de cuidado enfatizam a comunicação e o respeito mútuo. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I.A tomada de decisão compartilhada é um processo colaborativo no qual o médico apresenta as opções de tratamento baseadas em evidências, com seus riscos e benefícios, e o paciente expõe seus valores, preferências e expectativas, buscando-se um consenso terapêutico que respeite a autonomia do paciente e a responsabilidade profissional do médico.

II.O princípio da autonomia do paciente determina que o médico tem o dever de acatar qualquer solicitação de tratamento ou procedimento feita pelo paciente ou sua família, mesmo que a indicação seja fútil, inapropriada ou contrária à boa prática médica, sob pena de infração ética por desrespeito.

III.A empatia, na comunicação clínica, é definida como a capacidade do médico de compreender a perspectiva do paciente, seus sentimentos e o significado de sua enfermidade, sem necessariamente sentir as mesmas emoções (simpatia), e de comunicar essa compreensão de volta ao paciente de forma validante.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III apenas.

Questão 02

As doenças do sistema digestório possuem alta prevalência, e seu manejo adequado depende de um diagnóstico etiológico preciso, especialmente no que tange à infecção pelo *Helicobacter pylori* e às hepatites virais. Acerca da abordagem diagnóstica e terapêutica dessas condições, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__) A erradicação da infecção pelo *Helicobacter pylori* está formalmente indicada em todos os pacientes com diagnóstico de úlcera péptica (gástrica ou duodenal), ativa ou cicatrizada, por ser a medida mais eficaz para prevenir a recidiva da úlcera e suas complicações.

(__) Na investigação sorológica da hepatite B, a presença isolada do anticorpo anti-HBs (Anti-HBs reagente) com os demais marcadores não reagentes é indicativa de infecção crônica pelo vírus B, com baixo potencial de replicação viral.

(__) O teste de controle de cura da infecção por *H. pylori* após o tratamento deve ser realizado preferencialmente por meio de sorologia (dosagem de anticorpos IgG), colhida duas semanas após o término do esquema antibiótico, por sua alta sensibilidade e especificidade nesse cenário.

(__) Em um paciente com suspeita de hepatite viral aguda, a presença simultânea do antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg) reagente e do anticorpo IgM anti-core do vírus da hepatite B (Anti-HBc IgM) reagente confirma o diagnóstico de infecção aguda pelo vírus B.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – F – F – V.
- (B) V – V – V – V.
- (C) F – F – V – V.

(D) V – F – F – F.

Questão 03

As ações de saúde voltadas para a população masculina envolvem a abordagem de temas como a prevenção de doenças crônicas e o rastreamento de neoplasias. A discussão sobre o rastreamento do câncer de próstata é um ponto central, exigindo do médico o conhecimento das evidências científicas e das recomendações oficiais. Acerca do rastreamento do câncer de próstata em homens assintomáticos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(___) O Instituto Nacional de Câncer (INCA) e o Ministério da Saúde do Brasil recomendam formalmente o rastreamento populacional organizado para o câncer de próstata, com a convocação ativa de todos os homens a partir dos 50 anos para a realização anual do toque retal e da dosagem do PSA.

(___) O antígeno prostático específico (PSA) é um marcador tumoral altamente específico para o câncer de próstata, de modo que um resultado acima do valor de referência confirma o diagnóstico da neoplasia, tornando a biópsia prostática um procedimento opcional.

(___) O toque retal apresenta alta sensibilidade para a detecção de tumores em estágios iniciais, sendo capaz de identificar a maioria dos cânceres confinados à glândula que ainda não são detectáveis pelo PSA.

(___) A conduta recomendada atualmente no Brasil é a do rastreamento oportunístico, na qual o médico deve informar o homem assintomático sobre as incertezas, os riscos e os potenciais benefícios da detecção precoce, e a decisão pela realização dos exames deve ser compartilhada entre ambos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – F – V – V.
- (B) F – F – F – V.
- (C) V – F – F – F.
- (D) V – V – V – V.

Questão 04

Uma gestante de 28 anos, previamente hígida, sem comorbidades conhecidas e com IMC pré-gestacional de 23 kg/m², comparece à Unidade Básica de Saúde para sua primeira consulta de pré-natal, com idade gestacional de 9 semanas, calculada pela data da última menstruação. A equipe de saúde planeja a solicitação dos exames laboratoriais de rotina da primeira consulta. No que tange à investigação de alterações do metabolismo da glicose nesse momento inicial da gestação, assinale a alternativa que descreve a conduta correta, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil.

- (A) Solicitar a dosagem da hemoglobina glicada (HbA1c) como único método de rastreamento, considerando-se o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional se o resultado for igual ou superior a 5,7%, o que reflete o controle glicêmico das últimas semanas.
- (B) Postergar qualquer investigação de distúrbios glicêmicos para o período entre 24 e 28 semanas de gestação, pois o rastreamento no primeiro trimestre não é recomendado para gestantes de baixo risco e pode levar a resultados falso-positivos.
- (C) Realizar o teste de tolerância oral à glicose (TTOG) com 75g de glicose já na primeira consulta, por ser o padrão-ouro para o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, independentemente da idade gestacional ou da presença de fatores de risco.

- (D) Solicitar a glicemia de jejum como exame de rastreamento inicial. Um resultado ≥ 126 mg/dL confirmaria o diagnóstico de diabetes mellitus prévio, enquanto um resultado entre 92 e 125 mg/dL fecharia o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional.

Questão 05

O diagnóstico e o manejo das disfunções tireoidianas exigem a interpretação criteriosa dos exames laboratoriais no contexto clínico do paciente. Uma situação comum na prática clínica é a identificação de alterações hormonais que não preenchem todos os critérios para um diagnóstico franco, necessitando de uma conduta individualizada e baseada em evidências. Com base na abordagem do hipotireoidismo subclínico, assinale a alternativa que descreve a conduta mais apropriada.

- (A) O tratamento com levotiroxina deve ser iniciado imediatamente em todos os pacientes que apresentem qualquer nível de TSH acima do valor de referência, independentemente dos níveis de T4 livre ou da presença de sintomas, a fim de prevenir a evolução para hipotireoidismo franco.
- (B) A reposição hormonal no hipotireoidismo subclínico só deve ser considerada quando os níveis de T4 livre estiverem abaixo do limite inferior da normalidade, pois este é o marcador que define a transição da forma subclínica para a doença clinicamente manifesta.
- (C) A terapia de primeira linha para o hipotireoidismo subclínico consiste na administração de liotironina (T3), por ser a forma hormonal mais ativa e de ação mais rápida, sendo a levotiroxina (T4) reservada para casos que não respondem adequadamente ao tratamento inicial.

(D) A instituição de terapia de reposição com levotiroxina está geralmente indicada para pacientes com níveis de TSH persistentemente acima de 10 mU/L, ou para aqueles com TSH entre o limite superior da normalidade e 10 mU/L que apresentem sintomas, bócio, anticorpos anti-TPO positivos ou gestação.

Questão 06

A doença renal do diabetes (DRD) é uma das principais complicações crônicas do diabetes mellitus e a principal causa de doença renal crônica terminal no mundo. O rastreamento e o manejo precoce são fundamentais para retardar sua progressão. Sobre a abordagem da DRD, analise as afirmativas a seguir.

I.O primeiro sinal detectável da doença renal do diabetes é, invariavelmente, a elevação dos níveis de creatinina sérica, indicando uma redução da taxa de filtração glomerular que precede o surgimento de qualquer alteração urinária.

II.O rastreamento anual da doença renal do diabetes em pacientes com diabetes tipo 2 deve ser realizado por meio de duas avaliações: a dosagem da relação albumina/creatinina (RAC) em uma amostra isolada de urina e a estimativa da taxa de filtração glomerular (eTFG) a partir da creatinina sérica.

III.Em um paciente com diabetes tipo 2, hipertensão arterial e albuminúria persistente, a classe de fármacos de primeira linha para o controle pressórico e para a nefroproteção são os diuréticos tiazídicos, que demonstraram maior eficácia na redução da progressão da doença renal.

Está correto o que se afirma em

- (A) I apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III apenas.
- (D) II apenas.

Questão 07

A co-circulação de arbovírus como Dengue, Zika e Chikungunya em diversas regiões do Brasil representa um desafio diagnóstico para o médico, dada a sobreposição de sinais e sintomas iniciais. A identificação de características clínicas predominantes em cada uma delas é fundamental para o manejo adequado e a orientação do paciente. Acerca do diagnóstico diferencial dessas arboviroses, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(___) A poliartralgia intensa, simétrica e frequentemente incapacitante, que acomete tanto grandes quanto pequenas articulações, com edema associado, é a manifestação clínica mais característica e distintiva da febre pelo vírus Chikungunya.

(___) O exantema maculopapular na Dengue é tipicamente mais pruriginoso e de início mais precoce que na Zika, sendo a presença de conjuntivite purulenta um achado comum que ajuda a diferenciar a Dengue das outras duas arboviroses.

(___) Os sinais de alarme na Dengue, que indicam risco de evolução para formas graves, incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, letargia ou irritabilidade e sangramentos de mucosas.

(___) Embora a febre seja um sintoma comum às três doenças, na infecção pelo vírus Zika, ela tende a ser de menor intensidade (baixa) ou até mesmo ausente, com o quadro clínico sendo dominado pelo exantema, prurido e hiperemia conjuntival não purulenta.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – F – V – V.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – V – V – V.
- (D) V – F – F – F.

Questão 08

As doenças parasitárias endêmicas no Brasil, como a esquistossomose mansônica, apresentam diferentes formas clínicas que exigem abordagens terapêuticas e de acompanhamento distintas. O manejo da doença não se resume apenas à eliminação do agente etiológico, mas também à avaliação e ao controle de suas complicações crônicas, que representam um desafio para a saúde pública. Considerando especificamente a terapia da esquistossomose, assinale a alternativa que descreve corretamente um princípio do seu tratamento.

- (A) A utilização de Praziquantel na forma hepatoesplênica grave da esquistossomose tem como principal objetivo a reversão completa da fibrose periportal (fibrose de Symmers), restaurando a arquitetura hepática normal em um período de seis meses após o tratamento.
- (B) O tratamento farmacológico é absolutamente contraindicado em pacientes com a forma hepatoesplênica da esquistossomose devido ao risco elevado de agravar a hipertensão portal pela morte maciça dos vermes, devendo-se optar exclusivamente pelo manejo das complicações.
- (C) O Albendazol é o fármaco de primeira escolha para o tratamento de todas as formas clínicas da esquistossomose mansônica, devendo ser administrado em dose única, enquanto o Praziquantel é reservado para casos de resistência comprovada.
- (D) O tratamento com Praziquantel é eficaz contra as formas adultas do *Schistosoma mansoni*, mas não reverte a fibrose hepática avançada ou a hipertensão portal já estabelecidas na forma hepatoesplênica, visando, nesses casos, a prevenir a progressão e a reinfeção.

Questão 09

A Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, conhecida como a Lei do Ato Médico, estabelece as atividades que são consideradas privativas do profissional médico no Brasil, buscando delimitar as competências e organizar o campo de atuação na saúde. A correta interpretação de seus dispositivos é crucial para a prática interprofissional e para a segurança jurídica dos profissionais e pacientes. Com base nas atividades privativas definidas expressamente na referida lei, assinale a alternativa correta.

- (A) A emissão de laudo dos exames endoscópicos e de imagem, a emissão de atestado de óbito e a indicação de internação e alta médica são legalmente definidas como atividades privativas do médico.
- (B) A solicitação de exames complementares para a elucidação diagnóstica e o atendimento a pacientes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) são consideradas as principais atividades privativas do médico, não podendo ser realizadas por outros profissionais.
- (C) A indicação do uso de órteses e próteses, com exceção das próteses oftalmológicas, é uma atividade privativa do médico, que deve prescrever o dispositivo mais adequado após o diagnóstico nosológico.
- (D) A coordenação da estratégia do transplante de órgãos e tecidos, a direção dos serviços médicos e a perícia médica são atividades que, embora exercidas por médicos, podem ser delegadas a outros profissionais de saúde com especialização em gestão.

Questão 10

A correta solicitação e interpretação de exames laboratoriais, bem como a adesão aos protocolos legais de prescrição, são competências essenciais para a segurança e a eficácia da prática médica. Acerca de aspectos específicos da propedêutica e da

terapêutica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(___) Em um hemograma, a presença de leucocitose acentuada com desvio à esquerda escalonado (presença de metamielócitos, mielócitos) e granulações tóxicas nos neutrófilos é um achado altamente sugestivo de uma infecção viral aguda, como a mononucleose infecciosa.

(___) Na investigação de uma anemia microcítica e hipocrômica, a dosagem de ferritina sérica é o exame mais específico para avaliar as reservas de ferro do organismo, sendo que um resultado baixo confirma o diagnóstico de anemia por deficiência de ferro.

(___) A prescrição de opioides como a codeína, para o tratamento da dor, deve ser realizada em Receituário de Controle Especial, emitido em duas vias, pois se trata de uma substância sujeita a controle especial pela Portaria SVS/MS nº 344/1998.

(___) A isotretinoína, utilizada no tratamento da acne grave, é um medicamento de controle especial que exige, para sua dispensação, além da Notificação de Receita, a apresentação de um Termo de Consentimento de Risco e, para pacientes do sexo feminino em idade fértil, um termo de conhecimento sobre os riscos de gravidez.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – V – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – V – V – V.

Questão 11

O exercício da medicina submete o profissional a um complexo sistema de responsabilidades, cujas esferas – administrativa/ética,

civil e penal – são distintas e independentes, embora possam se originar do mesmo fato. A compreensão dessa estrutura é fundamental para a prática médica. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__)A responsabilidade civil do médico em procedimentos cirúrgicos é sempre caracterizada como "obrigação de fim", tornando-se objetiva. Assim, a ocorrência de qualquer resultado adverso, mesmo sem a comprovação de culpa, gera automaticamente o dever de indenizar o paciente.

(__)Na esfera penal, a configuração do crime de lesão corporal culposa exige a demonstração de que o médico agiu com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de produzir o resultado danoso, não bastando a simples comprovação de imperícia, imprudência ou negligência.

(__)A aplicação de uma pena de suspensão do exercício profissional por um Conselho Regional de Medicina (CRM), após trânsito em julgado do processo ético-profissional, implica automaticamente a condenação do médico na esfera cível ao pagamento de indenização por danos morais.

(__)A responsabilidade ética do médico é apurada mediante processo ético-profissional conduzido pelo Conselho de Medicina, que pode resultar em sanções como advertência, censura, suspensão ou cassação do exercício profissional, independentemente da existência ou do resultado de processos judiciais nas esferas cível ou penal.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – F – V – V.
- (B) F – F – F – V.
- (C) V – V – V – V.
- (D) V – F – F – F.

Questão 12

A prevenção da doença cardiovascular aterosclerótica (DCVA) baseia-se na identificação e no manejo intensivo dos fatores de risco, com destaque para as dislipidemias, cujo tratamento visa a atingir metas lipídicas individualizadas conforme o risco de cada paciente. Acerca dos princípios do manejo de dislipidemias, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(___) Em pacientes de muito alto risco cardiovascular, como aqueles em prevenção secundária (com DCVA já estabelecida), a meta terapêutica principal é a manutenção de um nível de LDL-colesterol (LDL-c) inferior a 50 mg/dL, sendo as estatinas de alta potência a primeira linha de tratamento.

(___) O mecanismo de ação da Ezetimiba na redução do colesterol consiste na inibição da HMG-CoA redutase no fígado, a mesma via metabólica de ação das estatinas, o que explica seu efeito sinérgico quando utilizada em associação.

(___) Nos casos de hipertrigliceridemia grave (triglicerídeos > 500 mg/dL), a prioridade terapêutica inicial é a introdução de estatinas em dose máxima para a redução do risco cardiovascular, mesmo antes da abordagem específica para a redução dos triglicerídeos.

(___) A indicação e a intensidade do tratamento com estatinas na prevenção primária da DCVA devem ser guiadas pela estratificação do risco cardiovascular global do indivíduo, que considera múltiplos fatores como idade, sexo, pressão arterial, tabagismo e níveis de colesterol.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – F – F – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – V – V – V.

Questão 13

Um paciente do sexo masculino, 71 anos, tabagista de longa data, procura o serviço de urgência com quadro de dispneia intensa, tosse produtiva e sibilância audível há dois dias, após um resfriado. Ele relata ter diagnóstico de bronquite desde jovem, com crises de "chiado" que melhoravam com "bombinhas". Ao exame, apresenta-se taquipneico, com tiragem intercostal, e a ausculta pulmonar revela sibilos difusos. Uma espirometria prévia mostra relação VEF1/CVF de 0,65 após broncodilatador. Diante deste quadro de exacerbação, assinale a conduta terapêutica inicial mais apropriada.

- (A) Administrar um corticoide inalatório em dose máxima associado a um beta-2 agonista de longa duração (LABA), mantendo a medicação de base do paciente e solicitando uma nova espirometria de urgência.
- (B) Iniciar antibioticoterapia de amplo espectro com Azitromicina e Ceftriaxona, pois o gatilho infeccioso e a tosse produtiva definem o quadro como pneumonia comunitária, postergando o uso de broncodilatadores.
- (C) Iniciar imediatamente a administração de um beta-2 agonista de curta duração (SABA) e um anticolinérgico de curta duração (SAMA) por via inalatória, associados a um corticoide sistêmico (oral ou intravenoso).
- (D) Administrar exclusivamente um beta-2 agonista de curta duração (SABA) em altas doses, pois a reversibilidade do quadro sugere uma crise asmática pura, sendo o corticoide sistêmico reservado para casos sem resposta inicial.

Questão 14

A puericultura realizada na Atenção Primária à Saúde é a principal estratégia para a vigilância da saúde infantil, tendo como pilares a avaliação do crescimento e desenvolvimento e a garantia da cobertura vacinal. Sobre estes pilares, analise as afirmativas a

seguir.

I.A vacina pentavalente, oferecida no Calendário Nacional de Vacinação aos 2, 4 e 6 meses de vida, confere proteção contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche (pertussis), hepatite B e infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b.

II.Na avaliação do gráfico de crescimento, a presença de um traçado de peso-para-idade que cruza um canal de Z-escore para baixo é um indicador patognomônico de desnutrição aguda, exigindo a imediata suplementação nutricional de alto custo.

III.A primeira dose da vacina oral de rotavírus humano deve ser administrada impreterivelmente entre 1 mês e 15 dias e 3 meses e 15 dias de idade, sendo contraindicada sua aplicação fora dessa faixa etária por questões de segurança e eficácia.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I apenas.
- (D) I e III apenas.

Língua Portuguesa

Questão 15

A sonda solar Parker, "primeira espaçonave na coroa solar", mergulhou na atmosfera externa de nossa estrela.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rn419np5xo>.

adaptado

Sintaticamente, o termo destacado nesta frase trata-se de:

- (A) Vocativo.
- (B) Adjunto adverbial.
- (C) Adjunto adnominal.
- (D) Aposto.

Questão 16

Uma sonda espacial da Nasa entrou para a história ao "fazer" uma aproximação inédita do Sol.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rn419np5xo>.

adaptado

O verbo destacado, nesta frase, comporta-se como um verbo:

- (A) Bitransitivo.
- (B) Transitivo indireto.
- (C) Intransitivo.
- (D) Transitivo direto.

Questão 17

A esperança é "que a sonda possa nos ajudar a entender melhor" como o Sol funciona.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rn419np5xo>.

adaptado

A expressão destacada trata-se de uma oração:

- (A) Coordenada sindética explicativa.
- (B) Coordenada sindética conclusiva.
- (C) Subordinada substantiva predicativa.
- (D) Subordinada substantiva objetiva direta.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Em 2025, a inteligência artificial está cada vez mais presente em áreas como saúde, educação e segurança. Um dos principais debates sobre o uso da IA está relacionado a:

- (A) O fim do uso de computadores em empresas.
- (B) Seu alto custo de manutenção em países pobres.

- (C) O impacto sobre empregos e questões éticas.
- (D) A massificação do plágio e pirataria.

Questão 19

A serra mais conhecida de Santa Catarina, que atrai turistas por suas paisagens e baixas temperaturas no inverno, é a:

- (A) Serra do Espinhaço.
- (B) Serra do Mar.
- (C) Serra do Rio do Rastro.
- (D) Serra da Canastra.

Questão 20

Com base nas modalidades de remoção previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guaraciaba/SC, analise as seguintes alternativas e identifique a correta:

- (A) É permitida remoção a pedido para acompanhar cônjuge removido, mesmo sem interesse da Administração.
- (B) A remoção a pedido depende sempre do interesse da Administração, mesmo por motivo de saúde.
- (C) A remoção de ofício ocorre por vontade do servidor.
- (D) A remoção por saúde do servidor ou de dependente deve ser comprovada por junta médica oficial.