

Prefeitura Municipal de Seara

Processo Seletivo – 03/2025

CADERNO DE PROVA - A

Organizadora:



MÉDICO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:


- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

Alternativas



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;

Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retirar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração 02h30min (duas horas e trinta minutos), incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos.
- A Prova será composta por 20 questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

Língua Portuguesa

Questão 01

Considerando as figuras de sintaxe assíndeto e polissíndeto, analise o trecho a seguir:

"Chegou, viu, conquistou. Não hesitou, não recuou, não falhou."

Assinale a alternativa que corretamente descreve as figuras de linguagem presentes no período:

- (A) O texto emprega apenas polissíndeto, com repetição de conjunções para enfatizar a sequência de ações, criando um ritmo acelerado.
- (B) O trecho é marcado pelo assíndeto, que elimina conjunções para produzir um efeito de brevidade e dinamismo, típico de enumerações rápidas.
- (C) Predomina o assíndeto, com omissão de conectivos para conferir agilidade à narrativa, enquanto o polissíndeto aparece secundariamente para contrastar.
- (D) A estrutura é exclusivamente sindética, pois prioriza a conexão lógica entre as orações, sem espaço para figuras de omissão ou repetição.
- (E) Ambos os recursos são utilizados de forma equilibrada: o assíndeto introduz ideias fragmentadas, e o polissíndeto as organiza com conjunções repetidas.

Questão 02

Analise as seguintes construções nominais e suas respectivas regências. Assinale a alternativa em que a regência do substantivo está incorretamente aplicada, violando a norma-padrão da língua portuguesa:

- (A) O aluno demonstrou dificuldade em resolver os problemas matemáticos mais complexos.
- (B) O líder exigia obediência a todas as normas institucionais sem exceção.
- (C) O discurso revelou sua aversão para as mudanças abruptas no sistema educacional.
- (D) A equipe não tinha dúvidas sobre a eficácia do novo método de pesquisa.
- (E) O cientista manifestava admiração por teorias revolucionárias, mesmo quando controversas.

Raciocínio Lógico

Questão 03

Uma sorveteria produz potes cilíndricos de sorvete com altura de 12 cm e raio da base de 5 cm. Para calcular quantos litros de sorvete cabem em cada pote, é necessário determinar o volume do cilindro. Qual é o volume aproximado de sorvete que caberá em cada pote?

- (A) O volume é de aproximadamente 1 litro.
- (B) O volume é de aproximadamente 1 litro e meio.

- (C) O volume é de aproximadamente 2 litro.
- (D) O volume é de aproximadamente 800 ml.
- (E) O volume é de aproximadamente 950 ml.

Questão 04

Uma pequena padaria tem 3 prêmios que serão entregues a três de seus 5 funcionários, e cada funcionário só pode ganhar um prêmio. De quantas formas diferentes podem ser determinados os 3 ganhadores?

- (A) De 15 maneiras diferentes.
- (B) De 5 maneiras diferentes.
- (C) De 10 maneiras diferentes.
- (D) De 9 maneiras diferentes.
- (E) De 12 maneiras diferentes.

Conhecimentos Gerais

Questão 05

Em Seara, a colonização inicial contou com agricultores vindos do Rio Grande do Sul, que chegaram com ferramentas simples e sementes. Qual atividade era praticada imediatamente por esses colonizadores para garantir alimento e sustento?

- (A) Extração de madeira de florestas nativas.
- (B) Agricultura e criação de animais.
- (C) Comércio de produtos manufaturados.
- (D) Criação de cavalos para transporte urbano.
- (E) Plantação de flores ornamentais.

Questão 06

Em 2003, o Brasil lançou o programa Bolsa Família, voltado à redução da pobreza e à inclusão social. Qual era o foco principal desse programa?

- (A) Aumentar a isenção de impostos sobre produtos de primeira necessidade.
- (B) Garantir crédito ilimitado a pequenas empresas sem critérios sociais.
- (C) Substituir o ensino público por vouchers para escolas privadas.
- (D) Transferir renda diretamente a famílias em situação de vulnerabilidade, condicionada à educação e saúde.
- (E) Financiar exclusivamente grandes projetos de infraestrutura em áreas vulneráveis.

Informática

Questão 07

Associe os recursos do Microsoft Word às suas respectivas funções:

- 1.Revisão de ortografia.

2. Tabelas.

3. Mala direta.

4. Estilos de texto.

() Criar e organizar dados em linhas e colunas.

() Automatizar envio de cartas/padrões personalizados.

() Verificar e sugerir correções de erros.

() Padronizar formatação de títulos e subtítulos.

A sequência correta da associação é:

(A) 4, 2, 3 e 1.

(B) 2, 3, 1 e 4.

(C) 1, 2, 3 e 4.

(D) 2, 1, 4 e 3.

(E) 3, 4, 1 e 2.

Questão 08

Leia as afirmações abaixo sobre scanners e marque a alternativa correta:

I. O scanner converte documentos físicos em arquivos digitais.

II. Scanners podem salvar arquivos em diferentes formatos, como PDF e JPEG.

III. O scanner é um dispositivo de saída de dados.

Sobre as assertivas acima podemos afirmar que:

(A) Apenas III está correta.

(B) Apenas I está correta.

(C) I e II estão corretas.

(D) II e III estão corretas.

(E) Apenas II está correta.

Conhecimentos Específicos

Questão 09

Um médico que atua em uma Unidade Básica de Saúde identifica um paciente com quadro clínico sugestivo de dengue, apresentando febre alta, cefaleia intensa, mialgia e exantema. Considerando as diretrizes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), qual é o procedimento correto que o médico deve adotar em relação à notificação desta suspeita diagnóstica?

(A) Notificar imediatamente o caso suspeito de dengue no SINAN, preferencialmente em até 24 horas, preenchendo a ficha de notificação/investigação específica para arboviroses.

(B) Notificar o caso apenas se houver confirmação de pelo menos três casos similares na mesma área geográfica, caracterizando um possível surto epidemiológico de dengue.

(C) Realizar apenas o registro no prontuário do paciente e comunicar verbalmente à equipe de enfermagem, dispensando a notificação formal no sistema SINAN.

(D) Aguardar a confirmação laboratorial do diagnóstico de dengue para então proceder com a notificação no SINAN, evitando notificações desnecessárias de casos falso-positivos.

(E) Encaminhar o paciente diretamente para o hospital de referência sem realizar a notificação, pois esta é responsabilidade exclusiva do serviço de maior complexidade.

Questão 10

Na Estratégia Saúde da Família, um médico avalia um paciente de 45 anos, tabagista, que há 3 dias apresenta febre alta (39°C), tosse produtiva com expectoração purulenta, dispneia aos esforços e dor torácica pleurítica. O exame físico evidencia murmúrio vesicular reduzido e estertores crepitantes em base pulmonar direita. A radiografia de tórax mostra consolidação no lobo inferior direito. Diante do diagnóstico de Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC), analise as afirmativas a seguir sobre a conduta inicial:

I. A conduta inicial exige a avaliação da gravidade do paciente, utilizando critérios como o escore CURB-65, para decidir entre tratamento ambulatorial ou hospitalar.

II. O tratamento de escolha para este paciente em nível ambulatorial, por ser tabagista (comorbidade), consiste na associação de um antibiótico betalactâmico (como amoxicilina-clavulanato) com um macrolídeo (como azitromicina).

III. A conduta mais adequada é a internação hospitalar imediata de todos os pacientes com diagnóstico radiológico de pneumonia, independentemente da idade ou da presença de comorbidades.

Está correto o que se afirma em:

(A) I e II apenas.

(B) III apenas.

(C) I apenas.

(D) II e III apenas.

(E) I, II e III.

Questão 11

Um médico da Estratégia Saúde da Família atende um paciente de 45 anos com dor epigástrica em queimação há 3 semanas, pior após as refeições, associada a pirose e ao uso frequente de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs). Não há sinais de alarme. A respeito da conduta mais adequada para a dispepsia não investigada neste caso, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() A conduta inicial apropriada inclui a prescrição de um Inibidor de Bomba de Prótons (IBP) por um período de 4 a 8 semanas e a orientação para suspender ou reavaliar o uso do AINE.

(__)A realização de uma Endoscopia Digestiva Alta (EDA) é mandatória e urgente para todos os pacientes com dispepsia, independentemente da idade ou da presença de sinais de alarme.

(__)A estratégia de pesquisar de forma não invasiva a presença da bactéria *Helicobacter pylori* e tratá-la em caso de resultado positivo ("testar e tratar") é uma abordagem válida e recomendada.

(__)O tratamento deve se restringir ao uso de antiácidos de alívio rápido, não havendo necessidade de medicamentos que suprimam a produção de ácido gástrico, como os IBPs.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, V, V, V.
- (D) F, F, V, V.
- (E) F, V, F, V.

Questão 12

Um médico avalia um recém-nascido a termo (38 semanas) que, nas primeiras horas de vida, apresenta dificuldade respiratória caracterizada por taquipneia, retração intercostal e cianose perioral. A radiografia de tórax evidencia padrão reticulogranular difuso bilateral associado à presença de broncogramas aéreos. Com base nesse quadro clínico-radiológico, analise as afirmativas a seguir:

I.O diagnóstico mais provável é a Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR), também conhecida como Doença da Membrana Hialina, apesar de ser mais comum em prematuros, pois os achados radiológicos são clássicos dessa patologia.

II.O quadro clínico-radiológico é patognomônico de Taquipneia Transitória do Recém-Nascido, uma condição benigna causada pelo retardo na absorção do líquido pulmonar fetal que não exige suporte ventilatório.

III.A conduta inicial apropriada consiste em estabilização clínica, oferta de suporte respiratório com pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP) para manter os alvéolos abertos, e a consideração da terapia com surfactante exógeno.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II apenas.

Questão 13

Um médico que integra a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) de um hospital de médio porte identifica um aumento significativo de infecções do

sítio cirúrgico em cirurgias de colecistectomia laparoscópica no último trimestre. Considerando as diretrizes para investigação e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), qual é a primeira medida que deve ser implementada pela CCIH?

- (A) Realizar investigação epidemiológica imediata para identificar os fatores de risco associados ao aumento das infecções, incluindo análise dos processos assistenciais e das práticas de prevenção.
- (B) Suspender imediatamente todas as cirurgias de colecistectomia laparoscópica até que seja identificada a causa das infecções, priorizando a segurança dos pacientes.
- (C) Notificar imediatamente a Vigilância Sanitária sobre o surto de infecções e aguardar orientações específicas antes de implementar qualquer medida de controle.
- (D) Implementar imediatamente medidas de isolamento de contato para todos os pacientes submetidos à colecistectomia laparoscópica, independentemente da presença de sinais de infecção.
- (E) Realizar coleta de culturas de todos os instrumentais cirúrgicos utilizados nas colecistectomias e substituir imediatamente toda a equipe cirúrgica responsável pelos procedimentos.

Questão 14

Na Estratégia Saúde da Família, um médico atende um homem de 45 anos, hipertenso, sedentário e com histórico familiar de infarto. Diante da necessidade de prevenir doenças cardiovasculares, analise as afirmativas a seguir, marcando V, para as verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A abordagem prioritária deve ser multifatorial, combinando a otimização do tratamento da hipertensão com orientações enfáticas sobre mudanças no estilo de vida, como dieta e prática regular de atividade física.

(__)Dado o risco do paciente, a única medida eficaz é o encaminhamento imediato para um especialista cardiologista, sendo a responsabilidade da atenção primária apenas a identificação do caso.

(__)A prescrição de ácido acetilsalicílico (AAS) em dose de prevenção primária deve ser a primeira e principal medida adotada, independentemente do controle da pressão arterial.

(__)A construção de um plano de cuidados compartilhado com o paciente, estabelecendo metas para o controle da pressão, peso e atividade física, é fundamental para aumentar a adesão ao tratamento.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, V, V.

(E) F, V, F, V.

Questão 15

Na Estratégia Saúde da Família, um médico atende um paciente de 58 anos, hipertenso e diabético, com dor precordial em aperto há 30 minutos, irradiando para braço esquerdo e mandíbula, associada a sudorese fria e náuseas. O eletrocardiograma evidencia supradesnivelamento do segmento ST em DII, DIII e aVF. Em relação à conduta inicial diante do provável Infarto Agudo do Miocárdio com supra de ST (IAMCSST), marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() A conduta prioritária é o reconhecimento da emergência e o acionamento imediato do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) para transferir o paciente a um hospital com capacidade para terapia de reperfusão.

() A administração de uma dose de ataque de ácido acetilsalicílico (AAS) e de um segundo antiagregante plaquetário (inibidor do P2Y12, como o clopidogrel) deve ser realizada o mais rápido possível, se não houver contraindicações.

() A administração rotineira de nitrato sublingual é a medida mais segura e indicada para alívio da dor neste caso específico, independentemente da pressão arterial do paciente.

() O paciente deve ser mantido em observação na Unidade Básica de Saúde para controle da dor com analgésicos comuns, devendo ser transferido apenas se não houver melhora dos sintomas em 2 a 3 horas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, F, V, F.

Questão 16

Uma paciente de 45 anos apresenta fadiga, ganho de peso, constipação e intolerância ao frio. Exames laboratoriais mostram TSH elevado (12 mUI/L) e T4 livre reduzido (0,6 ng/dL), confirmando hipotireoidismo primário. Quanto à conduta apropriada, analise as afirmativas:

I. O tratamento de escolha consiste na reposição hormonal com levotiroxina (L-T4) oral, com o objetivo de aliviar os sintomas e normalizar os níveis séricos de TSH.

II. A conduta mais segura para esta paciente, por ter mais de 40 anos, é iniciar com uma dose muito baixa de levotiroxina (ex: 12,5 mcg/dia) e aumentar gradualmente a cada 2 semanas, a chamada estratégia "comece baixo, vá devagar".

III. A paciente deve ser orientada a tomar a medicação diariamente, em jejum, cerca de 30 a 60 minutos antes do café da manhã, e a primeira reavaliação laboratorial do TSH para ajuste de dose deve ocorrer em 6 a 8 semanas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) II apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) I e III apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 17

Um médico que atua na Estratégia Saúde da Família está organizando o atendimento em sua unidade básica de saúde. Durante uma reunião de equipe, surge uma discussão sobre os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecidos pela Lei Federal nº 8.080/90. O médico precisa esclarecer à equipe qual princípio garante que todos os cidadãos brasileiros tenham direito ao acesso aos serviços de saúde, independentemente de sua condição socioeconômica, raça, religião ou qualquer outra característica.

- (A) Integralidade - determina que os serviços de saúde devem ser oferecidos apenas em hospitais de alta complexidade, garantindo atendimento especializado para todos os casos.
- (B) Equidade - estabelece que todos os cidadãos devem receber exatamente os mesmos serviços de saúde, independentemente de suas necessidades específicas ou condições de saúde.
- (C) Universalidade - garante que todos os cidadãos brasileiros tenham direito ao acesso aos serviços de saúde, sem qualquer discriminação ou barreira socioeconômica, racial, religiosa ou de qualquer outra natureza.
- (D) Participação social - estabelece que apenas profissionais de saúde podem tomar decisões sobre políticas de saúde, excluindo a participação da comunidade nos conselhos de saúde.
- (E) Descentralização - concentra todas as decisões e recursos de saúde exclusivamente no governo federal, impedindo a participação de estados e municípios na gestão do sistema.

Questão 18

Em uma Unidade Básica de Saúde, um médico é chamado para atender um paciente de 55 anos, encontrado inconsciente, sem pulso palpável e sem movimentos respiratórios. A esposa relata início súbito há cerca de 3 minutos, enquanto o paciente assistia televisão. É hipertenso e diabético em uso regular de medicações.

Qual deve ser a primeira conduta a ser realizada neste paciente?

- (A) Verificar sinais vitais detalhadamente, medir pressão arterial e realizar eletrocardiograma antes de iniciar qualquer intervenção.
- (B) Posicionar o paciente em decúbito lateral de segurança e aguardar a chegada do SAMU para transporte imediato.
- (C) Administrar imediatamente adrenalina 1mg endovenosa e atropina 1mg, seguido de desfibrilação com 200J.
- (D) Iniciar imediatamente ressuscitação cardiopulmonar (RCP) com compressões torácicas de alta qualidade na frequência de 100-120/min e profundidade de 5-6 cm, seguindo o protocolo de suporte básico de vida.
- (E) Realizar imediatamente intubação orotraqueal e ventilação com ambu, seguido de acesso venoso central.

Questão 19

Um paciente de 68 anos apresenta início súbito, há 2 horas, de fraqueza em hemitorpo direito, dificuldade para falar e desvio da comissura labial, quadro sugestivo de Acidente Vascular Cerebral (AVC) agudo. Sobre a conduta imediata na atenção primária, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A prioridade absoluta é o acionamento imediato do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), informando a suspeita de AVC agudo, para transporte rápido a um centro de referência.

(__)Deve-se administrar imediatamente uma dose de ácido acetilsalicílico (AAS) e iniciar a redução agressiva da pressão arterial, antes mesmo do transporte do paciente.

(__)A verificação da glicemia capilar é uma medida essencial a ser realizada na unidade para excluir hipoglicemia como um possível diagnóstico diferencial.

(__)Por se tratar de uma unidade de atenção primária, o paciente deve ser estabilizado com soro e analgésicos e mantido em observação por 6 horas antes de se decidir pela transferência.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, V, F.
- (E) V, V, V, V.

Questão 20

Na consulta de rotina em uma Unidade Básica de Saúde, um paciente solicita ao médico a emissão de um atestado falso, alegando uma doença inexistente para justificar ausências no trabalho. À luz do Código de Ética Médica, analise as afirmativas abaixo sobre a conduta adequada do profissional:

I.O médico deve negar o pedido, esclarecendo ao


paciente que a emissão de documento sem veracidade configura infração ética grave.

II.A postura correta envolve acolher o sofrimento relatado, explicar a impossibilidade ética do pedido e preservar o sigilo profissional em relação às informações pessoais compartilhadas.

III.Para manter o vínculo com o paciente, seria admissível fornecer um atestado de comparecimento à consulta, mas com o horário ampliado propositalmente para abranger todo o período de trabalho.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) III apenas.



RASCUNHO

1		6		11		16	
2		7		12		17	
3		8		13		18	
4		9		14		19	
5		10		15		20	



BOA PROVA!