

MÉDICO(A)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, regulamenta em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, estabelecendo as bases para a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). A operacionalização desse sistema é norteadada por um conjunto de princípios e diretrizes que visam garantir o direito à saúde conforme preceitua a Constituição Federal. Considerando os princípios doutrinários e organizativos do SUS, conforme a legislação vigente, assinale a alternativa que apresenta uma definição correta.

- (A) A equidade consiste em garantir o acesso igualitário de toda a população a todas as ações e serviços de saúde, em todos os níveis de assistência, sem qualquer tipo de preconceito ou privilégio, tratando todos os cidadãos de forma idêntica.
- (B) A descentralização político-administrativa preconiza a transferência de responsabilidades e recursos da esfera federal para as esferas estadual e municipal, com ênfase na direção única exercida exclusivamente pelo Ministério da Saúde para garantir a uniformidade das políticas.
- (C) A integralidade da assistência é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- (D) A participação da comunidade na gestão do SUS ocorre por meio de conselhos e conferências de saúde, órgãos de caráter consultivo cuja função principal é a fiscalização dos aspectos financeiros, sem poder deliberativo sobre a formulação das estratégias de saúde.

Questão 02

As vacinas representam uma das mais importantes conquistas da saúde pública, sendo ferramentas essenciais no controle e erradicação de doenças. O sucesso de um programa de imunização depende não apenas da disponibilidade de vacinas seguras e eficazes, mas também da capacidade de a equipe de saúde gerenciar a logística, o monitoramento e a aplicação adequada das doses, garantindo a cobertura vacinal ideal. Considerando os princípios e as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI), assinale a alternativa correta.

- (A) Acreditar que a imunidade de rebanho é alcançada quando a maioria da população está imunizada, resultando na proteção apenas dos indivíduos vacinados, e não na proteção indireta daqueles que não podem ser vacinados.

- (B) Considerar que o calendário nacional de vacinação é um guia flexível, que pode ser ajustado pelos municípios conforme a sazonalidade de doenças, sem a necessidade de seguir as diretrizes técnicas e operacionais estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (C) Promover a equidade e a universalidade do acesso à vacinação, com a oferta de todas as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), sem restrição de idade, sexo ou condição socioeconômica.
- (D) Utilizar as campanhas de vacinação como estratégia primária para a imunização de rotina, visando atingir altas coberturas vacinais em curtos períodos, substituindo a necessidade da vacinação em postos fixos.

Questão 03

Um paciente do sexo masculino, 58 anos, comparece à Unidade Básica de Saúde para uma consulta de rotina, negando queixas específicas. Durante a ectoscopia, o médico observa a presença de uma prega diagonal visível que atravessa o lóbulo de ambas as orelhas. Considerando este achado do exame físico geral, assinale a alternativa que descreve corretamente sua possível associação clínica.

- (A) A presença de uma prega lobular diagonal está fortemente associada a distúrbios do metabolismo do cálcio, sendo um indicador precoce de hiperparatireoidismo primário.
- (B) A presença de uma prega lobular diagonal indica um processo de condrite de repetição, sendo um sinal patognômico de policondrite recidivante.
- (C) A presença de uma prega lobular diagonal é um componente característico de síndromes neurocutâneas, como a esclerose tuberosa, indicando a necessidade de investigação neurológica.
- (D) A presença de uma prega lobular diagonal, conhecida como Sinal de Frank, é considerada um marcador cutâneo que sugere um risco aumentado para o desenvolvimento de doença arterial coronariana.

Questão 04

As ações em saúde coletiva são estruturadas a partir de diferentes lógicas e objetivos, abrangendo desde a atuação sobre os determinantes sociais da saúde até a reabilitação de indivíduos. A diferenciação conceitual entre as estratégias de promoção da saúde e os distintos níveis de prevenção de doenças é essencial para o planejamento e a avaliação dos serviços de saúde. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- (__) A prevenção primária compreende ações destinadas a evitar o surgimento de doenças em uma população ou indivíduo, atuando sobre os fatores de risco e as causas antes que o processo patológico se inicie, como as campanhas de vacinação.

(__)A promoção da saúde é sinônimo de prevenção primária, focando-se em ações educativas para grupos de risco específicos com o objetivo de reduzir a incidência de doenças, como programas de controle de tabagismo direcionados a fumantes.

(__)A prevenção quaternária refere-se às ações de reabilitação e de redução de danos em pacientes com doenças crônicas já estabelecidas, visando melhorar a qualidade de vida e prevenir complicações tardias.

(__)A prevenção secundária visa detectar problemas de saúde em seus estágios iniciais, antes do surgimento de sinais e sintomas clínicos relevantes, por meio de rastreamento e diagnóstico precoce, como a realização do exame citopatológico do colo do útero.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) V, F, F, V.

Questão 05

A polifarmácia é uma realidade crescente na prática clínica, especialmente em pacientes com múltiplas comorbidades, o que eleva exponencialmente o risco de interações medicamentosas. A compreensão dos mecanismos farmacocinéticos, em particular o metabolismo de fármacos pelo sistema enzimático do citocromo P450, é fundamental para prever e evitar desfechos adversos clinicamente relevantes. Sobre as interações medicamentosas mediadas pelo citocromo P450, analise as afirmativas a seguir.

I.A administração concomitante de claritromicina, um potente inibidor da isoenzima CYP3A4, com sinvastatina, um substrato desta mesma enzima, aumenta significativamente a exposição sistêmica à sinvastatina, elevando o risco de miopatia e rhabdomiólise.

II.A rifampicina, por ser um potente indutor da CYP3A4, quando coadministrada com a varfarina, um substrato da CYP2C9, leva a um aumento do efeito anticoagulante e do RNI (Relação Normatizada Internacional), exigindo uma redução na dose do anticoagulante.

III.O omeprazol, um inibidor da bomba de prótons, atua como um inibidor específico e potente exclusivamente da isoenzima CYP3A4, devendo ser evitado com todos os fármacos metabolizados por essa via, como o clopidogrel, devido ao risco de ineficácia terapêutica deste último.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II apenas.
- (C) I apenas.
- (D) I e III apenas.

Questão 06

A abordagem à saúde da pessoa idosa transcende o mero tratamento de doenças e comorbidades, exigindo uma avaliação multidimensional que considere a heterogeneidade do envelhecimento. Nesse contexto, um conceito central é o de uma síndrome clínica caracterizada pela diminuição da reserva homeostática e da resistência a estressores, que resulta em maior vulnerabilidade a desfechos adversos. Com base na definição e nas implicações dessa síndrome na população idosa, assinale a alternativa correta.

- (A) O fenótipo de fragilidade, uma vez estabelecido, representa uma condição irreversível e progressiva do envelhecimento, sendo o manejo focado exclusivamente em medidas paliativas e de suporte, sem a possibilidade de intervenção para reverter o quadro.
- (B) O fenótipo de fragilidade é diagnosticado fundamentalmente pela dependência do idoso na realização de Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD), como banhar-se e vestir-se, refletindo uma incapacidade funcional já instalada.
- (C) O fenótipo de fragilidade é definido pela presença de critérios como perda de peso não intencional, exaustão autorreferida, baixa velocidade de marcha, baixo nível de atividade física e redução da força de preensão, sendo um preditor de desfechos negativos independentemente da presença de comorbidades.
- (D) O fenótipo de fragilidade é sinônimo de multimorbidade, sendo sua intensidade diretamente proporcional ao número de doenças crônicas diagnosticadas, como hipertensão, diabetes e osteoartrite.

Questão 07

Em planejamento e gestão em saúde, a utilização de indicadores é um instrumento estratégico para a tomada de decisões, pois permite o monitoramento e a avaliação de políticas, programas e serviços de saúde. A escolha e a correta interpretação desses indicadores são cruciais para a identificação de problemas, a alocação de recursos e o acompanhamento das metas de saúde pública. Acerca dos indicadores de saúde e seus usos no planejamento, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__)Os indicadores de morbidade, como a taxa de incidência, são fundamentais para o planejamento, pois representam a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo em um período específico, sendo essenciais para o acompanhamento da dinâmica de doenças transmissíveis e para o dimensionamento de insumos.

(__)Indicadores demográficos e socioeconômicos, como a densidade populacional e a renda per capita, são considerados meramente descritivos e, portanto, têm aplicabilidade limitada no planejamento de ações de saúde, pois não refletem diretamente o estado de saúde da população.

(__)O coeficiente de mortalidade infantil é um indicador sintético de saúde que reflete apenas as condições de atenção à saúde do recém-nascido no primeiro ano de vida, não sendo influenciado por fatores como o saneamento básico e as condições socioeconômicas da gestante.

(__)A taxa de natalidade, que mede o número de nascidos vivos em um ano por mil habitantes, é um indicador demográfico com grande relevância para o planejamento em saúde, pois permite estimar a demanda futura por serviços de saúde materno-infantil.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, F, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, V, V, V.

Questão 08

Compreender a complexidade da Vigilância em Saúde é fundamental para a atuação do profissional médico, pois essa área engloba um conjunto de ações que vão além do tratamento clínico individual. O médico, em sua prática diária, deve estar atento aos diferentes campos de atuação da vigilância e como eles se inter-relacionam para a proteção da saúde coletiva. Sobre as definições e finalidades dos diferentes tipos de vigilância em saúde, analise as afirmativas a seguir.

I.A vigilância epidemiológica, definida na Lei nº 8.080/1990, engloba o conhecimento e a prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, mas sua finalidade principal é o diagnóstico e tratamento precoce de doenças infecciosas e parasitárias, não abrangendo agravos não transmissíveis.

II.A vigilância em saúde do trabalhador consiste em um conjunto de ações voltadas para a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por meio de intervenções nos determinantes e riscos presentes nos ambientes e processos de trabalho.

III.A vigilância sanitária tem como foco principal a fiscalização de fatores ambientais que afetam a saúde humana, como a qualidade da água e do ar, e a realização de atividades de controle de vetores, como a vigilância entomológica, sendo uma ferramenta primária para a vigilância de emergências climáticas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II apenas.
- (C) I apenas.
- (D) I e III apenas.

Questão 09

A tontura é uma das queixas mais prevalentes na atenção primária, representando um desafio diagnóstico devido ao seu caráter subjetivo e à ampla gama de etiologias possíveis. A abordagem sistemática, baseada em uma anamnese detalhada e no exame físico direcionado, é crucial para a diferenciação entre as síndromes vestibulares periféricas, mais comuns, e as centrais, potencialmente mais graves. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__)A manobra de Dix-Hallpike é considerada positiva para Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB) quando o paciente refere vertigem intensa ao realizá-la, independentemente da presença de nistagmo, sendo este último um achado sugestivo de causa central.

(__)Na avaliação de uma síndrome vestibular aguda, o exame HINTS (Head-Impulse, Nystagmus, Test-of-Skew) é uma ferramenta de alta acurácia para diferenciar causas centrais de periféricas, sendo um achado de impulso cefálico normal (negativo) mais preocupante que um anormal (positivo).

(__)O tratamento da VPPB do canal posterior, a forma mais comum, é primariamente farmacológico, utilizando supressores vestibulares como a betaistina ou a cinarizina por um período de 7 a 14 dias para facilitar a reabsorção dos otólitos deslocados.

(__)A neurite vestibular caracteriza-se por um quadro de vertigem súbita, intensa e contínua, com duração de dias, frequentemente associada a náuseas e vômitos, mas que tipicamente não cursa com sintomas auditivos como perda de audição ou zumbido.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F.
- (B) V, V, V, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, F, V, V.

Questão 10

O manejo do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) evoluiu significativamente, com novas classes de medicamentos que oferecem benefícios além do controle glicêmico. A escolha da terapia farmacológica para um paciente com DM2 e comorbidades, como doença cardiovascular aterosclerótica (DCVA) estabelecida, deve ser individualizada, visando não apenas a redução da hemoglobina glicada (HbA1c), mas também a redução de eventos cardiovasculares. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I.Em pacientes com DM2 e doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, os inibidores do cotransportador sódio-glicose 2 (SGLT2), como a empagliflozina, são recomendados como parte do esquema terapêutico devido à comprovada redução de eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE) e

hospitalizações por insuficiência cardíaca.

II. Os inibidores da dipeptidil peptidase-4 (iDPP-4), como a sitagliptina, são considerados uma classe de fármacos com potente efeito na redução de peso e demonstraram benefício cardiovascular robusto na prevenção primária de eventos ateroscleróticos em pacientes com DM2 e múltiplos fatores de risco.

III. Análogos do receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (arGLP-1), como a liraglutida e a semaglutida, além de promoverem o controle glicêmico e a perda de peso, também possuem evidências consistentes na redução de eventos cardiovasculares em pacientes com DM2 de alto risco, sendo uma terapia preferencial nesse subgrupo.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) II apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 11

A diverticulite aguda é uma das complicações mais comuns da doença diverticular dos cólons, apresentando um espectro clínico variado. A correta estratificação da gravidade do quadro é fundamental para a definição da conduta terapêutica, que pode variar desde o manejo ambulatorial até a intervenção cirúrgica de urgência. Acerca do manejo da diverticulite aguda, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() Na diverticulite aguda não complicada tratada ambulatorialmente, o esquema antibiótico de escolha para cobertura de gram-negativos e anaeróbios inclui, preferencialmente, a monoterapia com ciprofloxacino por 7 a 10 dias.

() A classificação de Hinchey modificada para diverticulite aguda define o estágio II como a presença de abscesso pélvico, enquanto o estágio III corresponde a múltiplos abscessos a distância, como hepáticos ou subfênicos.

() A cirurgia de Hartmann é o procedimento de escolha para todos os casos de diverticulite aguda complicada com peritonite difusa (Hinchey III e IV), não sendo recomendada a anastomose primária em nenhum cenário de urgência devido ao alto risco de deiscência.

() Após um episódio de diverticulite aguda tratado conservadoramente, recomenda-se a realização de uma colonoscopia cerca de 6 a 8 semanas após a resolução do quadro, com o objetivo principal de excluir a presença de neoplasia colorretal.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, F, F, V.
- (C) V, F, F, F.

(D) V, V, V, V.

Questão 12

O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) é uma ação preventiva de grande relevância no âmbito da saúde da criança, visando à detecção precoce de diversas doenças congênitas ou infecciosas. A eficácia do programa depende criticamente do cumprimento de etapas bem definidas, desde o momento da coleta da amostra até a confirmação diagnóstica e o início do tratamento. O conhecimento técnico preciso sobre o PNTN é mandatório para os profissionais que atuam na atenção primária. Considerando as diretrizes atuais do Ministério da Saúde para a triagem neonatal, assinale a alternativa correta.

- (A) A coleta da amostra para o Teste do Pezinho deve ser realizada, preferencialmente, entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido, em papel-filtro, a partir de sangue obtido por punção no calcanhar.
- (B) A coleta da amostra, quando resulta em um valor alterado, confirma o diagnóstico da doença triada, devendo o tratamento ser iniciado imediatamente pelo médico da atenção primária, sem a necessidade de exames confirmatórios adicionais.
- (C) A coleta da amostra destina-se à triagem de um painel de doenças que inclui, em sua fase básica e obrigatória, a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a fibrose cística e a toxoplasmose congênita.
- (D) A coleta da amostra deve ser efetuada obrigatoriamente nas primeiras 24 horas de vida, ainda na maternidade, para garantir a detecção precoce da fenilcetonúria antes da alta hospitalar.

Questão 13

Na complexa dinâmica da saúde pública, a formulação e implementação de ações e programas requer um ciclo contínuo de planejamento, execução e avaliação. O sucesso de uma intervenção, como a implantação de um novo protocolo de atenção primária para uma doença crônica, depende da capacidade de a equipe gestora estabelecer objetivos claros, alocar recursos de maneira eficiente e, principalmente, de monitorar o progresso e os resultados obtidos. Considerando os princípios e as etapas do processo de planejamento em saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Focar o planejamento em ações de saúde que se restringem ao âmbito da atenção primária, visto que as intervenções de média e alta complexidade dependem de um planejamento de nível central e não estão sob a alçada da gestão municipal.
- (B) Elaborar o planejamento de saúde com foco exclusivo nos recursos financeiros disponíveis e na capacidade instalada dos serviços, desconsiderando a análise do perfil epidemiológico da população, que deve ser feita apenas na fase de avaliação.

- (C) Considerar que o processo de planejamento em saúde é uma etapa linear e pontual, que se encerra após a execução das ações planejadas, sendo a avaliação uma fase independente e não retroalimentadora do ciclo.
- (D) Estabelecer as ações e os programas de saúde pública com base em uma análise situacional que defina claramente os problemas, as prioridades e as necessidades da comunidade, utilizando indicadores epidemiológicos e demográficos como ferramentas essenciais.

Questão 14

A notificação compulsória de doenças e agravos é um dos pilares do Sistema de Vigilância Epidemiológica, desempenhando um papel crucial no monitoramento da saúde pública e na resposta a emergências sanitárias. A sua efetividade depende do conhecimento e da adesão dos profissionais de saúde, que são responsáveis por identificar e informar as autoridades sobre a ocorrência de determinadas condições. O descumprimento dessa obrigação pode comprometer a capacidade de resposta do sistema de saúde. Acerca da notificação compulsória de doenças, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__) A notificação compulsória é uma atribuição exclusiva dos profissionais de saúde de nível superior que atuam na rede pública, não se aplicando à rede privada ou a outros níveis de formação profissional.

(__) A notificação de casos suspeitos ou confirmados de doenças, agravos ou eventos de saúde pública é um dever dos médicos e de outros profissionais de saúde, bem como dos responsáveis por estabelecimentos de saúde públicos e privados, e deve ser realizada em caráter imediato ou semanal, dependendo da situação.

(__) O preenchimento das fichas de notificação é facultativo para doenças de baixa letalidade e não está sujeito a sanções legais em caso de omissão, por não se enquadrar como infração sanitária grave.

(__) A notificação compulsória de um agravo ou evento de saúde pública pode ser imediatamente comunicada pelos serviços de saúde, mesmo que o diagnóstico definitivo não tenha sido concluído, visando à agilidade na resposta e à adoção de medidas de controle.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
(B) V, F, V, V.
(C) V, F, F, F.
(D) F, F, V, V.

Língua Portuguesa

Questão 15

Na última quarta-feira, a cidade de São Paulo foi afetada por uma forte tempestade, com rajadas de vento que ultrapassaram os 60 km/h.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4g944q07vlo>.

adaptado

Assinale a alternativa correta quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) Com rajadas de vento, que ultrapassaram os 60 km/h na última quarta-feira, a cidade de São Paulo, foi afetada por uma forte tempestade.
- (B) Foi afetada por uma forte tempestade, a cidade de São Paulo, na última, quarta-feira, com rajadas de vento que ultrapassaram os 60 km/h.
- (C) São Paulo, a cidade na última quarta-feira, foi afetada por uma forte tempestade, com rajadas de vento de que ultrapassaram os 60 km/h.
- (D) A cidade de São Paulo, na última quarta-feira, foi afetada por uma forte tempestade, com rajadas de vento que ultrapassaram os 60 km/h.

Questão 16

A cidade está sob alerta para nova tempestade nesta quinta, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4g944q07vlo>.

adaptado

Na frase em questão, tem-se a presença de um predicado:

- (A) Dois nominais.
(B) Um verbo-nominal.
(C) Um nominal.
(D) Dois verbais.

Questão 17

O cientista também referencia "a falta de políticas preventivas", como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4g944q07vlo>.

adaptado

De acordo com as regras de colocação pronominal, a forma correta do pronome oblíquo para substituir o termo destacado é:

- (A) O cientista também referencia-lhes, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.
- (B) O cientista também referencia-as, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.
- (C) O cientista também lhe referencia, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.

- (D) O cientista também a referencia, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Segundo a Lei Orgânica de Guarujá do Sul/SC, qual das alternativas abaixo NÃO constitui um objetivo fundamental da Educação Municipal:

- (A) Formação para o trabalho.
- (B) Preparo para o exercício da cidadania.
- (C) Formação para a vida.
- (D) Desenvolvimento integral da pessoa humana.

Questão 19

Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando surtos de dengue em diversas regiões, especialmente nas áreas urbanas com alta densidade populacional e presença constante do mosquito *Aedes aegypti*. Em resposta, o Ministério da Saúde vem implementando ações como forma de reduzir casos graves, internações hospitalares e óbitos relacionados à doença. Qual das alternativas abaixo cita uma dessas ações?

- (A) Realização de campanhas apenas de conscientização sobre higiene pessoal.
- (B) Vacinação contra a dengue, priorizando grupos etários específicos e regiões com maior incidência da doença.
- (C) Distribuição de medicamentos antivirais que curam a dengue após a infecção.
- (D) Introdução de mosquitos geneticamente modificados em todas as áreas urbanas do país.

Questão 20

Santa Catarina apresenta grande diversidade geográfica, com regiões que variam do litoral às serras e planaltos. A economia do estado é marcada por atividades agrícolas, industriais e turísticas. Entre os fatores que fortalecem a economia catarinense está o destaque na produção de suínos, aves e alimentos processados, além de expressiva participação na indústria têxtil e metalúrgica.

Qual destes fatores contribui de forma significativa para a economia de Santa Catarina?

- (A) Agroindústria de suínos e aves, associada à indústria têxtil e metalúrgica.
- (B) Exploração exclusiva de recursos minerais de ferro e cobre.
- (C) Produção de petróleo e gás natural como atividade principal.
- (D) Extração de carvão como principal fonte de receita.