

Domingo de manhã

GHC – GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO/RS CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2025

25 – MÉDICO (OTORRINOLARINGOLOGIA – RINOPLASTIA/PLÁSTICA FACIAL)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - **refere-se ao número e ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. O candidato deve assinar a(s) sua(s) Folha(s) Definitivas de Resposta(s), sob pena de eliminação.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
7. Haverá o toque do 3º sinal sonoro de encerramento das provas, conforme controle do quadro de sala.
8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V2_02/10/2025 13:44:05

**Eco
Friendly**
A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que apresenta o novo princípio incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) em abril de 2025.

- A) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- B) Descentralização político-administrativa.
- C) Atenção humanizada.
- D) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- E) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

QUESTÃO 02 – O art. 199 da Constituição Federal de 1988 dispõe que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Nesse sentido, assinale a alternativa que explica corretamente o referido artigo.

- A) Institui que o setor privado pode atuar na saúde seguindo sua própria regulamentação e com liberdade de mercado.
- B) Autoriza a participação da iniciativa privada na assistência à saúde, de forma complementar ao SUS e sob as regras estabelecidas pelo Estado.
- C) Garante que os serviços de saúde do SUS sejam prestados exclusivamente pelo setor público, sem a participação do setor privado.
- D) Estabelece que empresas estrangeiras podem instalar livremente hospitais no Brasil, sem necessidade de autorização específica.
- E) Determina que os serviços de saúde privados não podem estabelecer relação contratual com o SUS.

QUESTÃO 03 – Com base na Cartilha da Política Nacional de Humanização (PNH) Gestão e Formação no Processo de Trabalho, do Ministério da Saúde – HumanizaSUS, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os elementos do processo de trabalho às suas respectivas características.

Coluna 1

1. Organização.
2. Regulação.
3. Criação.
4. Gestão coletiva.

Coluna 2

- () Forma específica de agir, de se relacionar com os colegas e o estabelecimento de regras específicas na divisão de tarefas.
- () É efetivada na interação entre os trabalhadores, em uma dinâmica que perpassa diferentes pontos de vista particulares, visto que o trabalho é constituído por um conjunto de atividades simultâneas, que possuem características diferentes e são exercidas por trabalhadores de diversas áreas, com saberes e experiências específicas.
- () Fundamental para a promoção de saúde nos locais de trabalho em que se compreendem as situações nas quais os sujeitos trabalhadores afirmam sua capacidade de intervenção no processo de tomada de decisões no âmbito das organizações de saúde.
- () Evita fazer a tarefa de forma mecânica, em um processo de aprendizagem e desaprendizagem permanente, uma vez que questiona as prescrições e constrói outros modos de trabalhar para dar conta de uma situação nova e imprevisível.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 4 – 3.
- B) 2 – 1 – 3 – 4.
- C) 2 – 1 – 4 – 3.
- D) 3 – 4 – 1 – 2.
- E) 4 – 3 – 2 – 1.

QUESTÃO 04 – Considerando o campo das práticas de saúde, analise a citação abaixo e assinale a alternativa que traz uma reflexão alinhada a ela.

“ [...] quiçá, então, se possam fortalecer os necessitados, em lugar de debilitá-los; possibilitar sua inserção em novas redes sociais, e não estimular seu isolamento; reconhecer neles sujeitos capazes de decisão e diálogo, e não reforçar estratégias de infantilização” (Caponi, 2000).

- A) Reforça o controle, vigilância e medicalização da vida.
- B) Corrobora a ideia das posições determinadas, a saber, um cuidador e alguém a ser cuidado.
- C) Fortalece a tendência de que o profissional da saúde sabe de antemão o que é melhor para o seu paciente e é treinado para, a partir da queixa, diagnosticar e intervir na cura do corpo doente.
- D) Trata sobre fazer saúde junto com o outro e não para o outro, ampliando o grau de autonomia dos atores envolvidos.
- E) Promove a obediência e a relação com a patologia, com a predominância dos aspectos biológicos, em detrimento do sujeito portador de sofrimento.

QUESTÃO 05 – Em relação ao método da tríplice inclusão da Política Nacional de Humanização, analise a sentença abaixo:

A perturbação que a inclusão dos sujeitos e dos coletivos produz nos modos de governar os serviços de saúde e nas relações clínicas é um dos tripés do método da tríplice inclusão (**1ª parte**). Pode-se perceber que a inclusão produz movimentos ambíguos, os quais precisam ser suportados e sustentados por práticas de gestão que tolerem o convívio da diferença (**2ª parte**). O principal efeito da inclusão, do incluir o que não sou eu, é produzir perturbação e estranhamento nas práticas cotidianas de trabalho, sendo daí que nascem movimentos que fomentam mudanças, pois elas tendem a desestabilizar o que está dado (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – O hemograma está entre os exames laboratoriais mais solicitados na prática médica. Sobre esse exame e seus resultados, é INCORRETO afirmar que:

- A) O hemograma é relevante para a investigação diagnóstica, o monitoramento de doenças e a avaliação de resposta terapêutica.
- B) À hematoscopia, entre as alterações na série eritrocítica, enquadra-se o pontilhado basofílico observado na intoxicação pelo chumbo.
- C) Em pacientes adultos, o volume corpuscular médio abaixo de 80 femtolitros está frequentemente associado à deficiência de vitamina B12 e de folato.
- D) O hematócrito sofre influência do componente plasmático e pode ser subestimado em situações de hemodiluição em gestantes.
- E) A baixa contagem de plaquetas pode indicar trombocitopenia imune, coagulopatia de consumo e infecções virais.

QUESTÃO 07 – Em relação ao angioedema (AE), analise as seguintes assertivas:

- I. É mediado por mastócitos ou por bradicinina.
- II. Os pacientes com AE por bradicinina, potencialmente menos grave, têm melhor resposta terapêutica com os anti-histamínicos e corticosteroides.
- III. O AE mediado por mastócitos é o mais incomum, raramente é acompanhado por urticas pruriginosas e leva de 5 a 7 dias para regredir.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – A respeito de situações de emergência, reconhecimento, condutas e manejo, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No campo dos transtornos mentais, são exemplos de fatores de risco importantes no comportamento suicida de pessoas: história prévia de tentativa de suicídio, associação de depressão com ansiedade, abuso de álcool e outras substâncias, esquizofrenia, estresse pós-traumático e *delirium*.
- B) Nas situações de transtornos mentais com comportamento suicida, são condições de agravamento: sentimentos de desesperança, rompimento de relações afetivas, desemprego, dor ou doença crônica, abusos físicos, sexuais e morais na infância, morar em regiões rurais, e ter acesso a armas.
- C) No atendimento às emergências por trauma cranioencefálico, a avaliação pela Escala de Coma de Glasgow em indivíduo com abertura ocular com resposta à voz, resposta verbal estando orientado e interagindo, resposta motora que obedece a comandos, atinge escore de 9 a 12, grau de trauma moderado.
- D) Entre as medidas de manejo em pessoas com afogamento mais graves, com hipoxemia cerebral devido à aspiração pulmonar, há indicação de oxigenação e ventilação, sonda nasogástrica para decompressão do estômago, infusão de manitol em caso de edema cerebral e correção de distúrbios hidreletrolíticos.
- E) Em pacientes com psicose, agitação psicomotora e comportamento violento, o manejo com haloperidol IM associado com prometazina favorece o efeito antipsicótico, sedativo e ansiolítico, podendo ser usado midazolam IM em casos de extrapiramidalismo severo com uso de antipsicóticos típicos.

QUESTÃO 09 – Paciente de 72 anos de idade, normoglicêmico, internado há duas semanas com insuficiência cardíaca, em quarto individual. Na sequência, foi transferido à UTI por apresentar quadro complicado por pneumonia, que foi atribuída ao sistema de água de abastecimento do hospital, colonizado por bacilo gram-negativo. Teve manifestações de dor muscular, dor abdominal, febre, tosse produtiva, derrame pleural e hiponatremia. Na investigação diagnóstica, foi utilizado um teste para antígeno urinário da bactéria. O agente etiológico mais provável desse caso clínico é:

- A) *Brucella*.
- B) *Streptococo*.
- C) *Francisella*.
- D) *Legionella*.
- E) *Pseudomonas*.

QUESTÃO 10 – A epidemiologia trouxe importantes contribuições que são utilizadas na interpretação da literatura médica para exames diagnósticos. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A probabilidade pré-teste pode ser estimada a partir da prevalência da doença na população e por calculadoras de risco clínico ou experiência clínica, caso não haja ferramentas baseadas em evidência.
- () Um exame com resultado negativo tende a ser realmente negativo quando a prevalência da doença na população testada é baixa.
- () Quando a probabilidade pré-teste de doença do paciente e a razão de probabilidade ou razão de verossimilhança são conhecidas, um nomograma pode ser utilizado para estimar a probabilidade pós-teste de doença.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – F – V.
- E) F – F – F.

QUESTÃO 11 – A respeito do atendimento e avaliação de pacientes que apresentam cianose, analise as assertivas abaixo:

- I. São causas de cianose periférica: redução do oxigênio inspirado em altitudes elevadas e redução da saturação arterial de oxigênio.
- II. A cianose central não pode ocorrer sem dessaturação arterial e com pressão parcial de oxigênio normal nos casos em que há anomalias da hemoglobina, como metemoglobinemia.
- III. No exame clínico, a combinação de baqueteamento digital e cianose levanta a possibilidade diagnóstica de doença cardíaca congênita.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 12 – A respeito das características de distúrbios acidobásicos ou eletrolíticos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O envenenamento por álcool metílico e salicilatos são causas de acidose metabólica.
- B) Na acidose respiratória, um aspecto relevante para o raciocínio diagnóstico é considerar a hipoventilação alveolar.
- C) Na hipernatremia, a sede intensa é uma queixa frequente em pacientes que não têm alteração do estado mental.
- D) A cirrose em fase terminal é causa de alcalose respiratória crônica.
- E) Na hipermagnesemia, a hiperreflexia é um dos principais sinais para o diagnóstico.

QUESTÃO 13 – A _____ é fator de risco para a ocorrência de pré-eclâmpsia. A terapia antioxidante com suplementação de vitamina C, recomendada em gestantes com risco aumentado para pré-eclâmpsia, _____ proteção para o desenvolvimento da doença. Quando há presença concomitante de aumento da pressão arterial e de proteinúria após a 20ª semana gestacional em uma paciente primigesta, com história familiar de mãe com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, a probabilidade de pré-eclâmpsia é maior que _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) idade materna acima de 18 anos – confere – 30%
- B) primigestação – confere – 30%
- C) hipertensão arterial crônica – confere – 30%
- D) gestação gemelar – confere – 50%
- E) gestação molar – não confere – 90%

QUESTÃO 14 – Os indicadores podem ser utilizados na avaliação de serviços de saúde, sendo alguns atributos da qualidade das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde fundamentais para os profissionais de saúde e para os agentes públicos aprimorarem a assistência à população, alicerçados pela epidemiologia. Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A morbidade hospitalar, incluindo a distribuição das internações por causa, idade, sexo, altas, média de permanência, procedência, entre outros itens, é exemplo de indicador utilizado em análise de resultados ou impacto nos serviços de saúde.
- B) Um exemplo de indicador hospitalar de processo é a taxa de infecção hospitalar, representada pela razão entre o número de infecções atribuíveis ao hospital em determinado período e o número de egressos no mesmo período, em porcentagem.
- C) Os recursos e insumos; as políticas de saúde definidas; a organização dos níveis de atenção à saúde devidamente hierarquizados e referenciados constituem exemplos de indicadores utilizados na análise da estrutura dos serviços de saúde.
- D) Como atributo da qualidade das atividades executadas nos serviços de saúde, a eficácia significa a capacidade de produzir o efeito desejado de melhora na saúde, obtido na realidade ou esperado na prática diária.
- E) Como atributo da qualidade das atividades executadas nos serviços de saúde, a eficiência é a medida de custos de qualquer melhora na saúde, pois se duas estratégias são igualmente efetivas, a que custar menos será a mais eficiente.

QUESTÃO 15 – Em relação às situações de emergências, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as seguintes síndromes tóxicas aos seus respectivos agentes envolvidos.

Coluna 1

- 1. Anticolinérgica.
- 2. Colinérgica.
- 3. Serotoninérgica.

Coluna 2

- () Alcaloides da beladona.
- () Fisostigmina.
- () Inibidores da monoaminoxidase.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3.
- B) 1 – 3 – 2.
- C) 2 – 1 – 3.
- D) 2 – 3 – 1.
- E) 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 16 – Durante a abordagem nasal externa (rinoplastia aberta), secciona-se a artéria

- A) angular.
 - B) labial superior.
 - C) do soalho.
 - D) columelar.
 - E) do filtro.
-

QUESTÃO 17 – Os principais nervos sensoriais do nariz são ramos do nervo infraorbital e do nervo nasal externo, que, por sua vez, são ramos terminais do nervo

- A) facial.
 - B) trigêmeo.
 - C) frontal.
 - D) supratroclear.
 - E) nasal interno.
-

QUESTÃO 18 – Observa-se uma perda de função de dois músculos que controlam a posição da borda alar na paralisia do nervo facial, o que resulta em colapso da válvula nasal externa. Quais são esses músculos?

- A) Levantador da asa menor e levantador do lábio.
 - B) Depressor do septo e levantador alar.
 - C) Levantador do lábio e depressor do septo.
 - D) Levantador do lábio e orbicular oral.
 - E) Levantador da asa menor e orbicular do olho.
-

QUESTÃO 19 – Dorsalmente, os domos alares nasais são interconectados por um ligamento superficial na fáscia superficial e por um ligamento frequentemente referido como ligamento de Pitanguy. Qual é o nome desse ligamento?

- A) Interalar.
 - B) Piriforme.
 - C) Septal.
 - D) Interseptal.
 - E) Transalar.
-

QUESTÃO 20 – Quais cartilagens anexadas aos ossos nasais, cranialmente, e ao processo posterior da cartilagem septal, dorsalmente, formam o ponto "K" (*keystone point*)?

- A) Os processos laterais da cartilagem septal.
 - B) Cartilagem alar maior.
 - C) Cartilagem quadrangular.
 - D) Cartilagem nasal.
 - E) Porção superior do ramo lateral da cartilagem alar.
-

QUESTÃO 21 – Qual cartilagem suporta a válvula nasal externa?

- A) Triangular.
 - B) Quadrangular.
 - C) Nasal.
 - D) Cartilagem septal.
 - E) Alar maior.
-

QUESTÃO 22 – A ressecção cefálica deve ser executada em narizes com a ponta bulbosa ou globosa. A plenitude paradomal é secundária à proeminência da borda cefálica das cruzes média e lateral das cartilagens laterais inferiores. Quantos milímetros pelo menos de faixa da cruz lateral devem ser preservados para um apoio adequado da válvula externa?

- A) 1,5 mm.
- B) 2 mm.
- C) 3 mm.
- D) 4 mm.
- E) 5 mm.

QUESTÃO 23 – Em rinoplastia, de qual local os enxertos de cartilagem autóloga são mais comumente obtidos?

- A) Orelha.
- B) Cartilagem costal.
- C) Cartilagem quadrangular.
- D) Osso da calvária e nasal.
- E) Processo olécrano da ulna.

QUESTÃO 24 – A drenagem venosa do nariz consiste principalmente em vasos anastomosados com a veia

- A) supratroclear.
- B) nasal.
- C) labial superior.
- D) facial.
- E) carótida externa.

QUESTÃO 25 – São subunidades da unidade nasal, EXCETO:

- A) Ponta.
- B) Dorso.
- C) Radix.
- D) Columela.
- E) Triângulo mole.

QUESTÃO 26 – Nos dois terços superiores do nariz, admite-se o fechamento primário de um defeito com até quantos milímetros?

- A) 0,5 mm.
- B) 1-2 mm.
- C) 2-3 mm.
- D) 5-6 mm.
- E) 8-9 mm.

QUESTÃO 27 – São vantagens do enxerto de pele para reconstrução de defeitos nasais, EXCETO:

- A) Não se adiciona cicatrizes à superfície nasal.
- B) A quantidade de tecido disponível localmente não é um fator limitante.
- C) Resultado estético previsível.
- D) Pode ser usado para recobrir cartilagem com pericôndrio.
- E) Pode recobrir um enxerto cartilaginoso primário desnudo estreito, podendo revascularizar-se pelo fenômeno de pontes.

QUESTÃO 28 – O retalho geométrico bilobado é eficaz, mas deve ser limitado a defeitos da ponta do nariz que se situem a mais de 1 cm da margem da narina cujo o defeito seja igual ou inferior a:

- A) 0,5 cm.
- B) 0,7 cm.
- C) 1 cm.
- D) 1,5 cm.
- E) 2 cm.

QUESTÃO 29 – Segundo a Classificação Clínica de Defeito Auriculares de Tanzer, um paciente com orelha constricta é classificado como:

- A) II A.
- B) II B.
- C) III.
- D) IV A.
- E) IV B.

QUESTÃO 30 – Após a ocorrência de um oto-hematoma, qual é a conduta mais adequada para prevenir a formação da deformidade "orelha em couve-flor"?

- A) Aspiração com uma agulha.
- B) Incisão para drenagem com curativos captonados.
- C) Analgesia e tratamento após melhora do quadro agudo.
- D) Inserção de dreno.
- E) Gelo local e tratamento expectante.

QUESTÃO 31 – Embora haja vários relatos bem-sucedidos de orelhas microcirurgicamente reimplantadas após trauma, esse procedimento tende a fracassar. Qual é o motivo do fracasso recorrente do reimplante?

- A) Trombose venosa.
- B) Trombose arterial.
- C) Falha na técnica anastomótica dos vasos.
- D) Insuficiência arterial.
- E) Novo trauma por diminuição da sensibilidade nervosa.

QUESTÃO 32 – Qual é a deformidade mais comum causadora de orelhas proeminentes?

- A) Hipertrofia conchal.
- B) Orelha em taça.
- C) Anti-hélice sem dobra.
- D) Deformidade traumática.
- E) Deformidade posicional.

QUESTÃO 33 – Qual porcentagem do lábio superior pode ser ressecada para realização de um reparo direto?

- A) 8%.
- B) 10%.
- C) 15%.
- D) 20%.
- E) 25%.

QUESTÃO 34 – Os golpes sobre a maxila central, especialmente aqueles envolvendo um impacto frontal, frequentemente resultam em fraturas do segmento maxilar central com formato piramidal. O trecho refere-se à classificação Le Fort

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) IV.
- E) V.

QUESTÃO 35 – Os eventos embriológicos que levam à fissura labiopalatina ocorrem com que idade gestacional?

- A) 2-5 semanas.
- B) 3-7 semanas.
- C) 5-12 semanas.
- D) 10-12 semanas.
- E) 20-24 semanas.

QUESTÃO 36 – Em avaliações otorrinolaringológicas abrangentes, sintomas como tontura e vertigem podem surgir em pacientes que apresentam alterações nas estruturas faciais ou nas cavidades nasais, exigindo análise integrada da anatomia e da fisiologia regional. Nessa perspectiva, o sintoma mais característico da vertigem de origem periférica é:

- A) Instabilidade progressiva sem vertigem.
- B) Nistagmo vertical puro.
- C) Vertigem rotatória súbita com náuseas.
- D) Diplopia.
- E) Disartria.

QUESTÃO 37 – Durante a avaliação de pacientes com queixas nasais e faciais, é fundamental considerar repercussões otológicas associadas, dada a comunicação entre essas estruturas. Nesse contexto, a presença de otite média crônica com efusão unilateral sem precipitantes em adultos deve alertar para a possibilidade mais comum de:

- A) Fístula liquórica.
- B) Histiocitose X.
- C) SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida).
- D) Barotrauma.
- E) Tumor de rinofaringe.

QUESTÃO 38 – Na avaliação de massas em regiões adjacentes às cavidades nasais e faciais, o reconhecimento de sintomas otológicos específicos pode auxiliar no diagnóstico diferencial. A tríade clássica do zumbido pulsátil com hipoacusia condutiva e massa retrotimpânica avermelhada sugere:

- A) Otite média crônica.
- B) Otosclerose.
- C) Glomus timpânico.
- D) Colesteatoma.
- E) Doença de Ménière.

QUESTÃO 39 – A estética e a função da comunicação facial incluem aspectos vocais que dependem da integridade das estruturas laríngeas. Considerando essa análise, sobre o edema de Reinke, é INCORRETO afirmar que:

- A) Acomete mais as mulheres.
- B) Tabagismo, fonotrauma e refluxo laringofaríngeo são fatores de risco.
- C) Consiste no edema da camada superficial e média da lâmina própria.
- D) Pode ser simétrico ou assimétrico.
- E) Cirurgia está indicada para aqueles que desejam melhorar a qualidade vocal.

QUESTÃO 40 – Em avaliações otorrinolaringológicas voltadas à função respiratória e comunicativa, a análise da mobilidade das pregas vocais é fundamental. Nesse contexto, é correto afirmar que o sinal clínico clássico da paralisia unilateral de prega vocal é:

- A) Estridor bifásico.
- B) Disfonia soproso.
- C) Tosse metálica.
- D) Apneia do sono.
- E) Rouquidão.