



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - PB



NÍVEL SUPERIOR

ODONTÓLOGO - CEO

ESPECIALIDADE: CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA

BUCO-MAXILO-FACIAL

EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

**Do alto do Cruzeiro eu vejo a liberdade,
Oh minha São Francisco, Oh Terra amada.**

INSTRUÇÕES:

1. Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Língua Portuguesa de 01 a 15, Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
2. Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
3. Confira seus dados na Folha de Respostas com os dados do Cartão de Inscrição.
4. Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de transcorridas 2 (duas) horas completas, sob pena de eliminação.
5. É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
6. Certifique-se de que assinou a lista de presença e que preencheu adequadamente todos os espaços da Folha de Respostas.
7. Ao finalizar a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas, sob pena de eliminação.

PORTUGUÊS

O Texto I deve ser lido para responder às questões de 1 a 6.

Texto I

PAÍSES PRECISAM TRATAR A SOLIDÃO COMO UM PROBLEMA PÚBLICO

Sucesso de uma nação não é apenas produzir mais, é perder menos gente para o silêncio

Waldemar Magaldi Filho

20 set. 2025 às 10h10

Quando a vida perde o fio do sentido, até um simples resfriado pode derrubar. Não é exagero poético, é uma descrição precisa do que acontece quando o organismo psíquico se vê sem horizonte, sem pertencimento, sem uma razão que amarre as horas do dia.

Longe de um misticismo nebuloso, essa "tarefa" é o nome clássico de uma experiência cotidiana, a sensação de ter valor para alguém, de que o esforço tem direção, de que o mundo ainda nos pede algo. Quando esse chamado some, o corpo registra, a imunidade cede, a mente fecha e ficamos "bloqueados". O destino de pessoas e de sociedades muda quando o sentido deixa de existir.

É aí que entra um termo incômodo, nascido do esforço de dois economistas, Anne Case e Angus Deaton: "mortes por desespero". A expressão reúne três causas de morte que se expandiram em certas populações ao longo das últimas décadas: suicídio, overdose de drogas e doenças hepáticas relacionadas ao álcool.

Por trás dos números o desenho social de isolamento, perda de propósito, empregos que somem, comunidades que se desfazem, dor crônica tratada como mercadoria. O fenômeno foi fotografado com nitidez em partes dos Estados Unidos. Mas não se trata de um destino americano, é um alerta universal. Quando vínculos esgarçam e perspectivas encolhem, a curva do desespero sobe. E desespero não é só um afeto, é uma política do corpo.

A literatura de saúde pública insiste que o sentido é também um determinante social. Não basta aconselhar resiliência individual quando as estruturas que sustentam a vida comum – trabalho digno, moradia, transporte, escola, cuidado – estão corroídas.

Não se trata de eleger um culpado único – crises têm múltiplas causas, da inovação tecnológica aos choques geopolíticos –, mas de notar um padrão, quando políticas públicas passam a tratar a segurança econômica, a saúde, a educação e o cuidado como linhas de custo a serem comprimidas, a conta aparece em outro lugar.

Aparece na sobrecarga das famílias, na precarização silenciosa de territórios, na medicalização do sofrimento social, na anestesia como resposta. A retórica da meritocracia sem freios é psicologicamente tóxica porque produz um tipo de vergonha que isola. E isolamento é adubo para o desespero.

Dizer que "a matéria ganhou primazia sobre a alma" não é uma oposição simplista entre economia má e espiritualidade boa. É uma constatação sobre prioridades, quando o preço vira a linguagem, perde estatuto de valor. O resultado é uma sociedade eficiente para produzir coisas e inábil para acolher pessoas. E, no entanto, não há contradição entre prosperidade e sentido, há desordem de metas.

O desafio é civilizatório, alinhar incentivos econômicos a finalidades humanas. Isso significa cinco linhas de ação que cabem na pauta pública e na vida miúda: políticas de emprego que recompensem o trabalho decente; um sistema de saúde que integre cuidado mental desde a atenção primária; regulação e responsabilidade corporativa em mercados que lidam com dor e dependência; investimento em educação continuada e requalificação que devolvam horizonte a trabalhadores em transição; e, por fim, uma agenda de convivência que trate a solidão como problema público, promovendo espaços, tempos e serviços que refaçam a comunidade.

Fonte: MAGALDI FILHO, Waldemar. Países precisam tratar a solidão como um problema público. *Folha de São Paulo*, 20 set. 2025. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2025/09/uma-sociedade-eficiente-para-produzir-coisas-e-inabil-em-acolher-pessoas.shtml>. Acesso em: 20 set. 2025. Adaptado.

1ª QUESTÃO

Acerca do Texto I, analise as seguintes assertivas.

- I- A falta de horizontes, a solidão, não se sentir importante para alguém ou para o mundo são fatores que influenciam a saúde orgânica – e isso pode impactar a economia de uma nação.
- II- As chamadas “mortes por desespero”, cada vez mais comuns nas últimas décadas em algumas populações, incluem o suicídio, a overdose por drogas e doenças hepáticas devido ao uso abusivo de álcool.
- III- A saúde pública não pode ser considerada um determinante social porque não afeta o equilíbrio econômico de um país.
- IV- A primazia da matéria sobre a alma é vista pelo autor como uma questão de prioridades.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III apenas.
- b) I e III apenas.
- c) I, II e IV apenas.
- d) III e IV apenas.
- e) I, II, III e IV.

2ª QUESTÃO

Sobre o propósito comunicativo do Texto I, é CORRETO afirmar que se trata de:

- a) relatar o trabalho dos economistas Anne Case e Angus Deaton sobre "mortes por desespero".
- b) argumentar sobre a necessidade de os países tratarem a solidão como uma questão de saúde pública.
- c) narrar a trajetória acerca da literatura sobre saúde pública nos Estados Unidos.
- d) descrever como choques geopolíticos podem ser responsáveis pelo sentimento de perda de propósito.
- e) dissertar sobre como contornar o problema social para que ele não prejudique o setor econômico.

3ª QUESTÃO

O Texto I é um artigo de opinião. A respeito desse gênero textual, analise as assertivas a seguir.

- I- A tipologia textual predominante em um artigo de opinião é a argumentação.
- II- Num artigo de opinião, a descrição de um problema é mais importante do que a persuasão do público leitor/ouvinte.
- III- O domínio dos elementos da situação comunicativa no texto envolve a compreensão do público-alvo, do contexto de circulação e das normas implícitas que regem o gênero.
- IV- No artigo de opinião em análise, o público-alvo precisa dominar a norma padrão da linguagem para compreender o texto.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III apenas.
- b) I e IV apenas.
- c) II e IV apenas.
- d) I, III e IV apenas.
- e) I, II, III e IV.

4ª QUESTÃO

No período retirado do Texto I: “Mas não se trata de um destino americano, é um alerta universal. Quando vínculos esgarçam e perspectivas encolhem, a curva do desespero sobe. E desespero não é só um afeto, é uma política do corpo”, do ponto de vista das relações semântico-pragmáticas, tem-se um exemplo de:

- a) heteronímia.
- b) sinonímia.
- c) antonímia.
- d) paronímia.
- e) modalização.

5ª QUESTÃO

Considerando o trecho retirado do Texto I: “Não se trata de eleger um culpado único – crises têm múltiplas causas, da inovação tecnológica aos choques geopolíticos –, mas de notar um padrão, quando políticas públicas passam a tratar a segurança econômica, a saúde, a educação e o cuidado como linhas de custo a serem comprimidas, a conta aparece em outro lugar”, analise as assertivas que seguem.

- I- No aposto “crises têm múltiplas causas, da inovação tecnológica aos choques geopolíticos”, o substantivo **crises** oferece uma explicação sobre a quais culpados pelo quadro desanimador descrito no texto o autor poderia estar se referindo, enquanto o substantivo **causas** aponta para fatores que poderiam desencadear as crises, tais como a inovação tecnológica e os choques geopolíticos.
- II- O referente do sujeito “**a conta**”, em “**a conta** aparece em outro lugar”, não pode ser recuperado no texto em si, mas na exterioridade do texto, o que acarreta um problema de coesão.
- III- A classe de palavras **substantivo** é relevante para a coerência do período, uma vez que a intenção do autor é argumentar sobre uma situação, ou seja, sobre algo que está ocorrendo na sociedade, e que exige várias denominações, como ocorre em “múltiplas **causas**”, “**políticas** públicas”, “**segurança** econômica”, por exemplo.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I e II apenas.
- c) II e III apenas.
- d) II apenas.
- e) I e III apenas.

6ª QUESTÃO

Considerando a coesão do texto, é CORRETO afirmar que:

- a) em “Longe de um misticismo nebuloso, **essa "tarefa"** é o nome clássico de uma experiência cotidiana”, o termo em destaque não encontra o seu referente explícito no texto. É uma referência exofórica.
- b) em “[...] é uma descrição precisa do que acontece quando o organismo psíquico se vê sem horizonte, sem pertencimento, sem uma razão **que** amarre as horas do dia”, o pronome relativo em destaque tem por referente o substantivo **descrição**.
- c) em “Aparece na sobrecarga das famílias, na precarização silenciosa de territórios, na medicalização do sofrimento social, na anestesia como resposta”, o referente **a conta** está elíptico.
- d) em “três causas de morte **que** se expandiram”, empregos **que** somem” e “comunidades **que** se desfazem”, o termo em destaque exerce funções sintáticas diferentes.
- e) em “O desafio é civilizatório, alinhar incentivos econômicos a finalidades humanas. **Isso** significa cinco linhas de ação que cabem na pauta pública e na vida miúda”, o pronome demonstrativo em destaque é um exemplo de retomada catafórica.

7ª QUESTÃO

No Texto II:

Texto II



Fonte: DICAS HISTÓRICAS. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/DOIzO8GjpHC/>. Acesso em: 2 out. 2025.

Os substantivos **Biologia**, **Medicina**, **Jornalismo** e **História**, que nomeiam cursos e compõem as orações que formam a tira, do ponto de vista sintático são todos exemplos de:

- a) objeto indireto.
- b) objeto direto.
- c) complemento nominal.
- d) adjunto adnominal.
- e) adjunto adverbial.

Para responder às questões 8, 9 e 10, leia o Texto III.

Texto III



Fonte: GONSALES, Fernando. **Níquel Náusea**. Disponível em: https://www.instagram.com/p/DO-wPeVDngk/?img_index=1. Acesso em: 2 out. 2025.

8ª QUESTÃO

Acerca do Texto III, analise as assertivas a seguir.

- I- O substantivo “monstro” é empregado na tira de forma ambígua.
- II- A frustração dos monstros é importante para o estabelecimento da coerência do texto.
- III- O humor da tira gira em torno de uma quebra de expectativa.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I e III apenas.
- b) I e II apenas.
- c) II e III apenas.
- d) II apenas.
- e) I, II e III.

9ª QUESTÃO

No período composto retirado do Texto III: “**Se vocês não se comportarem**, o monstro come vocês!”, a oração em destaque se classifica como:

- a) oração subordinada adverbial condicional.
- b) oração subordinada adjetiva restritiva.
- c) oração subordinada substantiva objetiva direta.
- d) oração subordinada substantiva completiva nominal.
- e) oração principal.

10ª QUESTÃO

Caso a voz verbal da oração “o monstro come vocês!” fosse alterada, o resultado seria: “vocês serão comidos **pelo monstro!**”. Sobre isso, é CORRETO afirmar que:

- a) a voz verbal passa a ser passiva e o termo em destaque exerce a função sintática de adjunto adverbial.
- b) a voz verbal passa a ser passiva e o termo em destaque exerce a função sintática de agente da passiva.
- c) a voz verbal passa a ser ativa e o termo em destaque exerce a função sintática de objeto direto.
- d) a voz verbal passa a ser ativa e o termo em destaque exerce a função sintática de objeto indireto.
- e) a voz verbal passa a ser ativa e o termo em destaque exerce a função sintática de complemento nominal.

O Texto IV se refere às questões de 11 a 15.

Texto IV - Blanco

Marisa Monte

Me vejo no que vejo
Como entrar por meus olhos
Em um olho mais límpido
Me olha o que eu olho
É minha criação
Isto que vejo
Perceber é conceber
Águas de pensamentos
Sou a criatura do que vejo

Fonte: PAZ, Octavio. Blanco. Intérprete: Marisa Monte. **Barulhinho Bom**. Londres: EMI, 1996. Letra disponível em: <https://www.lettras.mus.br/marisa-monte/47272/>. Acesso em: 4 out. 2025.

11ª QUESTÃO

No verso “Sou a **criatura** do que vejo”, o processo de formação da palavra em destaque é:

- a) derivação sufixal.
- b) derivação prefixal.
- c) derivação parassintética.
- d) derivação regressiva.
- e) hibridismo.

12ª QUESTÃO

Ainda considerando o verso “Sou a criatura do que vejo”, é CORRETO afirmar que se trata de uma:

- a) antítese.
- b) metonímia.
- c) catacrese.
- d) comparação.
- e) metáfora.

13ª QUESTÃO

A função da linguagem **predominante** no Texto IV é:

- a) referencial.
- b) metalinguística.
- c) conativa.
- d) emotiva.
- e) fática.

14ª QUESTÃO

Ao colocar na ordem direta os versos 5 e 6 do Texto IV, tem-se o seguinte período composto:

Isto **que vejo** é minha criação.

É CORRETO afirmar que a oração em destaque se classifica como uma oração:

- a) subordinada adjetiva restritiva.
- b) subordinada adjetiva explicativa.
- c) subordinada substantiva objetiva indireta.
- d) coordenada sindética adversativa.
- e) coordenada sindética conclusiva.

15ª QUESTÃO

Observe os seguintes versos da canção:

Me vejo no que vejo
Como entrar por meus olhos
Em um olho mais **límpido**

É CORRETO afirmar sobre a palavra em destaque que é uma palavra:

- a) paroxítona e no texto atua como antônimo de **conturbado**.
- b) oxítona e no texto atua como sinônimo de **inexplicável**.
- c) paroxítona e no texto atua como antônimo de **tépido**.
- d) proparoxítona e no texto atua como sinônimo de **transparente**.
- e) proparoxítona e no texto atua como sinônimo de **enigmático**.

RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

Considere as seguintes proposições:

R: Todo campeão olímpico é medalhista;

S: $a + b = 4$, tal que $a = 1$ e $b = 2$.

Nesse contexto, é CORRETO afirmar que:

- a) a proposição **S** é falsa e a conjunção lógica ($\mathbf{R} \wedge \mathbf{S}$) é verdadeira.
- b) a proposição **R** é falsa e a disjunção lógica ($\mathbf{R} \vee \mathbf{S}$) é verdadeira.
- c) a proposição **S** é verdadeira e a disjunção lógica ($\mathbf{R} \vee \mathbf{S}$) é falsa.
- d) a proposição **R** é verdadeira e a conjunção lógica ($\mathbf{R} \wedge \mathbf{S}$) é verdadeira.
- e) as proposições **R** e **S** são, respectivamente, verdadeira e falsa. Portanto, a conjunção lógica ($\mathbf{R} \wedge \mathbf{S}$) é falsa.

17ª QUESTÃO

Complete a Tabela-verdade a seguir:

Tabela-verdade

| R | S | $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$ | $\sim \mathbf{R} \vee \mathbf{S}$ |
|----------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| V | V | | |
| V | F | | |
| F | V | | |
| F | F | | |

Analise as assertivas e assinale a alternativa CORRETA.

- a) A proposição composta ($\sim \mathbf{R} \vee \mathbf{S}$) foi construída mediante uma conjunção lógica.
- b) A proposição composta ($\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$) é tautológica.
- c) As duas proposições compostas, ($\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$) e ($\sim \mathbf{R} \vee \mathbf{S}$), são equivalentes.
- d) As duas proposições compostas, ($\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$) e ($\sim \mathbf{R} \vee \mathbf{S}$), são contradições.
- e) A proposição composta ($\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$) é contingente e a proposição composta ($\sim \mathbf{R} \vee \mathbf{S}$) é tautológica.

18ª QUESTÃO

Considere as proposições abaixo:

P: Carlos não é electricista;

Q: Maria é comissária de bordo;

R: Jorge é concursado.

É CORRETO afirmar que:

- a) **Jorge não é concursado ou Carlos não é electricista**, traduzida para linguagem lógica, é equivalente a ($\sim \mathbf{R} \wedge \mathbf{P}$).
- b) **Carlos é electricista** é a negação da proposição **P** e a proposição composta **Carlos não é electricista e Jorge é concursado** é a disjunção das proposições **P** e **R**.
- c) **Jorge é concursado ou Maria é comissária de bordo** é uma conjunção lógica.
- d) **Carlos é electricista ou Maria não é comissária de bordo**, traduzida para linguagem lógica, é equivalente a $\sim (\mathbf{P} \wedge \mathbf{Q})$.
- e) **Maria é comissária de bordo e Jorge não é concursado** é a conjunção das proposições **Q** e **R**.

19ª QUESTÃO

Os pais de Marília, a mais nova de dois irmãos, casaram-se em 1961, quando tinham uma diferença de idade de 23 anos. Sabe-se, ainda, que as informações a seguir também se referem a Marília:


- (i) nasceu em 1981, ano em que sua mãe completou 38 anos;
- (ii) seu pai é mais velho que sua mãe;
- (iii) seu irmão é 10 anos mais velho que ela.

É CORRETO afirmar que:

- a) em 2024, a mãe de Marília completou 79 anos.
- b) o pai de Marília nasceu em 1920 e em 2024 seu irmão completou 53 anos.
- c) em 2024, o irmão de Marília completou 54 anos.
- d) o pai de Marília nasceu em 1923.
- e) quando Marília nasceu, seu pai tinha 60 anos.

20ª QUESTÃO

A Figura 01 é composta por duas escadas independentes que se cruzam, formando um quadrado de letras.



Fonte: CPCON

Analise o padrão de formação das escadas e determine as letras correspondentes aos números 1, 2, 3 e 4, RESPECTIVAMENTE.

- a) H, J, I, I.
- b) H, I, I, J.
- c) A, B, C, D.
- d) I, K, J, L.
- e) I, L, J, K.

21ª QUESTÃO

Após a realização de uma corrida de 5km, o tempo final dos 8 (oito) primeiros atletas foi divulgado na Tabela 01 a seguir:

Tabela 01 – Tempo de prova

| Posição | Número de inscrição | Tempo final |
|---------|---------------------|-------------|
| 01 | 0014 | 12min04seg |
| 04 | 1234 | 14min18seg |
| 07 | 0356 | 17min21seg |
| 03 | 1102 | 12min45seg |
| 02 | 0025 | ? |
| 08 | 0001 | 22min00seg |
| 06 | 0011 | 16min14seg |
| 05 | 0007 | 15min01seg |

Fonte: CPCON

Sabendo-se que a diferença de tempo entre os 2 (dois) primeiros candidatos foi de 10 segundos e desconsiderando a fração em segundos do tempo final de cada candidato, assinale a alternativa que apresenta, CORRETA e RESPECTIVAMENTE, a **média aritmética**, a **moda** e a **mediana** da sequência crescente formada pelo tempo final dos candidatos.

- a) 15; 12 e 14,5.
- b) 14,5; 12 e 15.
- c) 15; 14,5 e 12.
- d) 10; 11 e 12.
- e) 12; 15 e 14,5.

22ª QUESTÃO

Dadas as sequências numéricas Seq1 e Seq2 a seguir, após determinar as incógnitas, é CORRETO afirmar que:

Seq1: 2, **a**, **b**, **c**, 14, 17, 20


Seq2: 4, **x**, **y**, **z**, 324, 972, 2916

- a) a incógnita **c** é igual a 10.
- b) a média aritmética das incógnitas **x**, **y** e **z** é igual a 51.
- c) a média aritmética das incógnitas **a**, **b** e **c** é igual a 8 e a incógnita **z** é igual a 108.
- d) a soma das incógnitas **x** e **y** é igual a 47.
- e) a média aritmética da Seq1 é igual a 10 e mediana da Seq2 é igual a 108.

23ª QUESTÃO

Um simulado composto por três disciplinas, **Matemática Aplicada (MA)**, **Álgebra Booleana (AB)** e **Circuitos Elétricos (CE)**, foi aplicado, de forma separada, ao final de um curso Técnico em Eletroeletrônica. A quantidade de alunos que realizaram a prova de cada disciplina, em um universo de 85 alunos matriculados, foi apresentada por meio do Diagrama de Venn a seguir:

Figura 02 - Diagrama de Venn



Fonte: CPCON

Com base nas informações contidas na Figura 02, é CORRETO afirmar que:

- a) apenas 5 alunos realizaram simultaneamente as provas de Matemática Aplicada e Álgebra de Booleana.
- b) apenas 17 alunos realizaram a prova de Circuitos Elétricos.
- c) 40 alunos realizaram a prova de Matemática Aplicada.
- d) 10 alunos realizaram as três provas simultaneamente e 16 alunos realizaram as provas de Matemática Aplicada e Circuitos Elétricos simultaneamente.
- e) 82 alunos realizaram o simulado e 3 são faltosos.

24ª QUESTÃO

Considerando o abecedário da língua portuguesa, determine a próxima letra da sequência e assinale a alternativa CORRETA cuja palavra inicia com a letra encontrada.

B, D, G, K, P, ____.

- a) VAZIO.
- b) WINDOWS.
- c) XADREZ.
- d) YOGA.
- e) ZEBRA.

25ª QUESTÃO

A matriz da Figura 03 foi construída admitindo a mesma regra lógica para a formação das linhas e colunas. Além disso, todos os elementos que a compõem pertencem ao conjunto $A = \{5, 10, 15, 25\}$.

Nesse contexto, é CORRETO afirmar que:

| | | | |
|----|----|----|----|
| 5 | 10 | 15 | 25 |
| 10 | A1 | A2 | 15 |
| 15 | A3 | A4 | 10 |
| 25 | 15 | 10 | 5 |

Fonte: CPCON

- a) A2 e A3 são necessariamente iguais a 5.
- b) A1 e A4 são iguais a 5 ou iguais a 25.
- c) A1 e A4 são necessariamente iguais a 25.
- d) A2 e A3 são diferentes.
- e) A1 e A4 são diferentes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

A artrocentese da articulação temporomandibular (ATM) é um procedimento de intervenção entre o tratamento não cirúrgico e a artroscopia, especialmente indicado em casos de aderência discal com sintomas agudos. Considerando a linha de Holmlund-Helsing traçada entre o canto lateral externo da órbita e o ápice do trágus da orelha, é CORRETO afirmar que os pontos de referência anatômicos para a técnica de dupla punção são:

- a) primeiro ponto: 10 mm do trágus e 2 mm abaixo da linha cantotragal; segundo ponto: 20 mm do trágus e 10 mm abaixo da linha cantotragal.
- b) primeiro ponto: 10 mm do trágus e 2 mm abaixo da linha cantotragal; segundo ponto: 2 mm do trágus e 10 mm abaixo da linha cantotragal.
- c) primeiro ponto: 10 mm do trágus e 2 mm abaixo da linha cantotragal; segundo ponto: 20 mm do trágus e 12 mm abaixo da linha cantotragal.
- d) primeiro ponto: 20 mm do trágus e 10 mm abaixo da linha cantotragal; segundo ponto: 10 mm do trágus e 2 mm abaixo da linha cantotragal.
- e) primeiro ponto: 12 mm do trágus e 5 mm abaixo da linha cantotragal; segundo ponto: 22 mm do trágus e 10 mm abaixo da linha cantotragal.

27ª QUESTÃO

Muitos pacientes encaminhados para procedimentos cirúrgicos odontológicos utilizam anticoagulantes orais, como a varfarina, devido a condições como fibrilação atrial, prótese valvar cardíaca ou histórico de tromboembolismo.

A partir deste contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- Para intervenções cirúrgicas de pequeno porte, como extrações dentárias, a manutenção da varfarina é considerada segura quando a INR está abaixo de 3,0 ou 3,5, visto que a suspensão pode aumentar o risco de eventos embólicos.
- II- O cirurgião-dentista pode suspender a varfarina por conta própria quando julgar necessário, sem necessidade de avaliação médica.
- III- Medidas hemostáticas locais (ex.: esponjas hemostáticas, suturas) são fundamentais para o controle de sangramento em pacientes anticoagulados.
- IV- O risco de sangramento cresce significativamente em pacientes com INR acima de 4, sendo indicada avaliação médica antes de qualquer procedimento cirúrgico.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II, III e IV.
- b) I e II.
- c) II e IV.
- d) I e III.
- e) I, III e IV.

28ª QUESTÃO

Os dentes impactados podem gerar complicações clínicas de diferentes gravidades, variando desde inflamações até alterações que interferem em reabilitações protéticas.

Considerando a conduta em relação a terceiros molares impactados, analise as assertivas a seguir.

- I- Quando um terceiro molar inferior erupciona parcialmente, pode ocorrer reação inflamatória denominada pericoronarite, frequentemente associada a bactérias como *Peptostreptococcus*, *Fusobacterium* e *Porphyromonas*. O tratamento inicial envolve desbridamento, irrigação antibacteriana e, em muitos casos, exodontia.
- II- Antes da confecção de próteses removíveis ou fixas, é necessário avaliar a presença de dentes impactados na região edêntula; se houver, a remoção deve ser indicada, principalmente em pacientes acima de 40 anos.
- III- Terceiros molares totalmente impactados, totalmente recobertos por osso, sem sinais de patologia e em pacientes acima de 40 anos não necessitam ser extraídos de rotina.
- IV- A coronectomia é uma técnica recomendada para dentes parcialmente erupcionados, pois evita o risco de lesão de estruturas nobres adjacentes.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e IV.
- b) I e III.
- c) III e IV.
- d) I, II e IV.
- e) II e IV.

29ª QUESTÃO

As técnicas anestésicas mandibulares são fundamentais para o controle da dor em procedimentos odontológicos, apresentando indicações e características específicas.

Considerando as técnicas de anestesia na região mandibular, analise as assertivas a seguir.

- I- A técnica de Gow-Gates consiste em uma abordagem alta do nervo mandibular, bloqueando também os ramos lingual e bucal, sendo indicada em falhas do bloqueio convencional. Requer que o paciente mantenha a boca amplamente aberta durante a punção.
- II- A técnica Vazirani-Akinosi é uma modalidade de boca fechada, indicada para pacientes com limitação de abertura bucal, permitindo bloqueio do nervo alveolar inferior, lingual e bucal.
- III- No bloqueio direto do nervo alveolar inferior, a agulha deve atravessar o músculo pterigoideo medial até atingir o ramo mandibular.
- IV- O bloqueio indireto do nervo alveolar inferior é caracterizado pela inserção da agulha paralela à linha oclusal, penetrando na fossa mandibular até o contato ósseo.
- V- A anestesia do nervo mentoniano é realizada por infiltração no forame mentoniano, proporcionando analgesia da região labial inferior e gengiva bucal adjacente, sem efeito sobre o nervo lingual.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II, III e V.
- b) I, III e IV.
- c) I e V.
- d) III e V.
- e) I, II e IV.

30ª QUESTÃO

Traumas de alta energia na região nasal podem ocasionar epistaxe significativa. A área mais importante de sangramento nasal interno é o *plexo de Kiesselbach* (*área de Little*). É CORRETO afirmar que as artérias que se anastomosam nessa região são:

- a) artérias esfenopalatina, palatina maior, labial superior e etmoidal anterior.
- b) artérias maxilar interna, temporal superficial, oftálmica e carótida externa.
- c) artérias alveolar superior posterior, alveolar inferior, palatina menor e esfenopalatina.
- d) artérias etmoidal posterior, submentoniana, labial inferior e carótida interna.
- e) artérias faríngea ascendente, lingual, auricular posterior e etmoidal anterior.

31ª QUESTÃO

As infecções odontogênicas podem se disseminar para diferentes espaços anatômicos da cabeça e pescoço, variando quanto ao grau de gravidade clínica. Sobre a classificação desses espaços em níveis de risco baixo, moderado e alto, respectivamente, é CORRETO afirmar que se trata de:

- a) subperiosteal, bucal e mediastino.
- b) bucal, pré-traqueal e pterigomandibular.
- c) sublingual, vestibular e faríngeo lateral.
- d) submassetérico, infraorbital e retrofaríngeo.
- e) infraorbital, sublingual e retrofaríngeo.

Considere o caso abaixo para responder às questões de 32 a 34.

Paciente F.C.S., 25 anos, sexo feminino, gestante de 24 semanas (2º trimestre), compareceu ao centro de especialidades odontológicas queixando-se de aumento de volume em hemiface esquerda e dor contínua em região posterior da mandíbula esquerda. Ao exame clínico, observou-se aumento de volume gengival na região distal do elemento 37, com halitose, dor à palpação e dificuldade para abertura bucal. A radiografia panorâmica revelou o elemento 38 incluído, méso-angulado, com parte da coroa exposta à cavidade oral e sem lesões ósseas associadas.

32ª QUESTÃO

Considerando a condição gestacional e a necessidade de anestesia local para a exodontia do elemento 38, é CORRETO afirmar que a opção mais adequada corresponde a:

- a) bupivacaína 0,5% com epinefrina 1:200.000.
- b) mepivacaína 3% sem vasoconstritor.
- c) lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000.
- d) articaína 4% com epinefrina 1:100.000.
- e) prilocaína 3% associada à felipressina.

33ª QUESTÃO

Considerando a paciente gestante no 2º trimestre e a necessidade de medicação pós-operatória após a exodontia do 38, é CORRETO afirmar que a conduta mais adequada é:

- a) osteomielite crônica, com contraindicação absoluta de cirurgia na gestação.
- b) abscesso periodontal, com tratamento restrito à drenagem e remoção do capuz pericoronário.
- c) cisto dentígero associado ao elemento 38, com indicação de marsupialização.
- d) granuloma periapical, sem necessidade de intervenção cirúrgica durante a gestação.
- e) pericoronarite associada ao elemento 38, com necessidade de exodontia sob anestesia segura e medidas hemostáticas locais.

34ª QUESTÃO

Com base nos achados clínicos e radiográficos descritos, qual o diagnóstico mais provável e a conduta cirúrgica indicada?

- a) Paracetamol associado a corticoides sistêmicos como primeira escolha para analgesia.
- b) Ibuprofeno como anti-inflamatório de escolha e ciprofloxacino como antibiótico seguro.
- c) Paracetamol para analgesia e amoxicilina em caso de infecção, evitando-se anti-inflamatórios não esteroidais.
- d) Diclofenaco como anti-inflamatório e tetraciclina como antibiótico de escolha.
- e) Dipirona sódica para dor e eritromicina como antibiótico de primeira escolha.

Considere o caso abaixo para responder às questões de 35 a 37.

Paciente M.A.S., 15 anos, sexo masculino, compareceu ao ambulatório de Cirurgia Bucomaxilofacial acompanhado da mãe, queixando-se de aumento de volume indolor em região mandibular posterior direita, percebido há cerca de dois meses. Ao exame físico extraoral, observou-se discreta assimetria facial sem sinais flogísticos. Intraoralmente, notou-se expansão de cortical vestibular na região do ângulo mandibular direito, com mucosa preservada e ausência de mobilidade dentária. Radiografia panorâmica evidenciou imagem radiolúcida unilocular, de limites definidos e corticais regulares, em íntima relação com o germe do dente 48. Diante dos achados, levantou-se a hipótese de lesão odontogênica cística.

35ª QUESTÃO

Considerando a idade do paciente e a hipótese de ceratocisto odontogênico, qual síndrome deve ser investigada pela possível associação com lesões múltiplas?

- a) Síndrome de Sturge-Weber.
- b) Síndrome de Gorlin-Goltz.
- c) Síndrome de Gardner.
- d) Síndrome de Treacher Collins.
- e) Síndrome de Crouzon.

36ª QUESTÃO

Após a radiografia panorâmica, qual exame de imagem apresenta maior acurácia para avaliar a extensão da lesão e sua relação com estruturas anatômicas adjacentes?

- a) Radiografias periapicais seriadas.
- b) Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC).
- c) Radiografia oclusal.
- d) Ultrassonografia.
- e) Ressonância magnética.

37ª QUESTÃO

Considerando tratar-se de lesão sugestiva de ceratocisto odontogênico mandibular em paciente jovem, analise as assertivas a seguir.

- I- A biópsia incisional é recomendada em lesões extensas, quando a remoção completa imediata poderia acarretar risco de fratura mandibular.
- II- A biópsia excisional deve ser evitada em ceratocistos, mesmo de pequeno porte, devido à alta taxa de recidiva.
- III- A marsupialização é indicada em pacientes jovens, preservando dentes adjacentes e podendo ser seguida de enucleação.
- IV- A enucleação simples é suficiente na maioria dos casos, pois o ceratocisto apresenta baixa taxa de recidiva.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) III e IV.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) I e III.
- e) I, II e IV.

38ª QUESTÃO

Paciente leucoderma, sexo masculino, 42 anos, procura atendimento odontológico relatando dor na região posterior superior direita. Ao exame clínico e radiográfico, observa-se a presença de resto radicular do dente 16, com indicação de exodontia. Durante a anamnese, o paciente informa ser portador de cardiopatia congênita cianótica não corrigida, condição que configura risco para endocardite bacteriana e necessidade de antibioticoprofilaxia. Refere ainda alergia à penicilina.

Considerando o quadro descrito, quanto à conduta medicamentosa do cirurgião-dentista para profilaxia antibiótica, é CORRETO afirmar que contempla:

- a) 600 mg de clindamicina, via oral, 1 hora antes do procedimento.
- b) 2 g de amoxicilina, via oral, 1 hora antes do procedimento.
- c) 20 mg/kg de clindamicina, via oral, 1 hora antes do procedimento.
- d) 2 g de azitromicina, via oral, 30 minutos antes do procedimento.
- e) 50 mg/kg de ampicilina, via intravenosa, 1 hora antes do procedimento.

39ª QUESTÃO

Durante um procedimento cirúrgico de exodontia em paciente adulto, o cirurgião-dentista teve contato de pele íntegra com sangue e saliva. De acordo com normas de biossegurança, quais condutas devem ser adotadas imediatamente após o acidente?

- a) Lavagem com água e sabão seguida de imersão em solução de antibiótico tópico.
- b) Fricção vigorosa da pele com álcool 70% e imersão da área em hipoclorito de sódio por 5 minutos.
- c) Apenas lavagem da área exposta com água corrente, sem necessidade de outras medidas.
- d) Encaminhamento imediato ao serviço de referência para avaliação de profilaxia, sem necessidade de higienização local.
- e) Lavagem imediata da área exposta com água e sabão, podendo-se aplicar solução antisséptica degermante (PVPI ou clorexidina 2%). Não há necessidade de encaminhamento para avaliação de profilaxia pós-exposição.

40ª QUESTÃO

Paciente masculino, 25 anos, sofreu acidente motociclístico resultando em extrusão do incisivo central superior permanente. Procurou atendimento imediatamente após o trauma. Ao exame clínico, o dente apresentava mobilidade aumentada, deslocamento coronário, sensibilidade dolorosa à palpação e ausência de fratura coronária.

Segundo a literatura de Andreasen sobre traumatismos dentoalveolares, qual a conduta CORRETA?

- a) Reposicionar cuidadosamente o dente sem anestesia local, mantendo parte do coágulo no alvéolo, aplicar contenção rígida por 2 a 3 semanas e solicitar apenas radiografia periapical.
- b) Realizar perfuração vestibular do alvéolo para drenagem do coágulo antes do reposicionamento, aplicar contenção rígida por 2 a 3 semanas e solicitar TCFC.
- c) Aguardar 1 a 2 semanas pelo reposicionamento espontâneo, intervindo apenas se não ocorrer, solicitando radiografia periapical em caso de sintomas persistentes.
- d) Reposicionar imediatamente o dente extruído sob anestesia local, preservando o ligamento periodontal, aplicar contenção flexível por 2 a 3 semanas e solicitar radiografia periapical e TCFC para descartar fraturas radiculares ou alveolares.
- e) Remover o coágulo formado no alvéolo, reposicionar o dente sem contenção e solicitar apenas radiografia panorâmica.