

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 41**

Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) são

- A** universalidade, equidade e integralidade, e orientam a atenção à saúde no Brasil, assegurando acesso para todos, tratamento justo segundo necessidades e cuidado integral em todas as dimensões da vida.
- B** equidade, integralidade e hierarquização, com ênfase na organização em níveis de complexidade crescente.
- C** integralidade, participação popular e regionalização, vinculando a saúde à gestão territorial e ao envolvimento social.
- D** universalidade, solidariedade e descentralização, entendidos como aspectos centrais da organização da saúde pública.
- E** universalidade, solidariedade e descentralização, e abrangem acesso para todos, tratamento igual a todos e foco na reabilitação de doenças.

Questão 42

De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde. No que concerne ao sigilo e à confidencialidade das informações pessoais no âmbito do sistema de saúde, assinale a opção correta.

- A** Compete à instituição de saúde decidir se manterá ou não a confidencialidade das informações do paciente após sua morte.
- B** O sigilo das informações pessoais deixa de ter validade após a morte da pessoa.
- C** As informações de saúde do paciente podem ser compartilhadas livremente entre instituições médicas.
- D** O sigilo das informações em saúde é relativizado quando há interesse científico.
- E** O direito ao sigilo e à confidencialidade só pode ser quebrado em situações que representem risco à saúde pública.

Questão 43

De acordo com a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), a análise de situação de saúde consiste em

- A** uma abordagem de evento adverso ou inesperado que cause doença, danos à saúde ou morte em um ou mais membros da população, em determinado lugar, em determinado período.
- B** uma situação que demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.
- C** ações de monitoramento contínuo da situação de saúde da população do país, do estado, da região, do município ou de áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde, por meio de estudos e análises que identifiquem problemas de saúde e expliquem o comportamento dos principais indicadores de saúde.
- D** um conjunto articulado de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde.
- E** uma forma de articulação de recursos e práticas de produção de saúde, orientada por diretrizes clínicas, entre as unidades de atenção de determinada região.

Questão 44

No que se refere às vacinas SCR (tríplice viral atenuada) e SCRv (tetra viral atenuada), assinale a opção correta, com base no Calendário Nacional de Vacinação de 2025.

- A** A vacina SCR protege contra sarampo, coqueluche e rubéola.
- B** Os intervalos mínimos entre as doses de SCR e SCRv devem ser, respectivamente, de 30 dias e 60 dias.
- C** A via de administração da vacina SCRv é intramuscular (IM).
- D** A SCRv corresponde à 2.^a dose da vacina tríplice viral e à 1.^a dose da vacina varicela.
- E** A vacina SCR deve ser administrada apenas em crianças com idade entre 15 meses de vida e 5 anos incompletos de idade.

Questão 45

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), é competência das secretarias municipais de saúde

- A** prestar apoio institucional aos respectivos estados no processo de implantação, acompanhamento e qualificação da atenção básica em outros municípios.
- B** divulgar periodicamente os relatórios de indicadores da atenção básica, com intuito de assegurar o direito fundamental de acesso à informação.
- C** fortalecer a estratégia de saúde da família na rede de serviços como estratégia prioritária de organização da atenção básica.
- D** buscar recurso federal para compor o financiamento tripartite da atenção básica.
- E** organizar os serviços para permitir que a atenção básica atue como a porta de entrada preferencial e ordenadora da Rede de Atenção à Saúde.

Questão 46

No que diz respeito às taxonomias de diagnósticos de enfermagem, assinale a opção correta.

- A** Compete ao enfermeiro identificar os sinais e sintomas indicativos da síndrome da fragilidade no idoso, mas o diagnóstico dessa condição é de competência exclusiva do médico.
- B** Diagnóstico de risco é o julgamento clínico de uma resposta humana indesejável a uma condição de saúde ou a um processo da vida de um indivíduo.
- C** A arritmia cardíaca, definida como qualquer distúrbio do batimento rítmico normal do coração ou da contração do miocárdio, é um diagnóstico de enfermagem.
- D** O diagnóstico de enfermagem consiste no mecanismo de registro para que os enfermeiros transmitam o raciocínio e o julgamento clínico de forma padronizada.
- E** O diagnóstico de enfermagem envolve um julgamento clínico derivado de achados de avaliação abrangentes e fundamentado em uma compreensão de conceitos básicos da disciplina de enfermagem.

Questão 47

Considerando o papel desempenhado pelo enfermeiro em promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde mental, assinale a opção correta.

- Ⓐ Todo atendimento de enfermagem em saúde mental deve ser baseado no acolhimento, uma vez que este é entendido como um norteador transversal da Rede de Atenção à Saúde.
- Ⓑ Durante o acolhimento de saúde mental, o enfermeiro deve priorizar o uso de perguntas fechadas para identificação das demandas do usuário.
- Ⓒ O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I, cuja coordenação é privativa do enfermeiro, funciona 24 horas por dia e está presente em municípios com população superior a 70 mil habitantes.
- Ⓓ Durante o primeiro encontro com o usuário e sua família, o enfermeiro deve avaliar a aptidão do usuário para a autogestão da própria vida.
- Ⓔ A identificação dos efeitos colaterais dos medicamentos, bem como das técnicas terapêuticas não farmacológicas que existem e que proporcionam melhor atuação do usuário, é atribuição do enfermeiro no plano terapêutico singular (PTS).

Questão 48

Acerca da assistência de enfermagem à pessoa idosa, assinale a opção correta.

- Ⓐ Níveis de pressão sistólica acima de 140 mmHg e(ou) de pressão diastólica acima de 90 mmHg são considerados fisiologicamente normais para os idosos.
- Ⓑ O enfermeiro deve orientar às pessoas idosas o uso de talcos corporais, especialmente nas regiões com maior acúmulo de umidade.
- Ⓒ Idosos com queixa de perda involuntária de urina devem ser orientados a acessar o banheiro para urinar, rotineiramente, a cada 4 horas.
- Ⓓ O mau controle glicêmico, identificado quando HbA1c está acima de 8,5%, está associado a maior risco de sarcopenia e fragilidade.
- Ⓔ A vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica) – VPP 23 deve ser administrada a toda população com idade igual ou superior a 60 anos.

Questão 49

Diante do diagnóstico de enfermagem intitulado “recuperação cirúrgica prejudicada relacionada à mobilidade física prejudicada, evidenciada por dificuldade em movimentar-se”, constituído a partir da taxonomia NANDA (2024-2026), a intervenção de enfermagem adequada e fundamentada para a promoção da recuperação cirúrgica, considerado o fator relacionado e a característica definidora do diagnóstico em apreço, é

- Ⓐ elaborar um plano de reabilitação física em conjunto com a equipe interdisciplinar, promovendo mobilização precoce e segura.
- Ⓑ monitorar sinais vitais a cada 4 horas nas primeiras 72 horas após o procedimento cirúrgico.
- Ⓒ orientar o paciente e a família sobre cuidados com o curativo cirúrgico antes da alta hospitalar.
- Ⓓ estimular o paciente a verbalizar sentimentos relacionados à sua imagem corporal.
- Ⓔ avaliar a presença de sinais glogísticos, como dor, rubor e calor na ferida cirúrgica.

Questão 50

É competência privativa do enfermeiro no tratamento de paciente em quimioterapia antineoplásica

- Ⓐ promover acesso venoso totalmente implantável.
- Ⓑ manter a atualização técnica e científica da biossegurança individual, coletiva e ambiental.
- Ⓒ participar de programas de orientação e educação de pacientes e familiares com enfoque na prevenção de riscos e agravos.
- Ⓓ participar da integração da equipe multiprofissional.
- Ⓔ participar de programas de garantia da qualidade em serviço de quimioterapia antineoplásica.

Questão 51

Com base nas orientações do Ministério da Saúde, assinale a opção correta acerca da assistência de enfermagem à criança.

- Ⓐ A presença de duas alterações fenotípicas (p. ex. fenda palpebral oblíqua, lábio leporino, prega palmar única) é suficiente para indicar um alerta no desenvolvimento integral da criança.
- Ⓑ A triagem neonatal auditiva, realizada por meio de medidas fisiológicas e eletrofisiológicas — emissões otoacústicas evocadas (EOA) e potencial evocado auditivo do tronco encefálico (PEATE) —, deve ser realizada após o 1.º mês de vida.
- Ⓒ Crianças com menos de 2 anos de idade devem ser medidas deitadas (comprimento), enquanto crianças com 2 anos de idade ou mais devem ser medidas em pé (estatura).
- Ⓓ Para o manejo do paciente com diarreia, o plano C prevê 70 mL/kg de soro fisiológico a 0,9% ou *ringer* lactato, em 1 h, na fase de expansão (etapa 1), para crianças a partir de 1 ano de idade.
- Ⓔ Para se evitar a deficiência de vitamina A, que pode resultar em problemas de vista, risco de diarreia e risco de infecções respiratórias, todas as crianças com idade entre 6 meses e 5 anos devem receber suplementação da referida vitamina.

Questão 52

De acordo com as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS), assinale a opção correta.

- Ⓐ Não é permitida a separação do conjunto seringa-agulha, mesmo com auxílio de dispositivos de segurança, e nem a desconexão e o reencape, principalmente manual, de agulhas.
- Ⓑ Apesar de serem classificados no grupo B, os medicamentos hemoderivados devem ser manejados como resíduos do grupo A com periculosidade.
- Ⓒ Os resíduos pertencentes à classe II, que incluem os agentes biológicos com capacidade de transmissão por via respiratória, apresentam alto risco individual e moderado risco para a comunidade.
- Ⓓ Os sacos para acondicionamento de RSS do grupo A devem ser substituídos ao atingirem o limite de dois terços de sua capacidade ou a cada 48 horas, independentemente do volume.
- Ⓔ Os resíduos que apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente são classificados como resíduos do grupo D.

Questão 53

Em determinado tipo de precaução, são recomendadas as seguintes medidas de biossegurança: uso de máscara cirúrgica durante atendimento direto ao paciente (a menos de um metro de distância); avental e luvas descartáveis, em caso de riscos de respingos ou contato com secreções; óculos, em caso de risco de respingos; higienização das mãos antes e depois do contato com o paciente; quarto privativo ou quarto compartilhado em coorte para o paciente, com um metro de distância entre os leitos; uso de máscara cirúrgica pelo paciente durante o transporte fora de seu quarto.

As medidas de biossegurança listadas no texto precedente estão relacionadas à precaução

- I padrão.
- II por gotículas.
- III por aerossóis.
- IV de contato.

Assinale a opção correta.

- A** Nenhum item está certo.
- B** Apenas o item I está certo.
- C** Apenas o item II está certo.
- D** Apenas o item III está certo.
- E** Apenas o item IV está certo

Questão 54

De acordo com a Resolução COFEN n.º 564/2017, que aprovou o Novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue os itens subsequentes.

- I O profissional deve recusar-se a executar prescrição de enfermagem ou médica na qual não conste assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência.
- II É proibido ao profissional delegar atribuições dos profissionais de enfermagem, previstas na legislação, para acompanhantes e(ou) responsáveis pelo paciente, excetuando-se os casos de atenção domiciliar para o autocuidado apoiado.
- III É permitido ao profissional de enfermagem registrar e assinar ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional, desde que se trate de situação de urgência e emergência.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item II está certo.
- B** Apenas o item III está certo.
- C** Apenas os itens I e II estão certos.
- D** Apenas os itens I e III estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

Questão 55

No que concerne ao atendimento inicial ao paciente politraumatizado, julgue os itens a seguir.

- I A permeabilidade da via aérea é a primeira medida de atendimento ao politraumatizado, sendo um resultado menor ou igual a 8 na Escala de Glasgow indicativo da necessidade de via aérea definitiva.
- II A perda sanguínea é a principal causa de morte evitável por trauma, devendo todo paciente politraumatizado com hipotensão e taquicardia ser considerado hipovolêmico até que se prove o contrário.
- III A reposição volêmica com cristalóide deve ser realizada preferencialmente com *ringer* lactato aquecido a 39 °C, e deve ser iniciada com 1 L/kg em adultos e crianças.
- IV Além da avaliação neurológica, é importante inspecionar no politraumatizado lesões indicativas de TCE, como o sinal de Guaxinin, que consiste em uma equimose retroauricular.

Estão certos apenas os itens

- A** I e II.
- B** I e IV.
- C** II e III.
- D** I, III e IV.
- E** II, III e IV.

Questão 56

No contexto do suporte básico de vida, para o reconhecimento de AVC em adultos, recomenda-se o uso da abordagem FAST ou BEFAST. A letra S destes mnemônicos significa

- A** perda súbita de equilíbrio ou tontura.
- B** necessidade de acionar a emergência imediatamente.
- C** dificuldade para falar.
- D** face paralisada.
- E** fraqueza do braço.

Questão 57

Conforme o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, para a adequada assistência à mulher e ao recém-nascido no momento do parto, todas as unidades integrantes do SUS têm como responsabilidade

- A** proibir o abortamento incompleto.
- B** realizar o exame de VDRL na mãe e no pai.
- C** assegurar condições para que as parturientes tenham direito a acompanhante durante a internação, independentemente da estrutura física.
- D** admitir a visita do pai do bebê em qualquer horário.
- E** realizar partos normais e encaminhar partos cirúrgicos para outra unidade.

Questão 58

Para o atendimento da parada cardiorrespiratória (PCR) em adultos, a relação compressão-ventilação, sem via aérea avançada, deve ser de

- A** 15:2.
- B** 30:3.
- C** 30:2.
- D** 30:1.
- E** 15:1.

Questão 59

Julgue os itens seguintes em conformidade com a Resolução RDC n.º 15/2012 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre requisitos mínimos de boas práticas no processamento de produtos para a saúde.

- I A pré-limpeza consiste na remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas e na redução da carga microbiana presente nos produtos para saúde, de forma a tornar o produto seguro para manuseio e preparado para desinfecção ou esterilização.
- II Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza.
- III É obrigatória a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo, no primeiro ciclo do dia.

Está(ão) certo(s) apenas o(s) item(ns)

- A I.
- B III.
- C I e II.
- D I e III.
- E II e III.

Questão 60

A respeito das diretrizes e normas de prevenção e controle de infecções hospitalares estabelecidas pelo Ministério da Saúde, assinale a opção correta.

- A Deve compor a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar um membro consultor representante da administração do hospital.
- B Pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida são considerados críticos apenas se internados para terapia intensiva.
- C Hospitais que se consorciem para uso recíproco de recursos para manutenção de programa de controle da infecção hospitalar ficam dispensados de manter Comissão de Controle de Infecção Hospitalar própria com fins consultivos.
- D O potencial de contaminação da ferida cirúrgica é entendido como a espécie e a letalidade dos microrganismos presentes no tecido a ser operado.
- E A inobservância das normas de prevenção e controle de infecções hospitalares pode ensejar encaminhamento da ocorrência a órgãos de defesa do consumidor para aplicação da legislação pertinente.

Espaço livre