

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 41**

Acerca do processo de luto, tal como tratado em referências de qualificação de profissionais validadas pelo Ministério da Saúde, assinale a opção correta.

- Ⓐ O luto é uma construção cultural que viabiliza a canalização da dor.
- Ⓑ A tentativa de animar o sobrevivente com frases feitas distrai o enlutado de sua dor.
- Ⓒ Por mais que o mundo tenha mudado, a expressão social do luto mantém-se inalterada.
- Ⓓ Para que a elaboração do luto seja resolvida adequadamente, é necessário passar por suas etapas de maneira sequencial.
- Ⓔ O luto é uma experiência coletiva e, por vezes, transferível.

Questão 42

Considerado o Formulário de Notificação de Indicadores Nacionais das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde e Resistência aos Antimicrobianos (versão 2025) de unidades de terapia intensiva pediátricas, assinale a opção correta.

- Ⓐ A taxa de adesão ao *checklist* de verificação das práticas de inserção segura de cateter central é dada pela razão entre o número total de *checklists* aplicados que tiveram 100% de conformidade e o número total de *checklists* aplicados no momento da inserção de cateter central na UTI pediátrica no mês de vigilância.
- Ⓑ A densidade de incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica é obtida pela razão entre o número total de pacientes com pneumonias associadas à ventilação mecânica na UTI pediátrica no mês de vigilância e o total de pacientes internados, a cada dia, por UTI pediátrica no mês de vigilância.
- Ⓒ A taxa de utilização de ventilação mecânica é fornecida pela razão entre o número total de pacientes submetidos a ventilação mecânica a cada dia, por UTI pediátrica, no mês de vigilância, e o número de ventiladores disponíveis na unidade multiplicado pelo número de dias do mês.
- Ⓓ A densidade de incidência de infecção primária de corrente sanguínea confirmada laboratorialmente (IPCSL) é obtida pela razão entre o número total de pacientes com IPCSL por UTI pediátrica no mês de vigilância e o número total de pacientes que usaram cateter central, a cada dia, por UTI pediátrica, no mês de vigilância.
- Ⓔ A taxa de conformidade a todos os itens do *checklist* de verificação das práticas de inserção segura de cateter central é calculada pela razão entre o número total de *checklists* aplicados que tiveram 100% de conformidade e o número total de cateteres centrais que foram inseridos na UTI pediátrica no mês de vigilância.

Questão 43

Tendo como referências as portarias do Ministério da Saúde que tratam de controle de infecções hospitalares e biossegurança, assinale a opção correta.

- Ⓐ Infecções que se manifestem após a alta hospitalar são consideradas hospitalares, ainda que não tenham relação com procedimentos hospitalares.
- Ⓑ A exceção das infecções transplacentárias, as demais infecções em recém-nascidos são consideradas infecções hospitalares.
- Ⓒ O uso de luvas dispensa a lavagem de mãos anteriormente, mas não posteriormente, aos contatos que envolvam mucosas, sangue ou outros fluidos corpóreos, como secreções ou excreções.
- Ⓓ A lavagem das mãos com antisséptico é obrigatória na realização de procedimentos invasivos.
- Ⓔ O diagnóstico das infecções hospitalares deverá valorizar informações oriundas de endoscopia e biópsia, entre outras fontes.

Questão 44

Uma enfermeira intensivista pediátrica depara-se com o caso de uma criança internada que evidentemente foi vítima de violência, caso este que não está sendo acompanhado pelas autoridades competentes.

Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a opção correta a aplicar-se no caso descrito.

- Ⓐ Caso a enfermeira mantenha sigilo sobre o caso e, posteriormente, seja intimada como testemunha, ela deve comparecer perante a autoridade e declarar suas razões éticas para a manutenção do sigilo profissional.
- Ⓑ Para evitar a denúncia direta, a enfermeira pode fazer uso de suas redes sociais e, discretamente, divulgar o caso para que ele chegue ao conhecimento das autoridades.
- Ⓒ A enfermeira deve revelar o fato sob a alegação de quebra de sigilo ser necessária à prestação da assistência à criança, sob o argumento de que a vida é o bem maior.
- Ⓓ A enfermeira deve manter sigilo sobre o caso, pois dele tomou conhecimento em razão de sua atividade profissional.
- Ⓔ A enfermeira deve comunicar o caso aos órgãos de responsabilização criminal, independentemente de qualquer autorização.

Questão 45

No que se refere a bancos de leite e outras estratégias de aleitamento materno e de terapia nutricional neonatal e pediátrica em Boa Vista e no Brasil, assinale a opção correta.

- Ⓐ Apesar da importância do aleitamento materno mesmo após o período legal de licença-maternidade, o Brasil prescinde de uma ação estratégica de incentivo à amamentação durante a jornada de trabalho.
- Ⓑ O banco de leite humano público de referência na cidade de Boa Vista é aquele sediado e mantido pelo Hospital Geral de Roraima.
- Ⓒ O eixo estratégico da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança que trata de aleitamento materno prevê que a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento devem iniciar-se imediatamente após o nascimento.
- Ⓓ Visando contribuir para uma adequada nutrição infantil, o Brasil criou lei que regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância.
- Ⓔ De acordo com documentos publicados pelo Ministério da Saúde, a iniciativa Hospital Amigo da Criança apresenta dezenas de objetivos junto aos hospitais pediátricos, sendo o objetivo ligado ao aleitamento materno apenas um deles.

Questão 46

Tendo como referências o guia de como elaborar projetos de pesquisa para o Sistema Único de Saúde e a lei que rege a pesquisa com seres humanos, assinale a opção correta.

- Ⓐ A metodologia deve ser descrita no projeto de pesquisa, sendo, entretanto, desnecessária sua apresentação no protocolo de pesquisa.
- Ⓑ A delimitação do problema a ser investigado na pesquisa prescinde da definição prévia da pergunta que o pesquisador queira responder sobre o tema.
- Ⓒ A definição de critérios de exclusão e de inclusão é obrigatória apenas quando a metodologia adotada na pesquisa assim o exigir.
- Ⓓ Há diversas situações legais em que é possível obter do comitê de ética em pesquisa a dispensa de termo de consentimento livre e esclarecido do participante da pesquisa.
- Ⓔ A metodologia consiste no estabelecimento do marco de referência adotado na pesquisa bem como na construção de sua base teórica.

Questão 47

Acerca do emprego de propofol na terapia intensiva pediátrica, assinale a opção correta.

- Ⓐ Pode ser sedada com propofol criança maior de três anos de idade que apresente epiglotite.
- Ⓑ O propofol pode levar à hipolipidemia se infundido por tempo prolongado e em dose elevada.
- Ⓒ Criança maior de três anos de idade sob tratamento intensivo com infecção grave na traqueia e nos pulmões pode receber infusão de propofol.
- Ⓓ Inexistem registros de sequelas neurológicas em crianças após a interrupção da administração de propofol.
- Ⓔ O risco de acidose metabólica em crianças durante a infusão de propofol é desprezível, o que se comprova pela ausência de relatos dessa natureza.

Questão 48

Considerado o conjunto de leis e normas que se associam ao prontuário do paciente e a suas informações pessoais associadas à saúde, assinale a opção correta.

- Ⓐ É vedada, em qualquer hipótese, a comunicação ou o uso compartilhado, entre controladores, de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica.
- Ⓑ O acesso de terceiros a informações pessoais relativas à intimidade e à vida pessoal do paciente dispensam consentimento se necessárias a um diagnóstico médico e para uso exclusivo no tratamento médico, ao passo que o acesso a informações pessoais relativas à honra e à imagem do paciente só pode ser obtido mediante seu expresso consentimento.
- Ⓒ A revelação sem justa causa de segredo contido em prontuário do paciente por enfermeiro que a ele tem acesso por sua profissão, em ato que possa produzir dano a outrem, é uma contravenção penal de ação incondicionada prevista na Lei das Contravenções Penais.
- Ⓓ Existem diversos tipos de dados pessoais, sendo alguns deles classificados como sensíveis, a exemplo de dados pessoais relacionados à saúde, à vida sexual, bem como genéticos ou biomédicos.
- Ⓔ Ainda que o prontuário seja um documento do paciente, se este era partícipe de pesquisa e sofreu evento adverso grave, é vedada a divulgação de detalhes relativos à sua participação na pesquisa em questão, mesmo que tal divulgação seja feita pelo paciente, por seus representantes legais ou por seus sucessores.

Questão 49

Considerando as recomendações validadas pelo Ministério da Saúde acerca de ventilação mecânica domiciliar (VMD), assinale a opção correta.

- Ⓐ A existência de dois ou mais cuidadores no domicílio do paciente é ideal, entretanto o fato de haver apenas um cuidador não constitui, por si só, fator de inelegibilidade para o desempenho das tarefas relativas à VMD.
- Ⓑ É admissível a VMD mesmo que o paciente apresente episódios de agitação, independentemente de controle ou manejo seguro.
- Ⓒ Recomenda-se que a adaptação do paciente ao equipamento seja feita no domicílio, no seu devido tempo.
- Ⓓ O domicílio do paciente é considerado apto a receber equipamento de ventilação mecânica desde que conte com fornecimento regular de energia elétrica, sendo dispensáveis os acessos a água e telefonia.
- Ⓔ A aptidão para a realização de cuidados é uma característica prévia e rígida, que deve ser avaliada pela equipe multiprofissional antes da alta hospitalar.

Questão 50

Considerando que os registros de enfermagem constituem parte da sistematização da assistência no processo de enfermagem, assinale a opção correta com base nas recomendações do Conselho Federal de Enfermagem para tais registros no exercício da profissão.

- Ⓐ O registro de enfermagem deve conter as impressões do profissional de enfermagem sobre as condições do paciente.
- Ⓑ Considera-se adequado um registro de enfermagem que apresente juízos de valor, visto que eles conferem maior grau informativo aos relatos.
- Ⓒ As respostas do paciente diante dos cuidados prestados, por serem excessivamente subjetivas, devem ser evitadas nos registros de enfermagem.
- Ⓓ Dados simples, que não requeiram maior aprofundamento científico, dispensam referência nos registros de enfermagem.
- Ⓔ Termos como “bem”, “mal”, “muito”, “pouco” são imprescindíveis nos registros de enfermagem por fornecerem informações importantes acerca do estado de saúde do paciente.

Questão 51

Acerca da doação de órgãos e transplantes pediátricos, assinale a opção correta.

- Ⓐ Na realização dos procedimentos de determinação de morte encefálica, os pacientes com idade de 7 a 15 anos devem apresentar temperatura corporal (esofágica, vesical ou retal) superior a 35 °C, saturação arterial de oxigênio acima de 94% e pressão arterial sistólica maior ou igual a 85 mmHg ou pressão arterial média maior ou igual a 62 mmHg.
- Ⓑ No âmbito da equipe de enfermagem, a entrevista familiar, com a finalidade de doação de órgãos, tecidos e células, compete privativamente ao enfermeiro.
- Ⓒ A hipotermia grave (temperatura corporal central menor ou igual a 36 °C) é fator confundidor na determinação de morte encefálica, pois os reflexos de tronco encefálico podem desaparecer.
- Ⓓ Em crianças com idade de dois a 24 meses incompletos, o intervalo mínimo de tempo entre os dois exames clínicos para a determinação da morte encefálica é de 24 horas.
- Ⓔ O tempo de isquemia é o período entre a interrupção de fluxo sanguíneo do doador para o órgão e o novo aporte de sangue após o implante no receptor (transplante), sendo aceitável o período de 48 horas para o transplante de fígado.

Questão 52

Julgue os itens seguintes, referentes ao paciente pediátrico oncológico.

- I A síndrome de lise tumoral é uma emergência oncológica caracterizada pela tríade clássica: hiperuricemia, hiperpotassemia e hiperfosfatemia.
- II Em pacientes neutropênicos febris, sempre que houver cateter central, deve-se coletar cultura simultânea do cateter e da veia periférica.
- III Edema de face e pescoço, dispneia em repouso, ortopneia, tosse, síncope, cefaleia, sonolência, confusão mental e dilatação das veias do tórax são alguns dos sinais e sintomas da síndrome da veia cava superior.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item II está certo.
- B** Apenas o item III está certo.
- C** Apenas os itens I e II estão certos.
- D** Apenas os itens I e III estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

Questão 53

No que diz respeito à terapia intravenosa em pediatria, assinale a opção correta.

- A** Para pacientes de qualquer idade em terapia intensiva, sedados ou com déficit cognitivo, a frequência ideal de avaliação do sítio de inserção é a cada 3 horas.
- B** Utilizar a técnica de pressão negativa, considerando-se a técnica de *flushing* pulsátil, promove a remoção de depósitos sólidos e minimiza o retorno de sangue para o lúmen do cateter.
- C** Cateter venoso periférico não deve ser utilizado para infusão contínua de produtos vesicantes, nutrição parenteral com mais de 10% de dextrose ou qualquer solução com osmolalidade acima de 900 mOsm/L.
- D** A fricção da pele, antes da punção com cateter periférico, deve ser realizada com solução à base de álcool, sendo de 1,5 minuto o tempo de aplicação da clorexidina > 0,5%.
- E** A cobertura para cateter periférico deve ser limpa, podendo ser semioclusiva (gaze e fita adesiva estéril) ou membrana transparente semipermeável.

Questão 54

Tendo como referência as diretrizes atuais para a ressuscitação cardiopulmonar em pediatria, assinale a opção correta.

- A** Após cada compressão, deve-se permitir que o tórax retorne, pelo menos, um terço do seu diâmetro anteroposterior, sendo necessário realizar a verificação de ritmo, com duração não superior a 10 segundos, a cada 2 minutos aproximadamente.
- B** A taxa de compressão razoável para bebês e crianças é de aproximadamente 60-80 compressões por minuto.
- C** Na ausência de via aérea avançada, é recomendada uma relação de compressão-ventilação de 30:2 caso haja dois socorristas, e de 15:2 caso haja apenas um socorrista.
- D** Para bebês, deve-se comprimir o esterno com 2 dedos ou 2 polegares colocados logo abaixo da linha intermamária; quando a ressuscitação é realizada por um socorrista, é recomendada a técnica de envolver as mãos com os dois polegares.
- E** É recomendado aplicar compressão que pressione o tórax aproximadamente em 4 cm para bebês e em 5 cm para crianças, o que corresponde a, pelo menos, um terço do diâmetro anteroposterior do tórax.

Questão 55

Acerca da bronquiolite, julgue os itens seguintes.

- I A bronquiolite é uma infecção viral aguda com impacto obstrutivo máximo no nível dos bronquíolos, sendo o vírus sincicial respiratório (VSR) a sua causa mais comum.
- II No manejo terapêutico, não é recomendado o início da terapia contínua com oximetria de pulso e oxigênio suplementar se a saturação de oxigênio for de 90% ou mais.
- III Sinais e sintomas graves de infecção por VSR incluem taquipneia (mais de 70 respirações/minuto), apatia, crises de apneia, alteração nas trocas gasosas (por exemplo, retrações e crepitações) e diminuição dos sons respiratórios.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item II está certo.
- B** Apenas o item III está certo.
- C** Apenas os itens I e II estão certos.
- D** Apenas os itens I e III estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

Texto 5A2

Uma criança com 2 anos de idade é levada ao pronto-atendimento, com história de diarreia, fezes líquidas e amareladas, 8 a 10 evacuações líquidas por dia, sem sangue, associadas a vômitos frequentes (5-6 episódios), há 3 dias. Nas últimas 8 horas, a mãe notou que a criança está apática, irritada, chorando sem lágrimas, rejeitando líquidos, sem diurese e sem febre. No exame físico, apresentou-se descorado, pouco responsivo, com mucosas secas, olhos fundos, lágrimas ausentes, sem aceitação de líquidos, com sinal de prega maior que 3 segundos, taquicárdico (FC = 150 bpm), com pulso fraco e filiforme. Seu peso atual é de 11,5 kg, mas o peso habitual, segundo a mãe, é de 13 kg.

Questão 56

A partir do caso clínico descrito no texto 5A2 e de acordo com as referências do Ministério da Saúde, é correto concluir que a causa mais provável dos sintomas do paciente é a desidratação

- A** persistente.
- B** grave.
- C** leve.
- D** mista.
- E** moderada.

Questão 57

Ainda com relação ao caso clínico apresentado no texto 5A2, é correto afirmar que o plano de tratamento inicial mais adequado para o paciente em apreço consiste na

- A** administração de 100-200 mL de soro de reidratação oral, continuamente, de acordo com a faixa etária, até desaparecerem os sinais de desidratação, na unidade de saúde.
- B** administração/ingestão de 50-100 mL de soro de reidratação oral, após evacuação diarreica, de acordo com a faixa etária, na unidade de saúde.
- C** administração de soro fisiológico 0,9% ou ringer lactato, 30 mL/kg de volume na primeira etapa (30 minutos) e 70 mL/kg de volume na segunda etapa (2,5 horas), reavaliando-se os sinais clínicos após cada fase de expansão administrada.
- D** administração de soro fisiológico 0,5% ou ringer lactato, 30 mL/kg de volume na primeira etapa (1 hora) e 70 mL/kg de volume na segunda etapa (5 horas), reavaliando-se os sinais clínicos após cada fase de expansão administrada.
- E** administração de soro fisiológico 0,9% ou ringer lactato, 70 mL/kg de volume na primeira etapa (30 minutos) e 30 mL/kg de volume na segunda etapa (2,5 horas), reavaliando-se os sinais clínicos após a administração.

Questão 58

Em relação à síndrome nefrótica (SN), assinale a opção correta.

- Ⓐ Crianças com SN têm risco diminuído para infecções virais e bacterianas (pneumonia e sepse) em razão do aumento na concentração de imunoglobulinas e uso de corticosteroides.
- Ⓑ Para pacientes com SN, é recomendada a manutenção de uma dieta com alto teor de sal e, em casos mais graves, com restrição de líquidos.
- Ⓒ Entre as manifestações clínicas da SN estão a pressão arterial normal ou aumentada e as alterações urinárias (volume aumentado e urina espumosa).
- Ⓓ O monitoramento contínuo da retenção ou excreção de líquidos (peso diário, medida de circunferência abdominal e balanço hídrico) é uma ação que compete à equipe de enfermagem no tratamento de paciente com SN.
- Ⓔ Na SN, o edema da face (inchaço facial), especialmente ao redor dos olhos, fica aparente à noite e desaparece pela manhã.

Questão 59

Acerca dos achados da apendicite, assinale a opção correta.

- Ⓐ O sinal de Dunphy refere-se a dor no lado esquerdo com extensão do quadril direito.
- Ⓑ O sinal do obturador, caracterizado pela sensibilidade no quadrante inferior direito do abdome, ocorre durante a palpação ou percussão de outros quadrantes abdominais.
- Ⓒ O sinal do músculo psoas corresponde ao aumento da dor abdominal ao tossir.
- Ⓓ O ponto de McBurney, localizado a dois terços da distância linear entre o umbigo e a espinha íliaca anterossuperior, é o ponto mais comum de sensibilidade.
- Ⓔ O sinal de Rovsing refere-se a dor à flexão e à rotação interna do quadril direito.

Questão 60

A respeito da Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a opção correta.

- Ⓐ O acolhimento norteia a PNH por meio de uma escuta qualificada, garantindo que apenas o profissional defina o projeto terapêutico.
- Ⓑ A ambiência — criação de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis — não interfere no processo de trabalho entre profissionais e pacientes.
- Ⓒ Uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento que considere a singularidade do sujeito, com a qualificação do diálogo, possibilita decisões compartilhadas entre profissionais e usuários.
- Ⓓ Apesar de os usuários da PNH terem direitos garantidos por lei, estes são válidos em apenas algumas fases do cuidado.
- Ⓔ A escuta qualificada oferecida pelos profissionais às necessidades do usuário, apesar de essencial, pode prejudicar a efetividade das práticas de saúde.

Espaço livre