

**-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --****Questão 41**

Acerca dos mecanismos da comunicação oral, assinale a opção correta.

- Ⓐ A área de broca localizada no lobo frontal do cérebro é responsável pela compreensão do som.
- Ⓑ O som é produzido na laringe por meio das cordas vocais.
- Ⓒ A ressonância é amplificada nas cordas vocais.
- Ⓓ No ouvido interno é feita a compreensão do som.
- Ⓔ Os pulmões não participam da fonação.

**Questão 42**

No que se refere ao desenvolvimento da linguagem infantil, assinale a opção correta.

- Ⓐ As dificuldades anatomofisiológicas, a exemplo da dificuldade auditiva, não prejudicam significativamente o desenvolvimento da linguagem infantil.
- Ⓑ A teoria mais aceita atualmente para explicar o desenvolvimento da linguagem é a de Jean Piaget, denominada teoria cognitivista.
- Ⓒ O transtorno do desenvolvimento da linguagem (TDL) é uma dificuldade persistente e significativa de aquisição e uso de linguagem em decorrência de causas neurológicas.
- Ⓓ A estrutura pragmática da linguagem infantil, com pouco uso de gestos, olhares e expressões faciais, não é relevante para o diagnóstico de atraso de linguagem, que foca apenas na comunicação oral.
- Ⓔ O desenvolvimento da linguagem infantil envolve fatores inatos, sustentados por uma base neuroanatômica e fisiológica.

**Questão 43**

Em relação à prevenção dos distúrbios da comunicação oral, julgue os próximos itens.

- I Falar com o bebê, cantar e responder a vocalizações é essencial para a prevenção dos distúrbios da comunicação oral.
- II A prevenção dos distúrbios da comunicação no contexto escolar é fortemente limitada, dada a ausência de interação entre a criança e seus pais nesse ambiente.
- III Os primeiros meses gestação são considerados como prioridade na prevenção dos distúrbios da comunicação, sendo fundamental a realização do pré-natal.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item I está certo.
- Ⓑ Apenas o item II está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e III estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens II e III estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

**Questão 44**

No que se refere à prevenção dos distúrbios da comunicação escrita, julgue os próximos itens.

- I Durante a alfabetização, métodos de ensino diversificados e ambiente alfabetizador rico podem contribuir para o desenvolvimento da linguagem escrita.
- II Somente o fonoaudiólogo pode realizar a avaliação e a prevenção dos distúrbios de leitura e escrita.
- III Na educação infantil, dada a pouca familiaridade da criança com a escrita, ainda não é possível prevenir dificuldades na comunicação escrita.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item I está certo.
- Ⓑ Apenas o item III está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens II e III estão certos.
- Ⓔ Nenhum item está certo.

**Questão 45**

Acerca dos distúrbios da voz, julgue os itens a seguir.

- I Professores, cantores e outros profissionais da voz devem receber orientações fonoaudiológicas preventivas, por fazerem parte do grupo de risco para os distúrbios vocais.
- II A hidratação adequada e a redução do esforço vocal são medidas preventivas importantes para evitar os distúrbios da voz.
- III O hábito de sussurrar é frequentemente considerado saudável e pode ajudar na prevenção vocal.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item II está certo.
- Ⓑ Apenas o item III está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens I e III estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

**Questão 46**

No que se refere aos distúrbios auditivos em locais de trabalho, julgue os seguintes itens.

- I Os trabalhadores que se acostumam a ambientes ruidosos têm menos propensão a apresentar distúrbios auditivos decorrentes da exposição a ruído no trabalho.
- II Usar o protetor auricular unilateralmente é prática adequada de prevenção de distúrbios auditivos se acompanhada de repouso auditivo.
- III A audiometria é necessária para a orientação e a prevenção da perda auditiva em locais de trabalho ruidoso.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Nenhum item está certo.
- Ⓑ Apenas o item II está certo.
- Ⓒ Apenas o item III está certo.
- Ⓓ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓔ Apenas os itens I e III estão certos.

**Questão 47**

O distúrbio específico de linguagem (DEL) envolve

- Ⓐ fatores ambientais, exclusivamente.
- Ⓑ dificuldades auditivas que impedem a aquisição da fala.
- Ⓒ alteração importante, mas breve, das capacidades linguísticas, com pouco risco de desenvolvimento de dificuldades acadêmicas.
- Ⓓ falhas na articulação de fonemas, exclusivamente.
- Ⓔ alteração primária na linguagem, sem déficit intelectual ou sensorial associado.

**Questão 48**

Acerca do uso da triagem auditiva neonatal (teste da orelhinha) no recém-nascido, assinale a opção correta.

- Ⓐ Fazem parte da triagem auditiva neonatal as emissões otoacústicas evocadas (EOAE) e o potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE).
- Ⓑ Essa triagem dispensa a realização de exames audiológicos futuros.
- Ⓒ O teste é utilizado para identificar perdas auditivas em crianças maiores de 6 meses de idade.
- Ⓓ Esse teste avalia apenas os bebês com risco para problemas auditivos.
- Ⓔ O teste é pouco confiável, por inconsistência das respostas obtidas.

**Questão 49**

O nódulo vocal

- Ⓐ é uma lesão que ocorre com pouca frequência na infância.
- Ⓑ está relacionado a malformação congênita da laringe.
- Ⓒ é uma lesão benigna causada pelo uso abusivo ou inadequado da voz.
- Ⓓ é um tumor maligno localizado nas cordas vocais.
- Ⓔ consiste em uma alteração transitória nas cordas vocais após um resfriado.

**Questão 50**

Acerca da disfagia, assinale a opção correta.

- Ⓐ A disfagia é sintoma de uma doença, podendo ser de origem neurológica, mecânica ou psicogênica.
- Ⓑ Na disfagia, a deglutição atípica ocorre somente devido à ingestão de alimentos líquidos.
- Ⓒ A disfagia acomete principalmente pessoas idosas.
- Ⓓ A disfagia não provoca desnutrição, pois é apenas uma dificuldade de engolir.
- Ⓔ A disfagia tratada não previne a broncoaspiração.

**Questão 51**

Acerca da classificação das disfonias proposta por Behlau, assinale a opção correta.

- Ⓐ Disfonias psicogênicas são caracterizadas por alterações estruturais das pregas vocais, como o Edema de Reinke, detectado em exame de videolaringoscopia.
- Ⓑ Disfonias organofuncionais são alterações vocais que acompanham lesões observadas nos exames de rotina, como nódulos vocais e pólipos.
- Ⓒ Quando há queixas relacionadas ao uso excessivo da voz sem que haja fator emocional envolvido, o quadro pode ser classificado como disfonia psicogênica.
- Ⓓ Disfonias funcionais são causadas por lesões estruturais de origem congênita nas pregas vocais, de forma bilateral.
- Ⓔ Disfonias mistas são alterações presentes em indivíduos com exames neurológicos alterados e altos níveis de cortisol.

**Questão 52**

A plena coordenação entre ritmo, velocidade, pausa e continuação da emissão oral são características presentes em uma fala fluente, o que assegura um processo adequado e fluido de comunicação oral. Acerca da fluência na fala, assinale a opção correta.

- Ⓐ A gagueira adquirida está associada ao desenvolvimento infantil, sendo seu surgimento esperado entre 2 e 5 anos de idade.
- Ⓑ Disfluências do desenvolvimento típico e disfluências patológicas (disfluências gagas) apresentam o mesmo padrão de desenvolvimento clínico e prognóstico, não havendo necessidade da distinção diagnóstica para o tratamento.
- Ⓒ A taquialalia é caracterizada por rupturas de fala acompanhadas de tensão muscular, esforço e bloqueios, sendo frequentemente associada à gagueira do desenvolvimento.
- Ⓓ A taquifemia diferencia-se da taquialalia pelo fato de a primeira estar relacionada a alterações anatômicas do trato vocal.
- Ⓔ A gagueira do desenvolvimento pode surgir, de forma típica, entre 2 e 5 anos de idade, e se caracteriza por repetições de sílabas, prolongamentos e, às vezes, bloqueio com risco de cronificação.

**Questão 53**

A triagem auditiva neonatal universal (TANU) é obrigatória no Brasil desde a promulgação da Lei n.º 12.303/2010, e é um procedimento fundamental na detecção precoce da deficiência auditiva em recém-nascidos. Acerca da TANU e dos exames utilizados para a sua realização, assinale a opção correta.

- Ⓐ O potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) é o exame indicado em casos de recém-nascidos com indicador de risco para deficiência auditiva, pois permite avaliar o sistema auditivo de forma mais completa até o tronco encefálico.
- Ⓑ A realização da TANU por meio do exame de emissões otoacústicas evocadas em recém-nascidos com indicadores de risco (permanência em UTI neonatal, hiperbilirrubinemia ou infecções congênicas) é suficiente para garantir a detecção precoce da surdez.
- Ⓒ Crianças que não têm desempenho satisfatório na TANU em geral apresentam transtorno do processamento auditivo central (TPAC), caracterizado por perda auditiva periférica.
- Ⓓ A observação comportamental da resposta ao som é considerada o padrão ouro de triagem universal, pois apresenta alta sensibilidade e especificidade para identificar casos de surdez congênita.
- Ⓔ O exame de emissões otoacústicas evocadas (EOA) é utilizado na TANU e avalia a integridade do sistema auditivo central, sendo capaz de detectar lesões retrococleares, como neuropatia auditiva.

**Questão 54**

No que se refere ao tratamento fonoaudiológico para disfunção temporomandibular (DTM), assinale a opção correta.

- A** A terapia fonoaudiológica para DTM busca promover equilíbrio das funções orofaciais (respiração, mastigação, deglutição e fala), por meio de técnicas de alongamento, relaxamento muscular, adequação postural e reequilíbrio dos movimentos mandibulares.
- B** A terapia fonoaudiológica para DTM deve priorizar os exercícios de fortalecimento da musculatura orofacial, principalmente masseteres associados a treino funcional de mastigação.
- C** O uso de aparelhos e placas interoclusais é preconizado na terapia fonoaudiológica para DTM, com objetivo de reposicionamento e adaptação muscular.
- D** A terapia fonoaudiológica para DTM deve ter como premissa básica promover a analgesia através de medicamentos e de técnicas de acupuntura.
- E** O foco da terapia fonoaudiológica nos casos de DTM é a adaptação da dieta alimentar para consistência líquido-pastosa, a fim de favorecer a deglutição segura do paciente.

**Questão 55**

Acerca do processo de aquisição de linguagem e seus distúrbios, assinale a opção correta.

- A** No processo de desenvolvimento normal da linguagem, é esperado que a combinação de palavras com diferentes valores semânticos, como “quer água”, esteja presente em crianças a partir de 4 ou 5 anos de idade.
- B** Alterações sistemáticas na compreensão e expressão da fala associadas ao déficit cognitivo e neurológico estão presentes no atraso simples de fala.
- C** Pacientes com diagnóstico de transtorno fonológico demonstram dificuldades na organização do uso dos sons da fala sem que haja alterações orgânicas nos órgãos fonoarticulatórios.
- D** O transtorno específico de linguagem (TEL) está associado a casos de surdez periférica não diagnosticada, principalmente em crianças com otites médias de repetição.
- E** Ecolalia imediata e persistente associada a movimentos é um marco de desenvolvimento típico de linguagem encontrado por volta dos 5 anos de idade.

**Questão 56**

No que diz respeito à atuação fonoaudiológica na área materno-infantil, assinale a opção na qual são corretamente apresentadas ações que contribuem diretamente para o fortalecimento do vínculo mãe-bebê durante a amamentação.

- A** O fonoaudiólogo deve realizar exercícios motores orais sem que haja a necessidade de associá-los à função, pois a sucção não nutritiva e a soltura da musculatura são suficientes para preparar o bebê para o seio materno.
- B** Além de verificar os aspectos fisiológicos de pega e coordenação da sucção, o fonoaudiólogo deve incentivar práticas de contato olho a olho, interação vocal e estímulo à comunicação responsiva durante a amamentação.
- C** O fonoaudiólogo deve verificar atentamente os aspectos de ganho ponderal, pois, à medida que o recém-nascido ganha peso com a amamentação, o vínculo mãe-bebê se fortalece.
- D** O fonoaudiólogo deve prescrever dietas alimentares específicas para a mãe, a fim de melhorar a qualidade do leite materno.
- E** O fonoaudiólogo pode substituir a equipe de enfermagem no acompanhamento clínico do recém-nascido, uma vez que a sucção deverá ser avaliada pelo fonoaudiólogo.

**Questão 57**

No que se refere ao processo de amamentação de recém-nascidos que permanecem por longos períodos em unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), assinale a opção correta.

- A** Recomenda-se a suspensão da amamentação, priorizando-se o uso de fórmula hidrolisada em mamadeira de bico comum.
- B** Deve ser mantida amamentação exclusiva para estimular o reflexo de sucção do bebê, pois a aspiração de leite nesse caso é improvável.
- C** O ideal é o uso da amamentação com mamadeira de fluxo rápido, pois facilita a oferta e reduz o esforço para o bebê.
- D** O início da amamentação deve ser adiado até que a criança esteja com a coordenação de sucção, deglutição e respiração bem estabelecida, com manutenção de dieta parenteral nesse período.
- E** Técnicas adaptativas como copinho, translactação e uso de bicos especiais podem ser utilizadas na dieta do bebê, aliadas ao acompanhamento fonoaudiológico.

**Questão 58**

Um paciente que sofreu um acidente vascular encefálico (AVE/AVC), com comprometimento do hemisfério esquerdo, apresenta fala lenta, pausada e com esforço, produzindo frases curtas e mal estruturadas, mas mantém boa compreensão da linguagem.

Na situação hipotética precedente, o paciente apresenta um quadro característico de

- A** afasia anômica.
- B** afasia de Wernicke.
- C** apraxia de fala.
- D** afasia de Brocca.
- E** dislexia.

**Questão 59**

No contexto hospitalar, a atuação fonoaudiológica visa, entre outros objetivos, prevenir, avaliar, diagnosticar e intervir nos distúrbios relacionados à deglutição. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A** Dor retroesternal e sensação de alimento parado no peito são sintomas recorrentes em paciente com disfagia orofaríngea de fase oral da deglutição.
- B** As disfagias estão presentes apenas em pacientes que sofreram acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico.
- C** Indivíduos com disfagia orofaríngea, em geral, têm associada queixa de flatulência excessiva após ingestão de grandes refeições, como almoço e jantar.
- D** A disfagia orofaríngea é uma alteração frequente em pacientes hospitalizados e se caracteriza pela presença de refluxo gastroesofágico intenso, especialmente na população idosa.
- E** A disfagia orofaríngea pode ser entendida como um distúrbio que dificulta ou impossibilita a ingestão segura, eficiente e confortável de qualquer consistência de alimento e(ou) saliva.

**Questão 60**

Um paciente com 50 anos de idade compareceu ao ambulatório de fonoaudiologia para realizar exame de audiometria. O resultado do exame foi normal, mas ele relatou estar com crises súbitas de tontura intensa várias vezes ao dia, associadas a mudança de posição de cabeça, náuseas e sensação de que o mundo está girando. Apresentou nistagmo desencadeado pela manobra de Dix-Hallpike.

Nesse caso, a hipótese diagnóstica mais provável para o paciente em apreço é de

- A** doença de Menière.
- B** labirintite.
- C** neuronite vestibular.
- D** migrânea vestibular.
- E** vertigem posicional paroxística benigna.

---

**Espaço livre**

---