

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 41**

Em relação às principais técnicas da cirurgia ortognática e às suas indicações, assinale a opção correta.

- Ⓐ A cirurgia ortognática deve ser realizada preferencialmente antes da finalização do crescimento craniofacial, para garantir melhores resultados funcionais e estéticos.
- Ⓑ O objetivo da cirurgia ortognática é exclusivamente estético, visando melhorar a harmonia facial do paciente.
- Ⓒ Em casos de discrepâncias leves de alinhamento dentário, a cirurgia ortognática deve ser sempre o tratamento de escolha, em substituição à ortodontia.
- Ⓓ A cirurgia ortognática é indicada apenas em pacientes adultos com deformidades faciais, sendo contraindicada em adolescentes.
- Ⓔ O tratamento ortognático pode ser indicado em casos de má oclusão esquelética grave associada a comprometimento funcional, como dificuldades mastigatórias, respiratórias ou fonéticas.

Questão 42

Considerando que, no planejamento e na execução das cirurgias bucomaxilofaciais, alguns princípios devem ser rigorosamente observados para garantir segurança e previsibilidade dos resultados, assinale a opção correta.

- Ⓐ A sutura deve ser realizada com tensão máxima, de modo a aproximar firmemente as bordas e evitar qualquer mobilidade dos retalhos.
- Ⓑ A osteotomia deve ser feita preferencialmente com instrumentos sem irrigação, pois o calor auxilia na hemostasia intraoperatória.
- Ⓒ O retalho mucoperiosteal deve ser elevado sem incluir periosteio, pois isso diminui a dor e acelera a cicatrização.
- Ⓓ A incisão deve ser realizada em mucosa alveolar aderida, pois isso garante melhor cicatrização e menor risco de deiscência.
- Ⓔ A preservação do suprimento sanguíneo e o afastamento delicado dos tecidos moles são fundamentais para reduzir complicações pós-operatórias.

Questão 43

Acerca do diagnóstico e tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) no contexto da odontologia, assinale a opção correta.

- Ⓐ O exame de polissonografia é considerado padrão-ouro para diagnóstico da SAOS, permitindo quantificar a gravidade por meio do índice de apneia-hipopneia.
- Ⓑ O diagnóstico definitivo da SAOS pode ser estabelecido apenas pelo cirurgião-dentista, a partir de exame clínico e questionários específicos aplicados no consultório.
- Ⓒ O tratamento com aparelhos intraorais de avanço mandibular é contraindicado em pacientes com SAOS leve a moderada, sendo reservado apenas para casos graves.
- Ⓓ O tratamento odontológico com aparelhos orais visa preferencialmente benefícios estéticos, sem impacto funcional na patência das vias aéreas.
- Ⓔ A cirurgia ortognática tem papel muito limitado no tratamento da SAOS, por isso é contraindicada para tratá-la.

Questão 44

Em um laudo histopatológico de biópsia da mucosa bucal, o que define carcinoma de células escamosas invasivo é a

- Ⓐ ruptura da membrana basal com infiltração do conjuntivo por ilhotas de células epiteliais atípicas.
- Ⓑ hiperplasia epitelial com paraqueratose e infiltrado inflamatório crônico subjacente.
- Ⓒ presença de mitoses atípicas e nucléolos proeminentes.
- Ⓓ presença de displasia epitelial leve, restrita ao terço inferior do epitélio.
- Ⓔ displasia epitelial grave que ocupa toda a espessura epitelial, com membrana basal íntegra.

Questão 45

Em relação aos tumores das glândulas salivares maiores e menores, assinale a opção correta.

- Ⓐ A maioria dos tumores diagnosticados na glândula parótida é maligna.
- Ⓑ O carcinoma mucoepidermoide é um tumor benigno que raramente apresenta recidiva.
- Ⓒ O oncocitoma é o tumor maligno mais frequentemente encontrado em glândulas salivares menores.
- Ⓓ O adenoma pleomórfico é o tumor benigno mais comum da parótida, podendo sofrer transformação maligna com o tempo de evolução do tumor.
- Ⓔ O tumor de Warthin é maligno e ocorre principalmente em glândulas salivares menores.

Questão 46

Em relação às lesões traumáticas da área bucomaxilofacial, assinale a opção correta.

- Ⓐ O *morsicatio buccarum* é uma lesão traumática agressiva da mucosa bucal, com alto potencial de malignização.
- Ⓑ Ulcerações traumáticas na mucosa oral devem ser sempre tratadas com excisão cirúrgica imediata, independentemente da extensão ou evolução.
- Ⓒ Lesões de mucosa causadas por trauma mecânico geralmente evoluem para fibrose ou malignização se não houver intervenção cirúrgica imediata.
- Ⓓ Clinicamente, a hiperplasia fibrosa inflamatória se apresenta como uma massa nodular ou polipoide, geralmente de superfície lisa, firme e cor semelhante à mucosa adjacente.
- Ⓔ Lesões traumáticas superficiais da mucosa oral requerem prescrição sistemática de antibióticos, mesmo na ausência de sinais de infecção.

Questão 47

No que se refere a cirurgia ortognática e osteotomias funcionais da face, assinale a opção que apresenta o procedimento padrão mais comumente utilizado para o avanço ou recuo da mandíbula, para correção de discrepâncias anteroposteriores.

- Ⓐ osteotomia Le Fort III
- Ⓑ osteotomia maxilar segmentada
- Ⓒ osteotomia vertical do ramo
- Ⓓ osteotomia Le Fort I
- Ⓔ osteotomia sagital bilateral do ramo da mandíbula

Questão 48

Nas malformações congênitas, a presença dos incisivos de Hutchinson — incisivos centrais superiores permanentes com formato de chave de fenda — é uma manifestação clínica oral da transmissão vertical de

- Ⓐ sífilis congênita.
- Ⓑ infecção pelo vírus da imunodeficiência humana.
- Ⓒ tuberculose.
- Ⓓ rubéola congênita.
- Ⓔ toxoplasmose congênita.

Questão 49

Sabendo que, durante o atendimento odontológico de uma pessoa com transtorno do espectro autista (TEA), o cirurgião-dentista deve considerar uma série de fatores para favorecer o bem-estar do paciente e aumentar a chance de sucesso do tratamento, assinale a opção que apresenta uma conduta adequada no cuidado odontológico de pessoas com TEA.

- Ⓐ O enriquecimento ambiental é empregado com pacientes que apresentam comportamentos mantidos pelo esforço automático, sendo uma técnica apenas utilizada pela terapia ocupacional.
- Ⓑ Deve-se realizar atividades inesperadas, para elevar a experiência do paciente e oferecer instruções longas para o melhor entendimento.
- Ⓒ Utilizar estratégias como histórias sociais pode aumentar a ansiedade do paciente, uma vez que muitos procedimentos, por serem técnicos, não podem ser demonstrados de forma lúdica.
- Ⓓ Não é indicado que a família realize restrição física suave durante a escovação dental, pois essa técnica gera um grande trauma dentro do domicílio.
- Ⓔ A consulta em “dois tempos” é uma sugestão adequada: a primeira visita acontece com o cuidador principal, e, em um segundo momento, é agendada uma consulta com o cuidador e o paciente.

Questão 50

Um homem de 68 anos, com hipertensão arterial há 20 anos, que faz uso regular de losartana 50 mg/dia, hidroclorotiazida 25 mg/dia e propranolol 40 mg, 2 vezes ao dia, comparece para cirurgia periodontal eletiva e, após aferição da pressão arterial (PA), apresenta valor de 160/100 mmHg. Encontra-se assintomático, porém ansioso.

Considerando as melhores práticas clínicas para o manejo odontológico de pacientes hipertensos, é adequado, nesse caso,

- Ⓐ verificar a pressão arterial antes e após o procedimento, sendo opcional a verificação no transoperatório.
- Ⓑ prosseguir normalmente com o procedimento, sendo contraindicado o uso de anestésico com vasoconstritor.
- Ⓒ adiar o procedimento até que a PA esteja menor que 140/90 mmHg, devido ao risco cardiovascular.
- Ⓓ prescrever ibuprofeno 600mg de 8/8 horas, antes do procedimento e por mais 7 dias, para o excelente controle da dor pós-operatória.
- Ⓔ realizar o procedimento, levando-se em consideração o controle de estresse e ansiedade.

Questão 51

A AHA (American Heart Association), em 2021, atualizou as recomendações de profilaxia antibiótica para prevenção de endocardite infecciosa em procedimentos odontológicos. Considerando essas recomendações da AHA na profilaxia antibiótica em odontologia, assinale a opção correta.

- Ⓐ Procedimentos odontológicos invasivos, incluindo-se raspagem, alisamento radicular e remoção de sutura, em pacientes com histórico de endocardite infecciosa requerem profilaxia antibiótica.
- Ⓑ A profilaxia antibiótica é indicada em injeção anestésica de rotina em tecido não infectado.
- Ⓒ A profilaxia antibiótica prévia aos procedimentos odontológicos é mais importante que a manutenção da saúde bucal.
- Ⓓ Tratando-se de via oral, em pacientes alérgicos à penicilina, a clindamicina 600mg é a primeira escolha.
- Ⓔ Em crianças, por via oral, a dose de amoxicilina deve ser calculada pelo peso, sendo considerado 50 mg/kg.

Questão 52

Paciente do sexo masculino de 80 anos de idade, com prótese valvar mecânica mitral, em uso de varfarina há sete anos, passou por intervenção coronária percutânea com implante de *stent* há 5 meses e está em uso de ácido acetil salicílico (AAS) 100 mg/dia + clopidogrel 75 mg/dia (terapia antiplaquetária dupla). O paciente irá realizar biópsia excisional de nódulo normocrômico que mede 0,5 x 0,5 cm, bem delimitado em mucosa jugal, compatível clinicamente com fibroma traumático. Espera-se sangramento baixo a moderado. Nos exames laboratoriais, realizados há 15 dias, apresentava INR (razão normalizada internacional) = 2,9, contagem de plaquetas acima de 150.000 mm³/mCL, funções renal e hepática normais.

Nesse caso, o cirurgião-dentista, considerando o indicado manejo odontológico de pacientes em uso de anticoagulantes e antiagregantes, deve

- Ⓐ suspender clopidogrel e AAS por 5 dias, manter varfarina independentemente do INR, pois a profilaxia antibiótica indicada para válvula mecânica reduz risco de sangramento.
- Ⓑ suspender a varfarina por 5 dias e fazer “ponte” com enoxaparina, mantendo AAS e clopidogrel; proceder apenas quando INR < 1,5, para controle de sangramento.
- Ⓒ manter a varfarina se o INR no dia estiver ≤ 2,5; suspender AAS e clopidogrel 7 dias antes do procedimento; solicitar tempo de sangramento para avaliação de risco de sangramento.
- Ⓓ não suspender varfarina, AAS ou clopidogrel; obter INR atualizado 24 h antes do procedimento e proceder com INR até 3,0; realizar sutura e utilizar agentes hemostáticos locais, como uso tópico de antifibrinolítico.
- Ⓔ trocar a varfarina por apixabana por 48 h, manter AAS e suspender clopidogrel; solicitar coagulograma completo 7 dias antes do procedimento.

Questão 53

A esquizofrenia acomete cerca de 1% da população mundial, e sua distribuição é bastante uniforme. As manifestações do transtorno podem ser observadas em indivíduos de todas as sociedades e áreas geográficas ao redor do mundo. Nesse contexto, é essencial que o cirurgião-dentista conheça esta condição para proporcionar um atendimento odontológico seguro e eficaz ao paciente esquizofrênico.

Considerando essas informações, assinale a opção que apresenta a conduta adequada para o atendimento ao paciente nessa condição.

- Ⓐ Devido ao risco de potencialização da ação de alguns medicamentos utilizados no controle do transtorno, como os antipsicóticos, a sedação consciente não deve ser considerada.
- Ⓑ Não se deve solicitar a presença de um acompanhante durante a consulta odontológica, para resguardar a privacidade do paciente.
- Ⓒ O paciente sempre está habilitado para assinar o termo de consentimento para o tratamento odontológico, devido ao respeito à privacidade e à autonomia.
- Ⓓ Antes de iniciar o exame físico, não se deve explicar o passo-a-passo dos procedimentos, pois o paciente pode se sentir infantilizado.
- Ⓔ Deve-se atentar ao uso de analgésicos associados a vasoconstritores, principalmente a noradrenalina, devido à possibilidade de interação medicamentosa com alguns antidepressivos, o que pode levar a arritmia cardíaca e ao aumento da pressão arterial sistólica e dos batimentos cardíacos.

Questão 54

Considerando que a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência e que o paciente acometido dessa doença necessita de cuidados específicos durante o atendimento odontológico, assinale a opção correta.

- Ⓐ Deve haver sempre um acompanhante do paciente presente na consulta, de preferência fora do seu campo de visão, para evitar agressividade e constrangimento.
- Ⓑ Alguns medicamentos para o controle dos sintomas e avanços do Alzheimer têm ação anticolinérgica e geram hipossalivação e hipotensão ortostática.
- Ⓒ A anestesia geral não pode ser indicada para o tratamento odontológico de pacientes com Alzheimer.
- Ⓓ Como os pacientes com Alzheimer podem apresentar baixa produção salivar, a sialorreia não ocorre nestes pacientes.
- Ⓔ A comunicação não verbal não é recomendada para esses pacientes, devido à dificuldade de entendimento.

Questão 55

Em um atendimento cotidiano, o cirurgião-dentista pode se deparar com uma situação na qual o paciente apresente sinais e sintomas da síncope vasovagal, uma das emergências médicas mais comuns no consultório, de modo que é importante que o cirurgião-dentista conheça esta emergência médica.

A partir dessas informações, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a causa da síncope vasovagal e os sinais e sintomas mais frequentes nesse quadro.

- Ⓐ redução do fluxo sanguíneo cerebral; taquicardia, pulso fraco, queixa de sensação de calor e náuseas
- Ⓑ redução do fluxo sanguíneo cerebral; taquicardia, pulso forte, queixa de sensação de calor e náuseas
- Ⓒ aumento do fluxo sanguíneo cerebral; taquicardia, pulso forte, queixa de sensação de calor e náuseas
- Ⓓ aumento do fluxo sanguíneo cerebral; bradicardia, pulso fraco, queixa de sensação de calor e náuseas
- Ⓔ redução do fluxo sanguíneo cerebral; bradicardia, pulso fraco, queixa de sensação de calor e náuseas

Questão 56

Considerando essas informações, assinale a opção que apresenta, respectivamente, uma intercorrência comum da DM, a forma como esse cirurgião-dentista pode manejar essa intercorrência e uma opção de tratamento da hipossalivação.

- Ⓐ hemorragia; solicitar que paciente com glicemia ≥ 99 mg/dl se alimente antes da consulta; saliva artificial
- Ⓑ hipoglicemia; solicitar ao paciente que se alimente antes da consulta; saliva artificial
- Ⓒ pressão alta; solicitar que paciente com glicemia ≤ 70 mg/dl se alimente antes da consulta; corticoide
- Ⓓ hipoglicemia; solicitar ao paciente que compareça ao atendimento em jejum; saliva artificial
- Ⓔ hiperglicemia; solicitar que paciente com glicemia ≤ 70 mg/dl se alimente antes da consulta; corticoide

Questão 57

As gestantes são consideradas pacientes com necessidades especiais, devido às constantes mudanças fisiológicas e psicológicas. Na prática odontológica, muitos profissionais têm dúvidas a respeito da possibilidade de realização de tratamento dentário durante esse período. A esse respeito, assinale a opção correta.

- Ⓐ Não se pode realizar o atendimento odontológico da gestante apenas durante o 1.º trimestre.
- Ⓑ Pode-se realizar o atendimento odontológico da gestante em qualquer período, sendo o 2.º trimestre o mais indicado para procedimentos cirúrgicos, restauradores básicos e reabilitadores.
- Ⓒ Pode-se realizar o atendimento odontológico da gestante em qualquer período, sendo o 3.º trimestre o mais indicado para procedimentos cirúrgicos, restauradores básicos e reabilitadores.
- Ⓓ Não se pode realizar o atendimento odontológico de gestante.
- Ⓔ Pode-se realizar o atendimento odontológico da gestante em qualquer período, mas somente para procedimentos profiláticos-preventivos.

Questão 58

Sabendo que a trissomia do cromossomo 21 (T21), conhecida como síndrome de Down, é a alteração genética mais comum em humanos, assinale a opção que apresenta aspectos orofaciais característicos da T21.

- Ⓐ epicanto, prega simiesca, palato profundo e protrusão lingual
- Ⓑ prega simiesca, face aplanada, braquidactilia e palato profundo
- Ⓒ protrusão lingual, braquidactilia, palato profundo e face aplanada
- Ⓓ epicanto, face aplanada, protrusão lingual, palato profundo
- Ⓔ prega simiesca, braquidactilia, palato profundo e protrusão lingual

Questão 59

Uma mulher de 63 anos de idade, com diagnóstico de câncer de boca e osteoporose, buscou atendimento na faculdade de odontologia da sua cidade, encaminhada pela equipe de oncologistas do hospital municipal, para adequação bucal prévia à radioterapia. Durante a anamnese, foi relatado o uso contínuo havia um ano e meio de Alendronato (Fosamax), 10mg, oral, por dia, e suplementação de cálcio para o tratamento da osteoporose. Ao exame físico prévio, foi observada a presença do resto radicular do elemento 14 e de cálculo dentário supragengival nos incisivos inferiores.

Nessa situação, o cirurgião-dentista deve obrigatoriamente esclarecer a paciente (e os familiares) quanto aos fatores de risco associados à

- A** osteonecrose dos ossos maxilares relacionadas a medicamentos, solicitar o parecer médico, realizar antibioticoterapia pré e pós-operatória para a exodontia do resto radicular, proceder com a raspagem do cálculo dentário e posterior acompanhamento clínico.
- B** osteonecrose dos ossos maxilares relacionados a medicamentos, suspender o uso do bisfosfonato para a exodontia do resto radicular e realizar raspagem do cálculo dentário.
- C** osteonecrose dos ossos maxilares relacionados a medicamentos e realizar normalmente a exodontia do resto radicular.
- D** osteonecrose dos ossos maxilares relacionadas a medicamentos, suspender imediatamente o uso do bisfosfonato para a exodontia do resto radicular, realizar profilaxia antibiótica, raspagem do cálculo dentário e posterior acompanhamento clínico.
- E** hemorragia, solicitar o parecer médico, realizar antibioticoterapia pré-operatória para a exodontia do resto radicular, proceder com a raspagem do cálculo dentário e posterior acompanhamento clínico.

Questão 60

Sabe-se que as alterações sensoriais do paciente, como a perda de audição e visão, podem dificultar o atendimento odontológico. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

- I Ao atender um paciente cego, a forma mais adequada para orientá-lo quanto às direções e em relação ao ambiente é por meio de comandos gerais, como “ali” e “lá”.
- II A falta de informações de profissionais de saúde sobre as habilidades de comunicação necessárias para o atendimento de pacientes com perda auditiva impede que muitos desses pacientes recebam informações apropriadas sobre suas doenças, tratamentos e prognósticos.
- III É importante que, durante a comunicação com o paciente surdo, o profissional se posicione à frente dele sempre que for se comunicar, para que esse paciente consiga identificar o profissional, registrar as expressões faciais e a linguagem gestual.
- IV Utilizar recursos didáticos em braille para pacientes surdos durante o atendimento odontológico contribui para um bom atendimento.
- V Pode-se utilizar a nomenclatura surdocegueira para pacientes que apresentem deficiência visual e auditiva associadas em maior ou menor grau.

Estão certos apenas os itens

- A** I e II.
- B** I, IV e V.
- C** I, III e IV.
- D** II, III, IV e V.
- E** II, III e V.

Espaço livre