

**-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --****Questão 41**

*Delirium* é uma síndrome clínica caracterizada por uma alteração aguda e flutuante no estado mental, afetando a

- I consciência.
- II cognição.
- III atenção.
- IV orientação.
- V coordenação.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas os itens I, III e V estão certos.
- B** Apenas os itens I, II, III e IV estão certos.
- C** Apenas os itens I, II, IV e V estão certos.
- D** Apenas os itens II, III, IV e V estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

**Questão 42**

Assinale a opção em que são apresentados apenas sintomas esperados no episódio maníaco.

- A** embotamento afetivo e euforia
- B** humor expansivo e alentecimento psicomotor
- C** frangofilia e pensamento delirante grandioso
- D** delírio de ruína e alucinações auditivas
- E** taquilalia e catatonia

**Questão 43**

É um antidepressivo representante único de sua categoria, quanto ao mecanismo de ação, a

- A** fluvoxamina.
- B** clomipramina.
- C** fluoxetina.
- D** vilazodona.
- E** tranilcipromina.

**Questão 44**

No contexto do tratamento para esquizofrenia, um efeito colateral comumente associado ao uso de haloperidol, mas raramente associado ao uso de clozapina, é o(a)

- A** cardiopatia.
- B** ganho de peso.
- C** distúrbio visual.
- D** acatisia.
- E** sonolência.

**Questão 45**

Assinale a opção que apresenta aspecto integrante do rol de critérios diagnósticos de transtorno factício, conforme o DSM-5.

- A** falsificação de sinais ou de sintomas físicos ou psicológicos, ou indução de lesão ou doença, associada a fraude identificada
- B** lacunas recorrentes na recordação de eventos cotidianos, informações pessoais importantes e(ou) eventos traumáticos que são incompatíveis com o esquecimento comum
- C** comportamento motor repetitivo que interfere em atividades sociais, acadêmicas ou outras, podendo resultar em autolesão
- D** ingestão persistente de substâncias não nutritivas, não alimentares, durante um período mínimo de um mês
- E** ato de beliscar a pele de forma recorrente, resultando em lesões

**Questão 46**

O dissulfiram

- A** atua como antagonista 5-HT<sub>3</sub>, modulando a liberação de dopamina no núcleo *accumbens* e reduzindo o reforço positivo associado ao consumo de álcool.
- B** age no metabolismo hepático do etanol, inativando a enzima acetaldéido-desidrogenase e produzindo, assim, um acúmulo dessa substância na corrente sanguínea quando há ingestão de álcool.
- C** atua pelo antagonismo de receptores glutamatérgicos do tipo AMPA/cainato, que leva à estabilização das membranas neurais hiperexcitadas, reduzindo efeitos agradáveis do álcool no organismo.
- D** aumenta a neurotransmissão gabaérgica e diminui a ação excitatória glutamatérgica no sistema nervoso central, via modulação de receptores NMDA, reduzindo a hiperexcitabilidade neuronal associada à abstinência alcoólica.
- E** é um antagonista do receptor opioides, que atua bloqueando sua ligação aos opioides endógenos e inibe os efeitos prazerosos e reforçadores relacionados à ingestão de álcool.

**Questão 47**

A tríade clínica clássica da síndrome de Wernicke é composta por

- A** nistagmo vertical, alucinações visuais e confusão mental.
- B** amnésia anterógrada, nistagmo horizontal e tremor.
- C** confusão mental, oftalmoplegia e ataxia.
- D** ataxia, disartria e tremor.
- E** amnésia retrógrada, hiperreflexia e hipertonia muscular.

**Questão 48**

De acordo com o DSM-5-TR, as características essenciais do transtorno de ansiedade generalizada (TAG) são ansiedade e preocupação excessivas acerca de diversos eventos ou atividades, de difícil controle, associadas com três ou mais sintomas, entre os quais estão

- A** sensações de “branco” na mente, hiporexia e sono insatisfatório.
- B** aceleração do pensamento, dificuldade em manter-se parado e insônia.
- C** inquietação, disforia e prejuízo de concentração.
- D** sensação de estar com os nervos à flor da pele, fadigabilidade e tensão muscular.
- E** anergia, dificuldade em conciliar o sono e irritabilidade.

**Questão 49**

Assinale a opção em que é apresentado o transtorno mental cuja característica central é o medo ou a ansiedade marcante acerca de duas ou mais situações como usar transporte público, permanecer em espaços abertos, estar em locais fechados, ficar em meio a uma multidão ou sair de casa sozinho(a).

- A** fobia específica do tipo situacional
- B** agorafobia
- C** neurastenia
- D** transtorno de pânico
- E** transtorno de ansiedade social

**Questão 50**

Engenheiro de 39 anos, sem histórico psiquiátrico prévio, procura atendimento ambulatorial em saúde mental por insônia inicial, fadiga, irritabilidade, preocupação excessiva com sua situação financeira e dificuldade de concentração. Relata que os sintomas começaram duas semanas após ter sido demitido do trabalho, há 4 meses, e vêm diminuindo gradualmente desde que recebeu apoio de um familiar há duas semanas, que sugeriu que o paciente buscasse atendimento médico. Diz que o quadro clínico tem prejudicado sua busca por novo trabalho e trazido um prejuízo significativo no seu funcionamento social. Refere sentir-se sem rumo, mas nega desesperança, anedonia, pensamentos de morte ou ideiação suicida. Nega histórico de uso de substâncias psicoativas, antecedentes de trauma grave ou sintomas psicóticos. Nega, ainda, outros sintomas associados.

Para o quadro clínico descrito, a hipótese diagnóstica mais provável, de acordo com o DSM-5-TR, é de

- A transtorno de adaptação.
- B transtorno depressivo maior, com sintomas ansiosos.
- C transtorno de ansiedade generalizada.
- D transtorno do luto prolongado.
- E transtorno misto de ansiedade e depressão.

**Questão 51**

Homem de 32 anos de idade é admitido em pronto-socorro após tentativa de suicídio por ingestão de grande quantidade de clordiazepóxido. Ele apresenta sonolência intensa, fala arrastada e ataxia, mas mantém estabilidade hemodinâmica e ventilatória.

Considerando a conduta clínica e a terapêutica específica, assinale a opção que corresponde ao antídoto indicado para o quadro clínico hipotético precedente.

- A N-acetilcisteína
- B atropina
- C fisostigmina
- D flumazenil
- E naloxona

**Questão 52**

Menino de 4 anos de idade é levado à consulta médica pela mãe, que relata que ele fala com frases completas, mas frequentemente não mantém diálogo recíproco, troca pouco os turnos de fala e, em contextos sociais, tende a se isolar. A mãe refere ainda que o paciente mostra pouco interesse em brincadeiras compartilhadas com colegas, embora consiga responder quando é diretamente solicitado, bem como apresenta insistência em rotinas específicas, ficando irritado com mudanças inesperadas, como alteração no trajeto da escola. Na avaliação, nota-se contato visual reduzido, comunicação funcional preservada e desempenho adequado em habilidades cognitivas e de linguagem formal. Relatório da escola informa isolamento frequente e dificuldade em participar de atividades em grupo, apesar de bom desempenho acadêmico.

Nesse caso, considerando o DSM-5-TR, o paciente tem transtorno

- A do desenvolvimento intelectual, leve.
- B do espectro autista, nível 1.
- C da comunicação social (pragmática).
- D do desenvolvimento intelectual, limítrofe.
- E do espectro autista, nível 2.

**Questão 53**

Homem de 55 anos de idade com diagnóstico de insuficiência hepática moderada associada do uso crônico de álcool é internado para correção cirúrgica de fratura óssea, que ocorreu sem intercorrências, com boa evolução intra e pós-operatória. Após 48 horas de internação, apresentou agitação intensa, tremores, sudorese profusa, desorientação, alucinações visuais (microzoopsias). Os exames laboratoriais demonstram elevação de transaminases e bilirrubina.

Considerando o quadro clínico precedente e o comprometimento da função hepática, assinale a opção que indica corretamente o medicamento mais apropriado para o manejo dessa condição clínica.

- A dissulfiram
- B olanzapina
- C lorazepam
- D tiamina
- E haloperidol

**Questão 54**

No que se refere à suicidalidade, julgue os itens a seguir.

- I A fase de eliminação progressiva de pesticidas altamente perigosos está associada à redução de casos de suicídio, sem impacto negativo na produção agrícola, como demonstrado em países como a Coreia do Sul.
- II No Brasil, a taxa de suicídios entre 2010 e 2021 é maior, no gênero masculino, entre idosos, e, no gênero feminino, entre adolescentes, com destaque para populações indígenas, que apresentam mortalidade proporcional superior à média nacional.
- III A mídia pode influenciar comportamentos suicidas por meio do “efeito Werther” (imitação após reportagens sensacionalistas) ou do “efeito Papageno” (prevenção ao divulgar histórias de superação).
- IV Desde o início da pandemia de covid-19, o Brasil registrou aumento imediato e sustentado das taxas de suicídio, especialmente entre pessoas do sexo feminino.

Assinale a opção correta.

- A Apenas os itens I e III estão certos.
- B Apenas os itens I e IV estão certos.
- C Apenas os itens II e IV estão certos.
- D Apenas os itens I, II e III estão certos.
- E Apenas os itens II, III e IV estão certos.

**Questão 55**

Em relação à neurobiologia do Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), julgue os itens a seguir.

- I Estudos de neuroimagem funcional em pacientes com TOC demonstram hiperatividade no circuito córtico-estriato-tálamo-cortical, condição reversível com tratamentos farmacológicos e psicoterápicos eficazes.
- II Alterações no sistema serotoninérgico são centrais na fisiopatologia do TOC, sustentando-se pela eficácia superior de inibidores seletivos da recaptação de serotonina e da clomipramina em comparação a placebos, bem como por estudos que mostram redução de metabólitos da serotonina no líquido cefalorraquidiano após tratamento.
- III Anormalidades no sistema noradrenérgico são consideradas, atualmente, o principal mecanismo fisiopatológico do TOC, uma vez que a clonidina, um agonista alfa-2 adrenérgico, demonstra eficácia consistente na redução de sintomas obsessivo-compulsivos.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item II está certo.
- B** Apenas o item III está certo.
- C** Apenas os itens I e II estão certos.
- D** Apenas os itens I e III estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

**Questão 56**

Homem de 34 anos de idade, atendido em pronto-socorro diversas vezes nos últimos 12 meses, apresenta queixas recorrentes de dor abdominal difusa, sensação de distensão e fadiga, apesar de múltiplos exames laboratoriais e de imagem normais. Refere já ter sido submetido a laparotomia exploratória, sem achados relevantes. Os sintomas causam prejuízo em sua rotina laboral e familiar, e não há evidências claras de ganho externo — financeiro, judicial, previdenciário — com as queixas. Durante a anamnese, mostra-se ansioso, pouco receptivo à hipótese de origem psicogênica e insiste em novas investigações médicas.

De acordo com o DSM-5-TR, assinale a opção que apresenta o diagnóstico mais provável para o caso precedente.

- A** simulação
- B** transtorno conversivo
- C** transtorno factício
- D** transtorno de ansiedade de doença
- E** transtorno de sintomas somáticos

**Texto 41A2-I**

Um homem de 28 anos de idade é submetido a perícia psiquiátrica para avaliação de imputabilidade em crime de roubo. Desde a adolescência, apresenta comportamentos “problemáticos”, envolveu-se diversas vezes em brigas e furtos e em episódios de manipulação de colegas e familiares para obter vantagens financeiras. Nunca demonstrou remorso consistente por seus atos, frequentemente culpando os outros por suas dificuldades. Já teve múltiplas condenações por furto e lesão corporal. Atualmente, relata que não vê problema em “usar as pessoas” para alcançar seus objetivos. Apresenta desenvolvimento psicomotor sem alterações. Não há histórico de psicose ou alteração cognitiva, tampouco evidência de dependência de álcool ou outras drogas.

**Questão 57**

Para o caso hipotético apresentado no texto 41A2-I, a principal hipótese diagnóstica é transtorno

- A** de personalidade narcisista.
- B** explosivo intermitente.
- C** de personalidade antissocial.
- D** de personalidade *borderline*.
- E** de conduta.

**Questão 58**

No exame pericial psiquiátrico a que se refere o texto 41A2-I, o indivíduo deverá ser considerado

- A** inimputável, por prejuízo da autodeterminação.
- B** imputável.
- C** semi-imputável, por prejuízo da autodeterminação.
- D** inimputável, por prejuízo do entendimento.
- E** semi-imputável, por prejuízo do entendimento.

**Questão 59**

Para o diagnóstico do transtorno relacionado ao uso de álcool, segundo o DSM-5-TR, é necessário haver um padrão problemático de uso de álcool, levando a comprometimento ou sofrimento clinicamente significativos, manifestados pela ocorrência de pelo menos dois critérios, em um período de 12 meses. É um dos critérios determinados pelo DSM-5-TR o(a)

- I uso recorrente de álcool em situações em que esse consumo representa perigo para a integridade física.
- II abandono ou redução de atividades sociais, ocupacionais ou recreativas devido ao consumo de álcool.
- III persistência no uso de álcool, apesar de problemas sociais ou interpessoais recorrentes relacionados ao consumo.

Assinale a opção correta.

- A** Nenhum item está certo.
- B** Apenas os itens I e II estão certos.
- C** Apenas os itens II e III estão certos.
- D** Apenas os itens I e III estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

**Questão 60**

Mulher de 27 anos procura atendimento psiquiátrico relatando pensamentos recorrentes e intrusivos de que pode ter atropelado alguém sem perceber, o que a leva a retornar diversas vezes ao mesmo trajeto para conferir se não houve acidente. Ela reconhece que esses pensamentos são excessivos e ilógicos, mas não consegue resistir à necessidade de verificar. O sofrimento subjetivo é intenso e o comportamento consome horas do seu dia. Não há alterações formais do pensamento.

Considerando a psicopatologia do quadro hipotético precedente, assinale a opção que corresponde a um sinal ou sintoma que a paciente em questão apresenta.

- A delírio compulsivo
- B comportamento egodistônico
- C maneirismo
- D potomania
- E lembrança obsessiva

---

**Espaço livre**