

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 41**

O tratamento de uma infecção urinária não complicada em mulheres deve ser iniciado com a administração de

- A amoxicilina com clavulanato, via oral, por 7 dias.
- B ceftriaxona IM por 7 dias.
- C ciprofloxacino, via oral, por 7 dias.
- D fosfomicina 01, sachê oral, em dose única.
- E amoxicilina simples, via oral, por 5 dias.

Questão 42

O uso de captopril para prevenção de cálculos é indicado em caso de

- A níveis aumentados de vitamina D.
- B história familiar de formação de cálculos.
- C hiperparatireoidismo.
- D cistinúria.
- E nefrocalcinose.

Questão 43

Acerca do câncer de próstata, assinale a opção correta.

- A Idade avançada, raça e história familiar estão entre os fatores de risco associados a maior incidência do câncer de próstata.
- B Câncer de próstata e hiperplasia prostática benigna (HPB) são patologias prostáticas que não podem coexistir no mesmo paciente.
- C Existe forte evidência científica de que o consumo de tomate reduz o risco de desenvolvimento de câncer de próstata.
- D Câncer de próstata é a segunda neoplasia mais prevalente do aparelho genitourinário em homens.
- E Normalmente, nas fases iniciais do câncer de próstata, o paciente apresenta sintomas como hematúria e jato urinário fraco.

Questão 44

A ressecção transuretral da bexiga é o método mais indicado para tratamento de

- A paciente em que o laudo do exame anátomo patológico cita a camada muscular do detrusor acometida por neoplasia.
- B adenocarcinoma de bexiga em paciente com ampliação vesical com seguimento ileal.
- C recorrência de ca urotelial pT1 alto grau após ressecção e tratamento com BCG intravesical.
- D lesão vesical de 5 cm com invasão de próstata e vesículas seminais.
- E varcinoma urotelial papilífero pTa, com 02 lesões no teto da bexiga.

Questão 45

A presença de lesão vascular no trauma renal está presente

- A em pacientes com trauma renal grau IV e grau V.
- B somente em pacientes com trauma renal grau V.
- C em trauma renal grau I, se houver instabilidade hemodinâmica.
- D a partir do grau II do trauma renal.
- E a partir do grau III do trauma renal.

Questão 46

O sinal de Prehn, significa

- A estímulo na face interna da coxa e subida do testículo ipsilateral.
- B melhora da dor na elevação testicular.
- C elevação e lateralização dos testículos.
- D torção do apêndice testicular.
- E passagem de luz através da bolsa escrotal.

Questão 47

Na propedêutica inicial para rastreamento do câncer de próstata, deve-se

- A pedir a dosagem de testosterona para toda população com história familiar de neoplasia de próstata.
- B fazer o exame de toque somente se o valor de PSA estiver alterado.
- C indicar a biópsia de próstata somente se tanto o exame de toque quanto o PSA apresentarem alteração.
- D pedir, além do exame de PSA, a ressonância magnética de próstata para todos os paciente afrodescendentes.
- E realizar, inicialmente, o PSA e o exame digital da próstata.

Questão 48

No que diz respeito à síndrome de Von Hippel-Lindau, é correto afirmar que

- A a mutação do gene VHL está presente e o tumor mais comum é o carcinoma de células claras.
- B o tumor renal mais comum relacionado à síndrome é o angiomiolipoma.
- C normalmente os tumores são únicos e de grande volume, acometendo rim e estruturas adjacentes.
- D na presença de tumores renais, deve-se dar preferência à cirurgia de nefrectomia radical em vez da nefrectomia parcial.
- E é uma síndrome genética que se relaciona à presença de tumores renais do tipo carcinoma de ductos coletores.

Questão 49

Assinale a opção que corresponde ao exame considerado padrão ouro para diagnóstico da estenose de artéria renal em pacientes com suspeita de hipertensão renovascular.

- A Dosagem de renina sérica
- B Ultrassom *doppler* de artérias renais
- C Arteriografia
- D Angioressonância
- E Angiotomografia

Questão 50

Suponha que uma paciente, mulher, de 32 anos, deu entrada no pronto atendimento com quadro de cólica renal típica do lado direito com história de pico febril há 12 horas. Nesse caso, a tomografia evidenciou um cálculo em ureter médio de 5 mm.

Considerando a situação hipotética apresentada, a conduta mais apropriada para o tratamento é

- A ureterorenolitotripsia semirrígida com baixa pressão de soro em regime de urgência.
- B realizar o implante de cateter duplo J em regime de urgência, apenas.
- C antibioticoterapia em dose de ataque na admissão e implante de cateter duplo J em regime de urgência.
- D internação, com antibioticoterapia endovenosa e nova tomografia após 48 h de tratamento.
- E antibioticoterapia oral ambulatorial e terapia expulsiva com tansulosina.

Questão 51

Tendo em vista que as disfunções neuromusculares da bexiga podem ser precipitadas por diversas doenças que acometem o sistema nervoso central, assinale a opção correta.

- Ⓐ A ressecção transuretral da próstata está contraindicada em pacientes com doença de Parkinson e obstrução infravesical causada pela hiperplasia prostática benigna, devido à alta frequência de aconitilidade do esfíncter estriado.
- Ⓑ Dissinergia esfíncteriana é a alteração urodinâmica mais frequente em pacientes que sofreram acidente vascular encefálico.
- Ⓒ A doença de Parkinson é caracterizada pela arreflexia detrusora, que acompanha o quadro muscular global de bradicinesia.
- Ⓓ Os pacientes com hidrocefalia de pressão normal frequentemente apresentam incontinência urinária por transbordamento.
- Ⓔ O retardo no relaxamento do esfíncter estriado (bradicinesia) que ocorre na doença de Parkinson pode ser interpretado como quadro de dissinergia esfíncteriana verdadeira no estudo urodinâmico.

Questão 52

Sabendo que a varicocele é a principal causa reversível de infertilidade masculina, assinale a opção correta a respeito do tratamento cirúrgico dessa condição.

- Ⓐ Para diminuir a falha da varicolectomia, é essencial a ligadura das veias do vaso deferente.
- Ⓑ A varicolectomia microcirúrgica é pouco eficaz em homens com azoospermia, permitindo a recuperação de espermatozoides no ejaculado em menos de 15% dos casos.
- Ⓒ Com o advento da laparoscopia, a ligadura das veias colaterais do escroto e do gubernáculo tornou-se desnecessária, pois essas vias de drenagem não estão associadas à recidiva da varicocele.
- Ⓓ O tratamento laparoscópico da varicocele apresenta taxas de insucesso menores do que as demais técnicas cirúrgicas.
- Ⓔ A varicolectomia microcirúrgica apresenta baixa taxa de hidrocele como complicação, pois os vasos linfáticos podem ser identificados e preservados.

Questão 53

A forma geniturinária da tuberculose é uma das mais graves, dada a dificuldade do diagnóstico, que, em geral, acontece tardiamente. Considerando o conhecimento médico atual sobre a tuberculose do aparelho geniturinário, assinale a opção correta.

- Ⓐ O método padrão-ouro para o diagnóstico da tuberculose geniturinária é a identificação do DNA da micobactéria por exame de PCR (*polymerase chain reaction*).
- Ⓑ Na forma geniturinária, a maioria dos pacientes apresenta os sintomas constitucionais típicos da tuberculose: febre baixa, perda ponderal e suores noturnos.
- Ⓒ A inflamação crônica da tuberculose renal pode causar metaplasia escamosa persistente, o que aumenta o risco de carcinoma de células escamosas.
- Ⓓ A tuberculose ureteral ocorre via ascendente, devido ao refluxo vésico-ureteral presente nos casos de tuberculose vesical.
- Ⓔ A tuberculose miliar renal, resultante da disseminação hematogênica, é de diagnóstico mais rápido por se manifestar como pielonefrite aguda com piora súbita da função renal.

Questão 54

Pacientes com dor testicular representam um grande percentual dos atendimentos do consultório urológico. Acerca dessa afecção, assinale a opção correta.

- Ⓐ A vasovasostomia e a epididimovasostomia apresentam baixa eficácia no tratamento da dor testicular crônica pós-vasectomia.
- Ⓑ A fisioterapia pélvica é eficaz no tratamento da dor pélvica crônica, principalmente quando o tônus muscular está normal ao toque retal.
- Ⓒ Em casos de dor testicular crônica com impacto significativo na qualidade de vida e refratária ao tratamento conservador, a orquiectomia apresenta taxa de sucesso superior a 95%.
- Ⓓ O paramixovírus, causador da caxumba, é o principal agente da orquite viral e pode levar à atrofia testicular em até 50% dos casos.
- Ⓔ A dor testicular crônica é complicação frequente da hernioplastia inguinal laparoscópica, acometendo até 50% dos pacientes; o quadro é benigno e autolimitado, com duração média de três meses.

Questão 55

As urgências urológicas são condições clínicas que exigem avaliação imediata e intervenção rápida, pois estão associadas a risco de complicações graves, comprometimento funcional ou risco de vida. A esse respeito, assinale a opção correta.

- Ⓐ O reflexo cremastérico apresenta valor preditivo negativo de 100% para torção do cordão espermático, indicando fluxo sanguíneo testicular presente.
- Ⓑ Em homens acima de 60 anos de idade, a hematúria macroscópica é causa frequente de tamponamento vesical, sendo a cistite hemorrágica sua principal etiologia.
- Ⓒ A ureterolitíase na gestante é urgência urológica, pois a taxa de eliminação espontânea é baixa em razão da hipotonia ureteral induzida pela progesterona.
- Ⓓ Testículos criptorquídicos apresentam maior risco de torção do cordão espermático.
- Ⓔ Orquite viral é a principal causa de escroto agudo em crianças.

Questão 56

Segundo dados do Ministério da Saúde, 60% dos brasileiros acima de 18 anos de idade afirmam não usar preservativo nenhuma vez em relações sexuais. Esse dado está relacionado ao aumento dos diagnósticos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) nos últimos anos. Considerando o panorama atual das ISTs no Brasil, seu diagnóstico e tratamento, assinale a opção correta.

- Ⓐ O principal objetivo da vacinação contra o HPV é prevenir o câncer de colo uterino, na maioria dos casos associado aos subtipos 6 e 11.
- Ⓑ O ácido acético a 3%-5% é fundamental no diagnóstico das lesões por HPV, que se tornam esbranquiçadas ao contato com essa substância, o que facilita sua visualização.
- Ⓒ O herpes-vírus tipo 1 causa exclusivamente úlceras labiais, enquanto o tipo 2 é responsável pelas lesões genitais.
- Ⓓ O diagnóstico de clamídia pode ser feito pela demonstração de diplococos Gram-negativos intracelulares.
- Ⓔ A infecção por *H. ducreyi*, bacilo Gram-negativo, causa úlceras genitais dolorosas e linfadenopatia inguinal.

Questão 57

A disfunção erétil (DE) é a dificuldade ou incapacidade de obter ou manter ereção suficiente para um intercursos sexual satisfatório. Seu diagnóstico e tratamento impactam não apenas o paciente e sua(seu) parceira(o), mas também a sociedade, devido à relação com a saúde mental e aos custos socioeconômicos associados. A respeito da DE, assinale a opção correta.

- Ⓐ A injeção intracavernosa está contraindicada em pacientes que utilizam drogas inibidoras da monoamina oxidase.
- Ⓑ A ultrassonografia peniana com Doppler após ereção fármaco-induzida é o exame de primeira linha na avaliação vascular da DE.
- Ⓒ Na DE com baixos níveis de testosterona e elevação de LH e FSH, deve-se dosar a prolactina, pois o quadro é típico de hipogonadismo secundário.
- Ⓓ O tratamento de escolha da disfunção erétil vasculogênica é a injeção intracavernosa de fármacos (papaverina, fentolamina e alprostadil), isolados ou combinados.
- Ⓔ Ao contrário da sildenafil, a tadalafila não inibe a fosfodiesterase-6 (retina e coronárias) e pode ser usada com segurança em pacientes em uso de nitratos.

Questão 58

Infertilidade é uma condição que afeta cerca de 15% dos casais. A correta avaliação, o diagnóstico e o tratamento dos homens nessa condição são importantes no cuidado com a saúde da população como um todo. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

- Ⓐ Graças ao avanço tecnológico dos métodos diagnósticos, a infertilidade idiopática corresponde hoje a menos de 5% dos casos de infertilidade.
- Ⓑ O tratamento cirúrgico da varicocele é indicado apenas quando o casal busca gestação natural, sendo a varicolectomia desnecessária na opção por reprodução assistida, pois não melhora os parâmetros dos espermatozoides obtidos por punção de epidídimo.
- Ⓒ Associada à medida do tamanho testicular, a dosagem de FSH é preditora precisa para diferenciar azoospermia obstrutiva de disfunção espermatogênica.
- Ⓓ Espermograma com azoospermia ou oligospermia (inferior a 5 milhões/mL) define infertilidade.
- Ⓔ A globozoospermia está associada à mutação no gene da fibrose cística.

Questão 59

A urologia ocupa lugar de destaque no uso de tecnologia cirúrgica, com redução significativa no número das cirurgias abertas, enquanto tem aumentado exponencialmente o volume de cirurgias laparoscópicas e robóticas. Em relação às cirurgias laparoscópicas em urologia, assinale a opção correta.

- Ⓐ Pressão de pneumoperitônio de 20 mmHg pode aumentar a resistência vascular periférica e reduzir a frequência cardíaca.
- Ⓑ A perfuração intestinal por agulha de Veress exige interrupção imediata do procedimento, sutura do segmento afetado e nova programação cirúrgica após duas semanas.
- Ⓒ A embolia gasosa é uma complicação grave, que pode causar choque cardiogênico e ocorre principalmente quando o pneumoperitônio é mantido acima de 20 mmHg durante a dissecação de grandes vasos.
- Ⓓ Quando for necessária a cirurgia laparoscópica em gestantes, o primeiro trimestre é considerado o de menor risco para trabalho de parto prematuro.
- Ⓔ A técnica de Hasson para confecção do pneumoperitônio é indicada principalmente quando há suspeita de aderências intra-abdominais.

Questão 60

Paciente de 66 anos de idade com insuficiência renal crônica dialítica (etiologia hipertensiva) recebeu transplante renal de doador cadáver, com 13 h de isquemia fria. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, com diurese iniciando 20 h após o implante, e queda concomitante da creatinina. O paciente recebeu alta cinco dias após o procedimento; no 40º dia pós-operatório, retornou ao serviço de nefrologia com queixa de edema em membro inferior esquerdo, febre e piora progressiva da função renal.

No caso clínico precedente, o diagnóstico mais provável é de

- Ⓐ linfocele.
- Ⓑ estenose ureteral.
- Ⓒ fístula urinária tardia.
- Ⓓ carcinoma urotelial.
- Ⓔ trombose venosa profunda do membro inferior esquerdo.

Espaço livre