

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 41**

São considerados pilares da odontologia integral

- Ⓐ a simplificação dos procedimentos, o acesso universal e a busca da saúde curativa.
- Ⓑ a prevenção, o acesso universal e a busca da saúde curativa.
- Ⓒ o acesso universal, a prevenção e a tecnologia.
- Ⓓ a prevenção, a simplificação dos procedimentos e o compartilhamento do saber.
- Ⓔ a simplificação dos procedimentos, a busca da saúde curativa e o acesso universal.

Questão 42

De acordo com o Conselho Federal de Odontologia, o técnico em saúde bucal (TSB) deve exercer sua atividade profissional

- I sob supervisão técnica, presencial ou de não, do cirurgião-dentista (CD), na proporção máxima de um CD para cinco TSB.
- II sempre na presença de cirurgião-dentista (CD), devendo haver um CD para cada TSB.
- III sempre sob supervisão presencial do cirurgião-dentista (CD), na proporção máxima de um CD para cinco TSB.
- IV sob supervisão técnica, presencial ou não, do cirurgião-dentista (CD), devendo haver um CD para cada TSB.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Nenhum item está certo.
- Ⓑ Apenas o item I está certo.
- Ⓒ Apenas o item II está certo.
- Ⓓ Apenas o item III está certo.
- Ⓔ Apenas o item IV está certo.

Questão 43

Assinale a opção em que são corretamente apresentados apenas procedimentos que, conforme legislação vigente, podem ser realizados por técnicos em saúde bucal.

- Ⓐ raspagem subgingival e profilaxia
- Ⓑ fotografias intraorais e afastamento da margem gengival com fio retrator
- Ⓒ troca dos elásticos ortodônticos e remoção de suturas
- Ⓓ remoção de suturas e escultura oclusal de restaurações
- Ⓔ radiografias intraorais e isolamento do campo operatório

Questão 44

Em relação às tomadas radiográficas, é correto afirmar que, em um exame de radiografia de boca total, devem ser realizadas exatamente

- Ⓐ 10 radiografias periapicais.
- Ⓑ 11 radiografias periapicais.
- Ⓒ 12 radiografias periapicais.
- Ⓓ 13 radiografias periapicais.
- Ⓔ 14 radiografias periapicais.

Questão 45

Acerca da radiografia interproximal, assinale a opção correta.

- Ⓐ Para o exame de pré-molares, a parte anterior do filme deve ficar justa entre a margem do primeiro pré-molar inferior com o segundo pré-molar inferior.
- Ⓑ Nos exames dos pré-molares, a referência de posição são os dois pré-molares superiores.
- Ⓒ Para tomada de pré-molares, a posição do filme em sua margem anterior deve se estender além do contato entre o canino inferior e o primeiro pré-molar inferior.
- Ⓓ O posicionamento para as tomadas dos molares deve ter como referência a borda mais distal do primeiro molar superior.
- Ⓔ O raio X, nos exames dos molares, deve ser direcionado para a posição mais distal possível do segundo molar inferior.

Questão 46

Em relação ao processo saúde-doença e aos níveis de prevenção, assinale a opção correta.

- Ⓐ Promoção de saúde, proteção específica e diagnóstico precoce são medidas da pré-patogênese.
- Ⓑ A prevenção secundária ocorre no período patogênico e contempla diagnóstico precoce, tratamento imediato e limitação do dano.
- Ⓒ No processo saúde-doença, após o início da patogênese, há somente a necessidade da prevenção terciária, para reabilitação das incapacidades.
- Ⓓ A prevenção terciária visa ao tratamento precoce para a melhor reabilitação das incapacidades.
- Ⓔ A proteção específica é importante no período patogênico do processo saúde-doença.

Questão 47

Considere que, após uma exodontia (extração dentária), o cirurgião-dentista tenha colocado sobre a bancada dois dentes, o 36 e o 15. Nesse caso, no que concerne às diferenças anatômicas entre esses dois dentes, é correto afirmar que

- Ⓐ o dente 36 apresenta duas raízes, vestibular e lingual, e sua coroa possui 5 cúspides, enquanto o dente 15 tem duas raízes e duas cúspides, palatina e vestibular.
- Ⓑ o dente 36 apresenta três raízes, mesial, distal e palatina, e cinco cúspides, enquanto o dente 15 apresenta 2 raízes e duas cúspides, mesial e distal.
- Ⓒ o dente 36 apresenta duas raízes, uma mesial e outra distal, e sua coroa possui 5 cúspides, enquanto o dente 15 tem duas cúspides, vestibular e palatina, com uma única raiz.
- Ⓓ o dente 36, diferentemente do dente 15, apresenta duas raízes, uma mesial e outra distal, e sua coroa tem 4 cúspides.
- Ⓔ o dente 36 possui 3 raízes, com 4 cúspides, enquanto o dente 15 tem duas cúspides, mesial e distal, com uma única raiz.

Questão 48

No que se refere à cronologia de erupção de dentição decídua, assinale a opção correta.

- Ⓐ Primeiro, os quatro incisivos inferiores irrompem, normalmente até os 9 meses de idade e, por último, os primeiros molares, por volta de 1 ano e meio de idade.
- Ⓑ Os primeiros dentes a irromper são os incisivos centrais, perto dos 6 meses de idade, e depois irrompem os segundos molares, por volta de 1 ano de idade.
- Ⓒ Os quatro incisivos superiores e inferiores normalmente irrompem juntos, entre os 6 e os 9 meses de idade, e, por último, irrompem os caninos, perto de 1 ano e meio de idade.
- Ⓓ Incisivos centrais inferiores são os primeiros a nascer, em geral por volta dos seis meses de idade, e os segundos molares são os últimos a irromper, após os 2 anos de idade.
- Ⓔ Os incisivos centrais superiores são os primeiros dentes a irromper, perto dos 9 meses de idade, e os caninos são os dentes guias, os últimos a irromper, próximo aos 2 anos de idade.

Questão 49

Em relação à oclusão dental, julgue os itens subsequentes.

- I A oclusão de classe I é considerada a oclusão normal.
- II Na má oclusão de classe III, a maxila é maior que a mandíbula, de modo que os dentes superiores são projetados mais à frente que o normal.
- III Mordida cruzada posterior ocorre quando os molares e(ou) pré-molares superiores se encaixam em posição lingual (mais para dentro) aos inferiores.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Nenhum item está certo.
- Ⓑ Apenas o item II está certo.
- Ⓒ Apenas o item III está certo.
- Ⓓ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓔ Apenas os itens I e III estão certos.

Questão 50

A posição correta do longo eixo do filme radiográfico, nas radiografias dos caninos inferiores e nas radiografias do incisivo lateral e do canino superior, é

- Ⓐ vertical ou horizontal, em ambos os casos.
- Ⓑ vertical e horizontal, respectivamente.
- Ⓒ vertical e vertical, respectivamente.
- Ⓓ horizontal e vertical, respectivamente.
- Ⓔ horizontal e horizontal, respectivamente.

Questão 51

Acerca do instrumental odontológico de exame clínico, é correto afirmar que

- Ⓐ uma das funções da sonda exploradora é medir a profundidade do sulco gengival ou da bolsa periodontal.
- Ⓑ a sonda exploradora auxilia na detecção de irregularidades e lesões de cárie na superfície dentária.
- Ⓒ a pinça clínica é utilizada unicamente para corte de tecidos moles.
- Ⓓ o explorador periodontal é utilizado para a remoção de cálculo dentário durante a raspagem.
- Ⓔ o espelho clínico tem apenas a função de refletir a imagem do dente.

Questão 52

A respeito da conservação e da manutenção adequadas de equipamentos e instrumentais odontológicos, assinale a opção correta.

- Ⓐ A lubrificação e a manutenção periódica de equipamentos mecânicos, como micromotores e peças de alta rotação, aumentam sua durabilidade e evitam falhas durante o atendimento.
- Ⓑ Para economizar tempo na limpeza, instrumentos de aço inoxidável podem ser armazenados úmidos, pois não há risco de corrosão.
- Ⓒ A limpeza manual de instrumentais antes da esterilização não é necessária se estes forem colocados diretamente na autoclave.
- Ⓓ Instrumentos cortantes, como curetas e espátulas, não precisam ser verificados antes da esterilização, pois a autoclave remove qualquer contaminação.
- Ⓔ O armazenamento de instrumentais esterilizados pode ser feito de qualquer forma, independentemente do tipo de embalagem utilizada.

Questão 53

No que diz respeito às atividades de esterilização e de desinfecção do ambiente odontológico, é correto afirmar que

- Ⓐ o hipoclorito de sódio é um desinfetante de baixo nível, visto que pode ser utilizado na desinfecção do reservatório de água do equipo.
- Ⓑ o álcool 70% é indicado para a desinfecção de superfícies.
- Ⓒ a esterilização em estufa é um método mais rápido e seguro em comparação à autoclave.
- Ⓓ a desinfecção de baixo nível dos instrumentos semicríticos é suficiente.
- Ⓔ o glutaraldeído pode ser utilizado para a esterilização de artigos críticos.

Questão 54

Durante um atendimento odontológico de rotina, certo paciente subitamente se queixa de tontura. Ele apresenta palidez e começa a suar frio, evoluindo para perda momentânea da consciência, ainda sentado na cadeira odontológica.

Nessa situação hipotética, a conduta inicial correta a ser realizada consiste em

- Ⓐ deitar o paciente em posição supina, elevar as suas pernas e assegurar ventilação adequada.
- Ⓑ deitar o paciente e oferecer sal ou algum alimento com alto teor de sódio.
- Ⓒ manter o paciente sentado e oferecer água imediatamente para evitar desidratação.
- Ⓓ administrar medicamentos sedativos para controlar a crise e reduzir sintomas.
- Ⓔ inclinar o paciente para frente, apoiando a sua cabeça entre os joelhos, até recuperar a consciência.

Questão 55

Considerando os princípios de comunicação e ética na relação entre paciente e profissional da saúde bucal, assinale a opção correta.

- A** Tanto a escuta ativa quanto o diálogo claro fortalecem o vínculo de confiança entre paciente e profissional.
- B** O sigilo profissional pode ser quebrado a qualquer momento, desde que seja de interesse do profissional.
- C** O único momento de diálogo deve ser durante a anamnese para que o trabalho do profissional não seja comprometido.
- D** O profissional, ao buscar compreender os sentimentos, os medos e as expectativas do paciente, pode comprometer a objetividade do tratamento.
- E** O paciente deve ser informado sobre procedimentos apenas se ele solicitar, para não causar ansiedade desnecessária.

Questão 56

No que diz respeito ao relacionamento com o paciente e com a equipe de trabalho no âmbito odontológico, assinale a opção correta.

- A** O uso de termos científicos deve ser priorizado em qualquer situação, mesmo que o paciente não compreenda.
- B** A comunicação entre os membros da equipe é secundária, pois cada profissional deve atuar de forma isolada em suas funções.
- C** O diálogo deve ser restrito ao paciente, não havendo necessidade de interação entre técnico em saúde bucal e cirurgião-dentista.
- D** O excesso de comunicação dentro da equipe pode comprometer o andamento do trabalho odontológico.
- E** A comunicação clara e respeitosa entre os profissionais favorece o entrosamento da equipe, melhora o ambiente de trabalho e reflete positivamente na qualidade do atendimento ao paciente.

Questão 57

A respeito do manejo do paciente pediátrico no consultório odontológico, assinale a opção correta.

- A** O uso de contenção física deve ser a primeira estratégia utilizada quando a criança demonstra resistência, sem considerar técnicas de manejo comportamental.
- B** O método *tell-show-do* consiste em mostrar os instrumentos à criança, sem explicar a função destes, para evitar ansiedade.
- C** O acompanhante deve sempre se posicionar fora da sala, para que não haja distrações durante o atendimento.
- D** Técnicas como distração, diálogo tranquilo e demonstração de instrumentos contribuem para reduzir o medo e melhorar a cooperação da criança.
- E** O reforço positivo é indicado apenas quando a criança realiza o procedimento de forma perfeita, sem considerar os pequenos avanços.

Questão 58

Acerca de epidemiologia e prevenção da cárie dentária, é correto afirmar que

- A** a prevenção primária da cárie corresponde à restauração de cavidades iniciais, que impede a progressão da doença.
- B** o declínio mundial da cárie observado nas últimas décadas está exclusivamente relacionado ao aumento no consumo de cálcio na dieta.
- C** a aplicação de selantes nos diferentes grupos dentários é uma prevenção secundária da doença.
- D** a prevalência da cárie é uniforme entre diferentes grupos populacionais, independentemente do nível socioeconômico e do acesso ao flúor.
- E** a fluoretação das águas de abastecimento público é a estratégia coletiva mais eficaz e custo-efetiva na redução da prevalência de cárie dentária.

Questão 59

Considerando a composição química do flúor e suas formas de aplicação para a prevenção da cárie dentária, assinale a opção correta.

- A** Uma vez que a população tem acesso à fluoretação da água de abastecimento público, não é indicada a aplicação tópica de flúor, pois há risco de fluorose.
- B** O flúor só atua por via sistêmica, de modo que é ineficaz quando aplicado topicamente sobre os dentes após a erupção.
- C** A aplicação profissional de flúor é indicada apenas para crianças menores de 5 anos de idade, não sendo recomendada para adultos.
- D** O flúor aplicado topicamente forma uma barreira física sobre o esmalte, o que impede qualquer contato com ácidos produzidos pelas bactérias.
- E** Compostos como fluoreto de sódio, fluoreto de estanho e fluoreto de amina são formas químicas utilizadas na aplicação tópica do flúor, com diferentes concentrações e indicações clínicas.

Questão 60

Assinale a opção correta, a respeito do manejo adequado dos resíduos odontológicos.

- A** Materiais perfuro-cortantes podem ser descartados em sacos plásticos comuns.
- B** Resíduos químicos, como amálgama, podem ser jogados diretamente na pia com bastante água.
- C** Resíduos biológicos devem ser acondicionados em sacos brancos leitosos com símbolo infectante.
- D** O lixo reciclável e o lixo infectante podem ser descartados juntos, desde que bem embalados.
- E** Resíduos infectantes, como gazes e algodões com sangue, devem ser acondicionados em sacos pretos para lixo hospitalar.