

1

Este é o número da
sua prova. Marque-o
no cartão de resposta.

Residência Uniprofissional em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – RMG ODONTÓLOGOS

Antes de iniciar a prova, leia as instruções:

✓ Para fazer a prova, você recebeu:

- este caderno de prova, que contém **80 questões**;
- um cartão de respostas.

✓ Confira:

- **no cartão de respostas:** nome, número e cargo, emprego ou função da sua inscrição.
- **no caderno de prova:** cargo, emprego ou função da sua inscrição e quantidade de questões.

✓ Duração da prova: **4 horas**

- Incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- Sair da sala: **60 minutos** após o início da prova.
- Levar caderno: **30 minutos** para o fim do tempo total da prova, contados a partir do seu efetivo início.
- Por questões de segurança, o candidato que sair antes desse tempo devolverá ao fiscal da sala, além do cartão de respostas, o caderno de prova.

✓ Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e se a sequência e a quantidade de questões estão corretas.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

✓ Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade! Não serão admitidas reclamações posteriores.

- ✓ A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas relacionadas ao conteúdo aos fiscais.
- ✓ Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, tampouco empréstimo de materiais e comunicação entre os candidatos.
- ✓ **O cartão de respostas é o único documento válido e utilizado para a correção da prova objetiva.** Preencha-o com cuidado, marcando apenas uma alternativa para cada questão.
- ✓ Não rabisque, rasure, amasse ou dobre o cartão de respostas. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro do candidato.
- ✓ Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de sala, aguardando autorização para entregar o material.
- ✓ Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas devidamente preenchido e assinado.
- ✓ Os três últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de acompanhar o fechamento do material.

Fraudar ou tentar fraudar concursos públicos é crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 80 QUESTÕES

1) A respeito das fraturas Le Fort descritas em 1901 por Rene Le Fort, analisar os itens.

- I. A apresentação clínica inclui ausência de sangramento, abscessos intrabuciais e alteração da mobilidade de diferentes segmentos ósseos, dependendo do tipo em questão.
- II. O tratamento inicial centra-se na estabilização do indivíduo e no controle do sangramento. O tratamento definitivo é cirúrgico. O tratamento de longo prazo diz respeito à preservação e à reabilitação da função facial.
- III. A velocidade do trauma está associada à gravidade das fraturas Le Fort.
- IV. Le Fort I: a força impacta a ponte nasal ou a parte superior do maxilar.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens II e III.
- c) Apenas nos itens III e IV.
- d) Apenas nos itens I e IV.

2) O Decreto nº 7.508/2011, que estabelece as regras de organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS), define os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS como:

- a) Redes integradas.
- b) Portas de entrada.
- c) Portais da saúde.
- d) Centros de reabilitação.

3) O texto constitucional evidencia que a concepção do Sistema Único de Saúde (SUS) fundamenta-se na construção de um modelo de atenção voltado às necessidades da população, reafirmando o compromisso do Estado com o bem-estar social, especialmente no âmbito da saúde coletiva. Dessa forma, foram estabelecidos como princípios doutrinários do SUS os seguintes, EXCETO:

- a) Universalidade.
- b) Integralidade.
- c) Equidade.
- d) Desospitalização.

4) Em relação ao odontoma, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) É uma lesão que normalmente não causa sintomas.
- b) É uma lesão comum em adultos acima de 40 anos.
- c) É um tumor de origem epitelial.
- d) É o tumor odontogênico menos comum.

5) Sobre os aspectos básicos das imagens radiográficas odontológicas, analisar os itens.

- I. Uma baixa densidade do objeto resulta em uma baixa densidade radiográfica. Objetos de baixo número atômico produzirão imagens menos densas, desde que com a mesma espessura.
- II. Quanto maior a miliamperagem (corrente do tubo de raios X), maior a densidade radiográfica. Portanto, são diretamente proporcionais.
- III. Alta densidade ou alto número atômico do objeto resultam em baixa densidade radiográfica ou áreas muito claras (por exemplo: restauração de amálgama, osso).

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas nos itens II e III.
- c) Apenas nos itens I e II.
- d) Apenas nos itens I e III.

6) O trauma é um problema mundial de saúde pública. As lesões por trauma intencional ou acidental afetam crianças, adolescentes, adultos jovens e idosos. Ainda, são as principais causas de morte entre pacientes de um a 44 anos e a quarta maior causa considerando-se todas as faixas etárias. Sobre o assunto, analisar os itens.

- I. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), as lesões em cabeça e face podem representar metade das mortes traumáticas.
- II. Os traumas de face, se não forem reparados de maneira adequada e no momento adequado, podem evoluir para sérias sequelas estéticas e funcionais.
- III. As causas dos traumas de face são variadas, sendo as principais: violência (gerada tanto por humanos quanto por animais), acidentes automobilísticos e quedas.
- IV. O gênero mais acometido é o masculino, e a faixa etária varia. Contudo, a maior concentração de vítimas encontra-se na faixa de 20 a 30 anos de idade, afetando as pessoas em suas idades mais produtivas.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Em todos os itens.
- b) Apenas nos itens I e IV.
- c) Apenas nos itens I, II e III.
- d) Apenas nos itens II, III e IV.

7) A respeito da anatomia radiográfica intrabucal normal, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () O esmalte é o tecido mais radiopaco de todos que podem ser visualizados radiologicamente e cobre a porção coronária do dente.
- () O forame nasopalatino está localizado imediatamente atrás dos incisivos superiores e é formado pela união dos dois processos palatinos da maxila, sendo radiopaco à radiografia.
- () As fossas incisivas apresentam-se como depressões na superfície externa do osso alveolar entre o incisivo lateral e o canino superior e entre os caninos inferiores, sendo radiolúcidas na radiografia.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - C.
- d) E - C - E.

8) A respeito das modalidades de imagem, analisar os itens.

- I. A decisão para realização de um exame de imagem é baseada nas necessidades clínicas do paciente.
- II. Um princípio fundamental em Radiologia é maximizar a relação custo-benefício em exames de imagem.
- III. Para possibilitar ao dentista prover o cuidado ou tratamento apropriado ao paciente, nem sempre será possível agregar o melhor custo com menor tempo de exposição.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

9) Sobre as vias de administração dos medicamentos, analisar os itens.

- I. Cada via de administração de um medicamento apresenta diferente velocidade de absorção.
- II. Quando os medicamentos são aplicados na pele, a absorção é muito rápida, em razão da composição física da pele.
- III. A injeção intravenosa produz a absorção mais rápida porque os medicamentos já ficam disponíveis imediatamente quando adentram a circulação sistêmica.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Apenas nos itens II e III.

10) Ao organizar o Sistema Único de Saúde (SUS), o legislador estabeleceu diretrizes que garantem que os serviços não sejam distribuídos de forma aleatória, mas sim estruturados para atender a população de maneira eficiente. O Art. 8º da Lei nº 8.080/1990 estabelece que as ações e os serviços do SUS devem ser organizados segundo os seguintes princípios organizativos:

- a) Burocratização e centralização.
- b) Regionalização e hierarquização.
- c) Setorização e concentração.
- d) Subordinação e redundância.

11) Quanto à organização, direção e gestão do SUS, cada esfera de governo tem suas corresponsabilidades. No âmbito da União, o gestor nacional do SUS é:

- a) O Conselho Nacional de Secretarias da Saúde.
- b) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- c) A Fundação Nacional de Saúde.
- d) O Ministério da Saúde.

12) A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) ou *cone beam* é um dos maiores avanços em tecnologia de diagnóstico por imagem da região maxilofacial dos últimos anos. Sobre esse assunto, analisar os itens.

- I. A TCFC permite reconstruções multiplanares e volumétricas, possibilitando a avaliação em 3D das estruturas anatômicas.
- II. A TCFC utiliza radiação não ionizante, sendo, portanto, isenta de riscos biológicos.
- III. O tamanho do campo de visão (*field of view* – FOV) não interfere na área irradiada, pois a colimação automática ajusta esse parâmetro de forma padronizada.
- IV. O exame por TCFC apresenta sempre menor dose de radiação do que exames bidimensionais convencionais.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas nos itens II e III.
- c) Apenas nos itens I e IV.
- d) Apenas nos itens III e IV.

13) A respeito do herpes simples tipo 1, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Dissemina-se, predominantemente, por meio da saliva infectada ou de lesões periorais ativas.
- () A exposição inicial em um indivíduo sem anticorpos para o vírus é denominada recorrente.
- () A transmissão para um indivíduo não infectado pode ocorrer facilmente durante os períodos de infecção assintomática.

- a) E - C - E.
- b) C - E - C.
- c) E - C - C.
- d) C - C - E.

14) Em relação ao abscesso periapical, analisar os itens.

- I. A primeira manifestação radiográfica da instalação de um processo inflamatório no periápice de um elemento dentário caracteriza-se por uma diminuição do espaço da membrana periodontal.
- II. Processos agudos e de curto tempo de instalação (de 24 a 48 horas) nunca apresentam alteração radiográfica.
- III. Uma lesão já instalada há um tempo apresenta-se, na radiografia, como uma área radiolúcida com contornos difusos, associada ao ápice de um elemento dentário desvitalizado.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas no item III.
- d) Em todos os itens.

15) A respeito do sindesmótomo, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () É utilizado em exodontia para a realização da sindesmotomia.
- () Não pode ser substituído pela espátula de cera número 7 no procedimento de sindesmotomia.
- () Apresenta duas extremidades pontiagudas, sendo uma reta (uso preferencial na maxila) e outra curva ou angulada (uso preferencial na mandíbula).

- a) C - C - E.
- b) E - C - E.
- c) C - E - C.
- d) E - E - C.

16) Paciente do sexo feminino de 20 anos de idade procurou atendimento odontológico de urgência com queixa de dor forte no lado direito inferior da boca na região do terceiro molar, apresentando febre com disfagia. Ao exame clínico, o dentista observou, na região do 48, semirretido, a mucosa eritematosa, edemaciada. Ao pressionar a região, houve drenagem de secreção purulenta. Qual é o provável diagnóstico?

- a) Pulpite.
- b) Pericoronarite.
- c) Abscesso periodontal.
- d) Abscesso subperiosteal.

17) Em relação aos anestésicos locais, analisar os itens.

- I. São bases orgânicas fracas, pobremente solúveis em água.
- II. Os do tipo amida caracterizam-se por maior potencial alergênico.
- III. A lidocaína é o anestésico padrão, com o qual os demais são comparados.
- IV. Atuam sobre os processos de geração e condução nervosa, reduzindo ou prevenindo o aumento de permeabilidade de membranas excitáveis ao sódio, de modo que são mantidas altas concentrações no meio extracelular.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens I, III e IV.
- d) Apenas nos itens II, III e IV.

18) Sobre os traumatismos dentais, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Um dos fatores de risco é o alto consumo de açúcar.
- b) Trespasse horizontal acentuado e hipotonia labial são fatores de risco ambiental.
- c) Algumas lesões dentárias traumáticas, como luxações dentárias, fraturas, intrusão e extrusão dentária, podem e devem ser resolvidas na rede básica e podem exigir monitoramento radiográfico.
- d) A periodontite é o principal fator de risco.

19) Certificar-se de que a via de administração atende às especificidades do usuário e do medicamento em questão faz parte dos procedimentos de segurança do paciente. Nesse sentido, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

- (1) Via oral.
- (2) Via subcutânea.
- (3) Via intravenosa.

- () Administrado pela boca.
- () Administrado por injeção sob a pele.
- () Administrado por injeção em uma veia.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 1 - 3 - 2.
- d) 2 - 1 - 3.

20) Considerando-se a preparação dos instrumentos cirúrgicos, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

- (1) Desinfecção.
- (2) Lavagem.
- (3) Preparação e inspeção.

- () Reduz de modo considerável o risco de infecção se ocorrer uma lesão inadvertidamente.
- () Utiliza-se escova e água fria.
- () Os instrumentos não funcionais são descartados, e partes motoras são lubrificadas com óleo especial.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 1 - 3 - 2.
- d) 2 - 1 - 3.

21) Em relação ao pós-operatório em exodontia, analisar os itens.

- I. O pós-operatório basicamente constitui-se na medicação a ser prescrita no receituário e nas recomendações pós-operatórias indicadas ao ato cirúrgico efetivado no paciente.
- II. O ideal é que as recomendações pós-operatórias sejam impressas, lidas, explicadas e entregues ao paciente, uma vez que, no momento cirúrgico, o paciente encontra-se tenso, o que dificulta lembrar das orientações posteriormente.
- III. O objetivo das recomendações pós-operatórias é propiciar condições locais e gerais que não interfiram no processo de cicatrização óssea e dos tecidos moles da cavidade bucal.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

22) Paciente do sexo masculino, de 20 anos de idade, compareceu para consulta odontológica de revisão portando um raio-X panorâmico. Na anamnese, relatou não estar sentindo nenhuma dor ou desconforto. No raio-X, o dentista observou uma área radiolúcida associada à coroa do dente 48 incluso. Qual é o diagnóstico mais provável?

- a) Cisto dentígero.
- b) Ameloblastoma.
- c) Odontoma.
- d) Cisto periapical.

23) A respeito da osteomielite, analisar os itens.

- I. Apresenta-se, de modo geral, de maneira aguda e determina febre elevada, sudorese e delírio.
- II. A osteomielite mandibular manifesta-se com dores intensas localizadas no ângulo da mandíbula, com irradiações aos ramos trigêmeos.
- III. A radioterapia pode condicionar o aparecimento da osteomielite, enquanto a pericoronarite não.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

24) Em relação à sonda exploradora em cirurgia, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Pode ser empregada para sondagem do alvéolo pós-exodontia.
- () Pode ser empregada para elevar o fio cirúrgico do alvéolo ao remover a sutura.
- () É empregada, em algumas situações, para explorar lesões em tecidos moles.
- () É empregada somente para exame clínico.

- a) E - E - E - C.
- b) E - C - E - C.
- c) C - C - C - E.
- d) C - E - C - E.

25) A respeito do abscesso periodontal, analisar os itens.

- I. É a evolução de uma bolsa periodontal, de uma lesão associada endodôntica e periodontal ou é a complicação de uma fratura ou fissura radicular.
- II. Mesmo sem zona de flutuação, está indicada a drenagem cirúrgica por meio de incisão na mucosa.
- III. A prescrição de antimicrobianos está indicada em todos os casos.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Apenas nos itens II e III.

26) Considerando-se o Calendário Nacional de Vacinação, qual vacina deve ser administrada ao nascer, que tem como objetivo prevenir as formas graves e disseminadas da tuberculose e que também possui efeito protetor contra a hanseníase?

- a) BCG.
- b) DTP.
- c) Tríplice viral SCR
- d) Tetraviral SCR.V.

27) Considerando as apicectomias, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Envolvem a remoção cirúrgica de tecidos patologicamente alterados próximos ao ápice radicular, a eliminação de ramificações apicais do canal radicular e o fechamento antibacteriano simultâneo do canal ou canais radiculares.
- () A condição clínica dos dentes adjacentes deve ser levada em consideração, especialmente em relação à formação de bolsas, à mobilidade e à vitalidade.
- () A extensão e a direção do deslocamento do retalho são determinadas pelo tamanho da raiz do dente.

- a) C - C - C.
- b) C - C - E.
- c) E - E - C.
- d) E - C - C.

28) Paciente do sexo masculino de 60 anos de idade, desdentado total superior, procurou o dentista a fim de realizar uma prótese total. Ao exame clínico, o dentista notou os freios vestibulares com inserção alta no rebordo, a ponto de impedir a extensão suficiente da margem da prótese. Qual é a solução mais provável para o caso?

- a) Cirurgia pré-protética dos freios vestibulares.
- b) Enxerto de gengiva livre do palato.
- c) Retalho de tecido conjuntivo.
- d) Prótese com uma extensão de margem insuficiente.

29) Considerando-se a bioética na prática da saúde, o princípio da autonomia está diretamente relacionado a:

- a) Realizar intervenções sem que se tenha que informar o paciente.
- b) Minimizar o diálogo entre equipe e usuário.
- c) Priorizar decisões exclusivamente técnicas do profissional.
- d) Respeitar as decisões e escolhas do paciente sobre seu próprio tratamento.

30) Sobre as exodontias em ambiente hospitalar, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) A intubação é feita pela boca, uma vez que não gera dificuldades para a cirurgia.
- b) Mesmo em ambiente hospitalar, não se deve extrair todas as peças dentárias indicadas no planejamento de uma só vez.
- c) Nunca se utiliza a incisão de Neumann para os dentes superiores.
- d) Estando o paciente anestesiado, pode-se realizar infiltrações locais com anestésico local para se obter a hemostasia, com a concordância do médico anestesilogista.

31) Considerando as dores e/ou disfunções têmporo-mandibulares, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () No exame clínico, é relevante proceder testes de manipulação, carga e palpação na expectativa de reproduzir os sintomas específicos.
- () É aconselhável examinar o paciente em pé para observar se os defeitos posturais do pescoço e dos ombros estão presentes, o que é relativamente comum em indivíduos portadores de disfunção.
- () A palpação isolada das articulações têmporo-mandibulares é suficiente para dar o diagnóstico.

- a) C - E - C.
- b) E - C - E.
- c) C - C - E.
- d) E - C - C.

32) De acordo com as ulcerações aftosas recorrentes, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Apresentam-se somente na forma de úlceras únicas.
- b) Não apresentam sintomatologia.
- c) O fator causal é bem definido.
- d) A linfadenopatia local pode estar presente, e dificuldade de fonação e mastigação são sintomas relatados frequentemente.

33) A respeito da halitose, analisar os itens.

- I. É queixa comum na população adulta, acompanhada, por vezes, de gosto ruim na boca.
- II. Pode decorrer de fatores locais somente.
- III. Dentre os fatores locais causadores, destacam-se a inadequada higiene oral, a cárie, a gengivite e a periodontite.
- IV. Mau hálito ao acordar não tem significado patológico, usualmente sendo consequência de baixo fluxo salivar e falta de higienização oral durante o sono.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens I, III e IV.
- d) Apenas nos itens II, III e IV.

34) Em conformidade com o sarcoma de Kaposi, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () O sarcoma de Kaposi na boca é praticamente patognomônico de aids, especialmente em jovens que não recebem tratamento imunossupressor.
- () Com frequência é associado a outros efeitos da infecção pelo HIV, como candidose, leucoplasia pilosa ou gengivite associada ao HIV.
- () O sarcoma de Kaposi só afeta a cavidade bucal.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

35) Sobre o reimplante dental, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Os dentes decíduos nunca devem ser reimplantados.
- b) Se um dente estiver fora da boca por até 2 horas, a chance do ligamento periodontal sobreviver é grande.
- c) A imersão do dente luxado em solução isotônica pode facilitar a necrose periodontal.
- d) O pior método é preservar um dente luxado em uma solução salina fisiológica.

36) Dentre as alternativas abaixo, assinalar aquela que NÃO corresponde a uma das fases de cicatrização de feridas.

- a) Degeneração.
- b) Inflamação.
- c) Proliferação.
- d) Maturação.

37) Em relação aos enxertos de tecidos, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () O tratamento de defeitos ósseos no processo alveolar usando tecido conjuntivo nunca é possível.
- () Um rebordo alveolar que recebeu aumento por meio de transplante de tecido conjuntivo pode ser submetido à carga de origem protética tranquilamente.
- () Os transplantes de tecido conjuntivo livre do palato podem ser usados para aumentar o volume do processo alveolar.

- a) E - E - C.
- b) C - C - E.
- c) C - E - C.
- d) E - C - C.

38) Os fatores predisponentes para a deiscência de ferida incluem:

- I. Obesidade, quimioterapia ou radioterapia e insuficiência renal ou hepática.
- II. Nutrição deficiente e diabetes.
- III. Infecção ativa e uso de corticosteroide.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Apenas nos itens II e III.

39) Paciente do sexo masculino de 16 anos de idade compareceu para consulta portando uma radiografia panorâmica, a fim de resolver a questão de seus caninos superiores não terem nascido. Ao exame clínico, o dentista visualizou a presença dos dentes caninos decíduos em posição. Ao exame radiográfico, o dentista notou os caninos permanentes não erupcionados bem localizados. Qual é a opção de tratamento mais provável?

- a) Deixar os dentes como estão e orientar que os decíduos uma hora irão cair, daí, então, procurar para por implantes na região.
- b) Transplante autólogo.
- c) Exposição cirúrgica, seguida de movimento ortodôntico.
- d) Exodontia dos caninos inclusos e dos decíduos e colocação de implante imediato.

40) Em relação ao tratamento das fissuras labiopalatinas, analisar os itens.

- I. Se, por um lado, as cirurgias precoces acarretam problemas para o crescimento dos maxilares, por outro, o atraso no procedimento cirúrgico traz consequências psicológicas, alterações na fonação e dificuldade na integração social dos pacientes fissurados.
- II. É comum a presença de microformas dentárias, dentes supranumerários, agenesias, giroversões e malformação na estrutura dos dentes dos fissurados.
- III. A ortopedia precoce substitui a cirurgia nos pacientes fissurados.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e II.
- d) Apenas nos itens II e III.

41) Um paciente do sexo masculino de 46 anos de idade realizou a cirurgia de implante unitário do dente 36 há 7 meses. Após isso, todos os indicadores clínicos estavam normais, e o implante parecia ter uma fixação rígida. Entretanto, o paciente chegou com a queixa de mobilidade no implante, a qual ocorreu logo após a colocação da prótese sobre implante com o protesista. Qual é a causa mais provável do fracasso do implante?

- a) Fracasso da carga inicial.
- b) Fracasso cirúrgico.
- c) Erro do protesista.
- d) Perda óssea por trauma oclusal.

42) A respeito das exodontias múltiplas, analisar os itens.

- I. Podem somente ser realizadas em ambiente hospitalar.
- II. Em um paciente que necessite extrair vários dentes com a finalidade protética, deve-se realizar um retalho mucoperiósteo para a regularização do rebordo num único procedimento, evitando-se assim um segundo tempo para regularização das exostoses e espículas.
- III. O ambiente de consultório para extrações múltiplas está contraindicado, principalmente pelo risco de excesso de anestésico.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e II.
- d) Apenas nos itens II e III.

43) Em relação aos implantes dentários unitários, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Possuem baixa taxa de sucesso.
- () Possuem menor risco de cárie nos dentes adjacentes.
- () Possuem melhor manutenção óssea no sítio desdentado.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - C.
- d) E - E - C.

44) Considerando as restaurações fixas nos pacientes parcialmente desdentados, analisar os itens.

- I. Uma das vantagens é a longevidade, pois perdura durante a vida útil dos implantes.
- II. O custo é similar ao de sobredentaduras sustentadas por implantes.
- III. Via de regra, há maior impação alimentar.
- IV. Há a vantagem psicológica devido à sensação de dentes naturais.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens I, II e IV.
- d) Apenas nos itens II, III e IV.

45) A respeito das radiografias periapicais em implantologia, analisar os itens.

- I. São utilizadas para a avaliação de rotina/manutenção.
- II. São indicadas para alinhamento e inclinação durante a cirurgia de implante.
- III. São usadas para avaliação de grandes espaços desdentados.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e II.
- d) Em todos os itens.

46) Paciente do sexo feminino de 23 anos de idade compareceu para consulta odontológica de avaliação. O dentista, antes de examinar a cavidade bucal, percebeu o lábio inferior deslocado, em relação ao superior, para o lado direito. O dentista, então, pediu para o paciente se posicionar em pé e observou a postura anormal do pescoço e dos ombros. Somente com esses achados clínicos, qual é o diagnóstico mais provável?

- a) Disfunção têmporo-mandibular.
- b) Neuralgia do trigêmeo.
- c) Celulite facial.
- d) Traumatismo dentário.

47) O crescimento craniofacial resulta da interação entre sincondroses da base e suturas faciais ao longo do pico puberal. Sobre o impacto desse binômio no planejamento ortocirúrgico em adolescentes, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) As suturas definem isoladamente a forma facial, e as sincondroses realizam remodelação superficial intramembranosa sem efeito de deslocamento.
- b) As sincondroses e as suturas têm predomínio intramembranoso com participação endocondral pouco relevante na base craniana.
- c) As sincondroses basais promovem crescimento endocondral que desloca a face média, e as suturas respondem com aposição adaptativa aos vetores funcionais.
- d) As suturas e as sincondroses atuam como centros autônomos equivalentes, independentes de estímulos funcionais e de deslocamentos secundários.

48) Em incisivo superior com periodontite apical persistente após tratamento endodôntico adequado, assinalar a alternativa que descreve CORRETAMENTE princípios cirúrgicos previstos para apicectomia com retropreparo.

- a) Ressecção com bisel amplo de quarenta e cinco graus para ampliar o campo e preservar delta apical remanescente.
- b) Curetagem além do defeito, retropreparo de um milímetro e selamento com ionômero de vidro modificado por resina.
- c) Ressecção de um milímetro perpendicular ao longo eixo, retropreparo manual e retro-obturaç o com comp sito fluido fotopolimeriz vel.
- d) Ressecção de tr s mil metros perpendicular ao longo eixo, retropreparo ultrass nico de tr s mil metros e selamento com biocer mico   base de silicato de c lcio.

49) Sobre o uso de tomografia computadorizada de feixe c nico para investigar fraturas e reabsorç es, assinalar a alternativa que respeita o princ pio ALADA(I) sem perder foco diagn stico.

- a) Solicitar volume grande com voxel m nimo para toda a arcada superior em dor endod ntica n o esclarecida.
- b) Selecionar campo restrito ao dente de interesse com voxel compat vel   hip tese e justificativa por achados pr vios inconclusivos.
- c) Usar CBCT como exame inicial em dor aguda e dispensar radiografias periapicais em diferentes angulaç es.
- d) Fixar voxel em 0,08 mil metro por rotina, independentemente do campo e da quest o cl nica.

50) Avulsão de incisivo permanente com ápice imaturo e tempo seco de cerca de setenta minutos coloca decisões finas em jogo. Assinalar a alternativa que apresenta a conduta inicial alinhada às diretrizes atuais.

- a) Contraindicar reimplante e planejar prótese adesiva temporária devido ao ápice imaturo e ao tempo extraoral.
- b) Reimplantar sem preparo radicular, imobilizar rigidamente por quatro semanas e adiar tratamento endodôntico.
- c) Remover tecido periodontal necrótico, condicionar a raiz em solução fluoretada, reimplantar com contenção flexível e iniciar endodontia em sete a dez dias.
- d) Realizar apicificação extraoral com MTA e reimplantar com contenção rígida por duas semanas.

51) Na região posterior, a decisão de carga imediata sobre implantes deve integrar estabilidade mecânica e contexto local. Assinalar a alternativa que apresenta uma relação clínica prudente entre torque de inserção, ISQ e fatores de risco.

- a) Torque entre 35 e 45Ncm associado a ISQ acima de 70 apoia carga imediata quando inexistem fatores locais de risco.
- b) Torque menor que 20Ncm é parâmetro suficiente para carga imediata quando não se mede o ISQ no transoperatório.
- c) ISQ acima de 55 autoriza carga imediata universal independentemente de densidade óssea e biotipo.
- d) Torque de 60Ncm em osso tipo IV é desejável para promover compressão e cicatrização por contato mais previsível.

52) Fratura condilar unilateral extracapsular com encurtamento da altura mandibular e mordida aberta ipsilateral exige decisão que restabeleça função e oclusão. Considerando o exposto, assinalar a conduta adequada.

- a) Redução aberta por acesso pré-auricular com fixação interna estável e fisioterapia precoce para recuperar altura e oclusão.
- b) Tratamento conservador com bloqueio intermaxilar por seis semanas sem fisioterapia para evitar mobilidade do foco.
- c) Analgésicos e dieta líquida por quatro semanas, pois a fratura tende à consolidação espontânea.
- d) Redução fechada com contenção extraoral elástica e limitação de abertura por oito semanas para proteger o segmento.

53) Na cirurgia pré-protética para prótese total imediata na maxila com tuberosidades volumosas e freio labial alto, assinalar a alternativa que melhor prepara o leito protético.

- a) Redução generalizada da crista com osteotomia em bloco igualando ao assoalho do seio maxilar.
- b) Frenotomia ampla com remoção de fibras do orbicular para reduzir mobilidade e aumentar estabilidade.
- c) Vestibuloplastia com enxerto de pele total em toda a arcada para ampliar o fundo de sulco de modo uniforme.
- d) Redução seletiva de tuberosidades por osteoplastia e reposicionamento do freio preservando faixa de mucosa queratinizada.

54) Mulher com dor pré-auricular, estalido na abertura e desvio ipsilateral, com imagem de deslocamento do disco com redução e sinovite discreta. Considerando o exposto, assinalar a alternativa que apresenta a conduta inicial mais indicada.

- a) Bloqueio intra-articular com corticosteroide de depósito isolado e mastigação forçada para alongamento ligamentar.
- b) Placa rígida inferior de avanço contínua por 24 horas e exercícios resistidos vigorosos nas primeiras semanas.
- c) Indicação imediata de artroscopia para reposicionamento discal com sutura e remodelação condilar.
- d) Placa estabilizadora ajustada, analgesia, terapia manual com treino de abertura controlada e progressão gradual de carga mastigatória.

55) Sobre enxertos em reconstrução de rebordo para implantes, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Enxerto autógeno apresenta ação unicamente osteoindutora e carece de osteocondução, exigindo membrana não reabsorvível em todos os casos.
- b) Xenógenos particulados funcionam como arcabouço osteocondutor de lenta remodelação e favorecem manutenção volumétrica em aumento de rebordo.
- c) Alógenos mineralizados reabsorvem por completo em quatro semanas, com perda volumétrica previsível e reintervenção ampla.
- d) Aloplásticos de beta-tricálcio-fosfato dispensam estabilidade da membrana por integram-se rapidamente ao leito receptor.

56) Paciente em uso de varfarina com INR de 3,2 e sem sangramentos prévios necessita exodontia simples de dois molares. Assinalar a alternativa que apresenta a conduta alinhada às diretrizes.

- a) Suspender varfarina por cinco dias e iniciar heparina de baixo peso molecular em domicílio para reduzir risco trombótico.
- b) Reduzir a dose de varfarina por três dias e realizar exodontia com suturas compressivas e curativos hemostáticos.
- c) Manter anticoagulação e realizar exodontia com medidas locais de hemostasia desde que o INR permaneça até 3,5.
- d) Adiar o procedimento até que o INR seja inferior a 1,5 para minimizar possibilidade de sangramento.

57) Sobre retenção e tracionamento de canino superior impactado, analisar os itens.

- I. Exposição fechada com tração por botão favorece emergência no centro da faixa de mucosa queratinizada.
- II. O vetor inicial deve ser coronal e levemente distal para reduzir risco de reabsorção do incisivo lateral adjacente.
- III. A ancoragem precisa de planejamento segmentado e reforço mecânico para controlar deslocamentos indesejados.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

58) Com relação à fisiopatologia da dor neuropática orofacial, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) A sensibilização central com perda de inibição descendente explica alodinia e hiperpatia em neuralgia pós-trauma do trigêmeo.
- b) A ativação de nociceptores polimodais de fibras A-beta responde pelo padrão em choque da neuralgia do trigêmeo clássica.
- c) A primeira linha terapêutica da neuralgia do trigêmeo é gabapentina, por bloquear canais de sódio voltagem-dependentes.
- d) A desmielinização por compressão vascular torna a falência de sinapses inibitórias no núcleo caudado patognomônica.

59) Sobre reparação tecidual, analisar os itens.

- I. Durante a primeira semana da cicatrização alveolar, ocorre intensa deposição de osteoide e epiteliação completa.
- II. Na cicatrização óssea por intenção secundária, tanto osteoblastos quanto osteoclastos participam ativamente das etapas de reabsorção e deposição óssea.
- III. Durante a fase de fibroplasia na reparação óssea, há proliferação de células osteogênicas do periosteio e da medula óssea, que se diferenciam em osteoblastos, osteoclastos e condroblastos.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens II e III.
- c) Apenas no item III.
- d) Em todos os itens.

60) Com relação às infecções bucais, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () A maioria dos procedimentos odontológicos em pacientes, mesmo nos saudáveis, exige profilaxia antibiótica para evitar infecções pós-operatórias.
- () A clindamicina é uma excelente opção alternativa para profilaxia antibiótica, pois pode ser considerada também um antimicrobiano predominantemente bactericida.
- () As bacteremias decorrentes de escovação dentária são menos frequentes do que aquelas causadas por extrações dentárias.

- a) C - C - C.
- b) E - E - C.
- c) C - C - E.
- d) E - E - E.

61) Sobre os cuidados pré-operatórios referentes a pacientes com condições médicas comprometidas, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () A ortopneia e a dispneia paroxística noturna são manifestações clássicas da insuficiência cardíaca congestiva.
- () O uso de anestésicos locais com epinefrina é absolutamente contraindicado em pacientes com angina estável.
- () A asma é uma contraindicação absoluta ao uso de óxido nítrico em procedimentos odontológicos.

- a) C - E - E.
- b) E - C - C.
- c) C - C - C.
- d) E - E - E.

62) Paciente do sexo masculino de 35 anos de idade compareceu para consulta odontológica portando um raio-X periapical do 35 desejando extraí-lo. Ao exame clínico, o dentista notou um remanescente de coroa bom e, ao exame radiográfico, notou a porção radicular e estrutura óssea alveolar dentro dos padrões normais anatômicos. Qual é a técnica exodôntica de primeira escolha?

- a) Exodontia com fórceps.
- b) Exodontia com alavancas.
- c) Exodontia com osteotomia.
- d) Exodontia com odontossecação.

63) A respeito do procedimento de curetagem do alvéolo pós-exodontia, analisar os itens.

- I. É sempre necessário.
- II. Deve abranger todo o alvéolo.
- III. É realizado com movimentos firmes e vigorosos, buscando desinserir as lesões das paredes alveolares e removê-las.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Apenas nos itens II e III.

64) Paciente do sexo masculino de 56 anos de idade chegou para consulta odontológica queixando-se de uma lesão no lábio. Na anamnese, disse que era agricultor há mais de 30 anos e relatou que a lesão não doía e que estava presente há uns três meses. Clinicamente a lesão estava endurecida, com crosta e uma área de espessamento de 1cm no lábio inferior. Qual é o diagnóstico mais provável?

- a) Carcinoma escamoso.
- b) Herpes.
- c) Leucoplasia sifilítica.
- d) Candidose crônica.

65) Sobre bases farmacológicas e clínicas das anestésias locais em odontologia, analisar os itens.

- I. A articaína a 4% difunde mais no osso alveolar que a lidocaína a 2%, favorecendo infiltração posterior superior.
- II. A prilocaína associa-se à meta-hemoglobinemia em doses altas ou em predisposição, com cautela na deficiência de G6PD.
- III. A bupivacaína a 0,5% tem maior cardiotoxicidade dose-dependente e latência mais longa, com uso seletivo em cirurgias extensas.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas nos itens I e II.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

66) Paciente do sexo masculino de 45 anos de idade procurou a Unidade Básica de Saúde a fim de fazer uma avaliação com dentista portando um raio-X panorâmico. Na consulta, o dentista observou ao raio-X uma lesão osteolítica na maxila, em região de pré-molares no lado esquerdo com limites bem definidos. Ao exame clínico, não observou nenhuma alteração. Na anamnese, o paciente disse não ter nenhuma sintomatologia. Qual é o provável diagnóstico?

- a) Odontoma.
- b) Fibroma.
- c) Ameloblastoma.
- d) Cisto dentígero.

67) Sobre a alveolite, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) É uma infecção pós-exodôntica que ocorre somente na mandíbula.
- b) É o mesmo que alvéolo seco.
- c) Não apresenta sintomas.
- d) Ocorre apenas por traumatismo exagerado na exodontia.

68) A mononucleose infecciosa é uma doença resultante da exposição ao vírus Epstein-Barr. A infecção ocorre usualmente pelo contato íntimo. Nesse sentido, sobre a mononucleose infecciosa, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) A disseminação intrafamiliar é rara.
- b) Os adultos usualmente contraem o vírus pela transferência direta da saliva.
- c) A exposição ao vírus durante a infância é sempre sintomática.
- d) O vírus não tem o poder de permanecer no hospedeiro por toda a vida.

69) Sobre as terapêuticas medicamentosas em infecções odontogênicas, analisar os itens.

- I. Antibióticos indicam-se em abscessos localizados drenados e sem sinais sistêmicos no atendimento inicial.
- II. Amoxicilina com ácido clavulânico é opção após falha clínica com amoxicilina, visando ao combate a produtores de beta-lactamase.
- III. Clindamicina é alternativa em alérgicos à penicilina, com atenção ao risco de colite por *Clostridioides difficile*.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

70) Terceiro molar inferior incluso em proximidade ao nervo alveolar inferior, com parestesia intraoperatória, requer decisão prudente. Com relação à conduta que preserva estruturas nobres, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Prosseguir com luxação vigorosa para vestibular e finalizar a exodontia sob irrigação copiosa para encurtar o tempo cirúrgico.
- b) Interromper manobras, estabilizar o campo, irrigar suavemente e optar por coronectomia com regularização das bordas e seguimento neurossensorial.
- c) Ampliar ostectomia lingual para expor ápices e liberar fragmentos com alavanca reta longa sob visão direta.
- d) Aprofundar a odontosecção separando o terço apical e inclinar o dente para distal com alavancas progressivas.

71) Em relação ao tema anestesiologia e técnicas anestésicas, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Uma das formas de se evitar complicações como o trismo é a utilização de infiltrações locais ao invés de bloqueios regionais sempre que possível.
- () Tanto a administração de adrenalina quanto a de noradrenalina são absolutamente contraindicadas a pacientes que fazem uso de antidepressivos tricíclicos.
- () Na presença de coagulopatias ou outros transtornos hemorrágicos, uma das técnicas anestésicas que deve ser evitada é a técnica supraperióstea.

- a) C - E - C.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) C - C - E.

72) Sobre ergonomia e instrumentação em clínica de alta demanda, analisar os itens.

- I. Pega em lápis modificada com apoio do anelar melhora a precisão e reduz carga dos flexores do antebraço.
- II. Posição do operador entre nove e doze horas reduz flexão cervical quando combinada à visão indireta e iluminação coaxial.
- III. Encosto com inclinação intermediária durante procedimentos mandibulares auxilia drenagem e visibilidade quando integrado à sucção eficiente.
- IV. Manter punho em desvio ulnar favorece estabilidade fina por longos períodos em regiões posteriores.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I, II e III.
- c) Apenas nos itens III e IV.
- d) Em todos os itens.

73) Considerando a macro-higiene, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

- (1) Zona estéril.
- (2) Zona higiênica.
- (3) Zona limpa.
- () Ambiente do consultório e salas de uso comuns.
- () Sala de cirurgia ou odontológica.
- () Ambiente ao redor da cadeira do paciente.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 1 - 3 - 2.
- d) 2 - 1 - 3.

74) Em conformidade com os retalhos mucoperiósteais, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Nesse procedimento, o perióstio não é refletido junto com o retalho.
- b) O tecido é separado de forma adjacente ao perióstio.
- c) Consistem em levantar a mucosa junto com o perióstio, separando-o da superfície óssea.
- d) É o retalho de primeira escolha para vestibuloplastia submucosa.

75) Assinalar a alternativa que apresenta uma indicação das radiografias oclusais.

- a) Pesquisa de cálculos pulpares.
- b) Examinar adaptações marginais de restaurações interproximais.
- c) Visualizar cáries.
- d) Pesquisa de cálculos nos ductos salivares.

76) Assinalar a alternativa que indica um caso de emergência odontológica.

- a) Pericoronarite.
- b) Alveolite.
- c) Celulite difusa.
- d) Celulite subaguda.

77) Considerando primeiros socorros em consultório odontológico, sobre anafilaxia, analisar os itens.

- I. A posição supina com elevação de membros é recomendada, e gestante mantém decúbito lateral esquerdo.
- II. Anti-histamínicos e corticosteroides são adjuvantes após adrenalina e não substituem manejo de via aérea.
- III. A via intramuscular no vasto lateral apresenta absorção mais rápida que a subcutânea e é preferível no consultório.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

78) Lesão ulcerada indurada em borda lateral de língua com linfonodomegalia cervical unilateral impõe abordagem resolutiva. Assinalar a alternativa que expressa o protocolo diagnóstico adequado.

- a) Aguardar duas semanas com antisséptico tópico e reavaliar por provável trauma mastigatório.
- b) Realizar biópsia incisional na margem incluindo zona de induração e encaminhar para histopatologia com avaliação linfonodal.
- c) Executar biópsia excisional ampla com margens oncológicas e encaminhar diretamente para radioterapia.
- d) Solicitar ressonância magnética como exame único por substituir imunohistoquímica e estadiamento cervical.

79) Sobre transplante dental autógeno de pré-molar para substituir incisivo avulsionado, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) O melhor prognóstico ocorre com rizogênese completa porque reduz risco de anquilose pós-operatória.
- b) O tempo extra-alveolar pode ultrapassar 30 minutos em gaze seca quando há boa estabilidade no reimplante.
- c) A fase ideal situa-se entre metade e três quartos de raiz com ápice aberto para favorecer revascularização e reparo pulpar.
- d) A ferulização rígida por seis semanas é necessária para garantir cicatrização periodontal estável no pós-operatório inicial.

80) Em relação ao tema cuidados pós-operatórios, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Trismo pós-operatório é geralmente autolimitado e decorre de inflamação dos músculos da mastigação, tendo como destaque o músculo pterigoide medial.
- () A eficácia do controle de hemorragia depende da pressão localizada sobre o alvéolo, e não do tamanho da gaze.
- () Para a maioria das extrações de rotina, analgésicos potentes (opioides) são preferíveis ao uso rotineiro de anti-inflamatórios não opioides, devido à sua eficácia superior.

- a) C - E - C.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) C - C - E.